<36635356120011
<36635356120011
Bayer. Staatsbibliothek
E

E.
S. III.
174. a.

Zool 1281(2,1
Donndorff

Hist. naturalis
Regnum animale. De animalibus
in genere. System. 268.

Zool. No. 97.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

ZOOLOGISCHE
BEYTRÄGE
ZUR
XIII. AUSGABE
DES LINNEISCHEN
NATURSYSTEMS

VON
JOHANN AUGUST DONNDORFF.

ZWEYTER BAND
DIE VÖGEL.

ERSTER THEIL
RAUBVÖGEL, SPECHTARTIGE VÖGEL,
SCHWIMMVÖGEL UND SUMPFVÖGEL.

Leipzig,
in der Weidmannſchen Buchhandlung.
1794.

ORNITHOLOGISCHE
BEYTRÄGE

ZUR

XIII. AUSGABE

DES LINNEISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DONNDORFF.

ERSTER BAND

RAUBVÖGEL, SPECHTARTIGE VÖGEL,
SCHWIMMVÖGEL UND SUMPFVÖGEL.

Leipzig,
in der Weidmannschen Buchhandlung.
1794.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Vorrede.

Der erſte Band meiner zoologiſchen Beyträge iſt von dem Publico mit Beyfall aufgenommen worden. Die Erinnerungen, die man in verſchiedenen gelehrten Blättern wegen einiger Mängel gemacht hat, waren nicht ungegründet; ich hatte dies auch bereits in der Vorrede geſagt. Ein Werk von dieſer Art kann ſchlechterdings nicht ohne Mängel ſeyn, wenigſtens nicht ohne ſolche, als man in dem meinigen entdeckt hat, die ich ſelbſt nicht

 verkannt

verkannt habe. Billige Kunſtrichter haben dies auch eingeſehen, und mir Gerechtigkeit wiederfahren laſſen. Die mir gegebenen Winke ſollen von mir nicht unbenutzt bleiben, und ich werde das fehlende, ſo viel als möglich, in einem Supplementbande zu ſeiner Zeit nachzuholen und zu ergänzen ſuchen.

Da die Klaſſe der Vögel viel weitläuftiger, als die der Säugthiere iſt, ſo war es nicht möglich, alles dahin gehörige in Einen Band zu faſſen. Die Ornithologie erſcheint daher in zwey Theilen, und unter einem gedoppelten Titel, zum Beſten derer, die ſich etwa dieſe *allein* anzuſchaffen Willens ſind. Das Verzeichniſs ausländiſcher Synonymen und das Regiſter über das Ganze werden beym zweyten Theile erfolgen.

In

In Ansehung der Einrichtung habe ich natürlich den vorigen Plan beybehalten. *Lathams* Index ornithologicus, s. Systema ornithologiae etc. London 1790. Vol. I. II. gr. 4. enthält noch viele neuere *Gattungen* und *Spielarten*, die seit der Herausgabe des Gmelin-Linneischen Systems bekannt geworden sind. *Erstere* habe ich, wie vorhin bey den Säugthieren geschehen, allemal am Schluss eines jeden Geschlechts mit bemerkt, *letztere* aber den Gattungen, wohin sie gehörten, beygefügt, und mit einem * bezeichnet. Ich hätte gewünscht, dass ich auch von *Bechsteins* Uebersetzung der *Lathamschen* Synops. mehr Gebrauch hätte machen können. Aber es ist bis hieher nur der erste und zweyte Theil davon heraus; ich muss also das Uebrige im Supplementbande

nachholen. Von *Briſſon* wird man die franzöſiſchen Synonymen nach der Octavausgabe der Ornithologie, Lond. 1763. angeführt finden. Es iſt ein Fehler, daſs nicht eben dies bey den Säugthieren im erſten Bande beobachtet iſt.

Uebrigens wünſche ich nichts mehr, als daſs durch meine mühſame Arbeit, der einzige Zweck derſelben — die Erleichterung des Studiums der Zoologie — erreicht werden möge. Quedlinburg vor der Oſtermeſſe 1794.

Donndorff.

ZWEYTE KLASSE.

A V E S. (*Vögel.*)

ERSTE ORDNUNG.

ACCIPITRES. (*Raubvögel.*)

41. GESCHLECHT. VULTUR. *Der Geyer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 48. Gen. XLI.
Leske, Naturgeſch. I. p. 229. Gen. X.
Borowsky, Thierreich, II. p. 60. Gen. I.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 156. Gen. I.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 305. Gen. I.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 196. Gen. I.
Halle, Vögel, p. 184. Gen. II.
Pennant, arct. Zool. II. p. 184.
Onomat. hiſt. natur. VII. p. 845.
Klein, hiſt. av. prodr. p. 42.
Briſſon, ornithol. I. p. 130. Gen. X.
Batſch, Thiere, I. p. 285. Gen. L.
Latham, allgem. Ueberſicht der Vögel, I. p. 3. Gen. I.
Latham, Index ornithol. ſ. Syſt. ornithol. I. p. 1. Gen. I.
Hermann, tab. affin. animal. p. 170.
Donndorf, Handb. der Thiergeſchichte, p. 195. Gen. I.

1. Gryphus. *Der Condor.* (1)

Müller, Naturfyft. I. p. 49. n. 1. *der Cuntur.*

Leske, Naturgefch. p. 229. n. 1. *der Kuntur.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 62. n. 2. *Greifgeyer, Cuntur, Condor.*

Blumenbach, Handb. der Naturgefch. p. 156. n. 1. Vultur (Gryphus), caruncula verticali longitudine capitis; *der Condor, Cuntur, Greifgeyer.*

Bechftein, Naturgefch. I. p. 307. *der Cuntur, oder fo genannte Vogel Greif.*

Funke, Naturgefch. I. p. 312. *der Condor.*

Ebert, Naturlehre, II. p. 15. *der Cuntur.*

Halle, Vögel, p. 194. n. 131. *der Greif; mit einem Helmgewächfe.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 2. n. 2. *der Cuntur.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 512. *Greifgeyer.*

Onomat. hift. nat. III. p. 259. *der grofse peruvianifche Raubvogel, Condor genannt.*

Handb. der Naturgefch. II. p. 137. *der Cuntur.*

Klein, Vorbereitung zur Vögelhift. p. 86. n. 8. *Greifgeyer.*

Klein, verbefferte Vögelhift. p. 45. n. 8. *Greifgeyer.*

Briffon, ornithol. I. p. 137. n. 10. *le Condor.*

Büffon, Vögel, I. p. 245. *der Greifgeyer.*

Batfch, Thiere, I. p. 286. n. 2. *der Cuntur.*

Latham, Vögel, I. p. 5. n. 1. *der Kondur, Greiffgeyer.*

Latham,

(1) Der gröfste von allen *fliegenden* Vögeln. Hauptfächlich im weftlichen Südamerika. Gröfse und Stärke werden aber von einigen ganz übertrieben angegeben. Lebt meift vom Raube unter den Viehheerden und von todten Fifchen, die die See auswirft.

Latham, Syst. ornith. I. p. 1. n. 1. Vultur (Gryphus) maximus, caruncula verticali longitudine capitis, gula nuda.

Eberhard, Thiergeschichte, p. 69. *der weiss und schwarze Geyer, oder der Greif.*

Vidaure, Beschr. von Chile. p. 69. *Condoro.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amerika, p. 846. *der Condor.*

Condamine, Reisen, Erf. 1763. p. 261. *Condor.*

Tesdorpfs, Beschreibung des Kolibrits u. s. w. p. 20. n. 22. *Condor.*

Berlin. Samml. IV. p. 292. *der Contor.*

Goeze, Allerley, I. p. 143. II. p. 137. n. 1. III. p. 123. n. 7. *Condor.*

Dresdner g. Anz. 1761. St. 27 *Contur.*

Krünitz, Encyklop. XIX. Art. *Greif.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 255. *Cuntur.*

Meidinger, Vorles. über das Thierreich, p. 111. n. 1. *der Kunthur.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 86. n. 1. Vultur (*Gryphus*) maximus, caruncula verticali longitudine capitis.

Ludolf, Aethiop. II. p. 165. Contur.

Acosta, hist. des Indes p. 197.

Hermann, Tab. affin. anim. p. 172. *Gryphus.*

Jonston, av. p. 179. *Cuntur.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 195. n. 1. *der Condor.*

2. Bengalensis. *Der bengalische Geyer.* (²)

Latham, Vögel, I. p. 17. n. 16. *der Geyer aus Bengalen.* Tab. I.

(²) Soll, nach *Latham* a. a. O. das Weibchen von *Hasselquists Vultur Percnopterus* seyn. In dem *Syst. ornith.* ist er als eine

Latham, Syſt. ornith. I. p. 3. n. 4. β. Vultur nigricans, capite colloque denudatis; corpore ſubtus ſcapis pennarum albis.

3. PAPA. *Der Geyerkönig.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 54. n. 3. *der Kahlhals*, Tab. 1. fig. 1.

Leske, Naturgeſchichte, p. 230. n. 2. *der Geyerkönig.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 61. n. 1. *Geyerkönig; indian. Geyer; Kuttengeyer;* Tab. 1.

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 157. n. 2. Vultur (Papa) naribus carunculatis, vertice colloque denudato; *der Geyerkönig, Kuttengeyer, Sonnengeyer.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 307. *der Geyerkönig.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 312. *der Geyerkönig.*

Ebert, Naturl. II. p. 16. *Geyerkönig*, Tab. 23. fig. 1.

Halle, Vögel, p. 184. n. 123. *der Geyerkönig, mit dem Ritterbande.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 4. n. 3. *Mönchsgeier, Geierkönig, Kuttengeier, Sonnengeier.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 400. n. 3. *Geyerkönig.* Vultur monachus.

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 855. *der Geyerkönig.*

Klein, av. p. 46. n. 9. *Vultur Monachus. Rex Warwouwarum.*

Klein, Vorbereit. p. 88. n. 9. *Kuttengeyer, Mönch, König der Geyer.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 46. n. 9. *Kuttengeyer, Mönch, Geyerkönig.*

Briſſon,

eine Varietät von *Falco Leucocephalos* aufgeführt, und auch *Haſſelquiſts* Percnopterus dahin gerechnet.

Briſſon, ornitholog. I. p. 135. n. 1. le Roi des Vautours.

Büffon, Vögel, I. p. 226. *der Geyerkönig;* mit 1 Figur.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 3. *der Geyerkönig.*

Batſch, Thiere, I. p. 287. *der Kuttengeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 7. n. 3. *der Geyerkönig;* Titelkupf.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 4. n. 7. Vultur (Papa) rufeſcente-albus, naribus carunculatis, vertice colloque denudatis.

Berlin. Samml. IV. p. 173. *der Geyerkönig;* mit einer Figur.

Meidinger, Vorleſ. p. 111. n. 2. *der Geyerkönig.*

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 376. *der Geyerkönig.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 86. n. 3. Vultur (Papa) naribus carunculatis, vertice colloque denudato.

Laet, nov. orb. p. 232. *Coſquauthli.*

Nieremb. hiſt. nat. p. 224. Regina auratum.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 195. n. 2. *der Geyerkönig.*

4. Monachus. *Der arabiſche Geyer.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 56. n. 4. *der Kahlkopf.*

Onomat. hiſtor. natur. VII. p. 854. *der arabiſche Mönchsgeyer.*

Briſſon, Syſt. ornith. I. p. 138. n. 14. le Vautour d'Arabie.

Latham, Vögel, I. p. 8. n. 4. *der Mönch*, *der arabiſche Geyer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 5. n. 9. Vultur (Monachus) vertice gibboſo, corpore nigro.

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 100. Vultur *monacus*, vertice gibboso, corpore nigro, pedibus et cera rubicundis.

5. Aura. *Der Urubu.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 56. n. 5. *der Menschenfresser.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 63. n. 3. *der Menschenfresser, Urubu, brasilianische Geyer.*

Halle, Vögel, p. 192. n. 130. *der brasilianische Geyer.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 4. n. 5. *Menschenfresser, Kahlkopf, brasilianische Geyer.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 183. n. 1. *der Aasgeyer.*

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 400. n. 4. *brasilianischer Geyer.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 849. *der brasilianische Geyer, Dreckvogel, Luderrabe.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 246. *Urubu.*

Klein, av. p. 44. n. 7. Vultur brasiliensis Urubu dictus.

Klein, Vorbereit. p. 85. n. 7. *Kahlkopf.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 44. n. 7. *Kahlkopf.*

Brisson, ornithol. I. p. 135. n. 10. le Vautour du Bresil.

Büffon, Vögel, I. p. 234. *der brasilianische Geyer, Urubu;* m. 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 287. *der Urubu.*

Latham,

(3) Gewicht, nach *Catesby* und *Pennant*, vier und ein halbes Pfund. Hat einen sehr scharfen Geruch, und wittert das Aas in einer grossen Entfernung aus. Ist auch im wilden Zustande nicht scheu, und läst sich bey dem Fressen ganz nahe kommen.

Latham, Vögel, I. p. 8. n. 5. *Urubu, der braſilianiſche Geyer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 4. n. 8. Vultur (Aura) fuſco-griſeus, remigibus nigris, roſtro albo.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 12. *der indianiſche Buſſaar, oder Buſshart.*

Schöpf, Reiſe durch Nordamerika, II. p. 161. *der Buzard.*

Schlözer, Erdbeſchr. von Amerika, p. 748. *Gallinazo.*

Murr, Reiſen der Miſſionar. p. 223. *Gallinazo.*

Murr, Reiſ. d. Miſſ. p. 547. *Urubu.*

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 91. *der dunkelgraue Geyer mit ſchwarzen Flügeln, und einem weiſsen Schnabel?*

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 377. *der braſilianiſche Geyer, Urubu.*

Linné, Syſt. N. Ed. X. I. p. 86. n 4. Vultur (Aura) fuſco-griſeus, remigibus nigris, roſtro albo.

Jonſton, av. p. 202. *Urubu.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 196. n. 3. *der braſilianiſche Geyer.*

β. Jota. *Der Jote.*

Latham, Vögel, I. p. 10. not. *.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 5. n. 8. β niger, remigibus fuſcis, roſtro cineraceo.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 196. *der Jote.*

6. Cinereus. *Der gemeine Geyer.* (+)

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 306. n. 1. *der gemeine Geyer.*

(+) Nährt ſich zwar hauptſächlich von Aas; ſtöſst aber auch auf Rehe, Ziegen, Schafe, Haſen u. dgl. und iſt ſo gefräſsig und

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 197. n. 1. *der gemeine Geyer.* p. 199. *der Geyer, grosse Geyer, braune Geyer, graue Geyer*; Tab. 8.

Ebert, Naturl. II. p. 18. *der schlechtweg sogenannte Geyer.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 155. *der gemeine Geyer.*

Klein, av. p. 44. n. 4. Vultur cinereus.

Klein, Vorbereit. p. 84. n. 4. *grauer Geyer, graue Weihe.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 44. n. 4. *grauer Geyer.*

Brisson, ornithol. I. p. 130. n. 1. le Vautour.

Büffon, Vögel, I. p. 202. *der grosse, gemeine Geyer*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 13. n. 8. *der grosse Geyer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 1. n. 2. Vultur (cinereus) fusco - nigricans, remigibus rectricibusque cinerascentibus, pedibus pennatis.

Bechstein, Musterung schädl. Thiere p. 55. n. 1. *der gemeine Geyer.*

Jonston, av. p. 17. Vultur cinereus.

8. Fuscus. *Der braune Geyer.* (5)

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 400. n. 1. *der braune Malthesergeyer.*

Büffon,

und auf seinen Raub so sehr erpicht, daſs er sich leicht dabey fangen und schieſsen läſst.

(5) Bey *dieser* und den *beyden* folgenden Gattungen herrscht in Ansehung der Synonymen grosse Verwirrung, da es von ihnen, so wie von der *vorhergehenden*, noch nicht völlig ausgemacht ist, ob sie wirklich besondere Gattungen, oder nur Spielarten von *V. Percnopterus* sind. Ist dieſs nicht, so sind auch die Synonymen, die der Uebersetzer von *Cetti* in den Noten angeführt hat, unrichtig.

Büffon, Vögel, I. p. 214. *der braune oder Maltheſergeyer;* m. 1 Fig.

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 376. *der braune oder Malthefer Geyer.*

Briſſon, av. I. p. 130. n. 2. le Vautour brun.

Latham, Vögel, I. p. 14. n. 9. *der Maltheſer-Geyer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 5. n. 10. Vultur (Fuſcus) fuſcus, remigibus nigricantibus, primoribus apice albis, fuſco-maculatis, pedibus nudis.

Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 3. *der Greif.*

Jonſton, av. p. 15. Heteropos?

9. Niger. *Der ſchwarze Geyer.*

Büffon, Vögel, I. p. 197. *ſchwarzer Geyer.*

Briſſon, ornith. I. p. 131. n. 4. le Vautour noir.

Latham, Vögel, I. p. 14. n. 10. *der ſchwarze Geyer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 6. n. 11. Vultur (Niger) niger, remigibus rectricibusque fuſcis, pedibus pennatis.

Cetti, Naturgeſch. von Sardin. II. p. 9. *der ſchwarze Geyer.*

Boswell, Beſchr. von Corſica, p. 45. *der Geyer.*

10. Leucocephalus. *Der weiſsköpfige Geyer.* (6)

Klein, av. p. 44. n. 5. Vultur albicans?

Klein, Vorbereit. p. 84. n. 5. *weiſser Geyer, Hünerweihe, weiſser Hünerahr?*

 Klein,

(6) Hält ſich haufenweiſe mit andern Gattungen ſeines Geſchlechts bey Aeſern auf, ſoll aber beſonders ſein Vergnügen an Menſchenkothe finden.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 44. n. 5. *weißer Geyer?*

Büffon, Vögel, I. p. 210. *der kleine Geyer.*

Batsch, Thiere, I. p. 290. *der norwegische Bergadler.*

Brisson, ornith. I. p. 134. Vautour à tête blanche.

Latham, Vögel, I. p. 12. n. 7. Var. A. *der aschgraue Aasgeyer; der Geyer aus Norwegen.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 2. n. 4. Falco (Leucocephalus) corpore fuliginoso maculis rufis; capite, collo basique caudae albis.

Lapeirouse, neue schwed. Abh. III. p. 100. *Vultur leucocephalus.* Rostrum elongatum, corneum, Irides caeruleae. Caput nudum, croceum, uti et cera et guttur, villis raris albis adspersum. Corpus albo-fuscum. Ventriculus nudus, prominens, croceus. Remiges nigrae. Pedes elongati, nudi, cinerascentes.

11. Fulvus. *Der braunrothe Geyer.* (7)

Ebert, Naturl. II. p. 18. *der braunrothe Geyer.*

Halle, Vögel, p. 190. n. 128. *der graurothe Geyer.* Fig. 10.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 398. n. 3. *der braunrothe Geyer.*

Büffon, Vögel, I. p. 193. *der braunrothe Geyer;* m. 1 Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 133. le Vautour fauve.

Latham, Vögel, I. p. 15. n. 11. *der rothgelbe Geyer, der Greif.*

Latham,

(7) Länge, nach *Brisson*, 3 Fuſs, 6 Zoll; Flügelweite 8 Fuſs. Nährt sich auf den samamissischen Alpen von allerley Sorten Aas, und wird von den dasigen Einwohnern *Dal* genennet, welche sich seines Fetts statt einer Salbe bedienen, wenn sie mit Gliederreissen behaftet sind.

Latham, Syst. ornith. I. p. 6. n. 12. Vultur (Fulvus) griseo-fuscescens, capite, collo et torque albis, remigibus rectricibusque nigris.

7. PERCNOPTERUS. *Der Aasgeyer.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 59. n. 7. *der Erdgeyer.*

Leske, Naturgesch. p. 230. n. 4. *der Erdgeyer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 65. *der egiptische Erdgeyer, heilige Geyer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 257. n. 4. Vultur (Percnopterus) remigibus nigris, margine exteriore, praeter extimas, canis; *der Aasgeyer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 308. n. 5. *der Aasgeyer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 313. *der Aasgeyer.*

Ebert, Naturl. II. p. 20. *der Erdgeyer.*

Halle, Vögel, p. 192. n. 129. *der Geieradler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 6. n. 7. *der Aasgeier, Erdgeier.*

Beckmann, Naturhist. p. 37. *der ägyptische Erdgeyer.*

Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 400. n. 2. *der ägyptische Geyer.*

Onomat.

(8) Die Verwechselung der Synonymen bey dieser Gattung so wohl an sich, als auch zwischen ihr und dem *Falco Barbatus* (Syst. p. 252. n. 38.) ist grofs, und die Beschreibungen in Ansehung der Gröfse, des Ansehens, des Vaterlandes, u. s. f. sehr verschieden. *Lathams* Beschreibung, den ich im System nicht angeführt finde, palst offenbar zu dem *Percnopterus*, aber er zieht Brissons *Vultur alpinus* mit hieher, der im System a. a. O. zu *Falco Barbatus* gerechnet wird, obgleich *Linné* ihn in der XII. Edition noch zu seinem *Percnopterus* rechnete; wohin er auch sammt *Ray's* und *Willughby's* Percnopterus wohl zu gehören scheint. Nach *Lapeirouse* ist weder das Männchen ganz weifs, noch das Weibchen ganz braun, die Jungen aber weifslich u. s. w.

Onomat. histor. nat. VII. p. 858. *der Geyeradler, der ägyptische Erdgeyer.*

Klein, av. p. 44. n. 6. Vulturina Aquila.

Klein, Vorbereit. p. 85. n. 6. *Geyeradler, Bastardadler.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 44. n. 6. *Adlergeyer, Bastartadler.*

Büffon, Vögel, I. p. 190. *der Geyeradler.*

Batsch, Thiere, I. p. 287. *der Erdgeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 11. n. 7. *der Aasgeyer, Geyeradler, Alpengeyer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 2. n. 3. Vultur (Percnopterus) remigibus nigris, margine exteriore, praeter extimas, albis.

Eberhard, Thiergesch. p. 68. *der egypt. Geyer.*

Schwed. Abhandl. XIV. p. 203. *ägyptische Bergfalke.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 99. Vultur (Percnopterus), auribus denudatis, claviculis prominentibus, remigibus nigris, secunda breviore?

Bruce, Reise nach d. Quellen des Nils, V. p. 167. Tab. 33. *Rachamah.*

Hasselquist, Reise nach Palästina, *Edit. german.* p. 286. n. 14.

Goeze, All. II. p. 139. n. 3. *der Aasgeyer.*

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 372. *der Geyeradler, oder Bastardadler.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 1. Falco capite nudo albicans.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 87. n. 6. Vultur (Percnopterus) remigibus nigris, margine exteriore (praeter extimas) canis.

Hermann, tab. affin. animal. p. 172. V. Percnopterus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 196. n. 4. *der Aasgeyer.*

β. *Büffon*, Vögel, I. p. 216. *der egyptische Erdgeyer.*

Brisson, ornitholog. I. p. 131. n. 3. le Vautour d'Egypte.

Latham, Vögel, I. p. 13. n. 7. Var. B. *der egyptische Aasgeyer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 2. n. 2. β. V. rufo-cinereus, fusco maculatus, pedibus nudis.

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 376. *der heilige ägyptische Geyer, ägyptischer Erdgeyer.*

Halle, Vögel, p. 186. n. 125. *der egiptische Erdgeier.*

Merrem, verm. Abh. p. 92. n. 3. V. *ägyptischer Geyerfalke.*

Jonston, av. p. 24. *Sacer Aegyptius.* Tab. 9. Abbild. schlecht.

12. Cristatus. *Der Hasengeyer.* (9)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 202. n. 3. *der Hasengeyer.* p. 204. *Aasgeyer, Kibgeyer, Roßgeyer, Gänseaar.*

Ebert, Naturl. II. p. 19. *der Hasengeyer.*

Halle, Vögel, p. 189. n. 126. *der Hasengeier.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 7. n. 8. *der Hasengeyer.*

Neuer

(9) In Deutschland giebt man Schlesien zu seinem Vaterlande an; eigentlich aber bewohnt er die südlichern bewachsenen Gebürge von Europa. Im Jahr 1513. fing man im Januar im Elsaß zwey solcher Vögel, und im folgenden Jahre traf man wieder einige in einem Neste auf einem sehr hohen dicken Eichbaum nicht weit von der Stadt Misen an. Seiner Gefräßigkeit ohnerachtet kann das Thier doch ohne Lebensgefahr an vierzehn Tage hungern.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 398. n. 4. *der Hasengeyer.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 135. *der Hasengeier.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 91. *Hasengeyer.*

Klein, av. p. 44. n. 2. Vultur Leporarius.

Klein, Vorbereit. p. 83. n. 2. *Hasengeyer, Gänseahr.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 44. n. 2. *Hasengeyer, Gänseahr.*

Brisson, ornith. I. p. 132. n. 6. *le Vautour hupé.*

Büffon, Vögel, I. p. 204. *der Hasengeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 15. n. 12. *der Haasengeyer, Gänseadler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 6. n. 13. Vultur (Cristatus) rutilo-nigricans, cristatus, pectore rufescente, pedibus nudis.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 259. n. 2. *Hasengeyer, Vogelgeyer.*

Naturforsch. VIII. p. 42. n. 2. *Hasengeyer.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 76. c. 116. *der Hasen-Geyer.*

Martini, Naturlex. I. p. 51. *Aasgeyer, oder Hasengeyer.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere. p. 97. n. 3. *der Hasengeyer.*

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 373. *der Hasengeyer oder Hasenstößer.*

Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, II. p. 527. n. 14. *Gans-Ahr.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 395. *der Hasen-Geyer.*

Merklein, Thierreich, p. 270. *Hasengeyer.*

Jonston, av. p. 18. V. Leporarius.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 197. n. 5. *der Hasengeyer.*

13. Bar-

13. BARBARUS. *Der Geyer aus der Barbarey.* (10)

Briſſon, ornith. I. p. 137. n. 13. le Vautour barbu?
Latham, Vögel, I. p. 10. n. 6. *der Bartgeyer, Goldgeyer?*
Latham, Syſt. ornith. I. p. 3. n. 5. Vultur (Barbarus) ex atro fuſcus, ſubtus albo-fuſceſcens, pedibus lanatis, digitis plumbeis, unguibus fuſcis.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 1. *der Bartgeyer?*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 202.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 120. n. 2. Vultur Harpya.	p. 251. n. 34. Falco Harpya.
p. 123. n. 6. Vultur Barbatus.	p. 252. n. 38. Falco Barbatus.
p. 123. n. 8. Vultur Albicilla.	p. 253. n. 39. Falco Albicilla.

In der XIIten Edition enthielt dies Geſchlecht acht Gattungen; von welchen nunmehro nach dieſem Verzeichniſs 3 unter das folgende Geſchlecht gebracht ſind. Da aber die XIIIte Edition demohnerachtet 13 Gattungen hat, ſo ſind 8 neue, als n. 2. 6. 8. 9. 10. 11. 12. und 13. hinzugekommen; überdem aber bey der 5. und 7. zwey Varietäten aus einander geſetzt; wovon die bey erſterer ganz neu, bey der letztern aber nur die Synonymen getrennt ſind.

B. *Un-*

(10) Ich habe das franzöſiſche Synonym aus *Briſſon*, und die deutſchen aus *Lathams* Ueberſetzung hier angeführt, weil ich ſie im Syſtem ſelbſt bemerkt finde. Aber ſollten nicht beyde, und auch *Edward's bearded Vulture* zu *Falco Barbatus* p. 252. n. 38. gehören? da zumal bey der Var. β daſ. *Lathams Golden Vulture* n. 13. angeführt iſt, der ohnſtreitig mit ſeinem *Bearded Vulture* n. 6. einerley iſt. Was übrigens von *Edward* gilt, muſs auch von *Seligmann* gelten.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Vultur (Arrian)* fuscus, collo dimidio pedibusque nudis caerulescentibus. *Auf den Pyrenäen.*
 Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 100.

2. *Vultur (Stercorarius)* albidus, capite, cera et gibbo nudis croceis; remigibus nigris; pedibus nudis cinerascentibus. *Auf den Pyrenäen, wo er Alimoch heißt.*
 Lapeirouse, a. a. O.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Geyer aus Pondischery.*
 Latham, Vögel, I. p. 21. n. 21.
 Latham, Syst. ornith. I. p. 7. n. 14. Vultur (Ponticerianus) niger, capite colloque subdenudatis, incarnatis; lateribus colli caruncula carnosa rubra.
 Sonnerat, voy. Ind. II. p. 182. le Vautour royal de Pondicheri. Tab. 104.

2. *Der indianische Geyer.*
 Latham, Vögel, p. 22. n. 22.
 Latham, Syst. ornith. I. p. 7. n. 15. Vultur (Indicus) fuscus, corpore supra fasciis pallidis, capite colloque denudatis, rufis, remigibus rectricibusque nigris.
 Sonnerat, l. c. p. 183. le grand Vautour des Indes, Tab. 105.

3. *Der Geyer aus Gingi.*
 Latham, Vögel, I. p. 22. n. 23.
 Latham, Syst. ornith. I. p. 7. n. 7. Vultur (Gingianus) albus, remigibus nigris; rostro pedibusque griseis.
 Sonnerat, l. c. p. 184. le Vautour de Gingi.

42. GESCHLECHT. FALCO. *Der Falk.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 62. Gen. XLII.
Leske, Naturgeſch. p, 231. Gen. XI.
Borowsky, Thierreich, II. p. 66. Gen. II.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 158. Gen. II.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 204. Gen. II.
Funke, Naturgeſch. I. p. 277. 281. und 312.
Ebert, Naturl. II. p. 22 ff.
Halle, Vögel, p. 174. Gen. I. p. 195. Gen. III.
Pennant, arct. Zool. II. p. 185.
Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 96. II. p. 750.
Onomat. hiſt. nat. I. p. 42. u. 616.
Klein, av. Prodrom. p. 47. Gen. I. Trib. 3.
Briſſon, ornithol. I. p. 89. Gen. VIII. p. 121. Gen. IX.
Batſch, Thiere, I. p. 285. Gen. LI.
Latham, allg. Ueberſ. der Vögel, I. p. 23. Gen. II.
Latham, Syſt. Ornith. I. p. 9. Gen. II.
Merrem, verm. Abhandl. p. 76.
Hermann, tab. affin. anim. p. 172.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 198 Gen. II.

* *Mit ſehr langen Füßen.*

33. SERPENTARIUS. *Der Sekretairvogel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p 158. n. 1. Falco (Serpentarius) cera alba, cruribus longiſſimis, criſta cervicali pendula, rectricibus intermediis elongatis; *der Secretair.*
Latham, Vögel, I. p. 17. n. 17. *der Secretair;* Tab. 2. (unter den Geyern.)
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 8. n. 21. Vultur (Serpentarius) plumbeus, occipite criſtato, pe-

dibus elongatis, remigibus, criſſo, femoribusque nigris, rectricibus intermediis longiſſimis.

Sparrmann, Reiſe n. d. Vorgeb. der g. Hoffn. p. 148. *der Secretairvogel.* p. 149. *Schlangenfreſſer.*

Boddaert, dierkundig Mengelwerk. Utrecht 1740. 4. p. 17. *Sagittarius.*

Beckmann, phyſikal. ökonom. Bibl. III. p. 76. *Sagittarius.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 198. n. 1. *der Sekretairvogel.*

** Geyeradler; *mit einem nur an der Spitze gebogenen Schnabel, und langen Bartborſten an der Wurzel.*

34. HARPYJA. *Der Heiduckenadler.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 53. n. 2. *der Räuber.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 68. n. 2. *der braſilianiſche Heiduckenadler.*

Ebert, Naturl. II. p. 27. *Haubenadler, gehäubte Adler.*

Halle, Vögel, p. 183. n. 121. *der braſilianiſche Heidukkenadler.*

Halle, Vögel, p. 183. n. 122. *der große amerikaniſche Stoßadler.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 83. n. 1. *Kronadler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 3. n. 3. *der Heiduckenadler.*

Onomat. hiſt. nat. I. p. 641. *Buſchadler, Kammadler, Kronenadler.*

Klein, av. p. 42. n. 8. Urutaurana, Urutavi Cuquichu Carririri.

Klein, Vorbereit. p. 81. n. 8. *Gehaupteter Adler.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 42. n. 8. *gehaubter Adler.*

Briſſon,

Briſſon, ornithol. I. p. 128. n. 13. l'Aigle hupé de Breſil.

Büffon, Vögel, I. p. 173. *der braſilianiſche Heiduckenadler;* m. 1 Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 291. *der Heyduckenadler.*

Latham, Vögel, I. p. 7. n. 2. *die Harpye, der Geyer mit dem Federbuſch.* (unter d. Geyern.)

Latham, Syſt. ornith. I. p. 9. n. 1. Falco (Harpyia) capite pennis elongatis criſtato, corpore vario, ſubtus albo.

Martini, Naturlex. I. p. 303. *der gekrönte afrikaniſche Adler.*

Molina, Naturgeſch. von Chili, p. 208. *der groſſe Adler.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 86. n. 2. Vultur (Harpyia) capite ſubcriſtato.

Jonſton, av. p. 198. Urutaurana.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 198. n. 2. *der Heiduckenadler.*

35. Jacquini. *Der Kronenfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 21. n. 20. *der Kronengeyer,* (unter den Geyern.)

Latham, Syſt. ornith. I. p. 9. n. 1 β. Falco criſtatus niger, ventre albo, femoribus albo-maculatis, cauda elongata, albo nigroque varia. *(als Variet. des vorigen.)*

36. Ambustus. *Der lohgelbe Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 16. n. 15. *der lohgelbe Geyer.* (unter den Geyern.)

Latham, Syſt. ornith. I. p. 8. n. 1. Vultur (Ambuſtus) luteo-fuſcus, orbitis antice nudis, gula pennis elongatis, cera ampla, pedibus caeruleſcentibus.

37. ANGOLENSIS. *Der Falk aus Angola.*
Latham, Vögel, I. p. 16. n. 14. *der Geyer aus Angola.* (unter den Geyern.)
Latham, Syſt. ornith. I. p. 7. n. 17. Vultur (Angolenſis) albus, orbitis nudis incarnatis, remigibus baſique caudae nigris.

38. BARBATUS. *Der Bartfalk.* (1)
Müller, Naturſyſtem, I. p. 57. n. 6. *Bartgeyer;* Tab. 1. fig. 2.
Leske, Naturgeſchichte, p. 230. n. 3. *der Bartgeier, Goldgeier, Lämmergeier.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 64. n. 4. *Lämmergeyer, Goldgeyer, Bartgeyer.*
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 157. n. 3. Vultur (Barbatus) roſtri dorſo verſus apicem gibboſo, mento barbato. *Lämmergeyer, Bartgeyer, Goldgeyer.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 306. *der Bartgeyer.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 199. n. 2. *der Bartgeyer.* p. 202. *Goldgeyer, Lämmergeyer, weiſsköpf. Geyer, Weiſskopf, Grimmer.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 313. *der Bartgeyer.*
Ebert, Naturl. II. p. 19. *der Bartgeyer.*
Halle, Vögel, p. 186. n. 124. *der goldbrüſtige Geier.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 5. n. 6. *Goldgeyer, Lämmergeyer, Bartgeyer.*

Neuer

(1) Das Weibchen legt 3 bis 4 Eyer, gröſser als Gänſeeyer, weiſs, von rauher Schale, und auf beyden Seiten ſcharf zugerundet. Man muſs dieſen Vogel der deutſchen Benennung halber nicht mit dem *Goldadler* verwechſeln. *Büffon*, und andere haben ihn mit dem *Condor* vermengt. Ueber die Verwechſelung der Synonymen bey dieſer Gattung, ſehe man bey dem vorigen Geſchlecht die Noten 8. und 10.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 400. *Bärtiger Geyer.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 852. *der Bartgeyer.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 131. *der Lämmergeyer.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 91. n. 1. *Lämmergeyer, Bartgeyer, Goldgeyer, Greifgeyer.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 46. n. 10. *bärtiger Geyer.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 133. n. 8. *le Vautour des Alpes?*

Büffon, Vögel, I. p. 196. *Goldgeyer.* p. 259. *der Lämmergeyer der Alpen.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 3. n. 6. Vultur (Barbatus) albido-rutilus, dorſo fuſco, taenia nigra ſupra et infra oculos.

Batſch, Thiere, I. p. 288. *der Bartgeyer.*

Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 17. *der Bartgeyer;* Tab. 1.

Bruce, Reiſe nach d. Quellen des Nils, V. p. 159. *Niſſerwerk, oder der Goldadler, Abou Douch'n.* Abbild. Tab. 31. ſchlecht. — Eine Abbild. des Kopfs aus dem Götting. Muſ. ebendaſ. zu Seite 249.

Pallas, Reiſ. Ausz. III. p. 185. *Bartgeyer.*

Beckmann, phyſik. ökon. Bibl. VII. p. 353. *Lämmergeyer.*

Goeze, All. II. p. 138. *der ſchweitzeriſche Lämmergeyer.*

Krünitz, Encykl. I. p. 417. *der Lämmer-Geier.* XVIII. p. 378. *Bartgeyer.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere p. 56. n. 2. *der Bartgeyer.*

Lapeirouſe, neue ſchwed. Abhandl. III. p. 99. Vultur (Barbatus), albo-ruféſcens, dorſo

 plumbeo,

plumbeo, coſtis plumarum albis; pedibus lanatis; gula barbata; capite linea nigra cincto.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 87. n. 5. Vultur (Barbatus) albidus, dorſo fuſco, iugulo barbato, roſtro incarnato, capite linea nigra cincto.

Hermann, tab. affin. animal. p. 172. n. 1. Vultur barbatus.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 199. *der Lämmergeyer.*

β. *Müller*, Naturſyſt. II. p. 58. *Goldgeyer.*

Klein, av. p. 43. n. 1. Vultur aureus.

Klein, Vorbereit. p. 83. n. 1. *Goldgeyer.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 44 n. 1. *Goldgeyer.*

Pallas, nord. Beyträge a. a. O. p. 64. *Goldgeyer.* p. 66. *Sach.*

Briſſon, ornith. I p. 132. n. 5. le Vautour doré.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 3. n. 6. β. Vultur rufus, dorſo nigro, capite et collo ſupremo ruſo-albis, remigibus rectricibusque fuſcis.

Breſsl. Natur- und Kunſtgeſch. 35. Verſ. 85.

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 373. *der Goldgeyer.*

γ. Falco (Magnus). *Der große Bartfalk.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 4. n. 6. β.

Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 89. n. 12. *Bart-Adler.*

39. Albicilla. *Der Fiſchadler.*(2)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 61. n. 8. *der Fiſchgeyer.*

Bechſtein,

(2) Bewohnt Europa bis Island und die Lapmark hinaus, und iſt in Grönland ſehr gemein. Er ſitzt auf den Felſen mit hangenden Flügeln, und fliegt langſam. Sein Neſt macht er auf

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 222. n. 4. *der Fischadler.* p. 226. *der große Fischadler, Gemsenadler, weißgeschwänzte Adler, Steingeyer, Weißkopf, Gelbschnabel, aschgraue Adler, Fischgeyer, (Schwalbengeyer.)*

Ebert, Naturl. II. p. 26. *der Fischadler?*

Halle, Vögel, p. 177. n. 115. *der weißköpfige Adler;* Fig. 8.

Merrem, verm. Abh. p. 87. n. 8. *Fischadler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 8. n. 9. *der Fischgeyer, Schwalbengeyer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 204. n. B. *der aschgraue Adler.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 98. *der Fischadler.*

Onomat. hist. nat. I. p. 648. *der weißgeschwänzte Adler.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 847. *der Fischgeyer.*

Klein, av. p. 40. n. 2. Aquila Pygangus; Albicilla, quibusdam Hinnularia?

Klein, Vorbereit. p. 77. n. 2. *Weißkopf, Gelbschnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 41. n. 2. *Weißkopf, Gelbschnabel, Weißschwanz?*

Brisson, ornithol. I. p. 123. n. 5. l'Aigle à queue blanche.

Büffon, Vögel, I. p. 125. *der Fischadler.*

Latham, Vögel, I. p. 32. n. 8. *der aschgraue Adler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 9. n. 2. Falco (Albicilla) cera pedibusque flavis, rectricibus albis, intermediis apice nigris.

auf hohen Klippen aus Zweigen, und futtert es in der Mitte mit Moos und Federn aus. Das Weibchen legt zwey Eyer, und brütet zu Ende des Mayes oder Anfang des Junius. Die Grönländer bekleiden sich mit der Haut dieses Vogels, essen das Fleisch, und tragen Füsse und Schnabel als Amulete.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 64. n. 32. *glattköpfiger Geyer.*

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 170. *Fiske-Oernen.*

Pontoppidan, Naturhist. von Dännemark, p. 165. n. 2. *Fischadler, weißköpfigter Adler.*

Leem, Nachricht von den Lappen, p. 126. Falco Albicilla.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 96. *der weißliche Adler, oder Weißschwanz.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 287. n. 52. *der Adlergeyer.*

Tengmalm, neue schwed. Abhandl. IV. p. 43. Falco Albicilla.

Bechstein, Musterung schädlicher Thiere. p. 62. *der Fischadler.*

Otto, neue Mannichfaltigk. IV. p. 443. *Gänseadler.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 17. n. 6. Pygangus.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 89. n. 8. Falco (Albicilla) cera flava, rectricibus albis, intermediis apice nigris.

Linné, Fn. Suec. II. p. 19. n. 55. Falco (Albicilla) cera flava, rectricibus albis, intermediis nigris.

Müller, zool. dan. prodr. p. 9. n. 58. Vultur (Albicilla) cera pedibusque flavis, rectricibus albis, intermediis apice nigris.

Kramer, Austr. p. 326. n. 3. Falco cera flava, rectricibus albis, versus apicem nigris. *Gamsen-Geyer.*

Fabric. Fn. Grönl. p. 53. n. 33. Vultur (Albicilla) cera pedibusque flavis, rectricibus albis, intermediis apice nigris.

Hermann, tab. affin. animal. p. 172. not. h. *Vultur Albicilla.*

Donn-

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 199. n. 4. *der aſchgraue Adler.*

*** Adler; *von vorzüglicher Größe, meiſtens mit befiederten Füßen.*

1. CORONATUS. *Der Haubenadler.* (3)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 62. n. 1. *der Haubenadler.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 164. n. IV. *gekrönter Adler.*

Briſſon, ornithol. I. p. 128. n. 14. l'Aigle hupé d'Afrique.

Büffon, Vögel, I. p. 175. *der Vogel der weſtlichen Küſte von Afrika, den Edwards unter dem Namen des gekrönten Adlers geliefert hat.*

Martini, Naturlex. I. p. 305. *gekrönter Adler.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 135. *der Haubengeier.*

Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 84. n. 1. *β. Haubenadler.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 1. *der gekrönte Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 24. n. 1. *der Kronenadler.*

Bruce, Reiſe nach den Quellen des Nils, V. p. 163. Tab. 82. *Niſſer - Tokoon? der ſchwarze Adler?*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 11. n. 6. Falco (Coronatus) cera ferruginea, pedibus lanatis, albis, nigro-punctatis, pectore ruſo, lateribus nigro-faſciatis.

(3) Wird von *Büffon* und *Merrem* mit *Falco Harpyia* für einerley gehalten.

40. Cheriway. *Der Cheriway.* (4)

Latham, Vögel, I. p. 21. n. 19. *der Cheriway.* (unter den Geyern.)

Latham, Syſt. ornith. I. p. 8. n. 20. Vultur (Cheriway) cera roſea, pedibus flavis, corpore ferrugineo, capite albido, vertice criſtato ferrugineo.

41. Tharus. *Der Tharu.*

Latham, Vögel, I. p. 24. not. *** *der Tharu.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 16. n. 24. Falco (Tharus) cera pedibusque luteis, corpore albo, nigreſcente, vertice criſtato.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 199. n. 5. *der Tharu.*

2. Melanaetos. *Der ſchwarzbraune Adler.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 63. n. 2. *der ſchwarze Adler.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 69. *Haſenadler, ſchwarzbrauner Adler.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 158. n. 2. Falco (Melanaëtos) cera lutea, pedibusque ſemila-

(4) Länge des Vogels, nach *Latham* anderthalb Fuſs, auch wohl drüber.

(5) Es iſt bey weitem noch nicht ausgemacht, ob dieſe Gattung von *Falco Fulvus* p. 256. n. 6. des Syſtems wirklich verſchieden, oder mit derſelben einerley ſey. Viele Ornithologen trennen ſie; Büffon aber und mehrere, auch von denen, die ich angeführt habe, nehmen beyde theils als Spielarten, theils nur als dem Geſchlecht nach von einander verſchieden, dieſe hier für das Männchen, jene für das Weibchen an. Wäre dieſs, ſo könnte man ihn mit Bechſtein *Falco Aquila* nennen, um hinführo Verwirrungen, wegen der zwey verſchiedenen lateiniſchen Benennungen zu vermeiden.

milanatis, corpore ferrugineo-nigricante, ftriis flavis; *der fchwarzbraune Adler.*

Bechftein, Naturg. I. p. 310. n. 2. *der gemeine Adler.*

Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 212. n. 2. *der gemeine Adler.* (mit Falco Fulvus verbunden.) p. 219. *Hafenadler, fchwarzbrauner Adler; gemeiner brauner Adler; kurzfchwänziger Steinadler; Kurzfchwanz mit weißem Ringe, weißgefchwänzter Adler, Stock- od. Steinadler.*

Funke, Naturgefch. I. p. 279. *gemeiner Adler.*

Ebert, Naturl. II. p. 23. *der gemeine Adler.*

Halle, Vögel, p. 180. n. 118. *der fchwarze Adler.*

Merrem, verm. Abh. p. 86. n. 6. *fchwarzer Adler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 10. n. 11. *der fchwarze Adler, Hafenadler.*

Onomat. hift. nat. I. p. 644. *der fchwarze Adler, Haafenadler.*

Handb. d. Naturgefch. II. p. 133. *der fchwarze Adler.*

Handb. der deutfchen Thiergefch. p. 92. *der gemeine Adler.*

Klein, av. p. 41. n. 4. Aquila Valeria f. Melanaetus.

Klein, Vorbereit. p. 78. n. 4. *Hafenadler, fchwarzer Adler.*

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 41. n. 4. *fchwarzer Adler, Hafenadler.*

Briffon, ornithol. I. p. 125. n. 3. l'Aigle noir.

Büffon, Vögel, I. p. 108. *der gemeine Adler.* Tab. 3. *der gemeine fchwarze Adler.*

Batfch, Thiere, I. p. 289. *der gemeine Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 25. n. 2. *der gemeine Adler, der fchwarze Adler.*

Latham, Syft. ornith. I. p. 10. n. 3. Falco (Melanaetos) cera lutea, pedibus femilanatis, corpore ferrugineo-nigricante, ftriis flavis.

Befeke,

Beſeke, Beyträge zur Naturgeſch. der Vögel Kurlands, p. 2. n. 1. *der ſchwarze Adler.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livl. p. 64. n. 33. *Haſenadler*, *ſchwarzer Adler.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 260. n. 4. *ſchwarzer Adler.*

Naturforſch. VIII. p. 43. n. 4. *der ſchwarze Adler.*

Martini, Naturlex. I. p. 306. *ſchwarzer Adler.*

Lapeirouſe, neue ſchwed. Abhandl. III. p. 101. Falco Melanaetos.

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 59. n. 5. *der gemeine Adler.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 68. *der ſchwarze Adler.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 21. *der Stockadler.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 460. *Haſenadler.*

Kraft, Ausrott. grauſ. Th. II. p. 520. *Melanectos oder Valeria.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 88. n. 1. Falco (Melanaetos) cera lutea, pedibus ſemilanatis, corpore ferrugineo-nigricante, ſtriis flavis.

Plin. hiſt. nat. Lib. I. c. 3. Melanaetes.

42. GLAUCOPIS. *Der blauſchnäblichte Adler.* (6)

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 234. *der weißköpfige Adler.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 16. n. 25. Falco (Glaucopis) cera et pedibus ſemilanatis citrinis, dorſo et pectore fuſco, capite et cervice ex flavicante albis, ſtriis fuſcis, remigibus nigris.

3. LEU-

(6) Die Beſchreibung iſt nur noch von einem einzigen und zwar von einem einjährigen Exemplare, das auf dem Dransberge bey Göttingen aus dem Neſte genommen und aufgezogen wurde, gemacht worden. Da aber faſt alle Raubvögel bis ins dritte Jahr ihre Farbe ändern, ſo iſt noch nicht gewiſs, ob es wirklich eine eigne Gattung, oder nur ein junger Vogel von einer andern, vielleicht vom Fiſchaar ſey.

3. LEUCOCEPHALUS. *Der weiſsköpfige Adler.* (7)

Müller, Naturſyſt. II. p. 64. n. 3. *der Weiſskopf.*

Halle, Vögel, p. 178. n. 116. *der weiſsköpfige Adler mit glattem Kopfe.*

Merrem, verm. Abh. p. 88. *β. der weiſsköpfige Fiſch-Adler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 187. n. 5. *der Adler mit dem weiſsen Kopfe.*

Onomat. hiſtor. nat. I. p. 632. *der weiſsköpfichte Adler, der kahle Adler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 11. n. 12. *der weiſsköpfige Adler.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 132. *der Weiſskopf.*

Klein, av. p. 40. ad n. 2. Aquila capite albo virginienſis.

Klein, Vorbereit. p. 78. ad n. 3. *ein glattköpfiger Adler.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 41. ad n. 2. *ein Adler aus Virginien und Carolina, deſſen Kopf, halber Hals und Schwanz weiſs ſind.*

Briſſon,

(7) *Pennant* ſagt: Dieſer Vogel begleitet gewöhnlich den Jäger und raubt ihm das erlegte Wildpret, ehe er es erreichen kann. Sie niſten in den gröſsten verdorrten Cypreſſen oder in Fichten, welche über die See oder groſse Flüſſe herabhangen, in Geſellſchaft des Balbuſard, Reigers und anderer Vögel. Ihre Neſter ſind ſo zahlreich, daſs ſie einem Dohlengeniſte ähnlich ſehen, ſind ſehr groſs, und ſtinken von den Ueberbleibſeln der Beute dieſer Vögel. — Sie ſollen ſehr oft brüten, und unter ihre kahlen Jungen ſchon wieder Eyer legen, welche die Wärme der Jungen ausbringt. — An der Hudſonsbay kommt der Vogel im May an, und bauet auf die höchſten Bäume. Den weiſsen Kopf und Hals ſoll er nicht vor dem zweyten Jahre bekommen. *Bechſtein* nimmt ihn als eine Varietät von *Falco Albicilla* an.

Brisson, ornithol. I. p. 122. n. 2. l'Aigle à tête blanche.

Büffon, Vögel, I. p. 126. *der weißköpfige Adler.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 2. *der Adler mit dem weißen Kopf.*

Latham, Vögel, I. p. 25. n. 3. *der weißköpfige Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 11. Falco (Leucocephalus) cera lutea, pedibusque semilanatis, corpore fusco, capite caudaque albis.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 265. n. 8. *der Weißkopf, Gelbschnabel, Fischadler.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 35. *Weißkopf.*

Cetti, Naturgesch. von Sardin. II. p. 31. *der weißgeschwänzte Adler.*

Boswell, Beschr. von Corsica, p. 45. *Adler?*

Martini, Naturlexicon, I. p. 298. *der weißköpfige Adler.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 8. *β.* Aquila capite albo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 200. n. 6. *der weißköpfige Adler.*

4. Ossifragus. *Der Seeadler.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 64. n. 4. *der Beinbrecher.*

Borowsky,

(8) Länge 3 Fuſs, 6 bis 10 Zoll. Flügelweite 8 Fuſs. Hält sich am liebsten nahe an den Ufern des Meers auf, verachtet aber auch das platte Land nicht, wenn fischreiche Flüsse, Seen und Teiche in der Nähe sind. Nährt sich besonders von grofsen Fischen, auf die er mit Ungestüm losstürzt; nimmt aber auch Lämmer, Hasen, junge Ziegen und Gänse mit sich fort. Horstet auf den höchsten Bäumen, besonders auf Eichen, macht ein ausserordentlich breites Nest; legt alle Jahr

Borowsky, Thierreich, II. p. 69. n. 4. *Beinbrecher, Meeradler.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 159. n. 4. Falco (Ossifragus) cera lutea, pedibusque semilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore albis; *der Fischadler, Beinbrecher.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 311. n. 3. *der Seeadler.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 219. n. 3. *der Seeadler.* p. 222. *Meeradler, Beinbrecher, großer Meeradler, großer Hasenadler, oder Hasenaar, Gänseadler, bartiger Adler, Fischadler, Skaft.* (in Thüringen *Steinadler.*)

Funke, Naturgesch. I. p. 278. *der Fischadler.*

Ebert, Naturl. II. p. 25. *der große Meeradler.*

Halle, Vögel, p. 181. n. 119. *der Meeradler.*

Merrem, vermischte Abhandl. p. 86. n. 7. *Beinbrecher.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 11. n. 13. *der Beinbrecher, Fischadler.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 185. n. 2. *der Seeadler.*

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 98. n. 3. *der große Meeradler oder Beinbrecher.*

Onomat. hist. nat. I. p. 645. *der Beinbrecheradler.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 133. *Beinbrecher.* Tab. IV. *Meeradler.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 93. *Fischadler, Beinbrecher.*

Klein, av. p. 41. n. 5. Aquila ossifraga.

Klein,

Jahr zwey grosse, abgerundete, schwere, schmutzigweisse und rothgefleckte Eyer, bringt aber oft nur Ein Junges aus, daher seine schwache Vermehrung. Das Fleisch der Jungen soll schmackhaft seyn.

Klein, Vorbereit. I. p. 79. n. 5. *Meeradler*, *Beinbrecher.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 41. n. 5. *Beinbrecher*, *Meeradler.*

Brisson, ornithol. I. p. 125. n. 9. le grand Aigle de mer.

Büffon, Vögel, I. p. 143. *der Beinbrecher.*

Batsch, Thiere, I. p. 291. *der Beinbrecher.*

Latham, Vögel, I. p. 26. n. 4. *der Seeadler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 12. n. 7. Falco (Ossifragus) cera lutea, pedibusque semilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore albis.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 4. n. 2. *der Beinbrecher.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 267. n. 5. *Beinbrecher*, *Gänseahr.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 34. *der Beinbrecher.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 316. *der große schwarze Adler.*

Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 357. *Meeradler.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 166. n. 16. *Gänseadler.*

Leem, von den Lappen in Finnmarken, p. 125. *der Landörn*, *Gaaseörn.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der weissschwänzige Adler.*

Martini, Naturlex. I. p. 292. *der Beinbrecher.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere. p. 60. n. 6. *der Seeadler.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 21. *der Beinbrecher.*

Kraft, Ausrott. grausl. Thiere, II. p. 521. *Stein- oder Beinbrecher.*

Her-

Hermann, Tab. affin. anim. p. 172. not. i. *Falco ossifragus.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 9. n. 58. Falco (Ossifragus) cera lutea, pedibus semilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere inferiore albis.

Jonston, av. p. 14. Ossifraga.

Plin. hist. nat. Lib. II. c. 3. Ossifraga.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 200. n. 7. *der Fischadler.*

5. Chrysaetos. *Der Goldadler.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 65. n. 5. *der Goldadler;* Tab. 28. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 232. n. 1. *der Goldadler; grosse Adler; Steinadler.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 66. n. 1. *der Goldadler, Steinadler, grosse Adler.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 158. n. 3. Falco (Chrysaëtos) cera lutea, pedibusque lanatis,

(9) Dieser Adler fliegt unter allen Vögeln am höchsten, daher ihn auch die Alten *Vogel des Himmels*, und bey ihren Wahrsagungen *Gesandten des Jupiters* nannten. Er nährt sich vom Raube kleiner Säugthiere, Hasen, Lämmer, junger Ziegen, Füchse, Gemsen und Vögel, als Gänse, wilder Hüner, Trappen, Kraniche, Störche. Liebt hohe gebirgigte Waldungen, und wird selten in Thälern angetroffen. Horstet auf den höchsten Felsen, auf hohen Tannen- und Fichtenbäumen, an unzugänglichen Orten. Macht ein flaches, 5 bis 6 Fuss breites Nest, von trocknen Stäben, Reisern und Ruthen, mit vielem Schilf, Heidekraut und Rasen bedeckt. Das Weibchen legt im März zwey grosse längliche, doch an beyden Enden stumpf zugerundete weisse, ungefleckte Eyer, und brütet 30 Tage. — Man hat Beyspiele, dass ein solcher Adler 21 Tage gehungert hat. — Soll über 100 Jahre alt werden können.

natis, luteo-ferrugineis, corpore fuſco, ferrugineo-vario, cauda nigra, baſi cinereo-undulata; *der Goldadler, Steinadler.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 309. n. 1. *der Goldadler.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 205. n. I. *der Goldadler.* p. 212. *Steinadler. groſser Adler, Landadler, Sternadler.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 279. *der Goldadler.*

Ebert, Naturl. II. p. 23. *der Goldadler.*

Halle, Vögel, p. 174. n. 114 *der Steinadler.*

Merrem, zool. Abh. p. 84. n. 2. *Goldadler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 12. *der Goldadler, Steinadler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 204. n. A. *der goldfarbige Adler.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 98. *der groſse Adler.*

Onomat. hiſt. nat. I. p. 635. *der Goldadler.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 133. *der Goldadler.*

Handb. der deutſchen Thiergeſchichte. p. 92. *der Goldadler.*

Klein, av. p. 40. n. 1. Aquila Chryſaëtos.

Klein, Vorbereit. p. 76. n. 1. *Gold-Steinadler.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 40. n. 1. *Goldadler, Steinadler.*

Briſſon, ornithol. I. p. 124. n. 7. l'Aigle doré.

Büffon, Vögel, I. p. 94. *der groſse Adler, der Steinadler.*

Batſch, Thiere, I. p. 289. *der Stein- oder Goldadler.*

Latham, Vögel, I. p. 27. n. 5. *der Goldadler.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 12. n. 8. Falco (Chryſaëtos) cera lutea, pedibusque lanatis, luteoferrugineis, corpore fuſco, ferrugineo-vario, cauda nigra, baſi cinereo-undulata.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 267. n. 7. a. *der Goldadler.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 36. *Goldadler.*

Lepechin, Tageb. der russischen Reise, I. p. 308. *Goldadler.*

Taube, Slavon. und Syrm I. p. 24. *Goldadler.*

Olaffen, Isl. I. p. 32. *der Adler.*

Pontoppidan, Naturhist. von Dännemark, p. 165. n. 1. *Landadler, Steinadler.*

Pallas, Reise, I. p. 235. — Ausz. I. p. 168. *Goldadler?*

Naturforsch. VIII. p. 44. n. 7. *Goldadler.*

Eberhard, Thiergesch. p. 68. *der Steinadler.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 2. n. 1. *Gold- Steinadler.*

Martini, Naturlex. I. p. 309. *Goldadler.*

Bechstein, Musterung schädlicher Thiere. p. 57. n. 4. *der Goldadler.*

Goeze, Allerley, II. p. 140. n. 4. *der Goldadler, Steinadler.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 321. *Adler, Steinadler, oder Gold-Königsadler.*

Beckmann, phys. ökon. Bibl. I. p. 187. III. p. 182. *Goldadler.*

Jablonsky, allgem. Lexicon, p. 20. *der Goldadler.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 345. *Adler, Steinadler.*

Meidinger, Vorles. I. p. 112. n. 1. *der Gold- Stein- oder grosse Adler.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 76. n. 114. *Steinadler.*

Merklein, Thierreich, p. 270. *der Steingeyer.*

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 4. Falco Chrysaëtos.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 88. n. 2. Falco (Chrysaëtos) cera lutea, pedibus lanatis, corpore fusco ferrugineo vario, cauda nigra, basi cinereo-undulata.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 9. n. 60. Falco (Chrysaëtos) cera lutea, pedibus lanatis, luteo-ferrugineis, corpore fusco ferrugineo vario, cauda nigra, basi cinereo-undulata.

Kramer, Austr. p. 325. n. 1. Falco cera lutea, pedibus lanatis, corpore rufo.

Hermann, tab. affin. anim. p. 172. *F. Chrysaëtos.*

Jonston, av. p. 11. Chrysaëtos.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 201. n. 8. *der Goldadler.*

β. *Der weiße Goldadler?*

Taube, Slavon. und Syrm. p. 25?

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 212?

6. Fulvus. *Der gemeine Adler.* (10)

Müller, Natursystem, II. p. 66. n. 6. *der gemeine Adler.*

Funke,

(10) Ich habe schon vorher, not. 5. bemerkt, dass diese Gattung von sehr vielen Ornithologen mit *Falco Melanaëtos* für einerley gehalten wird. Die lateinische Benennung *Chrysaëtos*, und die deutschen *Goldadler* und *Steinadler*, die diesem zuweilen beygelegt werden, haben so wie die Anführung des *weißen Schwanzes*, bey Bestimmung des Charakters, auch zu manchen Verwechselungen Anlass gegeben. Doch ist die Verbreitung des gemeinen Adlers beträchtlicher, als die des Goldadlers, seine Grösse aber merklich geringer. *Beseke* rechnet auch *Frischens braunfahlen Adler* Tab. 70 mit hieher, der im System p. 253. zu *F. Albicilla* n. 39. gezählt wird. *Pallas Goldadler* scheint freylich zur vorhergehenden Gattung zu *gehören*, da das Linneische *Chrysaëtos* dabey steht. Aber *Pallas*

Funke, Naturgesch. I. p. 279. *der braune Adler.*

Halle, Vögel, p. 179. n. 117. *der kurzſchwänzige Adler.*

Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 85. n. 3. *brauner Adler.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 13. n. 15. *der gemeine braune Adler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 186. n. 3. *der ſchwarze Adler.*

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 98. n. 2. *der braune Adler.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 132. *der gemeine Adler.*

Klein, av. p. 41. n. 3. Aquila ſimpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 78. n. 3. *Kurzſchwanz mit weiſsem Ringe.*

 Klein,

Pallas hat auch die katariſche Benennung *Bjurkut* hinzugefügt, und wenn man nach dieſer die Synonymen aus *Rytſchkow*, *Strahlenberg* und *Lepechin* vergleicht, ſcheinen ſie doch auf den *gemeinen Adler* zu gehen. Die Ornithologen mögen hier entſcheiden. Der gemeine Adler bewohnt die gebirgigten Waldungen, und liebt, wie der Goldadler, die Einſamkeit. Haſen ſind ſeine liebſte Speiſe. Fängt aber auch andere vierfüſsige Thiere, Vögel und Amphibien. In der Gefangenſchaft kann er ſehr lange hungern, und man hat Beyſpiele, daſs ſie fünf Wochen ohne Nahrung zugebracht haben. Niſtet auf Felſen und Bäumen. Das Neſt hat zwey Ellen ins Gevierte, und iſt flach, aus Stöcken, Heidekraut, Binſen und Reiſern zuſammen geſetzt. Das Weibchen legt zwey Eyer. Die Jungen ſind anfänglich wollig und weiſsgrau, werden hernach braun, und am Unterleibe weiſs und braunbunt. Erſt bey der dritten Federung erſcheint der röthlich weiſse Kopf, und der weiſse Schwanz, mit der ſchwarzen oder dunkelbraunen Schwanzſpitze. Die unabhängigen Tataren gewöhnen dieſen Adler zur Jagd auf Haſen, Füchſe, Antilopen, ja ſelbſt auf Wölfe, wie ſchon der groſse Reiſende *Marco Polo* 1269. bemerkt hat.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 41. n. 3. *Weiß-schwänzel.*

Brisson, ornith. I. p. 121. n. 1. Aigle.

Büffon, Vögel, I. p. 108. Tab. II. *der gemeine braune Adler.* (Edw. Fig.)

Latham, Vögel, I. p. 28. n. 6. *der Ringelschwanz-Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 10. n. 4. Falco (Fulvus) cera flava, pedibus lanatis, fusco-ferrugineis, dorso fusco, cauda fascia alba.

Beseke, Vögel Kurl. p. 5. n. 4 *der gemeine Adler.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 261. n. 6. *gemeiner Adler, Weisschwänzel.*

Fischer, Zusätze zur Naturgesch. von Livl. p. 43. n. 487. *Weisschwanz.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 30. *der gemeine Adler.* *

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 308. *braungelbe Falken.*

Lepechin, Tageb. der russ. R. II. p. 25. *Goldadler.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 168. *Goldadler.*

Rytschkow, orenb. Topogr. I. p. 242. *Berkuty.*

Rytschkow, orenb. Topogr. in *Büschings* Magaz. VII. p. 49.

Strahlenberg, Asien, p. 309. *Burkut.*

Carver, Reise durch Nordamerika, p. 384. *der Adler.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 101. Falco (Fulvus) cera flava, pedibusque lanatis, fusco-ferrugineis; dorso fusco, cauda fascia alba.

Perrault, Charras u. *Dodart*, Abh. zur Naturgesch. II. p. 29. anatomische Beschreib. dreyer Adler, Tab. 50. *der Adler;* Tab. 51. die Zergliederung.

Martini,

Martini, Naturlex. I. p. 306. *der braune Adler.*

Otto, neue Mannichfalt. IV. p. 442. n. 2. *brauner, mit ganz rauhen Füſsen.*

Oekonom. Zoologie, p. 62. n. 1. *der gemeine Adler.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 68. *der gemeine Adler.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 41. n. 3. Falco (Fulvus) cera flava, pedibus lanatis, dorſo fuſco, cauda faſcia alba.

Muſ. Worm. p. 292. Aquila.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 201. n. 6. *der gemeine Adler.*

β. Canadensis. *Der canadiſche Adler.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 77. *eine Nebenart des gemeinen Adlers.*

Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 85. γ. *der canadenſiſche Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 29. n. 6. A. *der weiſsgeſchwänzte Adler.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 11. n. 4. β. Falco cera flava pedibusque lanatis, corpore fuſco, cauda alba, apice fuſco.

Seligmann, Vögel, I. Tab. *der weiſsgeſchwänzte Adler.*

Ellis, Reiſe nach Hudſons Meerbuſen, p. 38. *der Adler mit dem weiſsen Schwanze.*

Gerin, ornith. I. p. 40. Tab. 7.

43. Leucogaster. *Der weiſsbäuchige Adler.* (1)

Latham, Vögel, I. p. 30. n. 7. a. *der Weiſsbauch-Adler.*

 Latham,

(1) Dieſe und die folgende Gattung, ingleichen die 67 u. 68. p. 264. werden von *Latham* als Spielarten von *Falco ferox*, p. 260. n. 59. angeſehen.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 13. n. 9. Falco (Leucogaſter) albus, dorſo, alis caudaque obſcure fuſcis, caudae apice albo, roſtro pedibusque flavis.

44. Japonensis. *Der japaniſche Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 30. n. 7. b. *der japaniſche Habicht.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 13. n. 10. Falco (Japonicus) cera obſcura, corpore fuſco, ferrugineo vario, remigibus caudaque obſcuris, ferrugineo maculatis.

45. Plancus. *Der ſchwarzgraue Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 30. n. 18. *der ſchwarzgraue Geyer.* (unter den Geyern.)

46. Americanus. *Der amerikaniſche Adler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 187. n. 4. *der Adler mit ſchwarzen Wangen.*

Latham, Vögel, I. p. 33. n. 10. *der amerikaniſche Adler.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 13. n. 12. Falco (Americanus) cera pedibusque lanatis, luteis, corpore nigro, capite, collo pectoreque cinereis, faſcia genarum transverſa nigra.

47. Albus. *Der weiße Adler.* (2)

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 132. *der weiße Adler.*

Onomat. hiſt. nat. I. p. 631. *der weiße Adler.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 212. *der weiße Adler.*

Klein,

(2) Nach *Bechſtein* u. a. eine Varietät von *Falco Chryſaëtos.*

Klein, Vorbereit. p. 80. n. 7. *weißer polnischer Adler.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 42. n. 7. *weißer Adler, polniſcher Adler.*

Briſſon, ornithol. I. p. 122. n. 3. Aigle blanc.

Latham, Vögel, I. p. 34. n. 12. *der weiße Adler.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 14. n. 16. Falco (Cygneus) totus albus.

Jonſton, av. p. 15. Aquila alba ſeu Cygnea.

48. CANDIDUS. *Der louiſianiſche Adler.* (3)

Pennant, arct. Zool. II. p. 188. n. 6. *der weiße Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 34. n. 13. *der louiſianiſche Adler.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 14. n. 17. Falco (Candidus) albus, remigibus apice nigris.

C 5 *Donn-*

(3) Das *Friedenszeichen* (Calumet of Peace), welches die Einwohner von Louiſiana aus den Schwungfedern dieſes Vogels machen, beſteht aus einer anderthalb Fuſs langen oder etwas längern Röhre oder Pfeiſe, die mit der Haut vom Halſe einer prächtig gefärbten Ente bedeckt wird: an dem einen Ende iſt eine Art von Fächer angebracht, der aus den Schwungfedern dieſes weiſsen Adlers beſteht, und beynahe die Form des vierten Theils eines Zirkels hat; an der Spitze jeder Feder iſt ein kleiner Buſch von rothgefärbten Haaren befindlich. Das andere Ende iſt unbedeckt, daſs man daraus rauchen kann. Der Kopf dieſer Pfeiſe iſt insgemein von weichem rothen Marmor gemacht. Ohne dieſs *Calumet* wird kein wichtiges Geſchäft vollbracht. Man ſieht es beſtändig beym Handel oder Tauſch, bey Zuſammenkünften, um Frieden oder Krieg zu beſchlieſsen, und ſelbſt in dem hitzigſten Gefechte. Wenn das Calumet angenommen wird, ſo iſt es ein Zeichen, daſs man in die vorgelegten Artikel einwilligt, ſchlägt man es aus, ſo iſt es wieder ein ſicheres Merkmal, daſs man ſie verwirft, u. ſ. w.

Donndorf, Handb. der Thiergefch. p. 202. n. 10. *der weiße Adler.*

49. NAEVIUS. *Der kleine Adler.* (4)

Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 226. n. 5. *der Schreyer.* (Planga und Clanga.) p. 228. *kleiner Adler, Steinadler, Entenadler, klingender Schellentenadler, Gänfeadler, gefleckter oder gefchäckter Adler, röthlicher Mäufeaar.*

Ebert, Naturl. II. p. 24. *der kleine Adler.*

Halle, Vögel, p. 182. n. 120. *der Entenadler.*

Merrem, verm. Abh. p. 86. n. 4. *Steinadler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 205. n. C. *der Schreyer.*

Onomat. hiftor. nat. I. p. 639. *der Entenadler, Fifchadler.*

Handbuch der Naturgefch. II. p. 133. *Schell-oder Entenadler.*

Klein, av. p. 41. n. 6. Aquila Clanga.

Klein, Vorbereit. p. 79. n. 6. *klingender Schellenten-Adler.*

Klein, verbefferte Vögelhift. p. 42. n. 6. *Schelladler, klingender Adler, Entenadler.*

Briffon, ornithol. I. p. 122. n. 4. Aigle tacheté.

Büffon, Vögel, I. p. 115. Tab. 4. *der kleine Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 35. n. 14. *der Steinadler, der Rauchfußadler.*

Latham,

(4) Man mufs die, zu diefer und der folgenden Gattung (wenn beyde wirklich von einander verfchieden find), gehörige Synonymen, forgfältig prüfen, um fie nicht zu verwechfeln; es ift aber fehr fchwer, fie vollkommen richtig aus einander zu fetzen. *Briffon*, *Büffon* u. m. der ältern und neuern Ornithologen vereinigen fie mit einander. Andere vermengen fie fogar mit *Falco Haliaetos*, p. 263. n. 26. Ueberhaupt ift die Hierakologie, oder die Naturgefchichte der Falkenarten, noch mit fehr vielen Schwierigkeiten verbunden.

Latham, Syst. ornith. I. p. 14. n. 18. Falco (Naevius) cera, iridibus pedibusque lanatis, luteis, corpore ferrugineo, rectricibus basi apiceque albis.
Batsch, Thiere, I. p. 289. *der kleine Adler.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 262. n. 7. *kleiner Adler, Steinadler, Entenadler.*
Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 28. *der kleine Adler.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Edit. in 4. p. 385. *der Enten-Adler.*
Steller, Kamtschatka, p. 193. Naevia?
Martini, Naturlex. I. p. 313. *der kleine Steinadler.*
Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 62. n. 8. *der Schreyer, Entenstößer.*
Plin. hist. nat. L. X. c. 3. *Morphnos?*

50. Maculatus. *Der gefleckte Adler.* (5)

Handb. d. Naturgesch. II. p. 133. *der fleckigte Adler.*
Latham, Vögel, I. p. 35. n. 15. *der gefleckte Adler.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 15. n. 19. Falco (Maculatus) cera pedibusque lanatis, luteis, corpore ferrugineo, subtus fusco, pennis axillaribus tectricibusque alarum apice macula ovata albida.
Jonston, av. p. 14. Morphno congener.

51. Albicaudus. *Der weißschwänzige Adler.* (6)

Borowsky, Thierreich, II. p. 70. n. 5. *der grosse Fischadler, Steingeyer?* (mit Falco Pygargus verwechselt.)

Ebert,

(5) S. die vorhergehende Anmerkung. *Latham* rechnet *Kleins* Aquila Clanga, *Pennants* Crying Eagle, und *Rajs* Morphno congener hieher.

(6) Auch diese Gattung wird häufig mit andern verwechselt und dadurch die genaue Berichtigung der Synonymen unendlich

Ebert, Naturl. II. p. 26. *der Fischadler.*

Klein, av. p. 40. n. 2. Aquila Pygargus, Albicilla quibusdam Hinnularia?

Klein, Vorbereit. p. 77. n. 2. *Weiſskopf, Gelbſchnabel?*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 41. n. 2. *Weiſskopf, Gelbſchnabel, Weiſsſchwanz?*

Briſſon, ornithol. I. p. 124. n. 6. le petit Aigle à queue blanche.

Büffon, Vögel, I. p. 125. *der kleine Fiſchadler.*

Naturforſch. VIII. p. 46. n. 9. *der Weiſskopf, Gelbſchnabel, Weiſsſchwanz, Fiſchadler?*

Latham, Vögel, I. p. 36. n. 16. *der braunfahle Adler.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 15. n. 20. Falco (Hinnularius) cera pedibusque nudis luteis, corpore ferrugineo, ſubtus nebuloſo, capite et collo caſtaneo-cineraſcentibus, cauda alba.

Jonſton, av. p. 13. Pygargus?

52. Gallicus. *Der franzöſiſche Adler* (7)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 70. *Moosweiher;* Jean le blanc; Tab. 27. fig. 2.

Borowsky,

lich erſchwert. Beſonders wird ſie mit *Falco Albicilla* und *Leucocephalus* vermengt, welche auch Büffon ſämmtlich als Spielarten von einer Gattung annimmt. Die Farbe des Schnabels, die nach dem Alter ſo ſehr veränderlich iſt, der weiſse Schwanz, der mehrern Gattungen gemein iſt, u. dgl. haben wohl oft Gelegenheit zu Verwechſelungen — auch wohl zu Beſtimmung neuer Gattungen gegeben, und auf die kahlen oder befiederten Füſse hat man vielleicht nicht immer Rückſicht genommen. Nach *Latham* ſoll ſogar *Friſch braunfahler Adler* hieher gehören. *S. vorher Note 10.*

(7) Soll auch, nach *Latham*, ſich häufig in den ſüdlichen Gegenden Ruſslands, beſonders am Düna- und Wolgaſtrom, nicht aber

Borowsky, Thierreich, II. p. 71. *St. Martin der Große, der weiße Hans.*

Handbuch d. Naturgesch. II. p. 137. *der Lerchengeier.*

Brisson, ornith. I. p. 127. n. 11. Jean-le-blanc.

Büffon, Vögel, I. p. 157. *der Lerchengeyer.* II. p. 13. *Lerchengeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 36. n. 17. *der französische Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 15. n. 21. Falco (Gallicus) rostro cinereo, pedibus nudis flavicantibus, corpore griseo-fusco, subtus (Mari) albido, maculis rufescente-fuscis.

Martini, Naturlex. I. p. 318. *der Lerchengeyer, der weißschwänzige Ritter.*

Beckmann, physik. ökon. Bibl. VI. p. 45. Jean-le-blanc.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 22. n. 11. *der Lerchengeyer.*

53. Australis. *Der Statenländische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 37. n. 19. *der Statenländische Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 16. n. 23. Falco (Australis) fuscus, cera flava, cauda nigra, apice lutescente.

54. Niger. *Der Adler mit schwarzem Rücken.*

Latham, Vögel, I. p. 39. n. 22. *der Adler mit schwarzem Rücken.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 16. n. 26. Falco (Melanonotus) cera pedibusque lanatis, luteis, capite, cervice, ventre et tectricibus alarum ferrugineis,

aber in Sibirien, finden, und die Kalmukken sich seiner zur Falkenjagd bedienen.

rugineis, gula, pectore, dorso remigibusque nigris.

55. Leucoryphos. *Der russische Adler.* (8)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 65. n. 33. *der russische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 39. n. 23. *der Adler mit dem weißen Wirbel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 17. n. 27. Falco (Leucoryphos) cera cinerea, pedibus semilanatis, albidis, corpore nebuloso-fusco, macula verticis trigona, gulaque tota alba.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 89. n. 11. *Weissfuss Adler.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 316. *eine noch unbeschriebene kleine Art, mit weissgefleckten Kopf.*

Pallas, Reise, Ausz. I. Anh. p. 2. n. 5. Aquila leucorypha.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 13. n. 19.

56. Mogilnik. *Der Mogilnik.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 86. n. 5. *hochbeinigter Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 40. n. 24. *der Mogilnick.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 17. n. 18. Falco (Mogilnik) cera lutea, pedibus lanatis, et reliquo corpore obscure ferrugineis, dorso albo admisto.

57. Cristatus. *Der Karakka.*

Latham, Vögel, I. p. 74. n. 64. *der Karakka.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 17. n. 29. Falco (Cristatus) capite cristato, dorso, alis gulaque

(8) Gewicht, nach *Pallas*, etwa sechs Pfund. Ist nach *Beseke* mit *Falco Haliaetus* einerley.

que nigris, abdomine albo, rectricibus fasciis quatuor cinereis.

58. Lagopus. *Der rauhbeinige Adler.*(9)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 228. n. 6. *der rauhbeinige Falk.* p. 229. *Scheerengeyer, Rauchfuß, Moosgeyer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 191. n. 8. *der Falk mit rauchen Beinen.*

Latham, Vögel, I. p. 67. n. 54. *der europäische Rauchfußfalke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 19. n. 33. Falco (Lagopus) cera pedibusque pennatis luteis, corpore fusco et albido vario, rectricibus fuscis, basi dimidia apiceque albis.

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 64. n. 10. *der rauhbeinige Falke.*

59. Ferox. *Der astrakanische Adler.*(10)

Latham, Vögel, I. p. 29. n. 7. *der Adler aus Astrakan.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 13. n. 11. Falco (Ferox) cera viridi, corpore supra fusco, dorso, abdomine et uropygio niveo, maculis castaneis vario, rectricibus aequalibus, fuscis, fasciis 4. obsoletis.

60. Ma-

(9) So lange er in den Waldungen sich aufhält, nährt er sich von Mäusen und kleinen Vögeln; im Herbst aber begiebt er sich oft in grosser Menge in die Ebenen, und stellt den Hasen, Rebhühnern, Tauben, Lerchen u. s. w. nach.

(10) Im System heisst es: *nec ipsa cadavera respuens.* In der Lathamschen Uebersetzung aber, die ich vor mir habe, steht: *er soll kein todtes Thier berühren.*

60. MARITIMUS. *Der Hühnergeyer von Java.*

Lichtenberg, Magaz. a. a. O. *Hühnergeyer*, *oder Hühnerdieb von Java.* Bey den Inländern: *Oelong-Oelong*, oder *Alap.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 20. n. 35. Falco (Maritimus) cera pedibusque flavis, corpore caudaeque apice albo, cruribus colore ex rubicundo et albido miſto.

61. AEGYPTIUS. *Der ägyptiſche Adler.*(1)

Latham, Vögel, I. p. 105. n. 108. *der arabiſche Hühnergeyer.*

Forskål, fn. arab. p. VI. n. 1. — Deſcript. anim. p. 1. n. 1. Falco cinereo-ferrugineus; arabiſch *Haddâj.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 20. n. 36. Falco (Forskalii) cera pedibusque ſemilanatis flavis, ſupra cinereus, ſubtus ferrugineus, alis ſupra fuſcis, cauda forficata, fuſco faſciata, longitudine corporis.

12. MILVUS. *Der Weihe.*(2)

Müller, Naturſyſt. II. p. 71. n. 12. *der Weihe.*

Müller,

(1) Wahrſcheinlich iſt dieſe Gattung wohl mit *F. Forskålii.* p. 263. n. 121. einerley, und dieſer Vogel aus Verſehen zweymal, mit den nämlichen Worten beſchrieben.

(2) Gewicht nach Pennant, u. ſ. w. 44 Unzen. Verläſst Deutſchland im Septbr. und October. Ueberwintert in Aſtrakan, beſonders aber in Aegypten, und kömmt im April zurück. Nährt ſich von jungem Geflügel, auſserdem aber von Feldmäuſen, Fröſchen, Schlangen, Eidexen, Regenwürmern, Schnecken und Aas. Niſtet in gebirgigen Waldern, und groſsen Feldhölzern auf den höchſten alten Eichen, Buchen, Fichten und Tannen, und nie in die Klüfte unzugänglicher Klippen.

Müller, Naturfyst. II. p. 72. *der Königs-Weihe.*
Leske, Naturgesch. p. 232. n. 2. *der Weihe.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 72. n. 8. *der Hünergeyer, Stoßvogel.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 159. n. 6. Falco (Milvus) cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore; *die Weihe, der Gabelgeyer, Milan, Scherschwänzel, Schwalbenschwanz, Taubenfalke.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 319. n. 11. *die Gabelweihe.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 243. n. 2. *die Gabelweyhe.* p. 250. *der Weyhe, Weyhfalk, Milan, Scheerschwänzel, Hüner-Dieb, Stößer, Stoßvogel, röthliche Weyhe, rother Milan, Gabelgeyer, Schwalbenschwanz, Hünergeyer, Steingeyer, Stoßgeyer, Hüneraar, Hauahr, Weichmilane, Grimmer, Schwimmer.*
Funke, Naturgesch. I. p. 281. *der Weihe.*
Ebert, Naturl. II. p. 31. *der Weihe.*
Halle, Vögel, p. 211. n. 146 *der Weihe, mit gabligem Schwanz und Fischerhosen.*

Gatterer,

Klippen. Das Nest hat eine Unterlage von grofsen Holzreisern, und ist inwendig mit Gras, Moos und Wolle nachlässig ausgefuttert. Das Weibchen legt zu Anfang des Maies, und brütet drey Wochen. Von den Jungen kommen gewöhnlich nur zwey auf. In Frankreich heifst dieser Vogel *Königsweihe*, weil er sonst zum Vergnügen der Prinzen diente, welche abgerichtete Falken und Sperber auf ihn losschickten. Seine Rückkunft sieht man im Frühjahr als ein sicheres Zeichen des geendigten Winters und der starken Fröste an. — Der allgemeine Name *Weihe* wird von den Jägern auch der 11. 29. u. a. Gattungen beygelegt.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 15. n. 18. *die Weyhe, der Milan, Scheerschwänzel, Gabelgeyer, Hühnerdieb.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 212. H. *der Weyhe, der Hühnergeyer.*

Beckmann, Naturhist. p. 37. n. b. *der Weihe.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 644. *Weihe.*

Onomat. hist. nat. V. p. 201. *der Weihe.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 123. *der Hühnergeier.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 94. *Milane.*

Klein, av. p. 51. n. 13. Falco cauda forcipata.

Klein, Vorbereit. p. 96. n. 13. *Scheerschwänzel.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 50. n. 13. *Scheerschwänzel.*

Klein, Vögeleyer, p. 19. Tab. 1. fig. 6.

Merrem, verm. Abhandl. p. 93. n. 5α. *der gemeine Weihe.*

Brisson, ornithol. I. p. 118. n. 35. Milan royal.

Buffon, Vögel, I. p. 267. *der Hünergeyer;* Tab. 21.

Batsch, Thiere, I. p. 295. *der Hühnergeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 57. n. 43. *der Milan, Gabelgeyer, Scheerschwänzel, Hühnergeyer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 20. n. 37. Falco (Milvus) cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore.

Beseke, Vögel Kurl. p. 9. n. 8 *der Königsweihe.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 10. n. 9. *der Weyhe.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 266. n. 10. *der Weihe.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 267. n. 11. *Königsweihe, röthliche Weihe.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 64. n. 34. *Hühnerweihe.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 165. n. 4. *Stößer, Weyhe.*

Pontoppidan, Naturhist. von Norwegen, p. 142. *Glente.*

Cetti, Naturgesch. von Sardin. II. p. 54. *der Hünergeier.*

Naturforsch. VIII. p. 47. n. 10. *der Weyhe.*

Naturforsch. VIII. p. 47. n. 11. *Königsweyhe.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 447. n. 2. *der Weihe.*

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *der Weiher.*

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 15. *der gemeine und der bunte Weihe.*

Adanson, Senegall. p. 97. *der Hünergeyer.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahnen, p. 347. n. 6. *der Milan, Schwalbenschwanz.*

Frisch, Vögel, Tab. 72.

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 286. n. 53. *der Weihe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 243. *der Milan, Gabler, oder Hünerdieb.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 65. n. 12. *die Gabelweyhe.*

Goeze, Allerley, II. p. 142. n. 5. *die Gabelweihe, oder Milane.*

Merklein, Thierreich, p. 297 *Hünerdieb, Wey, Weye, Wy, Weihe, Weiher, Wauwe, Rutel-Weyh, Rötel-Weyh, Hüner-Arh.*

Kraft, Ausrott. grauf. Th. II. p. 74. *Weyhen.*

Meidinger, Vorles. über d. Thierr. p. 112. n. 2. *der Weyhe.*

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 374. *der Hühnergeyer, Hühnerdieb.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 395. *Hüner-geyer.*

Naumann, Vogelsteller, p. 169. *Gabelgeyer.*

Loniceri, Kräuterbuch, p. 655. *Weyhe.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 78. *Mülane, Curwy, Schwalbenschwanz.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 48. VII. p. 222.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Milvus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 7. Milvus vulgaris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 10. Falco (Milvus) cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore.

Müller, zool. dan. prodr. p. 9. n. 61. Falco (Milvus) cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore.

Kramer, Austr. p. 326. n. 4. Falco cera flava, cauda forcipata, corpore ferrugineo, capite albidiore. *Rother Milan.*

Brünich, ornith. bor. p. 1. n. 2. Milvus.

Jonston, av. p. 25. Milvus.

Hermann, tab. affin. animal. p. 172. Milvus.

Plin. hist. nat. L. X. c. 10. Milvi.

Aristot. hist. animal. L. 6. c. 6. n. 72. Ικτινος.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 302. n. 12. *der Weihe.*

β. *Eine Abart mit kastanienbraunem Scheitel und Kehle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 21. β.

γ. *Der Korschun.*

Latham, Vögel, I. p. 57. n. 46. *der Korschun, der russische Milan.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 21. γ.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 93. n. 4. β. *der russische Weihe.*

δ. *Der*

δ. *Der jaikische Weihe.* Lepech. l. c.
Latham, Syst. ornith. I. p. 21. δ.

ε. *Der weiße Weihe.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 250.

62. Ater. *Der schwarze Weihe.* (3)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 259. n. 6. *die schwarze Hünerweyhe.*
Brisson, ornith. I. p. 117. n. 34. Milan noir.
Büffon, Vögel, I. p. 273. 274. *der schwarze Hünergeyer.*
Latham, Vögel, I. p. 57. n. 44. *der schwarze Milan.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 21. n. 38. Falco (Ater) cera pedibusque flavis, corpore supra fusco-nigro, capite subtus albido, cauda forficata.
Bechstein, Musterung schädlicher Thiere, p. 68. n. 15. *die schwarze Hühnerweihe, Mäuseaar.*
Merrem, verm. Abh. p. 93. n. 6. *Mäuse-Falke.*
Kramer, Austr. p. 326. n. 5. Falco cera flava, cauda subfurcata, fasciata, corpore castaneo-ferrugineo, capite albidiore; *Brauner Wald-Geyer.*

63. Austriacus. *Der braune Weihe.* (4)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 260. n. 7. *die braune Hühnerweihe.*

(3) *Der ätolische schwarze Hünergeyer; der Mäuseadler oder Aar.* Soll sich, besonders im Winter, in grossen gebirgigen Waldungen aufhalten, auf Heuschrecken, Feldmäuse, und junge Vögel stossen, und die Grösse einer Henne haben. *Büffon* hält ihn für verwandt mit dem gemeinen *Weihe;* und *Bechstein* ist geneigt, ihn für einen jungen *Bussard* zu halten.

(4) *Bechstein* will ihn für ein junges Männchen von der gemeinen *Weihe* halten, auf welches er die systematische Beschreibung sehr passend gefunden hat.

Latham, Vögel, I. p. 57. n. 45. *der österreichische Milan.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 21. n. 39. Falco (Austriacus) cera pedibusque semilanatis flavis, capite corporeque supra castaneo, pennarum scapis nigris, rectricibus fuscis, fasciis nigris, apicibus albis.

Kramer, Austr. p. 327. n. 6. Falco cera flava, corporeque castaneo, pennarum rachi nigra, rectricibus fuscis, fasciis nigris, apice albis. *Brauner Milan; brauner Geyer.*

64. Brasiliensis. *Der Karakara.*

Brisson, ornitholog. I. p. 116. n. 31. Busard du Brésil.

Büffon, Vögel, II. p. 30. *der brasilian. Sperber, Karakara.*

Latham, Vögel, I. p. 58. n. 47. *der brasilianische Milan.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 21. n. 40. Falco (Brasiliensis) pedibus flavis, corpore rufo, albo flavoque punctato, rectricibus fusco alboque variegatis.

Marcgr. Brasil. p. 211. *Caracara.*

Jonston, av. p. 205. *Caracara.*

25. Furcatus. *Die Sperberschwalbe.* (5)

Müller, Natursystem, II. p. 86. n. 25. *der Langschwanz.*

Halle, Vögel, p. 212. n. 147. *die purpurfarbne Sperberschwalbe.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 94. n. 9. *Schwalbenschwanz.*

Gatte-

(5) *Büffon* hält ihn für eine mit dem *Weihe* verwandte Gattung.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 21. n. 26. *der Sperberfalk, Schlangenhabicht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 200. n. 24. *der Falk mit dem Schwalbenschwanze.* Tab. X.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 754. n. 9. *Scheerschwänzel.*

Klein, Vorbereit. p. 97. n. 14. *Schwalbenfalke.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 50. *Schwalbenfalk.*

Brisson, ornitholog. I. p. 118. n. 36. Milan de la Caroline.

Büffon, Vögel, I. p. 272. *der Habicht mit dem Schwalbenschwanz.* p. 273. *der carolinische Geyer.*

Büffon, Vögel, II. p. 26. *die Sperberschwalbe.*

Batsch, Thiere, I. p. 295. *die Sperberschwalbe, Schwalbenfalk.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 8. *der Habicht mit dem Schwalbenschwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 55. n. 42. *der Schwalbenschwanz.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 22. n. 41. Falco Furcatus.

Linné, auserlesene Abhandl. II. p. 278. n. 1. *der Scheeren-Falk.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 11. Falco (Forficatus) cera flava, cauda forficata longissima, corpore supra fusco, subtus albido.

Hermann, tab. affin. animal. p. 173. *F. Furcatus.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 203. n. 13. *die Sperberschwalbe.*

121. Forskählii. Siehe vorher die Anmerk. 1. bey *F. Aegyptius.*

26. Haliaetos. *Der Balbuſard.* (6)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 86. n. 26. *der Fiſchadler.* Tab. II. fig. 4.

Leske, Naturgeſchichte, p. 233. n. 5. *der Fiſchhabicht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 71. n. 6. *der Flußadler, Balbuſard.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 159. n. 5. Falco (Haliaëtus) cera pedibusque caeruleis, corpore

(6) Ein Zugvogel, der uns im November, ſo bald die Teiche und Flüſſe gefrieren, verläſst, und zu Anfang des Märzes, wenn ſie ſich wieder öffnen, zurückkömmt. Beſucht die Gegenden des feſten Landes, wo Flüſſe, Teiche und Seen ſind, und wird ſeltener an den Meeresufern gefunden. Er ſchwebt ohne Geräuſch, wie angeheftet, über dem Waſſer, und wartet ſo, bey hellem Wetter, wenn die Fiſche an der Oberfläche des Waſſers ſpielen, da er denn mit einem Male wie ein Pfeil aufs Waſſer, und ſelbſt bis in die Tiefe hinabfährt und den Fiſch hervorholet, auf welchen er gezielt hatte. Bey trübem Wetter, wo ihm ſein Schweben nichts hilft, läſst er ſeinen Unrath ins Waſſer fallen, nach welchem die Fiſche wie nach einem Köder kommen, und ihm ſo zur Beute werden. Niſtet auf den höchſten Gipfeln alter Eichen und Tannen. An dem Bau des Neſtes nehmen Männchen und Weibchen Antheil. Das Neſt hat drey Fuſs im Durchmeſſer, beſteht aus lauter ſtarken Reiſern, iſt ganz flach, und inwendig mit Moos und Raſen ausgefuttert. Es dauert auch mehrere Jahre, bloſs mit einem kleinen Zuſatz von neuem Moos. Das Weibchen legt drey, ſeltener 4 weiſse rothgeſtreifte und gewölkte abgerundete Eyer, und brütet etwa dreyſsig Tage, binnen welcher Zeit ihm das Männchen Nahrung zuträgt. Nach *Büffon* u. a. nährt ſich der Vogel bloſs von Fiſchen, da man nie etwas anders in ſeinem Magen gefunden haben will. Seine Beute verzehrt er niemals auf der Stelle, ſondern trägt ſie zuweilen Stunden weit auf einen Baum, und löſst das Fleiſch ſehr ſorgfältig von den Gräten ab. — Iſt oft mit *Falco oſſifragus* verwechſelt.

corpore supra fusco, subtus albo, capite albido; *der Entenstößer, Moosweih.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 312. n. 5. *der Fischaar.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 229. n. 7. *der Fischaar.* p. 234. *der Balbusard, Fischadler, Meeradler, kleiner Meeradler, Flußadler, Rohrfalke, Fischähr, weißköpf. Blaufuß.*

Halle, Vögel, p. 208. n. 143. *der Rohrfalk.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 88. n. 10. *der europäische Meer-Adler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 21. n. 27. *der Balbusard, Entenstößer, Fischadler, Meeradler, Flußadler, Rohrfalk, Moosweyhe, Fischahr.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 190. n. 7. *der Balbusard.*

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 98. n. 2. *der kleine Meeradler.*

Onomat. histor. nat. I. p. 641. *der Meeradler, Fischadler.*

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 92. *Entenadler, kleiner Adler, scheckiger Adler, Schelladler, Moosweihe, Entenstößer.*

Brisson, ornith. I. p. 126. n. 10. Aigle de Mer.

Büffon, Vögel, I. p. 131. *der kleine Fluß- oder Meeradler, Balbusard.* Tab. 8.

Batsch, Thiere, I. p. 290. *der kleinere Balbusard.*

Latham, Vögel, I. p. 41. n. 26. *der Entenstößer, Moosweyh, Fischaar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 17. n. 30. Falco (Haliaëtus) cera pedibusque caeruleis, corpore supra fusco, subtus albo, capite albido.

Beseke, Vögel Kurl. p. 13. n. 19. *der Fischadler.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 37. *Fischadler.*

Leem, von den Lappen in Finnmarken, p. 126. n. 1. *Fiske-Gjoe.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 165. n. 8. *Meeradler.*

Carver, Reiſe durch Nordamerika, p. 384. *der Fiſchhabicht?*

Steller, Beſchreibung von Kamtſchatka, p. 193. Haliaëtus.

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 274. n. 19. *der Fiſchadler, Seeadler.*

Pallas, Reiſe, Auszug, I. p. 316. *der gemeine Fiſchaar?*

Naturforſch. VII. p. 40. *Fiſchadler.*

Naturforſch. VIII. p. 53. n. 19. *der Fiſchadler. Seeadler.*

Bechſtein, Muſterung ſchädlicher Thiere. p. 63. n. 9 *der Fiſchaar.*

Naumann, Vogelſteller, p. 168. *Fiſchaar.*

Martini, Naturlexicon, I. p. 289. *der Balbuzard.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 112. n. 4. *der Fiſchhabicht.*

Oedmann, neue ſchwed. Abhandl. V. *Geſchichte des Fiſchhabichts.*

Tengmalm, neue ſchwed. Abh. IV. p. 43. Falco Haliaëtus.

Lichtenberg u. *Voigt*, Magazin für das Neueſte u. ſ. w. IV. 1. p. 104. *Fiſchhabicht.*

Jablonsky, allgem. Lexicon, p. 20. *Meeradler, Fiſchaar.*

Kraft, Ausrott. grauſ. Thiere, II. p. 590. *Meer-Adler oder Fiſch-Ar.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 78. *Fiſch-Geyer.*

Nau, Entdeck. a. d. Naturgeſch. I. p. 247. Falco Haliaëtus.

Beckmann, phyſ. ökon. Bibl. I. p. 187. *Fiſchaar.* VI. p. 44. *Balbuzard.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 286. n. 53. F. Haliaëtus.

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 5. Falco Haliaëtus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 21. Falco (Haliaetus) cera pedibusque caeruleis, corpore ſupra fuſco, ſubtus albo, capite albido.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 10. n. 66. Falco (Haliaetus) cera pedibusque caeruleis, corpore ſupra fuſco, ſubtus albo, capite albido.

Kramer, Auſtr. p. 325. n. 2. Falco pedibus ceraque caeruleis; corpore ſupra fuſco, capite albo, *Blaufuß.*

Brünich, ornith. bor. p. 5. Haliaëtus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 170. F. Haliaëtus.

Jonſton, av. p. 12. *Haliaetus; Meeradler.*

Plin. hiſt. nat. L. X. c. 3. Haliaëtus.

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 203. n. 14. *der Balbuſard.*

β. ARUNDINACEUS. *Der Rohrfalk.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 18. β. Falco cera cinerea, pedibus pallidis, corpore ſupra griſeo, infra albido, cauda aequali.

γ. CAROLINENSIS. *Der caroliniſche Fiſcherfalk.*

Halle, Vögel, p. 215. n. 151. *der Seefalk mit Fiſcherhoſen.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 127. *der Geier aus Carolina.*

Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 89. β. *der amerikaniſche Meeradler.*

Klein, av. p. 52. n. 19. Falco piſcator cyanopus.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 99. n. 19. *Weißkopf, weißköpfiger Blaufuß.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 51. n. 19. *weißköpfiger Blaufuß.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 105. n. 14. Faucon pecheur des Antilles.

Briſſon, ornitholog. I. p. 105. n. 15. Faucon pecheur de la Caroline.

Büffon, Vögel, I. p. 182. *der Fiſchweihe.* Tab. 14.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 4. *der Fiſchaar.*

Latham, Vögel, I. p. 42. n. 26. A. *der Fiſchaar aus Carolina.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 16. γ. Falco cauda fuſca, concolore, vertice nigro, aut fuſco, albo-variegato, ventre albo.

Du Tertre, hiſt. gen. des Antilles, II. p. 253.

δ. CAYENNENSIS. *Der cayenniſche Fiſcherfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 43. n. 26. B. *der Fiſchaar aus Cayenne.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 18. δ. Falco corpore ferrugineo-fuſco, linea alba a mandibula ſuperiore per utrumque oculum ad occiput ſimiliter album ducta.

65. ANTILLARUM. *Der Mansfeni.*

Briſſon, ornithol. I. p. 114. n. 13. Faucon des Antilles.

Büffon, Vögel, I. p. 183. *der Mansfeni des du Tertre.*

Latham, Vögel, I. p. 43. n. 27. *der Mansfeny.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 19. n. 32. Falco (Antillarum) toto corpore fuſco.

Martini, Naturlex. I. p. 326. *der Mansfeni des du Tertre.*

66. SINENSIS. *Der chinesische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 33. n. 11. *der chinesische Adler*; Tab. 3.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 13. n. 13. Falco (Sinensis) cera pedibusque luteis, corpore supra rubro-fusco, subtus flavescente, tectricibus alarum, rectricibusque fascia obscura.

**** Falken; *von minderer Größe, mit unbefiederten Füßen.*

67. ORIENTALIS. *Der orientalische Falk.* (7)

Latham, Vögel, I. p. 31. n. 7. c. *der orientalische Habicht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 22. n. 44. Falco (Orientalis) pedibus plumbeis, corpore fusco, superciliis ferrugineis, remigibus rectricibusque albo maculatis.

68. INDICUS. *Der javanische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 31. n. 7. d. *der javanische Habicht.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 23. n. 45. Falco (Indicus) cera pedibusque luteis, corpore fusco rubro, remigibus rectricibusque nigro fasciatis, fronte, uropygio, crisso fasciisque abdominis albis.

69. NOVAE HOLLANDIAE. *Der neuholländische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 37. n. 18. *der neuholländische Adler.*

Latham,

(7) Nach *Latham*, nebst der folgenden Gattung, eine Varietät von *Falco Ferox*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 16. n. 22. Falco (Novae Hollandiae) albus, cera, orbitis pedibusque luteis, ungue postico anterioribus duplo longiore.

70. Urubitinga. *Der brasilianische Falk.*

Ebert, Naturl. II. p. 28. *Urubitinga.*

Halle, Vögel, p. 179. n. 117. *der kurzschwänzige Steinadler?*

Brisson, ornith. I. p. 128. n. 12. Aigle du Brésil.

Büffon, Vögel, I. p. 180. *der brasilian. Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 38. n. 20. *der brasilianische Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 22. n. 43. Falco (Urubitinga) cera pedibusque flavis, corpore fusco nigricante vario, alis cinereo admisto, rectricibus albis, apice nigricantibus, albo terminatis.

Martini, Naturlex. I. p. 297. *der brasilianische Adler, Urubitinga.*

Jonston, av. p. 208. Urubitinga.

71. Pondicerianus. *Der Adler von Pondichery.*

Ebert, Naturl. II. p. 27. *der Adler von Pondichery.*

Handb. d. Naturgesch II. p. 133. *der Adler aus Pondichery.*

Merrem, verm. Abh. p. 89. n. 13. *heiliger Adler.*

Brisson, ornithol. I. p. 129. n. 15. *Aigle de Pondichery.*

Büffon, Vögel, I. p. 170. *der Adler von Pondichery.*

Latham, Vögel, I. p. 38. n. 21. *der Adler aus Pondischery.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 23. n. 46. Falco (Ponticerianus) cera caerulescente, corpore castaneo, capite, collo pectoreque albis lineolis fuscis variis, remigibus sex primoribus ultima medietate nigris.

Batsch, Thiere, I. p. 291. *der Adler von Pondichery.*

Martini, Naturlex. I. p. 327. *der Adler von Pondichery, der malabarische Adler.*

Ess. philosoph. p. 35. Aigle Malabare.

72. AEQUINOCTIALIS. *Der cayennische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 40. n. 25. *der cayennische Adler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 22. n. 42. Falco (Aequinoctialis) pedibus luteis, corpore nigricante ferrugineo vario, remigibus medio ferrugineis, rectricibus V. albo notatis.

15. BUTEO. *Der Bussard.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 78. n. 15. *Busshard.* Tab. 27. fig. 1.

Leske,

(8) In Deutschland fast überall unter dem Namen des *Mäusefalken* bekannt. Variirt vor allen andern vorzüglich in der Farbe. Ein träger ungeschickter Vogel, der Stundenlang auf einem Baume zusammengedrückt sitzt, und nicht eher auf den Raub ausfliegt, bis ihn der gröste Hunger treibt. Fliegt langsam und hoch. Ist sehr scheu und furchtsam. Ist in Deutschland Strichvogel; wandert bey strengem Winter südlicher, und kömmt beym Eintritt gelinderer Witterung bald wieder. Liebt die Vorhölzer in grosen Waldungen. Nährt sich besonders von Amphibien, und lauert den Maulwürfen und kleinen Feldmäusen auf; geht aber auch auf junge Hasen, Kaninchen, Rebhühner und Wachteln. Nistet auf den höchsten Bäumen, besonders auf alten hohen Fichten. Das Weibchen legt drey bis vier weisliche, ins Grüne spielende, mit

Leske, Naturgesch. p. 233. n. 4. *der Bussard.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 313. n. 6. *der Bussard.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 238. n. 1. *der Bussard.* p. 242. *Bushart*, *Bushartfalk*, *Weyhe*, *Waldgeyer*, *Rüttelweyhe*, *Sumpfweyhe*, *Wasservogel*; (*Mäusefalke*, *Unkenfresser*, in Thüringen.)
Halle, Vögel, p. 207. n. 142. *der Bushart.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 17. *der Bushart*, *Mausefalk*, *Waldgeyer*, *die Rüttelweyhe*, *Sumpfweyhe.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 197. n. 19. *der Bussard.*
Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 753. n. 9. *Busshart.*
Onomat. hist. nat. II. p. 359. *Büzard*, *Busart.*
Handbuch der Naturgesch. II. p. 122. *der Busshart*, *Mausefalk.*
Klein, av. p. 50. n. 12. Falco Buten, vulgaris, autorum.
Klein, Vorbereit. p. 96. n. 12. *Busshart*, *Mausefalke.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 90. n. 12. *Busshart.*
Klein, Stemm. av. p. 8. Tab. 8. fig. 2. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 19. Tab. 6. fig. 2.
Brisson, ornith. I. p. 116. n. 32. la Buse.
Büffon, Vögel, II. p. 3. *der Weyhe.* Tab. 21.
Batsch, Thiere, I. p. 292. *der Weyhe.*
Latham, Vögel, I. p. 44. n. 28. *der gemeine Busart*, *die Weyhe.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 23. n. 47. Falco (Buteo) cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdo-

mit gelbbraunen Flecken unordentlich bestreuete Eyer. Im nördlichen Amerika bewohnt er die Hudsonsbay bis Neuland. Um Lyon soll er den Winter sehr häufig und ausnehmend fett seyn, auch daselbst gegessen werden.

abdomine pallido, maculis fuſcis, cauda fuſco faſciata.

Beſeke, Naturgeſch. der Vögel Kurl. p. 13. n. 17. *der Büſſard.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 272. n. 17. *Buſſard, Mauſefalk.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 65. n. 38. *Mauſefalk, Steinadler.*

Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 56. *der Weihe.*

Pennant, britt. Thiergeſchichte, (von Murr.) II. Tab. 5. *Buſshart.*

Linné, auserleſene Abhandl. II. p. 287. *der Buſshart.*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 165. n. 6. *Weyhe.*

Naturforſch. VIII. p. 52. n. 17. *Buſthart.*

Schriften der berlin. Geſellſchaft naturf. Fr. VII. p. 448. n. 5. *der Buſſard.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. p. 4. n. 4. *der Mauſefalk, Waldgeyer.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 65. n. 11. *der Buſſard.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 78. *Mauſegeyer.*

Beckmann, phyſikal. ökonom. Bibl. VI. p. 48. *der Bushard.*

Krünitz, Encyklop. I. p. 134. n. 13. *Mäuſefalk, Mäuſeaar, Mäuſegeyer, Mäuſehabicht, Mäuſewächter, Mauſer, Buſſaar, Buſshard.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 52. Buteo.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 12. Buteo triorchis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 14. Falco (Buteo), cera pedibusque luteis, corpore fuſco, abdomine pallido, maculis fuſcis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 9. n. 64. Falco (Buteo), cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido, maculis fuscis.

Kramer, Austr. p. 329. n. 11. Falco cera pedibusque luteis, dorso fusco, pectore pallido, maculis longitudinalibus fuscis; *Wald-Geyer.*

Brünich, ornith. bor. p. 5. Buteo.

Hermann, tab. affin. anim. p. 172. 174. F. Buteo.

Jonston, av. p. 23. Buteo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 204. *der Bussard.*

73. Gallinarius. *Der Hühnerfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 263. n. 9. *der Hühnerfalke. — Hühnerhabicht, Hühnergeyer.*

Brisson, ornithol. I. p. 114. n. 28. le gros Busard.

Latham, Vögel, I. p. 45. n. 29. *die Hühner-Weihe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 24. γ. (als Spielart vom vorigen betrachtet.)

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 70. n. 17. *der Hühnerfalke.*

β. Naevius. *Der gefleckte Hühnerfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 263. *der gefleckte Hühnerfalke.*

Brisson, ornith. I. p. 114. n. 28. A. le Busard varié.

Latham, Vögel, I. p. 45. n. 29. A. *die gefleckte Hühner-Weihe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 24. δ. (als Varietät von *Falco Buteo* aufgeführt.)

74. Jamaicensis. *Der Bussard aus Jamaika.*

Latham, Vögel, I. p. 48. n. 30. *der Busard aus Jamaika.*

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 24. n. 49 Falco (Jamaicenſis) cera pedibusque luteis, corpore ſupra luteo fuſceſcente, fuſco vario, rectricibus faſciis fuſcis obſoletis.

75. Borealis. *Der amerikaniſche Buſſard.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 196. n. 16. *der Falk mit dem rothen Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 40. n. 31. *der amerikaniſche Buſard.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 25. n. 50. Falco (Borealis) cera pedibusque luteis, corpore fuſco, abdomine albo, maculis haſtato-nigris, cauda ferruginea, faſcia ad apicem nigra.

76. Leverianus. *Der leverianiſche Falk.* (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 196. n. 17. *Levers Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 103. n. 103. *der leverianiſche Falke.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 18. n. 31. Falco (Leverianus) fuſcus, pedibus flavis, capite, collo corporeque ſubtus albis, pone aures taenia fuſca, rectricibus lateralibus fuſco alboque, intermediis fuſco nigroque faſciatis, omnibus apice albis.

77. Rufus. *Der Brandfalk.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 261. n. 8. *der Brandfalke.* p. 262. *Brandgeyer, Fiſchgeyer.*

Briſſon, ornithol. I. p. 115. n. 30. Buſard roux.

Büffon, Vögel, II. p. 20. *der Fiſchgeyer.* Tab. 26.

(9) Von *Ashton Lever* alſo genannt, dem dieſer Vogel aus Carolina geſchickt wurde.

Latham, Vögel, I. p. 46. n. 32. *der Fischgeyer, Brandgeyer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 25. n. 51 Falco (Rufus) pedibus flavis, corpore rufo maculis longitudinalibus vario, dorso fusco, rectricibus cinereis.

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 96. n. 16. *der Brandfalke.*

78. Variegatus. *Der bunte Bussard.*

Latham, Vögel, I. p. 88. n. 33. *der bunte Bussard.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 24. n. 48. Falco (Variegatus) pedibus flavis, corpore fusco, subtus albo, fusco maculato, capite colloque albidis, striis ferrugineo fuscis, tectricibus alarum albo maculatis, rectricibus albo fasciatis.

79. Albidus. *Der Bastardbussard.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 201. n. 25. *der Bastardbussard.*

28. Apivorus. *Der Wespenfalk.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 87. n. 28. *der Bienenfresser.*

Bechstein,

(10) Länge 2 Fuss. Flügelweite 4 Fuss 8 Zoll. Gewicht etwa 2 Pfund. Flug langsam und niedrig. Gang hurtig. Stimme zischend. Gehört unter die Zugvögel, die spät wegziehen und früh wieder kommen. Zieht die ebenen Gegenden den gebirgigen vor, und liebt besonders die Feldhölzer, auch die Vorhölzer an grossen Waldungen, wo er auf hohen Bäumen nistet. Das Nest besteht aus Spänen und Reisern, mit Wolle und Federn ausgefüttert. Das Weibchen legt 3 bis 4, — nach *Latham* dunkelrothbraune, rostigroth oder kastanienbraun gefleckte, nach *White*, an jedem Ende mit

Bechstein, Naturgesch. I. p. 314. *der Wespenfalke.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 264. n. 10. *der Wespenfalke.* p. 268. *Mäusehabicht, Mäusewächter, Läuferfalk, Honigbusshard, Froschgeyer, Mäusefalk, Bienenfalk, Vögelgeyerla.*
Halle, Vögel, p. 209. n. 144. *der Läuferfalk, Wespenfalk.*
Merrem, verm. Abh. p. 94. n. 8. *Wespenfalke.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 22. n. 29. *Wespenfalk, Läuferfalk.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 214. I. *der Bienenfresser.*
Onomat. hist. nat. II. p. 361. Buteo apivorus.
Handb. d. Naturgesch. II. p. 123. Buteo apivorus.
Klein, av. p. 50. ad n. 12. Buteo api — vel vespivorus.
Klein, Vorbereit. p. 96. ad n. 12. *der Bienen- oder Wespenfresser.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 50. ad n. 12. Honney Buzzard (zu F. Buteo gerechnet).
Brisson, ornith. I. p. 117. n. 38. la Bondrée.
Buffon, Vögel, II. p. 7. *der Wespenfalk.*
Batsch, Thiere, I. p. 292. *der Wespenfalk.*
Latham, Vögel, I. p. 47. n. 33. *der Wespenfalke, Honigfalke.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 25. n. 52. Falco (Apivorus) cera nigra, pedibus seminudis, flavis, capite cinereo, caudae fascia cinerea, apice albo.

mit schmalen rothen Flecken gezeichnete, in der Mitte mit einem rund herumgehenden blutrothen Querstreifen umgebene — nach *Bechstein* aschgraue mit kleinen braunen Flecken bezeichnete — Eyer, und brütet etwa 3 Wochen. *White* sagt: das Ey sey kleiner und nicht so rund als das vom Bussard.

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 276. n. 21. *der Bienenfreſſer.*

White, Naturg. v. England, p. 57. *Honigadler.*

Pennant, britt. Thiergeſch. (v. Murr.) Tab. 6. 7. *der Froſchgeyer.*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännemark, p. 165. n. 9. *Mäuſehabicht*, *Mäuſewächter.*

Naturforſch. VIII. p. 54. n. 21. *der Bienenfreſſer.*

Nau, Entdeck. a. d. Naturgeſch. I. p. 247. *Falco apivorus.*

Krünitz, Encyklop. XII. p. 135. *Bienenfreſſer, Honigbuſſhard.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 70. n. 18. *der Weſpenfalke.*

Beckmann, phyſik. ökonom. Bibl. VI. p. 48. *der Bienenfalk.*

Friſch, Vögel, I. Tab. 88.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 13. *Buteo apivorus.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 23. Falco (Apivorus), cera nigra, pedibus ſeminudis, flavis, capite cinereo, caudae faſcia cinerea, apice albo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 68. Falco (Apivorus) cera nigra, pedibus ſeminudis flavis, capite cinereo, caudae faſcia cinerea, apice albo.

Kramer, Auſtr. p. 331. n. 14. Falco pedibus ſeminudis, cera nigra, capite cinereo, cauda faſcia cinerea, apice albo; *Froſch-Geyerl*, *Mauſs-Geyerl*, *Vögel-Geyerl.*

Brünich, ornith. bor. p. 5. Apivorus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Apivorus.

Jonſton, av. p. 23. Goyran, ſ. Bondrée.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 204. n. 16. *der Bienenfreſſer.*

29. Aeru-

29. AERUGINOSUS. *Der Rostweyhe.*(1)

Müller, Naturfyst. II. p. 88. *die Hühnerweyhe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 320. n. 12. *die Rostweyhe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 250. n. 3. *die Rostweyhe.* p. 253. *Sumpfbussard, Brandgeyer, Entengeyer, Hühnerweihe, Hühnergeyer, brauner Geyer, Wasserfalke, brauner Rohrgeyer, rostige Weihe, buntrostiger Falke* (die Jungen), *rostiger Falke;* bey den Jägern: *Moosweyhe.*

Halle, Vögel, p. 213. n. 148. *der rostige Weihe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 22. n. 30. *Brandgeier, Entengeier.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 215. L. *der Sumpfbussard.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 754. *buntrostiger Falk.*

Onomat. hist. nat. III. p. 203. Milvus aeruginosus, *der rostige Weihe.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 122. Circus, *der buntrostige Falk.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 94. *Rohrvogel, Rohrfalke, rostige Weihe, Rohrgeyer, Brandgeyer, Entengeyer.*

(1) Länge 23 Zoll. Flügelweite 4 Fuss. Gewicht etwa 20 Unzen. Fliegt schön, sanft schwimmend, und fast immer in horizontaler Lage. Hält sich in Vorhölzern, Gebüschen, Hecken, nahe bey Teichen, Flüssen und Sümpfen auf. Wandert nicht. Nistet in sumpfigen Gegenden, im niedrigen Gesträuche, oder gar nur auf kleinen mit hohem Gras bewachsenen Hügeln. Das Nest besteht aus dürren Reisern, trocknem Riedgras und welkem Laub. Legt 3 bis 4 bläulich weisse Eyer. Brütet 3 Wochen. In seinem Kropfe hat man mehrere Spitzmäuse gefunden. In Frischens Zeichnung sind die Endspitzen der Federn zu helle.

Klein, av. p. 51. n. 15. Falco ſ. Milvus aeruginoſus.

Klein, Vorbereit. p. 97. n. 15. *buntroſtiger Falke.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 50. n. 15. *buntroſtiger Falk.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 115. n. 29. Buſard de marais.

Büffon, Vögel, II. p. 22. *der roſtige Weyhe.*

Batſch, Thiere, I. p. 293. *der roſtige Weyhe.*

Latham, Vögel, I. p. 48. n. 34. *die roſtige Weyhe.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 25. n. 53. Falco (Aeruginoſus) cera vireſcente, corpore griſeo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 16. n. 23. *der Hühnerweihe.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 278. n. 23. *Hünerweihe, brauner Geyer, Fiſchahr, Fiſchgeyer.*

Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 45. *der Sumpfweihe.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 66. n. 40. *brauner Fiſchgeyer.*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 370. Falco aeruginoſus.

Pontoppidan, Dännemark, p. 165. n. 10. *Hühnergeyer.*

Pennant, britt. Thiergeſch. (von Murr.) Tab. 8. *brauner Rohrgeyer.*

Friſch, Vögel, Tab. 77.

Bechſtein, Muſterung ſchädlicher Thiere, p. 66. n. 13. *die Roſtweihe.*

Linné, auserleſ. Abh. II. p. 286. *der roſtige Falk.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 49. *der Buſard.*

Naumann, Vogelſteller, p. 169. *die Moosweyhe.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 8. Milvus aeruginoſus.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 24. Falco (Aeruginosus) cera fusca, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 10. n. 69. Falco (Aeruginosus) cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis.

Kramer, Austriac. p. 328. n. 7. Falco cera flava, corpore subtus ferrugineo, superne fusco, capite concolore, rectricibus testaceis; *brauner Rohr-Geyer.*

Brünich, ornith. bor. p. 5. Aeruginosus.

Jonston, av. p. 22. Circus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 204. n. 17. *der Sumpfbussard.*

80. Javanicus. *Der Habicht von der Insel Java; der Lang.* (²)

Latham, Syst. ornith. I. p. 27. n. 58. Falco (Javanicus) cera nigra, medio luteo; pedibus luteis, capite, collo et pectore castaneis, dorso fusco.

81. Cinereus. *Der aschfarbige Falk.*

Klein, av. p. 50. ad n. 12. *the ashcoloured Buzzard*, pedibus e caeruleo cinereis, unguibus nigris.

Klein, Vorbereit. p. 96. ad n. 12. the ashcoloured Buzzard.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 50. ad n. 12. (zu Falco Buteo gerechnet.)

Merrem, verm. Abhandl. p. 98. n. 14. *Blaufuß.*

Brisson, ornithol. I. p. 103. n. 10. Faucon de la Baye de Hudson.

Büffon, Vögel, II. p. 32. *der aschfarbige Weyhe.*

 Selig-

(²) Länge 19 Zoll. Flügelweite 48 Zoll; engl. M.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 1. *der aſchfarbne Buſſaar.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 24. β. Falco cera pedibusque caeruleſcentibus, ſupra cinereo fuſcus, albo fuſcoque varius, ſuperciliis albis, fuſco maculatis. (*zu Falco Buteo gerechnet.*)

82. Lineatus. *Der geſtreifte Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 197. n. 18. *der Falk mit rothen Schultern.*

Latham, Vögel, I. p. 51. n. 36. *der geſtreifte Buſard.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 27. n. 59. Falco (Lineatus) cera pedibusque flavis, corpore fuſco ferrugineo alboque vario, pectore rufo albo faſciato, rectricibus faſciis duabus albis.

83. Obsoletus. *Der einfarbige Falk.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 198. n. 20. *der einfarbige Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 101. n. 99. *der einfärbige Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 30. Plain Falcon.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 28. n. 61. Falco (Obſoletus) pedibus flavis, corpore fuſco, ſubtus remigibus, rectricibusque, latere interiore albo maculatis.

7. Rusticolus. *Der Falk mit dem Halsbande.* (3)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 67. n. 7. *der Weiß-kragen.*

Bechſtein,

(3) Wenn *Fabricii Falco Ruſticolus* wirklich hieher gehört, wie mir ſehr wahrſcheinlich iſt, auch von *Pennant* und *Latham* angenommen wird, ſo iſt doch in Anſehung der dahin gezo-

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 839. *der Falke mit dem Halsbande.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 212. G. *der Falk mit dem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 52. n. 37. *der Falke mit dem Halsbande.*

Latham, Syn. Suppl. p. 15. Collared Falcon.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 28. n. 60. Falco (Rusticolus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo, alboque undulato, collari albo.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 87. Falco rusticolus.

Neue Mannichfalt. IV. p. 422. n. 3. *Weißkragen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 88. n. 5. Falco (Rusticolus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo alboque undulato, collari albo.

Fabric. fn. groenl. p. 55. n. 34. Falco (Rusticolus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo, alboque undulato, collari albo?

84. Novae seelandiae. *Der neuseeländische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 52. n. 38. *der Neu-Seeländische Falke.* Tab. 4.

Latham, Syst. ornith. I. p. 28. n. 62. Falco (novae Zelandiae) cera pedibusque flavis, corpore ferrugineo-

gezogenen Synonymen manche Schwierigkeit. *Fabricius* rechnet nämlich *Brünichs Falco Islandus* (ornith. bor. p. 2. n. 9.) und *Müllers Falco Islandus* (zool. dan. prodr p. 10 n. 73.) hieher, welcher im System p. 271. n. 87. als eine eigne Gattung aufgeführt ist. *Latham* folgt (Syst. ornithol. I. p. 32. n. 69.) in Ansehung *Brünichs* n. 7. und 8. der *Gmelinschen* Eintheilung, rechnet aber n. 9. und *Müllers* n. 73. zu *Falco Gyrfalco* (l. c. p. 32. n. 68.) *Müller* a. a. O. nimmt *Brünichs* 7. u. 9. als Spielarten an, und *Brünich* selbst läfst nur 7. u. 9. als Varietäten gelten.

rugineo-fuſco, ſubtus rufo ſtriato, cauda luteſcente faſciata, femoribus ferrugineis.

30. PALUMBARIUS. *Der Stockfalk.* (Habicht.) (4)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 88. n. 10. *der Taubenhabicht.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 460. n. 8. Falco (Palumbarius) cera nigra, margine, pedibusque flavis, corpore fuſco, rectricibus faſciis pallidis, ſuperciliis albis; *der Habicht, Taubenfalke.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 318. n. 10. *der Stockfalke.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 268. n. 11. *der Stockfalke.* p. 273. *Tauben-Hühner-oder Gänſehabicht, Habicht, großer Habicht, Taubenfalk, Taubengeyer, brauner Taubengeyer, Sternfalk, Stockaar, ſchwärzlicher Falke mit pfeilförmigen Flecken, größter gepfeilter Falke.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 281. *der Habicht.*

Ebert,

(4) Einer der ſchönſten Falken. Das Männchen iſt um ein Drittheil kleiner als das Weibchen, beyde aber haben einerley Farbe. Beyde laſſen ſich nicht leicht zähmen, zanken mit einander, und tödten ſich ſogar, wenn man ſie einſperrt. — Dieſer Vogel gehört zu den gefährlichſten Feinden des Wald-Feld- und Hausgeflügels; ſtößt aber auch auf allerhand Feldmäuſe und auf Spitzmäuſe, und geht im Winter auch aufs Aas. Vögel rupft er, und zerreiſt ſie erſt in Stücken, ehe er ſie friſst; Mäuſe aber verſchluckt er ganz, und ſpeyet die zuſammengerollten Häute derſelben mit den Knochen wieder von ſich. Gekochtes Fleiſch friſst er nur bey groſsem Hunger. Niſtet auf hohen Waldbäumen, beſonders Tannen und Fichten. Legt 3 bis 4 rothgelbe Eyer mit ſchwarzen Flecken und Strichen, unter welchen hie und da die weiſse Farbe hervorſchimmert. Die Jungen ſehen bis zur ſechſten Woche weiſsgrau aus, und alsdenn erſt wird der Oberleib allmählich braun.

Ebert, Naturl. II. p. 33. *der Habicht.*

Halle, Vögel, p. 216. n. 153. *der schwärzliche Falk, mit Flecken wie Pfeile.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 44. n. 31. *der Habicht, Habich, Taubenfalk, Taubengeier, Sternfalk, Stockahr.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 194. n. 15. *der Stockfalk.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 753. *Taubenfalk.* VIII. p. 810. *Tauberfalk.*

Onomat. hiſt. nat. II. p. 39. *Aſtur.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 107. *der große Habicht.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 94. *der Habicht, Hacht, Tauberfalke, Ahr, Eichvogel, Taubengeyer, Gänſegeyer, Hünerfalke.*

Klein, av. p. 50. n. 11. Falco Palumbarius.

Klein, Vorbereitung, p. 95. n. 11. *Taubenfalke, Stockahr.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 49. n. 11. *Taubenfalk.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 91. n. 3. Autour.

Büffon, Vögel, II. p. 46. *der Taubengeyer.* Tab. 22.

Batſch, Thiere, I. p. 293 *der Taubengeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 53. n. 39. *der Habicht, Taubenfalke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 16. Goshawk.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 29. n. 65. Falco (Palumbarius) cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fuſco, rectricibus faſciis pallidis, ſuperciliis albis.

Gerini ornith. I. p. 54. Tab. 21. 22.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 12. n. 15. *der große gepfeilte Falk.*

Fiſcher,

Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 67. n. 45. *Taubenhabicht*, *Taubengeyer.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 277. n. 22. *Taubenhabicht*, *Tauberfalke*, *Stockahr.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 48. *der Habicht.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 165. n. 11. *Taubenfalk.*

Steller, Beschreibung von Kamtschatka, p. 194. *weiße Habichte?* (vergl. mit Latham a. a. O. p. 53. u. Bechstein a. a. O. p. 273.)

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *der eigentlich sogenannte Habicht.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 77. n. 118. *Habicht*, *Eich-Vogel.*

Mellin, Anleg. der Wildbahn. p. 346. n. 2. *der Habicht.*

Tengmalm, neue schwed. Abhandl. IV. p. 44. *der Taubenhabicht.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 72. n. 19. *der Stockfalke.*

Anweis. Vögel zu fangen u. s. w. Nürnb. 1768. p. 269. *der Habicht.*

Neues Hamb. Magaz. St. 37. *Taubengeyer.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 238. *der eigentlich sogenannte Habicht.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 49. *der Habicht.*

Merklein, Thierreich, p. 278. *Habicht.*

Kraft, Ausrottung grausamer Thiere, I, p. 529. *Habicht.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 422. *Habicht.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 25. Falco (Palumbarius) cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis.

Müller,

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 70. Falco (Palumbarius) cera nigra, margine, pedibusque flavis, corpore fuſco, rectricibus faſciis pallidis, ſuperciliis albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Palumbarius.

Jonſton, av. p. 21. Accipiter Palumbarius. Tab. XI. Accipiter maior.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 204. n. 18. *der Habicht.*

85. Cayennensis. *Der cayenniſche Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 54. n. 40. *der Falk aus Cayenne.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 28. n. 69. Falco (Cayanenſis) pedibus caeruleis, corpore cinereo-nigricante, ſubtus albo, capite et collo caeruleſcente-albis, rectricibus albo nigroque quater faſciatis.

86. Macrourus. *Der Lun.*

Latham, Vögel, I. p. 54. n. 41. *der langgeſchwänzte Falke.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 29. n. 64. Falco (Macrourus) cera pedibusque luteis, roſtro nigricante, corpore ſupra cinereo, ſubtus albo, remigibus interioribus cinereis, apice albis.

Lepechin, l. c. n. b. Falco ſuperne fuſcus, inferne rufus, lituris longitudinalibus fuſcis, circulo ex pennis decompoſitis albo, fuſco rufoque permixtis, oculorum orbitas ambiente.

13. Gentilis. *Der Edelfalk.* (ſ)

Müller, Naturſyſt. II. p. 73. n. 13. *der Edle Falke.*

Müller,

(ſ) Bey keiner Gattung in der Hierakologie ſind die Synonymen mehr verwechſelt, und die Eintheilungen und Unterabthei-

Müller, Naturfyftem, II. p. 77. g. *der edle Falke.*
Leske, Naturgefch. p. 232. n. 3. *der edle Falke.*

Bornmo-

theilungen der Naturhiftoriker verfchiedener, als bey diefer, und den folgenden, und den dazu im Syftem gerechneten Spielarten. Einige fondern den *Edelfalken* vom *gemeinen* als eine eigene Gattung ab; andere halten beyde für einerley, und nennen den *gemeinen* Falken *edel*, wenn er abgerichtet ift; andere nehmen viele der im Syftem bey n. 86. angeführten Spielarten, als befondere Gattungen an; andere rechnen fie wieder zum Theil zu n. 13. u. dgl. m. So viel ift wohl gewifs, dafs eine ungewöhnliche Veränderung der Farbe, nach dem Unterfchiede des Alters und des Gefchlechts, unbeftändige Merkmale des Schnabels, die veränderliche Farbe der Füfse u. f. w. fehr leicht Gelegenheit geben können aus einer Art zwey zu machen, und die Anzahl der Gattungen wider die Natur zu vermehren. Ueberhaupt mufs man fagen, dafs die Spielarten bey dem Falkengefchlecht ins Unendliche gehen, fo wie die Meynungen der verfchiedenen Schriftfteller über diefen Gegenftand. Ich will bey jeder Gattung und Spielart, wo es nöthig ift, die Abweichungen anderer Naturhiftoriker bemerken, und die Entfcheidung den Ornithologen überlaffen. — Das Weibchen der Edelfalken ift 1 Fufs 10 Zoll lang; die Flügelweite beträgt faft 4 Fufs. Das Männchen ift gemeiniglich um ein Drittheil kleiner. — Hält fich auf den fteilen Klippen der höchften Berge auf. Findet fich auch in der Schweitz, in Polen, Italien, Spanien, an der Wolga, und auf den Infeln des mittelländifchen Meeres. Stöfst auf lauter köftliche Biffen, junge Hafen, Kaninchen, Birkhühner, Hafelhühner, Fafanengehege u. dgl. m. und hat ein ausnehmend fcharfes Geficht. Niftet in den höchften Felfenklüften. Das Neft ift grofs, befteht aus groffen und kleinen Reifern, und ift allemal gegen Mittag in dem Felfen angebracht, damit es vor dem kalten Nordwinde ficher feyn, und von der Sonne erwärmt werden möge. Schon im März findet man 3 bis 4 Eyer in demfelben, und die Jungen find fchon im May zum Ausfliegen tüchtig. Nur die jung aus dem Nefte genommenen Falken fchicken fich zum Abrichten. Haben fie erft ein Alter von 9 bis 10 Monathen erreicht, fo hält es weit fchwerer fie zahm und folgfam zu machen.

Borowſky, Thierreich, II. p. 73. n. 9. *der edle Falke.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 160. n. 7. Falco (Gentilis) cera pedibusque flavis, corpore cinereo, maculis fuſcis, cauda faſciis quatuor nigricantibus.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 315. n. 1. *der edle Falke.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 273. n. 12. *der edle Falke.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 283. *der Edelfalke.*

Ebert, Naturl. II. p. 29. *der edle Falke.*

Halle, Vögel, p. 197. n. 134. *der deutſche Falke.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 95. n. 10. *edler Falke.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 29. n. 36. *der Falk, Edelfalk, Jagdfalk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 194. n. 14. *der edle Falk.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 37. n. a. *der edle Falk.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 753. n. 3. *edler Falk, deutſcher Falk.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 116. *der edle Falk.*

Handb. der deutſchen Thiergeſch. p. 93. *der edle oder deutſche Falke.*

Klein, av. p. 48. n. 3. Falco gentilis, i. e. nobilis. Falco migrator et commeator.

Klein, Vorbereit. p. 92. n. 3. *edler, deutſcher Falke, Wanderfalke, Fremdlingsfalke.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 48. n. 3. *edler Falk, teutſcher Falk, Wanderfalk, Fremdling.*

Briſſon, ornithol. I. p. 98. n. 5. Faucon gentil.

Buffon, Vögel, II. p. 76. Tab. 39. *der Falke.*

Batſch, Thiere, I. p. 293. *der eigentliche Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 58. n. 48. *der Edelfalke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 17. Gentil Falcon.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 29. n. 6. Falco (Gentilis) cera pedibusque flavis, corpore cinereo, maculis fuſcis, cauda faſciis quatuor nigricantibus.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 10. n. 10 *der Edelfalk.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 278. n. 13. *edler teutſcher Wanderfalk.*

Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 36. *der Falke.*

Fiſcher, Zuſ. z. Naturgeſch. von Livland, p. 43. n. 489. *Jagdfalk, edler Falk.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 15. *gemeiner Falk.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. p. 4. n. 3. *der Falk, edler deutſcher Falk.*

Naturforſch. VIII. p. 50. n. 13. *edler Falke.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 73. n. 20. *der edle Falke.*

Goeze, Allerley, II. p. 143. n. 6. *der Edelfalk.*

Krünitz, Encyklop. XII. p. 130. *der gemeine deutſche Falk.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 67. *der Falk.*

Oekonom. Zoologie, p. 63. n. 2. *der edle Falke.*

Ludovici, Kaufmannslex. II p. 1462.

Neueſte Mannichfalt. I. p. 169.

Jablonſky, allg. Lex. p. 317. *Falke.*

Kraft, Ausrott. grauſ. Th. I. p. 528. *der Falke.*

Hamburg. Magazin, V. p. 144. *der Falke.*

Meidinger, Vorleſ. über d. Thierr. I. p. 112. n. 3. *der edle Falk.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 52. Falco.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 3. Falco gentilis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 12. Falco (Gentilis), cera pedibusque flavis, corpore cinereo.

cinereo, maculis fuſcis, cauda faſciis quatuor nigricantibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 9. n. 62. Falco (Gentilis), cera pedibusque flavis, corpore cinereo, maculis fuſcis, cauda faſciis quatuor nigricantibus.

Kramer, Auſtr. p. 328. n. 8. Falco pedibus flavis, corpore cinereo, maculis fuſcis, cauda faſciis quatuor; *Falk.*

Brünich, ornith. bor. p. 1. n. 6. Falco Gentilis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 172. Falco Gentilis.

Jonſton, av. p. 31. Gentilis.

Böhmer, Handb. der Naturgeſch. u. ſ. w. Leipz. 1786. II. 1. p. 544. 550. (eine Sammlung höchſt unregelmäſsig geordneter, zum Theil die Falkonirkunſt betreffender Schriften.)

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 209. n. 19. *der Edelfalke.*

86. Communis. *Der gemeine Falk.* (6)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 73. a. *der gemeine Falke.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 114. *der gemeine Falk.*

Briſſon, ornith. I. p. 92. n. 4. Faucon.

Büffon, Vögel, II. p. 96. *der gemeine Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 59. n. 49. *der gemeine Falke.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 30. n. 67. Falco (Communis) roſtro caeruleſcente, cera, iridibus, pedibusque luteis, corpore fuſco, pennarum margine rufo, rectricibus faſciis ſaturatoribus.

(6) Nach *Büffon* und den allermehreſten Naturhiſtorikern mit dem vorhergehenden einerley; (ſ. *die vorige Anmerkung*) daher auch viele der vorſtehenden Synonymen auf beyde ohne Unterſchied gehen.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 269. n. 12. *der gemeine Falke.*
Naturforsch. VIII. p. 49. n. 12. *der gemeine Falke.*
Loniceri, Kräuterb. p. 657. *Falk.*
Krünitz, Encykl. XII. p. 130. n. 3. *der gemeine deutsche Falk.*

β. Hornotinus. *Der jährige Falk.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 294. n. 1. *der junge Falk.*
Brisson, ornithol. I. p. 93. A. Faucon Sors.
Büffon, Vögel, II. p. 99. *Faucon Sors.* p. 91. *frische Falken.*
Latham, Vögel, I. p. 60. n. 49. A. *der jährige Falke.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 30. β. Falco Hornotinus.
Jonston, av. p. 228. Hornotini.

γ. Gibbosus. *Der bucklichte* (alte) *Falk.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 294. n. 2. *der bucklichte oder alte Falke.*
Brisson, ornitholog. I. p. 93. B. Faucon hagard, ou bossu.
Büffon, Vögel, II. p. 77. n. 2. *Hagerfalk.* p. 91. *die Alten.* p. 99. *Faucon hagard.*
Latham, Vögel, I. p. 60. B *der wilde Falke.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 30. γ. Falco gibbosus.
Jonston, av. p. 32. Falco gibbosus.

δ. Leucocephalus. *Der weißköpfige Falk.*
Brisson, ornitholog. I. p. 93. C. Faucon à tête blanche.
Büffon, Vögel, II. p. 78. n. 3. *der Rauchfußgeyer.* p. 99. *der weißköpf. Falk, mit langen Hosen.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 60. C. *der weißköpfige Falke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 30. δ. Falco leucocephalus; capite, collo pectoreque albis, maculis minutis fuscis.

Merrem, verm. Abhandl. p. 91. n. 2. β. *der deutsche Geyerfalke.*

2. Albus. *Der weiße Falk.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 74. b. *der weiße Falke?*

Borowsky, Thierreich, II. p. 73. *der weiße Falk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 294. n. 3. *der weiße Falke.*

Halle, Vögel, p. 199. n. 137. *der weiße russische Falke.*

Klein, av. p. 49. n. 6. Falco albus, lactei coloris.

Klein, Vorbereit. p. 93. n. 6. *weißer Falke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 48. n. 6. *weißer Falk.*

Klein, Vögeleyer, p. 18. Tab. 5. fig. 3.

Brisson, ornitholog. I. p. 94. D. Faucon blanc.

Büffon, Vögel, II. p. 95. *der weiße Falke.*

Batsch, Thiere, I. p. 293. *der weiße Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 60. D. *der weiße Falke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 31. n. 2. Falco albus, corpore toto albo, maculis flavis vix conspicuis.

Jonston, av. p. 32. Falco albus.

ζ. Ater. *Der schwarze Falk.* (8) (*Schwarzbraune Habicht: Kohlfalk.*)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 305. n. 1. *der schwarze Falk.*

(7) Soll nicht mit dem isländischen Falken verwechselt werden. (Syst. p. 271. n. 87.)

(8) Nach *Büffon* mit dem *gefleckten* Falken einerley. Nach *Bechstein* eine Varietät von *Falco Peregrinus.*

Halle, Vögel, p. 210. n. 145. *der ſchwarze amerikaniſche Falk.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 115. *der ſchwarze Falk.*

Briſſon, ornith. I. p. 94. E. Faucon noir.

Büffon, Vögel, II. p. 126. *der ſchwarze Falke.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 7. *der ſchwarze Falk oder Habicht.*

Latham, Vögel, I. p. 61. C. *der ſchwarze Falke.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 31. ζ. Falco niger.

Jonſton, av. p. 22. Aeſalo?

η. Naevius. *Der gefleckte Falk.* (9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 74. c. *der gefleckte Falke.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 306. n. 2. *der gefleckte Falke oder Habicht.*

Klein, av. p. 50. ad n. 11. *Edwardi* ſpotted Falcon.

Klein, Vorbereit. p. 96. ad n. 11. Edwards ſpotted Falcon.

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 50. ad n. 11. *der gefleckte Falk.*

Briſſon, ornith. I. p. 95. F. Faucon tacheté.

Büffon, Vögel, II. p. 129. *Edwards gefleckter Falk oder Habicht.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 5. *der gefleckte Habicht oder Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 61. F. *der Falke mit gefleckten Flügeln.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 31. η. Falco maculatus (p. 33. n. 72. γ. zu *Falco peregrinus* gezogen.)

ϑ. Fuscus.

(9) Nach *Klein* zu Falco *Palumbarius* gehörig. Nach *Büffon* mit dem *vorhergehenden* einerley. Nach *Bechſtein* eine Spielart von *Falco Peregrinus.*

9. Fuscus. *Der braune Falke.* (10) (Braunfahle Geyer.)

Brisson, ornithol. I. p. 95. G. Faucon brun.
Handb. d. Naturgesch II. p. 115. *der braune Falk.*
Büffon, Vögel, II. p. 100. *der braune Falke.*
Latham, Vögel, I. p. 62. G. *der braune Falke.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 31. 9. Falco fuscus.

i. Ruber. *Der rothfleckige Falk.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 115. *der rothe Falk.*
Brisson, ornith. I. p. 36. H. Faucon rouge.
Büffon, Vögel, p. 100. *der rothe Falk.*
Merrem, verm. Abh. p. 96. n. 10. β. *der rothe Falke.*
Latham, Vögel, I. p. 62. H. *der rothe Falke.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 31. i. Falco rubens.
Krünitz, Encyklop. XII. p. 134. n. 12. *der rothe Falk.*

z. Indicus. *Der rothe indianische Falk.* (1)

Halle, Vögel, p. 218. n. 155. *der rothbäuchige indianische Falk.*
Brisson, ornithol. I. p. 96. I. Faucon rouge des Indes.
Handb. der Naturgesch. II. p. 116. *der rothe indianische Falk.*
Büffon, Vögel, II. p. 101. n. 9. *der rothe indianische Falk.* p. 132. *der ostind. rothe Falk.*
Latham, Vögel, I. p. 62. I. *der rothe indianische Falk.*

F 4 *Latham*,

(10) Nach *Büffon* eine Abänderung der Weyhen. Nach *Latham* vielleicht zu Falco *Borealis* gehörig.

(1) Nach *Büffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 31. κ. Falco ruber indicus.

Jonſton, av. p. 33. Falco rubeus

λ. Italicus. *Der italieniſche Falk.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 294. n. 4. *der italiäniſche Falke.*

Briſſon, ornithol. I. p. 97. K. Faucon d'Italie.

Büffon, Vögel, I. p. 101. n. 10. *der italieniſche Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 63. K. *der ital. Falke.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 32. λ. Falco italicus.

Merrem, verm. Abh. p. 96. n. 10. γ. *der italiäniſche Falke.*

μ. Arcticus. *Der arctiſche Falk.*

Briſſon, ornith. I. p. 97. L. Faucon d'Islande.

Latham, Vögel, I. p. 63. L. *der nordiſche Falke.*

87. Islandus. *Der isländiſche Falk.* (2)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 75. d. *der isländiſche Falke.*

Pennant,

(2) Hier findet ſich abermals eine groſse Verwechſelung und Vermiſchung der Synonymen. *Bechſtein* u. a. nehmen zwar mit unſerm Syſtem den *isländiſchen Falken* als eine eigene Gattung an; aber die mehreſten betrachten ihn als Spielart vom gemeinen. *Brünich* ſelbſt iſt noch bey weitem nicht überzeugt, ob er eine eigne Gattung ſey. *Latham* ordnete in der *Synopſ.* die Synonymen ſo, wie wir ſie im Syſtem finden. In dem *Syſt. ornithol.* aber zieht er *Raj. Gyrfalco*, *Pennants Gyrfalcon*, *Briſſons und Büffons Gerfault*, ingleichen ſeinen eignen *White* und *Iceland Jerfalcon*, u. a. m. die im Syſtem p. 275. n. 101. zu *Falco candicans* gerechnet werden, hieher; und läſst nicht nur dieſen *Falco candicans* eingehen, ſondern rechnet auch wieder zu ſeinem *Gyrfalco* p. 32. n. 68. den er übrigens wie *Linné* und *Gmelin* charakteriſirt, *Briſ-*

ſons

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 206. d. *der isländische Falk.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 115. *der isländ. Falk.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 295. *der isländ. Falk.*
Büffon, Vögel, II. p. 101. n. 11. p. 125. *der isländ. Falk.*
Latham, Vögel, I. p. 62. n. 50. *der isländ. Falk.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 32. n. 69. Falco (Islandicus) albis maculis fuscis varius, rectricibus albis, lateralibus extus fusco-maculatis?
Oloffen, Reise d. Island, I. p. 32. *der Falk.*
De Kerguelen Tremarec, Reis. n. der Nordsee, p. 76. *graue Falken.*
Berlin. Samml. VII. p. 156. *graue Falken.*
Uno von Troil, Reise nach Island, p. 118. *graue Falken.*
Cranz, Hist. von Grönl. p. 112. *graue Falken?*
Egede, Beschr. von Grönl. p. 88. *graue Falken?*
Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 73. Falco Islandus.

β. Albus. *Der weiße isländische Falk.*

Müller, Natursyst. II. p. 74. b. *der weiße Falke.*

sens Gyrfalco Islandicus, *Brünichs Falco Islandus*, n. 9. *Kleins Falco Rapax* u. a. m. so, dass man gar nicht weiss, wie man aus dieser Verwickelung herauskommen soll. *Fabricii Falco Islandus* ist nach der Beschreibung kein anderer als *Brünichs* n. 8. oder Var. γ. des Systems. Er macht aber aus dieser und n. 7. wieder zwey Spielarten, die bloss auf der Verschiedenheit des Alters beruhen sollen, und rechnet *Cranzens* und *Egedens sprenklichte* und *fleckige Falken* mit hieher. *Brünichs* isländischen Falken n. 9. aber zieht er zu seinem *Falco Rusticolus*; s. auch vorher Anmerk. 5. bey *Falco Gentilis*; imgleichen die *folgende* Anmerk. 6. bey *Falco Gyrfalco*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 296. n. 2. *die weißen isländischen Falken.*

Latham, Vögel, I. p. 64. A. *der weiße isländische Falke.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 271. n. 14. *der weiße isländ. Falke.*

Naturforsch. VIII. p. 50. n. 14. *der isländische Falke.*

Tremarec, Reise nach der Nordsee, p. 76. *weiße Falken.*

Egede, Beschreib. von Grönland, p. 88. *weißliche Falken?*

Uno von Troil, Reise durch Island, p. 118. *weiße Falken.*

Berlin. Samml. VII. p. 156. *weiße Falken.*

Leem, von den Lappen in Finnmarken, p. 127. *weiße Falken?*

Krünitz, Encyklop. XII. p. 134. n. 11. *der weiße, weiße isländische, oder russische Falk.*

γ. MACULATUS. *Der gefleckte isländische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 64. B. *der gefleckte isländische Falke.*

Tremarec, Reise n. d. Nordsee, p. 76. *weißgraue Falken.*

Uno von Troil, Reise d. Island, p. 118. *dunklere Falken.*

Cranz, Hist. von Grönland, p. 112. *sprenklichte Falken?*

Egede, Beschr. von Grönl. p. 88 *fleckige Falken.*

Berlin. Samml. VII. p. 156. *weißgraue Falken.*

Fabric. fn. groenl. p. 58. n. 35. Falco (Islandus) albus, maculis cordatis nigricantibus, rectricibus albis, nigro-fasciatis.

8. BAR-

8. Barbarus. *Der Falk aus der Barbarey.* (3)

Müller, Naturſyſt. II. p. 68. n. 8. *der Barbarfalke.*

Halle, Vögel, p. 198. n. 135. *der graublaue Falke von den barbariſchen Küſten.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 253. n. 4. *der Barbarfalke.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 116. n. 1. *der Tuneſer aus der Barbarey.*

Klein, av. p. 48. n. 4. Falco Tunetanus. Falco punicus.

Klein, Vorbereitung, p. 92. n. 4. *Alphanet, Barbarfalke.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 48. n. 4. *Barbarfalk, Alphanet.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 99. A. Faucon de la Barbarie.

Büffon, Vögel, II. p. 102. n. 15. *der barbariſche Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 65. n. 51. *der Falke aus der Barbarey.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 33. n. 71. Falco (Barbarus) cera pedibusque luteis, corpore caeruleſcente, fuſco-maculato, pectore immaculato, cauda faſciata.

Krünitz, Encyklop. XII. p. 130. n. 4. *der barbar- oder tuneſiſche Falk.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 88. n. 6. Falco (Barbarus) cera pedibusque luteis, corpore caeruleſcente fuſcoque maculato, pectore immaculato, cauda faſciata.

Jonſton, av. p. 31. Falco Tunetanus.

88. Pere-

(3) Nach *Briſſon* eine Varietät von *Falco Peregrinus.* Nach *Büffon* iſt *Briſſons Pelerin* kein anderer als der *gemeine Falke*, und der *barbariſche Falk* eine bloſse Abänderung des *Wanderfalken.*

88. PEREGRINUS. *Der Wanderfalk.* (4)

Müller, Naturfyft. II. p. 76. f. *der Pilgrimfalk.*

Borowfky, Thierreich. II. p. 74. *der Wanderfalk.*

Bechftein, Naturgefch. I. p. 317. n. 9. *der Wanderfalke.*

Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 300. n. 15. *der Wanderfalke.* Tab. 11.

Ebert, Naturl. II. p. 30. *der Wanderfalk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 193. n. 13. *der Wanderfalk.*

Briffon, ornithol. I. p. 98. n. 6. Faucon pelerin.

Büffon, Vögel, II. p. 97. 101. Tab. 40. *der Wanderfalke.*

Latham, Vögel, I. p. 65. n. 52. *der ausländifche Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 18. Peregrine Falcon.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 33. n. 72. Falco (Peregrinus) cera pedibusque luteis, corpore nigricante, transverfim ftriato, fupra caerulefcente, fubtus albido, rectricibus fafciatis, apicibus albidis.

White, Naturgefchichte von England, p. 14. *ein Falke?*

Pallas, Reife, Ausz. II. p. 8. *Wanderfalk?*

Pennant, britt. Thiergefch. (von Murr.) Tab. 3. *der Wanderfalke.*

Bechftein, Mufterung fchädlicher Thiere. p. 74. n. 22. *der Wanderfalke.*

Jonfton, av. p. 29. Falco peregrinus.

β. TATA-

(4) Länge 1 Fufs, 10 Zoll, Flügelweite 4 Fufs. — Nach *Klein* u. a. zu *Falco Gentilis* oder *communis* gehörig. *Latham* ift geneigt, den *Falco communis naevius* Syftem Linn. p. 271. *n.*) als eine Varietät hieher zu rechnen. S. Syftem. ornith. l. c. p. 33. γ.

β. Tataricus. *Der tatarische Falk.*

Müller, Natursystem, II. p. 76. *der große tartarische Falk mit röthlichen Flügeln.*

Handb. der Naturgeschichte, II. p. 116. n. 2. *der Tartar.*

Brisson, ornith. I. p. 100. B. Faucon de Tartarie.

Büffon, Vögel, II. p. 98. 102. *der tartar. Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 66. A. *der Falke aus der Tartarey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 33. β. Falco tartaricus.

89. Versicolor. *Der gefleckte Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 66. n. 53. *der gefleckte Falke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 33. n. 73. Falco (Versicolor) cera flava, corpore supra albo et rufescente-fusco vario, uropygio subtus albicante, pectore ferrugineo maculato, remigibus rectricibusque fuscis, saturatiore fasciatis.

90. Pennatus. *Der gestiefelte Falk.*

Brisson, ornithol. I. p. 120. n. 39. Faucon Patu.

Latham, Vögel, I. p. 68. n. 55. *der gestiefelte Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 19. n. 34. Falco (Pennatus) cera pedibusque pennatis, luteis, corpore nigricante, griseo vario, subtus luteo-fusco, capite pallido, superciliis nigris.

91. Spadiceus. *Der chocolatfarbige Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 192. n. 10. *der chocolatfarbige Falk.* Tab. 9. unt. Fig.

Latham, Vögel, I. p. 49. A. *der Hudsons-Bayfalke.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl p. 19. Placentia Falcon.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 27. n. 57. Falco (Spadiceus) cera pedibusque pennatis flavis, corpore ſpadiceo, abdomine lateribus albo, femoribus luteo mixtis, ſpeculo alarum albo, rectricibus 5. exterioribus baſi albis.

β. F. Uropygio albo. *Der weißbürzliche Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 50. B. *der Hudſons - Bay-Falke mit weißem Bürzel.* (Im *Syſt. ornith.* hat *Latham* dieſe beyden Varietäten nicht getrennet; *vielmehr ſeinen white - rumped Bay-Falcon*, als eine Spielart von *Falco cyaneus* angenommen. S. Syſt. ornith. I. p. 40. n. β.)

92. S. Johannis. *Der St. Johns Falk.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 191. n. 9. *St. Johns Falk.* Tab. 9. obere Fig.

Latham, Vögel, I. p. 69. n. 58. *der St. Johannis Falke.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 34. n. 74. Falco (S. Johannis) cera, pedibusque pennatis flavis, corpore fuſco, capite colloque ferrugineis, cauda flaveſcente, faſciis nigris.

93. Sacer. *Der Sakerfalk.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 76. e. *der britanniſche Falke.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 298. *der Sakerfalke.* p. 299. *Brittiſcher Falke, Sokerfalk, heiliger Falk, Sacker, Köppel, Stockerfalk,*

(5) Nach *Briſſon* eine Variet. von *F. Communis.* Nach *Merrem* eine Varietät von *F. Gyrfalco.*

ckerfalk, heiliger Sakerfalke, Stock-oder Stoßfalk, Großfalk.

Halle, Vögel, p. 197. n. 133. *der brittische Falke, mit bohnenförmigen Flecken.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 753. n. 2. *der Sackerfalk.*

Handb. der Naturgesch II. p 119. *der Sacrefalk.*

Klein, av. p. 48. n. 2. Falco Sacer.

Klein, Vorbereit. p. 92 n. 2 *Sacker, Sockerfalke, Stockerfalke, heiliger Falke.*

Klein, verbess. Vögelhistorie, p. 48. n. 2. *Sacrefalk.*

Brisson, ornith. I. p. 98. M. *Le Sacre.*

Büffon, Vögel, II. p. 71. *der brittische Falke.* Tab. 38.

Batsch, Thiere, I. p. 293. *der brittische Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 69. n. 59. *der Saker-Falke.*

Latham, Syn, Suppl. p. 20 Sacre.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 34 n. 75. Falco (Sacer) cera pedibusque caeruleis, dorso, pectore, et tectricibus alarum fusco-maculatis, rectricibus maculis reniformibus.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 92. n. 3. β. *der heilige Geyerfalke.*

Krünitz, Encykl. XII. p. 130. n. 2. *der Sakerfalk, Großfalk.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 74. n. 21. *der Sakerfalke.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 50. *der Sakre-Falk.*

Jonston, av. p. 29. Sacer.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 205. n. 20. *der heilige Falke.*

β. *Pennant*, arct. Zool. II. p. 192. n. 12. *der heilige Falk.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 70. A. *der amerikanische Saker-Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 20. American Sacre.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 34. n. 75. β. Falco cera pedibusque caeruleis, corpore, remigibus rectricibusque fuscis, fasciis pallidis, capite, pectore et abdomine albis maculis longitudinalibus fuscis.

94. Novae terrae. *Der neuländische Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 192. n. 11. *der Falk von Neuland.*

Latham, Vögel, I. p. 70. n. 60. *der Neu-Foundländische Falk.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 34. n. 76. Falco (novae Terrae) cera pedibusque semipennatis, flavis, corpore supra fusco, occipite subtusque ferrugineo, abdomine nebuloso, cauda fusca, fasciis quatuor saturatioribus.

95. Stellaris. *Der Sternfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 307. n. 16. *der Blaufuß.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 117. n. 6. *der Sternfalk.*

Halle, Vögel, p. 214. n. 150. *der aschfarbne Bergfalk.*

Klein, av. p. 52. n. 18. Falco Cyanopus.

Klein, Vorbereit. p. 98. n. 18. *Blaufuß, Sprinz, aschfarbener Bergfalke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 51. n. 18. *Blaufuß.*

Brisson, ornitholog. I. p. 103. n. 11. Faucon etoilé.

Büffon, Vögel, II. p. 103. *der Sternfalke.*

Latham, Vögel, I. p. 70. n. 61. *der Stern-Falke.*

Latham,

Latham, Syſt. ornith. I. p. 35. n. 77. Falco (Stellaris) pedibus caeruleis, corpore nigricante, maculis ſtellas referentibus, ſubtus albo nigroque vario.

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 75. n. 23. *der Blaufuß.*

Jonſton, av. p. 33. Falco Cyanopus.

96. Hiemalis. *Der Winterfalk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 119. *der Winterfalk.*

β. Der nördliche Falk.

Pennant, arct. Zool. II. p. 120. *Lathams nördlicher Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 71. n. 62. *der Winterfalke.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 35. n. 78. Falco (Hyemalis) cera pedibusque flavis, capite corporeque ſupra atro-fuſcis, ſubtus ferrugineo-fuſcis, faſciis albis interruptis, cauda faſciis 4 fuſcis, apice albo.

97. Cirrhatus. *Der indianiſche geſchoppte Falk.*

Halle, Vögel, p. 219. n. 156. *der rauchbeinige indianiſche Falk, mit dem Federbuſche.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 90. n. 1. *Haubenfalke.*

Briſſon, ornithol. I. p. 104. n. 12. Faucon hupé des Indes.

Büffon, Vögel, II. p. 103. *der indianiſche geſchoppte Falk.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 117. n. 7. *der Haubenfalk aus Oſtindien.*

Latham, Vögel, I. p. 71. n. 63. *der indianiſche Falke mit dem Federbuſche.*

Latham, Syn. Suppl. p. 20. Creſted indian Falcon.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 36. n. 83. Falco (Cirrhatus) cera pedibusque pennatis luteis, criſta occipitis bifida pendula, corpore ſupra nigro, ſubtus albo nigroque ſtriato.

98. MELANOLEUCOS. *Der ſchwarz und weiße Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 72. n. 65. *der ſchwarz und weiße Falke, der indianiſche Ringelfalke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 20.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 36 n. 85. Falco (Melanoleucos) pedibus luteis, corpore albo, capite, collo, dorſo, axillis remigibusque nigris.

Naturforſch. I. p. 265. n. 2. *der ſchwarz und weiße Falke.*

Berlin. Samml. IX. p. 190. n. 2. *der ſchwarz und weiße Falk.*

Neueſte Mannichfalt. I. p. 187. n. 2. *der ſchwarz-und weiße Falk.*

Wolf, Reiſe n. Zeilan, p. 136. *der Falke?*

99. CEYLANENSIS. *der zeyloniſche Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 73. n. 66. *der ceyloniſche Falke mit dem Federbuſche.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 36. n. 84. Falco (Ceylanenſis) cera flava, corpore lacteo, capite pennis duabus elongatis dependentibus.

100. GRISEUS. *Der graue Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 73. n. 67. *der graue Falke.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 37. n. 86. Falco (Griſeus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore ſupra griſeo, abdomine albo, maculis oblongis nigris, cauda cuneiformi, longa, remigibus rectricibusque lateralibus albo maculatis.

27. GYR-

27. GYRFALCO. *Der braune Geyerfalk.* (6)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 87. n. 27. *Geyerfalke.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 22. *der Geierfalk, Gyrfalk, Mittelfalk, Raubfalk.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 72. n. 7. *der Geyerfalke.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 308. n. 17. *der Geyerfalke.* p. 311. *groſse Falken, Mittelfalken, Gierfalken, Geyer, Raubfalken, Gyr- oder Geyerfalken, Reigerfalken.*

Ebert, Naturl. II. p. 30. *der Geyerfalke, oder Gyrfalke.*

Halle, Vögel, p. 196. n. 132. *der Geierfalke.*

(6) Die Auseinanderſetzung der zu dieſer und der folgenden Gattung (wenn beyde wirklich von einander verſchieden ſind) gehörigen Synonymen, iſt mit groſsen und faſt unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden. Die Farbe der Wachshaut, der Füſse, und des ganzen Gefieders variirt ſo ſehr, und die Beſchreibungen der Naturhiſtoriker ſind in Anſehung des Vaterlandes, der Lebensart und der verſchiedenen einzelnen Theile des Körpers, zum Theil ſo ſchwankend und in einander laufend, daſs es oft gar nicht möglich iſt, mit Gewiſsheit zu beſtimmen, welche Gattung gemeynt ſey. *Beſeke*, deſſen Beobachtungen vielen Glauben verdienen, legt ſogar ſeinem Geyerfalken ein *gelbes Naſenwachs*, und dem Schwanze *vier weiſse Binden* bey, welche Umſtände auf keine von beyden Gattungen unſers Syſtems paſſen. Ich habe daher die Synonymen, wo mir das Syſtem nicht ſelbſt Anleitung gab, ſo gut, als es mir hier möglich war, zu ordnen geſucht. Es iſt aber unter allen kein einziges, welches ſich nicht gewiſſermaſsen auf beyde deuten lieſse. Ich beziehe mich übrigens auf dasjenige, was ich hierüber ſchon vorher *in der Anmerk. 2.* angeführt habe, und bemerke nur noch, daſs auch Pennant *Brünichs und Fabrizens isländiſchen Falken* mit hieher zieht,

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 752. n. 1. *der Geierfalk, Gyrfalk.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 114. *Geyer-Falke.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 112. *der Gyrfalk.*

Klein, av. p. 48. n. 1. Falco rapax, Gyrfalco, Falco vulturinus, Herodias.

Klein, Vorbereit. p. 91. n. 1. *Gyr-, Gerfalke.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 47. n. 1. *Gyrfalk, Gerfalk.*

Batſch, Thiere, I. p. 293. *der Geyerfalke.*

Latham, Vögel, I. p. 74. n. 68. *der braune Geyer-Falke.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 32. n. 68. Falco (Gyrfalco) cera caerulea, pedibus luteis, corpore fuſco, ſubtus faſciis cinereis, caudae lateribus albis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 15. n. 22. *der Geyerfalk.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 276. *Geyerfalke, Gyrfalk, Gerfalk.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 67. n. 44. *Geyerfalk.*

Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Freunde, VII. p. 449. n. 7. *der Geyerfalke.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 76. n. 24. *der Geyerfalke.*

Krünitz, Encyklop. XII. p. 129. n. 1. *der Ger-, Gier- oder Geyerfalk.*

Merrem, verm. Abh. p. 91. n. 3. *Geyer-Falke.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 10. Gyrfalco.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 22. Falco (Gyrfalco) cera caerulea, pedibus luteis, corpore fuſco, ſubtus faſciis cinereis, caudae lateribus albis.

101. Can-

101. CANDICANS. *Der weiſse Geyerfalk.* (7)

Briſſon, ornithol. I. p. 108. n. 19. Gerfault.
Büffon, Vögel, II. p. 60. Tab. 36. *der Geyerfalke.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 211. F. *der Geyerfalk.*
Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 91. n. 2. α. *der nordiſche Rauchfaſsfalke.*
Latham, Vögel, I. p. 74. n. 69. *der weiſse Geyer-Falke.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 50. *der Geyerfalk.*
Jonſton, av. p. 29. Gyrfalco?

β. ISLANDICUS. *Der isländiſche Geyerfalk.*
Briſſon, ornith. I. p. 108. A. Gerfault d'Islande.
Büffon, Vögel, II. p. 63. *der isländ. Geyerfalk.*
Latham, Vögel, I. p. 75. A. *der isländiſche Geyer-Falke.*

17. SUFFLATOR. *Der ſurinamiſche Falk.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 80. n. 17. *der Blaſer.*
Latham, Syn. I. p. 85. n. 7. Surinam Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 75. n. 70. *der ſurinamiſche Falke.*
Latham, Syſt. ornithol. p. 37. n. 87. Falco (Sufflator) cera pedibusque luteis, corpore fuſco albido, oculorum operculis oſſeis.
Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 91. *der ſurinamiſche Falke.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 52. Falco ſufflator.
Hermann, tab. affin. anim. p. 173. Falco ſufflator.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 16. Falco (Sufflator) cera pedibusque luteis, corpore fuſco albido, oculorum operculis oſſeis.

7) S. die vorhergehende Anmerkung. Länge des Körpers nach *Pennant* faſt 2 Fuſs; Flügelweite 4 Fuſs 2 Zoll. Gewicht 45 Unzen Troy.

18. CACHINNANS. *Der Lachfalk.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 81. n. 18. *der Spötter.*

Latham, Vögel, I. p. 76. n 71. *der Lach-Falke.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 37. n. 88. Falco (Cachinnans) cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fuſco albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 17. Falco (Cachinnans) cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fuſco albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente.

24. LANARIUS. *Die braune Lanette.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 85. n. 24 *der Mausadler.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 296. n. 14. *die Lanette.* p. 297. *Mausadler, Schwimmer (Swimern, Schweymer,) groſse Schlachter, Würger mit dem langen Schwanze; wollige Falken.*

Halle, Vögel, p. 199. n. 136. *der franzöſiſche Würger, mit rundlichen Münzflecken, an der inwendigen Seite der Flügel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 20. n. 24. *der Mausadler, franzöſiſche Würger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 214. K. *die Lanette.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 117. *der groſse Schlachter.*

Klein, av. p. 48. n. 5. Falco lanarius, crudelis.

Klein, Vorbereit. p. 93. n 5. *groſser Schlachter.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 48. n. 5. *groſser Schlachter.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 105. n. 16. Lanier.

Büffon, Vögel, II. p. 67. Tab. 37. *der franzöſiſche Würger.*

Batſch,

Batſch, Thiere, I. p. 293. *der franz. Würger.*
Latham, Vögel, I. p. 77. n. 72. *die braune Lanette, der Schweimer, Wachtelgeyer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 21. Lanner.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 38. n. 92. Falco (Lanarius) cera lutea, pedibus roſtroque caeruleis, corpore ſubtus maculis nigris longitudinalibus.
Lepechin, Tageb. der ruſſiſchen Reiſe, I. p. 308. *Neuntödter.* Ruſſ. *Balaban.*
Pallas, Reiſe d. Ruſsl. Ausz. I. p. 255. *Schwemmefalken oder Balaban.*
Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 370. Falco lanarius.
Pallas, Reiſe, Ausz. III. p. 373. *Steppenfalken.*
Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 286. n. 53. *der Würger-Falk.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 67. *der Würger mit langem Schwanz.*
Beckmann, phyſik. ökonom. Bibl. VI. p. 50. *der Schweymer.*
Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 52. Lanio?
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 9. Falco Lanarius.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 20. Falco (Lanarius) cera lutea, pedibus roſtroque caeruleis, corpore ſubtus maculis nigris longitudinalibus.
Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 67. Falco (Lanarius) cera lutea, pedibus roſtroque caeruleis, corpore ſubtus maculis nigris longitudinalibus. *Smirle.*
Brünich, ornith. bor. p. 1. n. 1. 2. Lanarius.
Jonſton, av. p. 32. Lanarius?
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 206. n. 21. *die Lanette.*

102. ALBICANS. *Die weiſse Lanette.*(8)

Briſſon, ornith. I. p. 107. n. 18. Lanier blanc.

Latham, Vögel, I. p. 78. n. 73. *die weiſse Lanette.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 38. n. 93. Falco (Albicans) cera pedibusque luteis, corpore fuſceſcente, ſubtus albicante, remigibus rectricibusque nigricantibus.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 78. ad n. 73. * *

10. CYANEUS. *Der blaue Habicht.*(9)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 69. n. 10. *der blaue Habicht.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 256. n. 5. *der blaue Habicht.* p. 259. *St. Martin, grauweiſſer Geyer, weiſſe Weyhe, blauer Falke, Schwarzflügel, kleiner Spitzgeyer, blaues Geyerle;* in Thüringen: *der Bleyfalke.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 165. *blauer Falk.*

Briſſon, ornith. I. p. 106. n. 17. Lanier cendré.

Büffon,

(8) Nach *Latham* vielleicht eine Spielart von der vorigen. Seine Länge giebt er auf ein Fuſs, achthalb Zoll, und die der Var. β. auf 2 Fuſs, 1 Zoll an.

(9) Hier findet ſich wieder eine groſse Verwechſelung der Synonymen, da dieſe und die folgende Gattung von mehrern für einerley gehalten werden. *Latham* ordnete vorher die Synonymen ſo wie ſie in unſerm Syſtem aufgeführt ſind. In ſeinem *Syſt. ornithol.* hat er eine merkliche Abänderung gemacht. Er nimmt *Brünichs* und *Briſſons Falco Torquatus*, *Raj* und *Willougby Pygargus*, *Kleins Falco plumbeus*, und *Albins Pygangus* als das Männchen, — *Linné's* und *Scopoli's Pygangus*, *Büffons Soubouſe*, *Pennants Ring-tail* in der brittiſchen Zoologie, und *Kramers kleinen Rohrgeyer* als das Weibchen, — *Briſſons Accipiter freti Hudſonis*, *Edwards Ringtail-Hawk*, als eine, — und ſeine eigene *Cayenne Ringtail* (Falco Buffoni) als die andere Varietät an.

Büffon, Vögel, II. p. 28. Tab. 24. *der St. Martin, oder der grauweiße Geyer.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 2. *der blaue Falk.*

Batsch, Thiere, I. p. 292. *der grauweiße Geyer.*

Latham, Vögel, I. p. 78. n. 74. *der Hühnerhabicht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 39. n. 94. Falco (Cyaneus) cera alba, pedibus fulvis, corpore caeruleo-canescente, arcu superciliari albo, gulam cingente. *(Mas.)*

Beseke, Vögel Kurl. p. 9. n. 6. *der blaue Habicht.*

Kramer, Austr. p. 329. n. 12. Falco cera luteo-viridi, cinereus, maculis abdominalibus longitudinalibus ferrugineis; *kleiner Spitz-Geyer, blaues Geyerl?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 174. F. Cyaneus.

Jonston, av. p. 13. Pygargus, genus alterum?

11. PYGARGUS. *Der Ringelfalk.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 70. n. 11. *der Bleyfalke.*

Halle, Vögel, p. 217. n. 154. *der aschfarbne Falk, mit weißem schwarzgewürfelten Schwanze.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 15. n. 17. *der Bleyfalk, Lerchengeier.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 199. n. 22. *der Falk mit einem Ringe um den Schwanz.*

Klein, av. p. 52. n. 22. Falco plumbeus, cauda tessellata.

Klein, Vorbereit. p. 100. n. 22. *Bleyfalke mit gewürfeltem Schwanz.*

(10) Nach *Latham* u. a. das Weibchen vom vorhergehenden. S. *die vorige Anmerk.* Gewicht des Männchens, nach *Latham* 12 Unzen, Länge 17 Zoll, Breite 3 Fuſs, 2 Zoll. — Gewicht des Weibchens 18 Unzen, Länge 20 Zoll, Breite über 3 Fuſs.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 51. n. 22. *Bleyfalk.*

Briſſon, ornith. I. p. 100. n. 7. Faucon à collier.

Büffon, Vögel, II. p. 17. Tab. 25. *der Ringelfalke, oder Halbweyhe.*

Batſch, Thiere, I. p. 292. *der Ringelfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 79. n. 75. *der Ringel-Falke.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 39. n. 94. Falco cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pallido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba. *(Femina.)*

Beſeke, Vögel Kurl. p. 9. n. 7. *der Bleyfalke.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 266. n. 9. *der Bleyfalke, Ringelfalke.*

Pennant, britt. Thiergeſch. Tab. 9. 10.

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 165. n. 3. F. Pygargus.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 3. n. 2. *der weißgeſchwänzte Adler, Steingeyer, Weißkopf, Gelbſchnabel.*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 375. Falco Pygargus.

Schriften der berlin. Geſellſchaft naturf. Freunde, VII. p. 447. n. 1. *der Bleyfalke.*

Naturforſch. VII. p. 40. *Bleyfalke, Tauberfalke.*

Naturforſch. VIII. p. 46. n. 8 *der Bleyfalke.*

Bechſtein, Muſterung ſchädlicher Thiere, p. 67. n. 14. *die Halbweyhe.*

Beckmann, phyſikal. ökonom. Bibl. VII. p. 221. Falco Pygangus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 9. Falco (Pygargus) cera flava, corpore cinereo, abdomine pallido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba.

Müller, zool. dan. prodrom. p. 10. n. 72. Falco (Pygargus) cera pedibusque flavis, corpore cinereo,

nereo, abdomine pallido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba.

Kramer, Auftr. p. 330. n. 13. Falco flavo-viridi, teftaceo-, ferrugineo-et fufco-varius; abdomine pallido, maculis longitudinalibus ferrugineis, *kleiner Spitzgeyer, kleiner Rohrgeyer?*

Brünich, ornithol. bor. p. 4. n. 14. Falco Torquatus?

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 206. n. 22. *der Bleyfalk.*

19. Hudsonius. *Der Falk von der Hudfons-bay.* (¹)

Müller, Naturfyft. II. p. 81. n. 19. *der hudfonifche Falk.*

Briffon, ornithol. I. p. 119. n. 37. Epervier de la Baye de Hudfon.

Latham, Vögel, I. p. 83. n. 76. *der Ringelfalk aus Hudfons-Bay.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 40. β. Falco cera pedibusque flavis, dorfo fufco, fuperciliis albis, fpeculo alarum caerulefcente.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 2. *der Ringelfalk.*

103. Buffoni. *Der cayennifche Ringelfalk.* (²)

Latham, Vögel, I. p. 85. A. *der cayennifche Ringelfalke.*

Latham,

(1) Nach *Latham* Synopf. eine eigne Gattung, nach *Latham* Syft. ornith. eine Spielart von *Falco Cyaneus*, wohin auch dafelbft *Pennants Ring-tail Hawk* in der arctifchen Zoologie, gerechnet wird.

(2) Nach *Latham* Synopf. eine Varietät von *Falco Hudfonius*. — Nach *Latham* Syft. ornithol. eine Spielart von *Falco Cyaneus*. Die Länge giebt *Latham* in der Synopf. auf zwey, die Flügelweite auf vier Fufs an.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 40. γ. Falco cera caerulea, pedibus luteis, corpore nigricante spadiceo, subtus rufescente, arcu gulari albicante, remigibus rectricibusque fusco-fasciatis.

104. ULIGINOSUS. *Der Sumpffalk.* (3)

Pennant, arct. Zool. II. p. 198. n. 21. *der Sumpffalk.*

Latham, Vögel, I. p. 84. A. *der Sumpf-Hacht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 40. n. 95. Falco (Uliginosus) cera pedibusque aurantiis, corpore supra fusco, subtus splendide ferrugineo, caudae taeniis quatuor nigris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 206. n. 23. *der Sumpffalk.*

105. LITHOFALCO. *Der Steinfalk.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 77. h. *der Bergfalke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 328. *Steinfalke.*

Brisson, ornithol. I. p. 101. n. 8. Faucon de Roche, ou Rochier.

Büffon, Vögel, II. p. 102. *der Steinfalke.*

Büffon, Vögel, II. p. 157. *der Steinfalke.* Tab. 44.

Latham, Vögel, I. p. 84. n. 77. *der Stein-Falke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 47. n. 115. Falco (Lithofalco) cera lutea, corpore fusco-cinereo, supra rufescente, striis fuscis, rectricibus apice

(3) Nach *Latham* Synops. eine Varietät von *Falco Pygargus*; — nach *Latham* Syst. ornithol. eine Varietät von *Falco Cyaneus*, weil er, wie ich schon vorher Anmerk. 9 angeführt habe, beyde in der Folge für einerley angenommen hat.

(4) Nach *Bechstein* u. a. eine Varietät von *Falco Nisus*.

apice nigricantibus, albo terminatis, laterali-bus nigro fasciatis.

Frisch, Vögel, Tab. 87. *der Steinfalk.*

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *der Steinfalke.*

Krünitz, Encyklop. XII. p. 133. n. 8. *der Steinfalk.*

Jonston, av. p. 33. Falco Lapidarius.

106. MONTANUS. *Der Bergfalk.* (5)

Halle, Vögel, p. 216. n. 152. *der graue Bergfalke.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 754. n. 11. *Bergfalk.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 117. n. 5. *der Bergfalk.*

Brisson, ornitholog. I. p. 101. n. 9. Faucon de Montagne, ou Montagner.

Büffon, Vögel, II. p. 102. n. 19. *der Bergfalke.*

Klein, av. p. 52. n. 20. Falco montanus, montarius. Cybindus. Accipiter nocturnus.

Klein, Vorbereit. p. 99. n. 20. *Birk-Bergfalke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 51. n. 20. *Birkfalk, Bergfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 84. n. 78. *der Bergfalke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 48. n. 116. Falco (Montanus) pedibus luteis, corpore fusco-cinereo, subtus albido, capite nigro, iugulo maculato, caudae basi cinerea, medio nigricante, apice albo.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 271. n. 15. *Steinfalke, Bergfalke.*

Naturforsch. VIII. p. 51. n. 15. *Bergfalk.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 101. Falco *montanus*, cera, digitis palpebrisque citrinis;

(5) Nach *Büffon* eine Spielart vom vorigen.

trinis; corpore atro, pectore macula alba notato, pedibus lanatis.

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *der Birkfalke.*

Krünitz, Encykl. XII. p. 133. n. 7. *der Berg- oder Birkfalk.*

Jonston, av. p. 30. Falco Montanus.

β. Der aschgraue Bergfalk. (Zwitterfalk.)

Brisson, ornithol. I. p. 102. A. Faucon de montagne cendré.

Latham, Vögel, I. p. 85. A. *der aschgraue Berg-Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 48. *β.* Falco pedibus luteis, corpore cinereo, subtus niveo, rectricibus duabus utrinque lateralibus albis.

Jonston, av. p. 31. alterum Montani genus.

16. TINNUNCULUS. *Der Thurmfalk.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 80. n. 16. *der Thurmfalk.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 74. n. 10. *der Kirchenfalke, Thurmfalke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 322. *der Thurmfalke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 311. n. 18. *der Thurmfalke.* p. 314. *Kirchenfalke, Wannenweher,*

(6) Länge 16 Zoll; Flügelweite 2 Fuss 8 Zoll. Gewicht des Männchens etwa siebentehalb Unzen. Nistet in den Steinritzen hoher Thürme, Bergschlösser, Felsen, auf alten Baumstämmen, in hohlen Bäumen. Legt im May 4 bis 6 rundliche, gelbröthliche, mit rothen und braunen Flecken besetzte Eyer. Die Jungen lassen sich sehr leicht zähmen, und verlassen das Haus nicht, wenn man ihnen die Flügel beschneidet. Die Benennung: *Rittel-* oder *Röthelgeyer* kömmt daher, weil der Vogel oft in der Luft lange auf einem Flecke hängt, und die Flügel schnell bewegt, welches die Jäger *ritteln* oder *rötteln* heissen.

nenweher, *Steinschmätzer*, *Röthelweyhe*, *Rötelweib*, *Rittlweyer*, *Windwahl*, *Graukopf*, *Wandweher*, *Wandwäher*, *Lachweyhe*, *Wiegwehen*, *Steinschmack*, *Steengall*, *Sperber*, *rother Sperber*; in Thüringen: *Röthelgeyer*, oder *Rittelgeyer*.

Halle, Vögel, p. 200. n. 138. *der Thurmfalke*.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 18. n. 21. *der Thurmfalk*, *Kirchenfalk*, *Wannenweher*, *Steinschmätzer*, *Röthelweyhe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 215. M. *der Thurmfalk*, *Wannenweher*.

Onomat. histor. natur. II. p. 784. Cenchris; *der Thurmfalke*, *Wannenweher*.

Handb. der Naturgeschichte, II. p. 121. *der Wannenweher*.

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 95. *Rittelgeyer*, *Wandwäher*, *Thurmfalk*, *Sperlingshabicht*.

Klein, av. p. 49. n. 7. Falco Cenchris.

Klein, Vorbereitung, p. 94. n. 7. *Wannenweher*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 48. n. 7. *Wannenweher*, *Graukopf*, *Steinschmatz*.

Klein, Vögeleyer, p. 19. Tab. 6. fig. 4.

Gesner, Vögelbuch, p. 309. *Wannenweher*.

Brisson, ornith. I. p. 113. n. 27. Cresserelle.

Büffon, Vögel, II. p. 148. Tab. 43. *der Kirchenfalke*.

Batsch, Thiere, I. p. 294. *der Kirchfalke*.

Latham, Vögel, I. p. 85. n. 79. *der Röthelgeyer*, *Wannenweher*, *Kirch-Falke*.

Latham, Syn. Suppl. p. 25. Kestrel.

Latham, Syst. ornith. I. p. 41. n. 98. Falco (Tinnunculus) cera pedibusque flavis, dorso rufo,

punctis

punctis nigris, pectore striis fuscis, cauda rotundata.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 13. n. 18. *der Thurmfalk.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 273. n. 18. *Thurm-, Kirchen-, Mauerfalke, Rothelgeyer.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 47. *Kirchenfalk.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 39. *Thurmfalk, Mauerfalk.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 165. n. 7. *Kirchenfalk, Sperlingshabicht.*

Pennant, britt. Thiergesch. (v. Murr) Tab. 11.

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 16. Falco Tinnunculus.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 79. *Rittelgeyer.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahnen, p. 347. *der Rittelgeyer.*

Linné, auserlesene Abhandl. II. p. 287. n. 53. *der Kirchenfalk.*

Naturforsch. VIII. p. 52. n. 18. *Thurmfalke.*

Nau, neue Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 246. Falco tinnunculus.

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 448. n. 6. *der Thurmfalke.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 77. n. 25. *der Thurmfalke.*

Beckmann, phys. ök. Bibl. VI. p. 11. *der Thurmfalk.* (Weibchen zuweilen fälschlich: *Lerchensperber.*)

Zorn, Petinotheol. II. p. 242. *das Röthel-Geyerlein.*

Krünitz, Encykl. XII. p. 131. n. 5. *der Kirchen- oder Thurmfalk.*

Jablonsky, allgem. Lexicon, p. 395. *der Rittel-Geyer, oder Rötel-Geyer.*

Merklein,

Merklein, Thierreich, p. 279. *Wannenweher.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 5. *der Wannenweher, Windwahl.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Falco Tinnunculus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 14. Falco Tinnunculus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 15. Falco (Tinnunculus) cera pedibusque flavis, dorso rufo, punctis nigris, pectore maculis longitudinalibus fuscis, cauda rotundata.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 9. n. 65. Falco (Tinnunculus) cera pedibusque flavis, dorso rufo, punctis nigris, pectore striis fuscis, cauda rotundata.

Kramer, Austr. p. 331. n. 15. Falco pedibus ceraque flavis, dorso rufescente, pectore maculis longitudinalibus fuscis, cauda rotundata; *Windwachl, Rittlweyer, Wannenweher.*

Brünich, ornith. bor. p. 1. n. 45. Falco Tinnunculus.

Jonston, av. p. 22. Tinnunculus.

Columella, de re rust. L. 8. c. 8. n. 7. Tinnunculus.

Aristot. hist. anim. L. VI. c. 8. Κεγχρις.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 207. n. 24. *der Thurmfalk.*

β. Griseus. *Der graue Thurmfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 86. B. *der graue Röthelgeyer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 42. β. Tinnunculus pennis griseis.

γ. Accipiter alaudarius. *Der Lerchenhabicht.*

Klein, av. p. 49. n. 8. Falco Murorum,Ruderum, Turrium?

Klein, Vorbereit. p. 94. n. 8. *Mauerfalke?*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 49. n. 8. *Mauerfalk?*

Klein, av. p. 49. n. 9. Falco varius, pictus, alaudarum.

Klein, Vorbereitung, p. 94. n. 9. *Lerchenfalke.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 49. n. 9. *Lerchenfalk, Schwimmer.*

Klein, Vögeleyer, p. 19. Tab. 6. fig. 6.

Briſſon, ornithol. I. p. 110. n. 22. Epervier des alouettes.

Latham, Vögel, I. p. 86. A. *der Lerchenhabicht.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 42. γ. Falco rufus, fuſco-ſtriatus, ſubtus rufeſcens maculis longitudinalibus fuſcis, rectricibus griſeo-rufeſcentibus, fuſco transverſim ſtriatis, apice nigricantibus, albo terminatis.

δ. *Der Thurmfalk mit hellblauem Kopfe.* *

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 315. n. 2.

ε. *Der weiße Thurmfalk.* *

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 315. n. 3.

107. Bohemicus. *Der böhmiſche Falk.* (7)

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 259. *der böhmiſche Mäuſehabicht.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 43. n. 100. Falco (Bohemicus) pedibus flaveſcentibus, corpore ſupra cinereo, ſubtus candido, remigibus 5. exterioribus extus nigris, orbitis albis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 207. n. 25. *der böhmiſche Falk.*

108. Piscator. *Der Fiſcherfalk.*

Büffon, Vögel, II. p. 141. Tab. 41. *der Fiſcherfalke.* (*Tanas* bey den Negern am Senegall.)

Latham,

(7) Nach *Bechſtein* eine Varietät von *Falco Cyaneus.*

Latham, Vögel, I. p. 86. n. 80. *der Fischer-Falke.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 43. n. 101. Falco (Piſcator) ſubcriſtatus, capite ferrugineo, corpore cinereo pennis margine fuſcis, ſubtus luteſcente, maculis longitudinalibus fuſcis.

109. Badius. *Der ceyloniſche braune Habicht.*

Latham, Vögel, I. p. 87. n. 81. *der ceyloniſche braune Habicht.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 43. n. 102. Falco (Badius) pedibus flavicantibus, corpore fuſco, ſubtus albo, lunulis flavis; tectricibus alarum albo marginatis, rectricibus lineis 4. nigricantibus.

110. Aquilinus. *Der Falk mit rother Kehle.*

Büffon, Vögel, I. p. 181. Tab. 13. *der kleine amerikaniſche Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 87. n. 82. *der Falke mit rother Kehle.*

Latham, Syn. Suppl. p. 26. Red-throated Falcon.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 38. n. 91. Falco (Formoſus) cera, orbitis pedibusque luteis, iugulo purpureo, corpore ſupra caeruleſcente-rubro, abdomine incarnato.

Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 90. n. 14. *rothhalſigter Adler.*

111. Fuscus. *Der braune amerikaniſche Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 88. n. 84. *der braune amerikaniſche Habicht.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 43. n. 103. Falco (Fuſcus) cera cinerea, pedibus flavis, corpore nigro ſtriato, ſupra cinereo-fuſco, ſubtus albicante, rectricibus faſciis 4. obſcurioribus.

31. Nisus. *Der Sperber.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 88. n. 31. *der Sperber.*

Leſke, Naturgeſch. p. 233. n. 6. *der Sperber.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 75. n. 11. *der Sperber, Lerchenfalke.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 161. n. 9. Falco (Niſus) cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griſeo-undulato, cauda faſciis nigricantibus; *der Sperber, Vogelfalke.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 324. n. 16. *der Sperber.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 320. n. 21. *der Sperber.* p. 327. *Sperber* (bey den Jägern) das Weibchen; *Sprinz, Sprenzchen, Blaubäckchen*, das kleinere Männchen. — *Weißgeſperberter Habicht, Isländer, Wachtelhabicht, Sperberfalke, Lerchenfalke, Lerchenſtößer, Taubenſtößer, Schwalbenfalke, Schwalbengeyer, Finkenfalke, Finkenſperber, Finkenhabicht, Stößer, kleiner Stockfalke, Goldfuß mit ſchwarzem Schnabel, Schwimmer, Luftſchiffer.*

Funke,

(8) Hält ſich vorzüglich gern in gebirgigen und waldigen Gegenden auf, und ſucht in Vorhölzern groſser Kettenwälder, wo er ſich in den tiefen Zweigen der Bäume verbirgt, immer dem freyen Felde nahe zu ſeyn, und geht beſonders vor Sonnen Auf- und Untergang ſeiner Nahrung nach. Brütet im May und Junius. Niſtet auf den höchſten Fichten. Das Neſt beſteht aus Reiſern, mit Moos, dürren Blättern und Haaren ausgefuttert. Legt 3 bis 4 ſchmutzig weiſse, mit roſtfarbigen groſsen und kleinen, eckigen und zackigen Flecken, beſonders am ſtumpfen Ende in Geſtalt eines Kranzes bezeichnete Eyer. Brütet faſt drey Wochen. Die Jungen ſehn im erſten und zweyten Jahre ſehr bunt aus, und erhalten erſt nach dem zweyten Mauſern die regulaire Farbenzeichnung. — Gewicht des Männchen, nach *Pennant* fünf, des Weibchen neun Unzen.

Funke, Naturgeſch. I. p. 282. *der Sperber.*
Ebert, Naturl. II. p. 33. *der Sperber.*
Halle, Vögel, p. 201. n. 139. *der Lerchenfalke.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 25. n. 32. *der Sperber, Finkenfalk, Finkensperber, Sprinz.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 216. N. *der Sperber.*
Beckmann, Naturhiſt. p. 37. c. *der Sperber.*
Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 332. *Sperber.*
Onomat. hiſtor. nat. I. p. 47. *der grüne Sperber, der kleine Habicht.*
Onomat. hiſtor. nat. V. p. 620. *Sperber, Finkenſperber, Lerchenfalke, kleiner Stoſsfalke, Finken Habicht.*
Handbuch der Naturgeſch. II. p. 109. *der kleine Habicht.*
Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 95. *Sperber, Finkenhabicht, Vogelfalke.*
Klein, av. p. 53. n. 23. Falco Fringillarius.
Klein, Vorbereit. p. 100. n. 23. *Finkenfalke.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 52. n. 23. *Finkenfalk, Sprinzel.*
Gesner, Vögelb. p. 307. *Sperber.*
Briſſon, ornith. I. p. 89. n. 1. Epervier.
Büffon, Vögel, II. p. 35. Tab. 31. *der Sperber, Finkenſperber.*
Batſch, Thiere, I. p. 293. *der Sperber.*
Latham, Vögel, I. p. 89. n. 85. *der Sperber, Vogelfalke.*
Latham, Syn. Suppl. p. 26. Sparrow-Hawk.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 44. n. 107. Falco (Niſus) cera viridi, pedibus flavis, abdomine griſeo undulato, cauda faſciis nigricantibus.
Beſeke, Vögel Kurl. p. 16. n. 25. *der Sperber.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 6. n. 6. *der Sperber, Finkenfalke, Sprinz.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 278. n. 24. *der Sperber.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 66. n. 42. *Sperber.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 51. *der Sperber.*

White, Naturgesch. von England, p. 58. *Sperber.*

Taube, Slavon. und Syrm. p. 23. *Sperber.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 12. *Sperber.*

Pallas Reise, I. p. 370. Falco Nisus.

Zorn, Petinotheol. II. p. 240. *der Sperber.*

Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 13. 14.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 78. *Sperber.*

Meidinger, Vorles. über d. Thierr. I. p. 112. n. 5. *der Sperber.*

Naumann, Vogelsteller, p. 125. *der Sperber.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 79. n. 28. *der Sperber.*

Tengmalm, neue schwed. Abhandl. IV. p. 44. Nisus.

Geoffroy, mat. med. VII. p. 274. *Habicht oder Sperber.*

Loniceri, Kräuterb. p. 658. *Sperber.*

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 291. *Sperber.*

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *Sperber.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 1102. *Sperber.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 389. *Sperber?*

Beckmann, Bibl. VI. p. 49. *der Sperber.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Nisus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 15. Falco Moschetus.

Linné,

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 92. n. 26. Falco (Niſus) cera viridi, pedibus flavis, pectore albo, fuſco undulato, cauda faſciis nigricantibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 71. Falco (Niſus) cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo, griſeo undulato, cauda faſciis nigricantibus.

Kramer, Auſtr. p. 332. n. 16. Falco cera viridi, pedibus flavis, pectore albo, undulis transverſis fuſcis, cauda fuſca faſciis nigricantibus; *Sprinzl* mas, *Sperber* foemina.

Brünich, ornith. bor. p. 5. Niſus.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 189. Accipiter fringillarius; *ein Sperber*, *Sperwer*.

Knorr, delic. nat. II. p. 83. Tab. I. 3.

Jonſton, av. p. 21. Accipiter Fringillarius.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Niſus.

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 207. n. 26. *der Sperber.*

β. Maculatus. *Der gefleckte Sperber.*

Klein, av. p. 53. n. 25. Falco manibus aureis, roſtro nigricante.

Klein, Vorbereitung, p. 101. n. 25. *Goldfuß mit ſchwarzem Schnabel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 52. n. 24. *Goldfuß mit ſchwarzem Schnabel.*

Briſſon, ornithol. I. p. 90. A. Epervier tacheté.

Büffon, Vögel, II. p. 36. *der gefleckte Sperber.*

Latham, Vögel, I. p. 90. A. *der gefleckte Sperber.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 45. β. Accipiter maculatus.

γ. Lacteus. *Der weiße Sperber.*

Gesner, Vögelb. p. 307. *ganz weiße Sperber.*

Latham, Vögel, I. p. 91. B. *der weiße Sperber.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 45. γ. Falco lacteus.

112. Dubius. *Der unbeſtimmte Falk.* (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 203. n. 28. *der unbeſtimmte Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 107. n. 115. *der unbeſtimmte? Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 37. dubious Falcon.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 44. n. 104. Falco (Dubius) cera, iridibus pedibusque flavis, corpore fuſco, ſubtus albo, ſtriis fuſcis, rectricibus cinereis, faſciis 4 nigris.

113. Obscurus. *Der dunkelbraune Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 203. n. 29. *der dunkelbraune Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 107. n. 116. *der americaniſche Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 38. Dusky Falcon.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 44. n. 105. Falco (obſcurus) cera pedibusque flavis, corpore fuſco, ſubtus ſtriis albis, cervice albo maculato, rectricibus fuſco alboque faſciatis.

21. Columbarius. *Der caroliniſche Taubenfalk.* (10)

Müller, Naturſyſt. II. p. 82. n. 21. *der Taubenſperber.*

Halle,

(9) Gewicht, nach *Pennant*, 8 Unzen. Soll eine Spielart vom folgenden ſeyn.

(10) Länge 10 bis 12 Zoll. Gewicht 6 Unzen. Bewohnt Amerika von der Hudſonsbay bis Südcarolina. In der Hudſonsbay erſcheint er im May an den Ufern des Severnfluſſes, brütet daſelbſt, und geht im Herbſt nach Süden zurück. Friſst kleine Vögel. Fliegt, wenn ſich ihm jemand nähert, mit groſsem Geſchrey im Kreiſe herum. Niſtet in Felſen oder

Halle, Vögel, p. 206. n. 141. *der Tauberfalke mit langen ſchmalen Fiſcherhoſen.*

Merrem, verm. Abh. p. 93. n. 7. *Taubenfalke.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 20. n. 23. *der Buntſchwänzel, Taubenſperber.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 202. n. 27. *der Taubenfalk.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 810. *Taubenhabicht.*

Briſſon, ornithol. I. p. 110. n. 21. Epervier de la Caroline.

Büffon, Vögel, II. p. 58. *der Taubenhabicht.*

Klein, av. p. 51. n. 17. Falco Carolinenſis Palumbarius.

Klein, Vorbereitung, p. 98. n. 17. *Buntſchwänzel, karoliniſcher Taubenfalk.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 51. n. 17. *Buntſchwänzel.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 6. *der Taubenhabicht.*

Latham, Vögel, I. p. 91. n. 86. *der Taubenhacht aus Carolina.*

Latham, Syn. Suppl. p. 27. Pigeon Hawk.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 44 n. 106. Falco (Columbarius) cera, iridibus pedibusque luteis, corpore fuſco, ſubtus albido, ſtriis fuſcis, cauda faſciis linearibus 4 nigris.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 19. Falco (Columbarius), cera lutea, corpore fuſco, ſubtus albido, cauda fuſca, faſciis linearibus quatuor albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Columbarius.

oder hohlen Bäumen. Legt 2 bis 4 weiſse, rothgefleckte Eyer. Raubt in Carolina Tauben, und junge welſche Hühner. *Pennant.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 208. n. 27. *der Taubenfalk.*

22. Superciliosus. *Der guianische Falk.*

Müller, Natursyst. II. p. 83. n. 22. *der surinamische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 92. n. 87. *der guianische Falk.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 45. n. 108. Falco (Superciliosus) cera, pedibus palpebrisque luteis, corpore fusco, albido undulato, remigibus ferrugineis, nigro fasciatis.

23. Vespertinus. *Der Abendfalk.*

Müller, Natursyst. II. p. 83. n. 23. *der Kobetz.*

Latham, Vögel, I. p. 92. n. 28. *der Falk aus Ingrien.*

Latham, Syn. Suppl. p. 27. Ingrian Falcon.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 46. Falco (Vespertinus) cera, pedibus palpebrisque luteis, crisso femoribusque ferrugineis.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 66. n. 43. *Nachtfalk.*

Decouv. Russ. II. p. 142. Kobez.

Hermann, tab. affin. animal. p. 274. F. Vespertinus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 208. n. 28. *der Kobez.*

114. Vespertinoides. *Der Falk aus Permien.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 46. n. 110. Falco (Vespertinoides) cera, pedibus palpebrisque luteis, femoribus nigris, collo, pectore et ventre fuscescentibus, albo maculatis.

115. Magni-

115. MAGNIROSTRIS. *Der großschnäblichte Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 93. n. 89. *der Großschnäbler-Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 27. Greatbilled Falcon.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 46. n. 111. Falco (Magnirostris) cera pedibusque flavis, corpore fusco, abdomine albo, striis ferrugineis, rectricibus albo nigroque fasciatis.

14. SUBBUTEO. *Der Baumfalk.*(1)

Müller, Natursystem, II. p. 78. n. 14. *der Baumfalke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 323. n. 15. *der gemeine Baumfalke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 317. *der gemeine Baumfalke.* p. 320. *der kleine Bußhart, Lerchenfalke, Stoßfalke.* Bey den thüring. Jägern: *das Weißbäckchen.*

Halle, Vögel, p. 219. n. 157. *der kleine Bushart mit rothen schwarzfleckigen Schenkeln, und rothweißem Halse.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 16. n. 19. *der Baumfalk, kleine Bushart.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 216. O. *der Baumfalk.*

Onomat. histor. natur. III. p. 591. Dendrofalco; *der Baumfalk.*

Hand-

(1) Länge 1 Fuss 4 Zoll. Flügelweite 3 Fuss 4 Zoll. Gewicht des Männchen, nach *Pennant* 7 Unzen. Hält sich beständig in den Wäldern auf, und nistet auf den höchsten Bäumen. Zuweilen baut er kein eignes Nest, sondern bedient sich eines alten der Rabenkrähe. Legt 3 bis 4 weisse, röthlich gefleckte Eyer. Die Jungen sehn im ersten Jahre schwärzer aus, und sind gewöhnlich am Unterleibe aschfarbig und ungefleckt.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 120. *der Baumfalk.*

Handb. der deutſchen Thiergesch. p. 93. *Baumfalke, Stoßfalke, Lerchenfalke, kleiner Weißback.*

Gesner, Vögelbuch, p. 331. *Baumfalk.*

Briſſon, ornithol. I. p. 109. n. 20. Habereau.

Büffon, Vögel, II. p. 143. Tab. 42. *der Baumfalke.*

Batſch, Thiere, I. p. 294. *der Baumfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 93. n. 90. *der Baum-Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 28. Hobby.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 47. n. 114. Falco (Subbuteo) cera pedibusque flavis, dorſo fuſco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuſcis, criſſo femoribusque rufis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 12. n. 16. *der Baumfalk.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 271. n. 16. *Baumfalke, Lerchenfalke.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 66. n. 41. *Lerchenfalk.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 79. *Baum-Falke.*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 165. n. 5. *Lerchenfalke, Baumfalke.*

Mellin, von Anleg. der Wildb. p. 347. n. 8. *der Baumfalke, Steinfalke.*

Pennant, britt. Thiergeſch. (v. Murr) Tab. 12. *der Lerchenfalk.*

Naturforſch. VIII. p. 51. n. 16. *Baumfalke.*

Schriften der berlin. Geſellſchaft naturf. Freunde, VII. p. 448. n. 4. *der Baumfalke.*

Nau, Entdeck. a. d. Naturgeſch. I. p. 246. Falco Subbuteo.

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 77. n. 26. *der gemeine Baumfalke.*

Tänzer,

Tänzer, notabil. venat. p. 132. *der Baumfalk.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 241. *der Weißback oder Schmerl.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 11. Dendro-Falco.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 13. Falco (Subbuteo) cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis.

Müller, zoolog. dan. prodrom. p. 9. n. 63. Falco (Subbuteo) cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis.

Brünich, ornithol. bor. p. 3. n. 10. 11. Falco Subbuteo.

Jonston, av. p. 33. Falco arborarius.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 209. n. 29. *der Baumfalk.*

116. Aurantius. *Der Falk mit orangefarbner Brust.*

Latham, Vögel, I. p. 95. n. 91. *der Baum-Falke mit orangefarbner Brust.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 48. n. 117. Falco (Aurantius) rostro pedibusque plumbeis, corpore nigricante, dorso basique caudae fasciis albicantibus interruptis, pectore fulvo, femoribus ferrugineis.

β. Orange-breasted Hobby. *

Latham, Syn. Suppl. p. 28.

Latham, Syst. ornith. I. p. 48. n. 117. *β.*

Latham, Vögel, I. p. 95.

γ. Falco

γ. Falco pedibus fulvis, corpore ſupra nigro-caeruleſcente, faſciis caeruleſcentibus, ſubtus faſciolis albis, abdomine imo, femoribus criſſoque rufis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 29. deſcr. 2.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 48. n. 117. γ.
Latham, Vögel, I. p. 95.

117. PLUMBEUS. *Der Falk mit gefleckten Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 95. n. 92. *der Baum-Falk mit gefleckten Schwanze.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 49. n. 118. Falco (Plumbeus) cera obſcura, pedibus flavis, capite, dorſo infimo, abdomineque cinereis, remigibus intus ferrugineis, rectricibus lateralibus intus maculis tribus albis.

118. AESALON. *Das Schmierlein.*(2)

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 328. n. 22. *der Merlin.* p. 330. *kleiner Rothfalke, Zwergfalke, Schmierlein, Schmerl, kleiner Sperber.*

Halle, Vögel, p. 205. *der Sperber mit weißgelbem Nackenring.*

Onomat. hiſtor. nat. I. p. 117. Aeſalo, Smerillus, Merillus.

Handb.

(2) Die zu dieſer und der nächſtfolgenden Gattung gehörigen Synonymen werden häufig verwechſelt; auch die Varietäten der erſtern ſehr unter einander geworfen; die ganze Gattung von einigen mit *Falco Minutus* für einerley gehalten; manche Spielarten wieder zu andern Gattungen gerechnet, u. dgl. m. Das *Schmierlein* legt ſein Neſt in ebenen und gebirgigen Waldungen auf hohen Bäumen an, und legt 5 bis 6 weiſsliche, mit braunen Punkten beſetzte Eyer. Nährt ſich von allerhand kleinen Vögeln; iſt aber auch wohl im Stande ſich eines Rebhuhns zu bemächtigen. — Flügelweite 26 und einen halben Zoll.

Handb. der Naturgeſch. II. p. 113. *der Sperber.*
Klein, av. p. 50. n. 10. Falco Aeſalon.
Klein, Vorbereit. p. 95. n. 10. *Schmierlein.*
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 49. n. 10. *Sperber, Schmierlein.*
Gesner, Vögelb. p. 303. *Mirlein oder Smirlein.*
Briſſon, ornitholog. I. p. 111. n. 23. Emerillon.
Büffon, Vögel, II. p. 164. *der europäiſche Smerl.*
Latham, Vögel, I. p. 96. n. 93. *das Schmierlein.*
Latham, Syn. Suppl. p. 29. *Merlin.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 49. n. 119. Falco (Aeſalon) cera pedibusque flavis, capite ferrugineo, corpore ſupra caeruleſcente - cinereo, maculis ſtriisque ferrugineis, ſubtus flavicante-albo, maculis oblongis.
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 274. n. 18. *der Hühnerdieb, Schmierlein, Merle?*
Bock, Preuſſen, IV. p. 279. n. 25. *Zwergfalke;* (mit *Falco Minutus* verwechſelt.)
Döbel, Jägerpraktik, I. p. 79. *Sprentzgen oder Schmerl.*
Tänzer, notab. venator. p. 133. *der Schmerl.*
Naturforſch. VIII. p. 55. n. 25 *Zwergfalk;* (mit *Falco Minutus* verwechſelt.)
Bechſtein, Muſterung ſchädlicher Thiere, p. 80. n. 29. *der Merlin.*
Pennant, britt. Thiergeſch. (v. Murr) Tab. 15. *Schmerling.*
Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 348. Smerillus. p. 349. Falco parvus, Merlinus; *ein Smyrle, Smyrlin, Myrle.*
Rzaczynſk. auct. hiſtor. nat. Polon. p. 354. Falconellus.
Hermann, tab. affin. anim. p. 172. F. Aeſalon.
Plin. hiſt. nat. Lib. X. c. 8. Aeſalon?

β. Noveboracensis. *Der Merlin von Neuyork.* (3)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 202. *der Merlin von Neuyork.*

Latham, Vögel, I. p. 97. A. *das Schmierlein aus Neuyork.*

γ. Caribaeorum. *Das caribäische Schmierlein.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 113. n. 1. *der Grigri.*

Brisson, ornithol. I. p. 111. n. 24. Emerillon des Antilles.

Büffon, Vögel, II. p. 165. *Gry Gry.*

Latham, Vögel, I. p. 98. B. *das karibäische Schmierlein.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 49. β. Accipiter supra rufus, maculis nigris variis, inferne albus, maculis longitudinalibus nigris notatus.

δ. Falconariorum. *Das Falkonirer-Schmierlein.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 19. n. 22. *das Schmierlein*, *der Schmerl, Myrle.*

Büffon, Vögel, II. p. 159. Tab. 45. *das Schmierlein.*

Latham, Vögel, I. p. 98. C. *das Falkonirer-Schmierlein.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 49. γ. Aesalon habitu *Subbuteonis*, ceterum *Lithofalconi* similior.

Beckmann, Bibl. VI. p. 51. *der Emerillon, das Schmierlein.*

20. Spar-

(3) Ist nach *Pennant* dem *Falco Dominicensis* so ähnlich, daſs er kaum von demselben zu trennen seyn möchte. Im Syst. ornith. hat *Latham* ihn auch selbst als das Weibchen von der folgenden Gattung angenommen; p. 42.

20. SPARVERIUS. *Der Kalotchenfalk.* (4)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 81. n. 20. *der Hühnerdieb.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 201. n. 26. *der kleine Falk.*

Klein, av. p. 51. n. 16. Falco vertice vel rubro vel luteo.

Klein, Vorbereit. p. 97. n. 16. *Kalotchenfalke.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 50. n. 16. *Kalotchenfalk.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 113. n. 2. *der Sperber aus Carolina.*

Briſſon, ornithol. I. p. 112. n. 25. Emerillon de la Caroline.

Büffon, Vögel, II. p. 167. *der kleine Habicht.*

Latham, Vögel, I. p. 99. n. 94. *das amerikaniſche Schmierlein.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 42. n. 99. Falco (Sparverius) cera pedibusque luteis, capite fuſco, vertice abdomineque rubro, alis caeruleſcentibus. *(Mas.)*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 10. *der kleine Falk.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 18. Falco (Sparverius) cera lutea, capite fuſco, vertice abdomineque rubro, alis caeruleſcentibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Sparverius.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 209. n. 30. *der kleine Falk.*

119. DOMINICENSIS. *Der Falk von Domingo.* (5)

Pennant, arct. Zool. II. p. 202. *oben.*

Briſſon,

(4) Nach *Latham* Syſt. ornithol. gehören die Synonymen der folgenden Gattung mit hieher.

(5) Nach *Pennant* und *Latham* das Weibchen von *Falco Sparverius.*

Briſſon, ornith. I. p. 112. n. 26. Emerillon de S. Domingue.

Latham, Vögel, I. p. 99. n. 95. *der St. Dominik-Falke.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 42. n. 99. Falco cera, pedibusque luteis, capite cinereo, corpore rufo-vinaceo, nigro faſciato, ſubtus albido, maculis ferrugineis, rectricibus faſciis undecim nigris. (femina.)

32. MINUTUS. *Der Zwergfalk.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 90. n. 32. *der Zwergfalke.*

Briſſon, ornithol. I. p. 91. n. 2. Petit epervier.

Latham, Vögel, I. p. 100. n. 96. *der Zwerg-Falke.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 50. n. 121. Falco (Minutus) cera fuſca, pedibus luteis, corpore ſubtus albo, rectricibus fuſcis, nigro-faſciatis.

Fiſcher, Zuſ. z. Naturgeſch. von Livland, p. 43. n. 488. *Zwergfalk?*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 87. *der allerkleinſte Habicht?*

9. CAERULESCENS. *Der bengaliſche Falk.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 69. n. 9. *der kleine bengaliſche Habicht.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 52. n. 25. *indianiſcher Sperber.*

Briſſon, ornithol. I. p. 119. n. 38. Falco Bengalenſis; *Faucon de Bengale.*

Merrem, vermiſchte Abhandl. p. 90. n. 15. *kleiner Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 100. n. 97. *der bengaliſche Falke.*

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 50. n. 120. Falco (Caeruleſcens) cera, palpebris, pedibus ſubtusque luteus, dorſo nigro-caeruleſcente, temporibus linea alba incluſis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 3. *der kleine ſchwarz und oranienfarbne indianiſche Falk.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 88. n. 7. Falco (Caeruleſcens) cera, palpebris, pedibus ſubtusque luteus, dorſo nigro-caeruleſcente, temporibus linea alba incluſis.

Gerin. ornith. I. p. 66. Tab. 44. fig. 1. Falco parvus indicus.

120. Regulus. *Der ſibiriſche Falk.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 67. n. 34. *der kleine König.*

Latham, Vögel, I. p. 101. n. 98. *der ſibiriſche Falke.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 50. n. 122. Falco (Regulus) cera vireſcente, pedibus obſcure flavis, torque ferrugineo, corpore ſupra plumbeo, ſubtus albido, maculis ferrugineo-fuſcis.

Pallas, Reiſe, Ausz. II. Anh. p. 7. n. 13. Falco Regulus.

Hermann, tab. affin. animal. p. 172. F. Regulus.

b. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Die XIIte Edition hatte 32 Gattungen; die XIIIte 120, worunter 3, als die 34te, 38te und 39te aus dem vorigen Geſchlecht hieher verſetzt worden. Da nun die 61te und 121te Gattung, p. 261 und 263. ohnſtreitig einerley, ſo beläuft ſich die Anzahl der neu hinzugekommenen auf 84. Auſserdem ſind bey der 12ten Gattung 4, bey

der 13ten 14. bey der 16ten 4, bey der 26ten 4, bey der 31ten 3 Varietäten aus einander gesetzt, und bey der 27ten die Synonymen dergestalt getrennt, daß daraus die 101ste als eine neue Gattung entstanden ist.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Ein Adler, der das Mittel hält zwischen Adler und Falken.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 7. Tab. 1.

2. *Der getiegerte Falk.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 10. n. 11. Falco tigrinus. Tab. 2.

3. *Der Falk mit gelbem Nasenwachs, Augenringen und Füßen; ist röthlich schmutzig weiß; Flügel, Rücken und Schwanz dunkelbraun; Endspitzen der Flügel heller; Schwanz mit vier hellern gezackten Binden; Füße bis über die Knie mit einfarbigen, röthlich braunen Flecken besetzt.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 11. n. 12. a. b.

4. *Ein dem vorigen ähnlicher Falk.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 12. n. 14.

5. *Ein dem Falco Fulvus ähnlicher Falk.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 15. n. 21.

6. *Ein dem Falco Aeruginosus ähnlicher Falk.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 16. n. 24.

7. *Ein dem Falco Nisus ähnlicher Falk.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 16. n. 26.

8. *Ein unbekannter Falk, von der Größe der Bleyfalken.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 17. n. 27.

9. *Ein*

9. *Ein ganz ſchwarzer Falk, mit fahlſchwarzen Schwingfedern und Unterleibe; Lenden, After, Deckfedern des Schwanzes ſchön braunroth; Augen ſchwarz; Augenlieder kahl und nebſt dem Naſenwachs und Füßen ziegelroth; Schnabel gezähnt.*
Beſeke, Vögel Kurl. p. 19. n. 28.

10. *Der weiße Falk,* (Falco Leucaëtos) *aus Neuholland; mit ſchwarzem Schnabel, gelber Schnabelhaut und gelben Füßen.*
White, Reiſe nach Neuſüdwallis; — in dem Magazin merkw. Reiſebeſchr. V. p. 127.
Vielleicht Falco Cyaneus?

11. *Der große Baumfalke.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 315. n. 19.

12. *Ntann, eine Adlerart am Senegall.*
Adanſon, Reiſe nach Senegall, p. 154.

13. *Kleke*, in Norwegen.
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 126. n. 3.

14. *Der geſtreifte Falk aus Madagaſkar.*
Latham, Vögel, I. p. 103. n. 105.
Sonner. Voy. Ind. II. p. 181. l'Autour à ventre rayé de Madagaſcar. pl. 103.

15. *Der amerikaniſche Rauchfußfalk.*
Latham, Vögel, I. p. 68. n. 56.
Forſter, Cat. N. A. p. 9. Rough-footed Falcon.

16. *Der grönländiſche Falk.*
Latham, Vögel, I. p. 106. n. 103.
Fabric. fn. groenl. p. 56. n. 34. *b.* Falco (Fuſcus) cera pedibusque plumbeis, ſupra ſubfuſcus, ſubtus

subtus albidus maculis fuscis longitudinalibus.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 210. E. *der dunkelbraune Falk.*

Cranz, Hist. von Grönland, p. 112. —

Egede, Beschr. von Grönl. p. 88. *graue Falken?*

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Falk mit schwarzem Halse;* (aus Cayenne.)

Latham, Syn. Suppl. p. 30. n. 100. Black-necked Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 102. n. 100.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 35. n. 80. Falco (Nigricollis) pedibus flavis, corpore rufo, nigro fasciato, vertice colloque nigro striatis, iugulo nigro, rectricibus ad apicem nigricantibus.

2. *Der Falk mit dem weißen Halse;* (aus Cayenne.)

Latham, Syn. Suppl. p. 30. n. 101. White-necked Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 102. n. 101.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 36. n. 81. Falco (Albicollis), pedibus flavis, capite, collo, dorso antice corporeque subtus albis, pennis interscapularibus maculis quadratis nigris, alis nigris albo maculatis.

3. *Der asiatische Falk;* (in China.)

Latham, Syn. Suppl. p. 31. Asiatic Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 102. n. 102.

Latham, Syst. ornith. I. p. 14. n. 15. Falco (Asiaticus) pedibus semilanatis flavis, corpore fusco, subtus albo, pectore striato, rectricibus griseo-argenteis, exteriore fasciis quinque obsoletis.

4. *Der*

4. *Der Falk von der Johanna-Insel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 32. Johanna Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 103. n. 104.
Latham, Syst. ornith. I. p. 47. n. 113. Falco (Iohannensis) pedibus luteis, corpore ferrugineo punctis linearibus nigris, gula lutescente, remigibus fusco nigricantibus, cauda cuneiformi, tectricibus albis.

5. *Der Cheela*, in Indien.

Latham, Syn. Suppl. p. 33. Cheela Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 104. n. 106.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 14. n. 14. Falco (Cheela) subcristatus fuscus, capistro albo, tectricibus alarum albo maculatis, cauda fascia lata alba.

6. *Der Falk mit rothbraunem Kopfe;* (in Cayenne.)

Latham, Syn. Supplem. p. 33. n. 107. Rufous-headed Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 104. n. 107.
Latham, Syst. ornith. I. p. 36. n. 82. Falco (Meridionalis) cera gulaqne luteis, capite colloque rufis, fusco nigrove striatis, abdomine albido, fasciolis cinereis, rectricibus 4. intermediis fascia unica, lateralibus 6 pallidis.

7. *Der gestreifte Falk aus Cayenne.*

Latham, Syn. Supplem. p. 34. n. 109. Streaked Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 105. n. 109.
Latham, Syst. ornith. I. p. 37. n. 89. Falco (Melanops), cera pedibusque luteis, corpore nigro, albo maculato, subtus albo, capite colloque albis, nigro striatis, orbitis nigris, rectricibus nigris, medio fascia alba.

8. *Der Falk mit gekerbtem Schnabel;* (in Cayenne.)
Latham, Syn. Suppl. p. 34. n. 110. Notched Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 105. n. 110.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 38. n. 90. Falco (Bidentatus) roſtro bidentato fuſco, corpore plumbeo, pectore abdomineque rufis, criſſo albo, remigibus faſciis plurimis, rectricibus tribus albis.

9. *Der Falk mit rautenförmigen Flecken;* (in Indien, am Ganges.)
Latham, Syn. Suppl. p. 35. Rhomboidal Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 106. n. 111.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 35. n. 79. Falco (Rhombeus) pedibus flavicantibus, ſupra griſeus, ſubtus fuſcus, maculis rhombeis, rectricibus faſciis undecim obliquis nigris.

10. *Der Behree*, in Indien.
Latham, Syn. Suppl. p. 35. Behree Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 106. n. 112.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 41. n. 96. Falco (Calidus) pedibus flavis, corpore fuſco-nigro, ſubtus albo, lunulis nigris, rectricibus faſciis obſoletis.

11. *Der Bleyfalk;* (in Cayenne.)
Latham, Syn. Suppl. p. 37. Plumbeous Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 107. n. 114.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 41. n. 97. Falco (Nitidus) plumbeus, ſubtus albus, faſciis cinereis, rectricibus nigricantibus, lineis duabus transverſis albis.

12. *Der Schreyfalk;* (in Indien.)
Sonner. Voy. Ind. II. p. 184. Petite Buſe criarde.
Latham, Syn. Suppl. p. 38. Criard Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 108. n. 117.

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 46. n. 112. Falco (Vociferus) pedibus flavis, corpore cinereo-griſeo, ſubtus albo, tectricibus alarum minoribus maioribusque nigris.

13. *Der kleinſte Falk;* (in Cayenne.)

Latham, Syn. Suppl. p. 39. Tini Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 108. n. 118.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 50. n. 125. Falco (Tinus) pedibus flavis, corpore cinereo-fuſco, ſubtus albido faſciis nigricantibus, vertice albido.

14. *Der Schneegeyer.*

Kramer, Auſtr. p. 329. n. 10. Falco cera lutea, pedibus, exceptis digitis, lanatis; corpore teſtaceo, maculis nigris, capite et collo albidioribus; *Schneegeyer, Rauchfuß, Moosgeyer.*
Latham, Syſt. ornith. I. p. 26. n. 54. Falco (Sclavonicus) cera lutea, pedibus, exceptis digitis, lanatis, corpore teſtaceo, maculis nigris, capite et collo albidioribus.
Vielleicht eine Spielart von Falco Aeruginoſus?

15. *Der Falk mit ſchwarzbandirten, zu beyden Seiten weißgerändelten Schwanzfedern;* (in Slavon.)

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 26. n. 55. Falco (Marginatus) cera caeruleſcente, corpore ſupra fuſco ferrugineoque vario, ſubtus ferrugineo, maculis ſubovatis fuſcis, rectricibus faſciis nigricantibus, albo utrinque marginatis.

16. *Der Falk mit röthlichem Fleck auf der Bruſt;* (in Slavonien.)

Latham, Syſt. ornith. I. p. 27. n. 56. Falco (Rubiginoſus) fuſcus, ſubtus albeſcenti-luteus,

macula pectorali lutea, rectricibus fasciis 4. testaceis.

17. *Ein unbestimmter Falke.*

Sparrmann, muf. Carlf. Fafc. II. Tab. 26.

Latham, Syft. ornith. I. p. 32. n. 70. Falco (Incertus) cera flava, corpore cinereo-fufco, fubtus ferrugineo, rectricibus fafciis tribus fufcis.

* * *

Ein Verzeichnifs von Schriften über die Falconirkunft findet man in *Böhmers* fyft. lit. Handb. der Naturgefch. II. 1. p. 544 ff.

43. GESCHLECHT. STRIX. *Die Eule.*

Müller, Naturfyft. II. p. 92. Gen. XLIII.

Leske, Naturgefch. p. 233. Gen. XII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 75. Gen. III.

Blumenbach, Handbuch der Naturgefch. p. 161. Gen. III.

Bechftein, Naturgefch. I. p. 325. Gen. III.

Bechftein, Naturgefchichte Deutfchl. II. p. 330. Gen. III.

Funke, Naturgefch. I. p. 285.

Ebert, Naturl. II. p. 34.

Halle, Vögel, p. 229.

Pennant, arct. Zool. II. p. 217.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 713.

Onomat. hift. nat. II. p. 306. VII. p. 312.

Klein, av. p. 54. Gen. I. Trib. IV.

Briffon, ornithol. I. p. 139. Gen. XI. p. 146. Gen. XII.

Büffon, Vögel, III. p. 1.

Batfch, Thiere, I. p. 285. 295. Gen. LII.

Latham, allg. Ueberf. d. Vögel, I. p. 109. Gen. III.

Latham,

Latham, Syst. Ornith. I. p. 51. Gen. III.
Hermann, tab. affin. anim. p. 175.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 209. Gen. III.

* *Ohreulen. Horneulen.*

1. Bubo. *Der Uhu.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 33. n. 1. *der Schuhu.*
Leske, Naturgesch. p. 234. n. 1. *der Uhu, Schuhu.* Tab. VI. fig. 2.
Borowsky, Thierreich, II. p. 76. n. 1. *der Uhu, Schuhu, große Ohreule.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 161. n. 1. Strix (Bubo) auribus pennatis, iridibus croceis, corpore rufo; *der Uhu, Schubut, die Ohreule.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 327. n. 1. *der Uhu.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 333. n. 1. *der Uhu.* p. 339. *Schubut, Buhu, Bhu, Uhueule, Schaffut, Hub, Huo, Puhi, Berghu, Huhuy, Puhuy, Adlereule, Großherzog, Schubuteule,*

(6) Länge 2 Fuſs 4 Zoll. Flügelweite 6 Fuſs. Gewicht viertehalb Pfund. Nistet in Felsenhöhlen, in Klüften hoher und alter Mauern, seltener auf hohen Bäumen. Das Nest hat drey Fuſs im Durchmesser, besteht aus kleinen biegsamen Reisern, und ist mit Blättern ausgefuttert. Legt 2 bis 3 runde weiſse Eyer, etwas gröſser als Hühnereyer. Brütet im April, etwa drey Wochen, und zwar nur einmal des Jahrs. Die Jungen werden von den Jägern zum Jagdgebrauche auferzogen. Diese Eule kann das Tageslicht mehr als die meisten andern Eulen vertragen, und fliegt oft am hellen Mittag auf. Am Tage fliegt sie niedrig, des Nachts aber kann sie sich sehr hoch schwingen. Ihre Stärke ist so groſs, daſs selbst Adler ihr zuweilen unterliegen müssen. Mit Weyhen und Krähen unterhält sie einen ewigen Krieg. Soll über dreyſsig Jahre alt werden.

buteule, große gelbbraune Ohreneule, große Horneule.

Funke, Naturgesch. I. p. 286. *Uhu od. Schubut.*

Ebert, Naturl. II. p. 35. *Uhu oder Schuhu.*

Halle, Vögel, p. 231. *die große gelbbraune Ohreule.* Fig. 12.

Meyer, Thiere, I. Tab. 84.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 43. n. 38. *der Schuhut* u. f. w.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 716. *die große Ohreule.*

Onomat. hiftor. nat. II. p. 308. *Uhu, röthlicher Uhu, gemeine Ohreneule.*

Onomat. hiftor. nat. VI. p. 317. *der Uhu oder Schuhu.*

Handb. der Naturgefch. II. p. 142. *die Schubuteule, der Uhu.*

Handb. der deutfchen Thiergefch. p. 95. *Uhu, Buhu.*

Klein, av. p. 55. n. 1. Ulula, Chalcis *Goropii.*

Klein, Vorbereit. p. 105. n. 1. *Schubuteule, Puhuy, Uhu, Berghu, Huhay, Eule mit großen Ohren und feuerrothem Körper.*

Klein, verb. Vögelhift. p. 54. n. 1. *Schubuteule.*

Klein, Vögeleyer, p. 20. Tab. 7. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 338. *Huw oder Hüru.*

Briffon, ornithol. I. p. 139. n. 1. le grand Duc.

Büffon, Vögel, III. p. 27. *die große Ohreule der Uhu.* Tab. 61.

Batfch, Thiere, I. p. 297. *der Uhu.*

Latham, Vögel, I. p. 109. n. 1. *die Horn-Eule, der Schubut, Uhu.*

Latham, Syn. Suppl. p. 40. Great-eared Owl.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 51. n. 1. Strix (Bubo) capite auriculato, corpore rufo.

Befeke,

Beseke, Vögel Kurl. p. 21. n. 29. *der Schubu.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 280. n. 27. *der Schubut.*
Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 68. n. 47. *Uhu, Berguhu, Schubuteule.*
Strahlenberg, Asien, p. 352. *Eulen.*
White, Naturgesch. von England, p. 43. *der Schubut.*
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 166. n. 1. *Steineule, große weiße Ohreule.*
Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 193. *Berg- oder Steineule.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 255. *der Schuhu oder Uhu.*
Eberhard, Thiergesch. p. 70. *Uhu.*
Oekonom. Zoologie, p. 64. n. 3. *der Uhu.*
Meidinger, Vorlesf. I. p. 113. *der Uhu.*
Naturforsch. VIII. p. 56. n. 27. *der Schuhu.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 76. *Schuhu oder Uhu.*
Naumann, Vogelsteller, p. 165. *der Uhu.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 9. n. 7. *Uhu, Buhu, Berghu.*
Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 80. n. 30. *Uhu.*
Lichtenberg u. *Voigt*, Magazin für das Neueste u. s. w. VII. 2. p. 147. *Schuffut.*
Linné, auserlesf. Abhandl. II. p. 287. n. 53. *die Schubuteule.*
Goeze, nützl. All. II. p. 158. n. 8. *der Uhu, Schubut.*
Anweis. Vögel zu fangen, p. 187. *der Schuhu.*
Loniceri, Kräuterb. p. 671. *Uhu.*
Krünitz, Encyklop. XI. p. 682. *große Ohreule, Uhu.*
Jablonsky, allg. Lex. p. 311. *Schuhu.*

Kraft

Kraft, Ausrott. grauſ. Th. I. p. 290. *Schuhu.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 353. *Schuhu, Buhu, Schuffut, Uhu.* Fig. p. 356.

Heppe, wohlredender Jäger, p. 41.

Götting. g. Anz. 1769. p. 1111. 1773. p. 508.

Lemmery, Materiallex. p. 187.

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 52. Bubo.

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 1. Bubo primus.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 92. n. 1. Strix (Bubo) capite auriculato, corpore ruffo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 75. Strix (Bubo) capite auriculato, corpore rufo.

Kramer, Auſtr. p. 323. n. 1. Strix capite aurito, corpore rufo.

Brünich, ornith. bor. p. 7. Bubo.

Gerin. ornith. I. p. 84. Tab. 81.

Muſ. Worm. p. 296. Noctua.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 175. Strix Bubo.

Jonſton, av. p. 46. Bubo.

Plin. hiſt. nat. L. X. c. 12. 16. Bubo.

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 210. n. 1. *der Schubut.*

β. Bubo athenienſis. *Die große athenienſiſche Horneule.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 34. B. *der athenienſiſche* C. *der italieniſche.* Tab. 28. fig. 3.

Borowſky, Thierreich, II. p. 77. n. 1. *die große athenienſiſche Horneule.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 142. n. 1. *der wälſche Uhu.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 165. n. 1. *große Horneule von Athen.*

Briſſon,

Briſſon, ornith. I. p. 140. A. Grand Duc d'Italie.

Büffon, Vögel, III. p. 35. n. 1. *der ſchwarz geflügelte Uhu.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 6. *groſse Horneule von Athen.*

Latham, Vögel, I. p. 111. A. *die athenienſiſche Ohr-Eule.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 51. β. Bubo Athenienſis.

γ. Bubo pedibus nudis. *Der kahlfüßige Uhu.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 35. D. *Kahlfuß.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 142. n. 2. *der barfüßige Uhu.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 141. B. Grand Duc dechauſſé.

Büffon, Vögel, III. p. 36. n. 2. *der kahlfüßige Uhu.*

Latham, Vögel, I. p. 111. B. *die Ohr-Eule mit glatten Füßen.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 52. γ. Bubo pedibus nudis.

δ. Bubo magellanicus. *Der Jacurutu.*

Büffon, Vögel, III. p. 37. *der braſiliſche Jacurutu des Markgrav.* Tab. 62.

Latham, Vögel, I. p. 111. C. *die magellaniſche Ohr-Eule.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 52. δ. Strix capite auriculato, corpore luteo-nigricante albo vario.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 4. Feliceps flaveſcens, maculis nigris.

13. Vir-

13. VIRGINIANA. *Die virginiſche Ohreule.* (7)

Pennant, arct. Zool. II. p. 217. n. 30. *die groſse Horneule, Adlereule, Uhu.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 717. *der virginiſche Uhu.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 143. oben.

Briſſon, ornithol. I. p. 141. n. 2. grand Duc de Virginie.

Büffon, Vögel, III. p. 38. *der virginiſche Uhu.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 15. *der Uhu.*

Klein, av. p. 55. ad n. 1. Edwardi great-horned owl.

Klein, Vorbereit. p. 105. ad n. 1. *Edwardi* great-horned owl.

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 54. ad n. 1. *Edwards Horneule.*

Latham, Vögel, I. p. 112. n. 2. *die virginiſche Ohreule.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 52. n. 2. Strix (Virginiana) corpore fuſco-rufo cinereoque lineato, ſubtus cineraſcente, ſtriis transverſis fuſcis, remigibus rectricibusque fuſco faſciatis.

Ellis, Reiſe nach Hudſons Meerbuſen, p. 38. *die groſse gehörnte Eule.*

Schlözer, Erdbeſchr. von Amerika, p. 112. *die groſse gehörnte Eule.*

2. SCAN-

(7) Nach *Büffon* eine bloſse Spielart von der vorigen, die nur durch die Stellung der ohrähnlichen Federbüſchel von ihr abgeht. Sie iſt in Nord- und Südamerika ſehr gemein, auch nicht ſelten auf der Hudſonsbay, wo ſie, nach *Latham*, ſich in Wäldern aufhält, und im März ein Neſt baut, das aus einigen wenigen, kreutzweis über einander gelegten Reiſern beſteht, und mehrentheils auf Fichten angebracht iſt. Die Jungen werden im Junius flügge. Der Eyer ſind 2 an der Zahl, und von mattweiſser Farbe.

2. SCANDIACA. *Die lappländische Ohreule.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 97. n. 2. *die lappländiſche Eule.*

Halle, Vögel, p. 233. n. 170. *die große weiße Ohreule mit ſchwarzen Flecken.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 226. A. *die lappländiſche Ohreule.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 323. *der lappländiſche Schuhu.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 142. n. 3. *der lappländiſche Uhu.*

Briſſon, ornithol. I. p. 242. n. 3. grand Duc de Laponie.

Büffon, Vögel, III. p. 36. *der weiße lappländiſche Uhu mit ſchwarzen Flecken.*

Latham, Vögel, I. p. 113. n. 3. *die lappländiſche Ohreule.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 53. n. 6. Strix (Scandiaca) capite aurito, corpore toto albo, nigris maculis adſperſo.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 2. Bubo Scandiacus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 92. n. 2. Strix (Scandiaca) capite auriculato, corpore albido.

Linné, amoenit. acad. VII. p. 479. §. 16. 2.

14. ZEYLONENSIS. *Die zeyloniſche Ohreule.*

Latham, Vögel, I. p. 113. n. 4. *die zeyloniſche Ohr-Eule.*

Latham, Syn. Supplem. p. 41. Ceyloneſe eared Owl.

Latham,

(8) Nach *Büffon* eine bloſse von der Kälte der nördlichen Länder hervorgebrachte Abänderung vom *Uhu*.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 52. n. 3. Strix (Ceylonenſis) corpore ruſo-ſuſco, nigro ſtriato, ſubtus luteſcente, remigibus rectricibusque nigro, albo ruſeſcenteque ſtriatis.

Marſden, Sumatr. p. 98?

3. Asio. *Die rothe Ohreule.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 97. n. 3. *die virginiſche Ohreule.*

Halle, Vögel, p. 234. n. 173. *das kleinſte gehörnte dunkelbraune Käutzchen.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 44. n. 39. *die ſüdamerikan. Horneule.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 220. n. 33. *die rothe Eule.* Tab. 11.

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 316. *der kleine Schuhu, die caroliniſche Ohreule.*

Handb. d. Naturg. II. p. 143. *der kleine Schubut.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 144. n. 6. petit Duc de la Caroline.

Büffon, Vögel, III. p. 48 *die vom Katesby beſchriebene karoliniſche Ohreule.* Tab. 64.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 14. *die kleine Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 116. n. 8. *die rothe Ohr-Eule.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 54. n. 10. Strix (Aſio) capite aurito, corpore ſupra ferrugineo, ſubtus cinereo, alis punctis quinque albidis.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 92. n. 3. Strix (Aſio) capite aurito, corpore ſupra ferrugineo, ſubtus cinereo, alis punctis quinque albis.

Fabric. fn. groenl. p. 61. n. 37. Strix (Aſio) capite aurito, corpore ſupra ferrugineo, ſubtus cinereo, alis punctis quinque albis?

Naturforſch. VII. p. 40. Strix Aſio.

Beck-

Beckmann, Bibl. VI. p. 55. *die carolinische Ohr-Eule.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 177. Strix Asio.

15. Mexicana. *Die mexicanische Ohreule.*

Brisson, ornith. I. p. 146. n. 9. Hibou du Mexique.

Büffon, Vögel, III. p. 50. n. 12. *der mexicanische oder neuspanische Tocolotl.*

Latham, Vögel, I. p. 116. n. 7. *die mexicanische Ohreule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 54. n. 9. Strix (Mexicana) capite aurito, corpore nigro, fuscoque fasciato.

16. Americana. *Die amerikanische Ohreule.*

Brisson, ornithol. I. p. 145. n. 7. Hibou d'Amerique.

Büffon, Vögel, III. p. 49. *die Ohreule des mittägigen Amerika.*

Latham, Vögel, I. p. 115. n. 6. *die amerikanische Ohr-Eule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 54. n. 8. Strix (Americana) capite aurito, corpore cinereo, subtus ferrugineo, uropygio crissoque albis, nigro maculatis, remigibus rectricibusque cinereo griseoque fasciatis.

4. Otus. *Die mittlere Ohreule.*(9)

Müller, Natursystem, II. p. 98. n. 4. *die kleine Horneule.*

(9) Länge 16 Zoll. Flügelweite 3 Fuſs 3 Zoll. Gewicht 10 Unzen. Bewohnt gewöhnlich alte verfallene Gebäude, Felsenhöhlen, gebirgige Wälder, auch ebene Eichwälder, wenn sie

Leske, Naturgesch. p. 234. n. 2. *die mittlere Ohreule.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 78. n. 2. *die mittlere Ohreule.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 328. n. 2. *die mittlere Ohreule.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 340. n. 2. *die mittlere Ohreule.* p. 344. *kleiner Schuhu, gemeine Ohreneule, Katzeneule, Horneule, Fuchseule, Ohrkautz, Ranzeule, rothgelber Schubut, kleine rothgelbe Ohreule, Käutzlein, Hörnereule.*

Funke, Naturgesch. I. p. 287. *die mittlere Ohreule.*

Ebert, Naturl. II. p. 36. *kleiner Uhu, kleine Horneule.*

Halle, Vögel, p. 232. n. 169. *die kleinere rothgelbe Ohreule.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 45. n. 40. *die Ohreule; Katzeule* u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 218. n. 31. *die Eule mit langen Ohren, die mittlere Ohreule.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 717. *die mittlere Ohreule.*

Onomat. hist. natur. VII. p. 322. *der gemeine kleinere Schuhu, die gemeine Ohreule.*

Hand-

sie viele alte hohle Eichen enthalten. Nährt sich vorzüglich von Wasserratten, Maulwürfen, kleinen Feldmäusen, auch Mist- und Maykäfern. Nistet in alten verlassenen Rabenkrähen- wilden Tauben- und Eichhörnchensnestern, die in dichten Bäumen, besonders Fichtenbäumen stehen; seltener in hohlen Eichen und Steinklüften. Das Weibchen legt 4 bis 5 rundliche weisse Eyer, und brütet sie allein aus; unterdessen trägt ihm das Männchen Speise zu. Die Jungen sehn anfänglich ganz weiss aus, fangen aber nach 14 Tagen an, sich zu verfärben, und lassen sich leicht zähmen.

Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 96. *kleiner Schuhu, Fuchseule.*

Klein, av. p. 55. n. 2. Ulula-Aſio, Otus, Noctua aurita.

Klein, Vorbereit. p. 105. n. 2. *rothgelber Schuhut, kleiner Schuhut.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 54. n. 2. *kleiner Schuhut.*

Briſſon, ornithol. I. p. 142. n. 4. Moyen Duc, ou Hibou.

Büffon, Vögel, III. p. 42. *die mittlere Ohreule. der kleine Schuhut.*

Batſch, Thiere, I. p. 298. *die mittlere Ohreule.*

Latham, Vögel, I. p. 114. n. 5. *die langöhrigte Eule, kleine Horn-Eule.*

Latham, Syn. Supplem. p. 42. Long-eared Owl.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 53. n. 7. Strix (Otus) capite aurito, pennis ſenis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 22. *die kleine Horneule.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 282. n. 28. *kleine Horneule, Ohrkauz.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 68. n. 48. *Hornohreule, kleine Horneule.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 2 *Horneule.*

Haſſelquiſt, Reiſe nach Paläſtina, p. 290. n. 15. Strix (Otus) capite aurito, pennis 6.

Pennant, britt. Thiergeſch. Tab. 16. fig. 1.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 10. n. 8. *die Ohreule, Horneule.*

Lichtenberg u. *Voigt*, Magaz. f. d. Neueſten. ſ. w. V. 2. p. 21. *die kleine Horneule.*

Naturforſch. VIII. p. 57. n. 20. *kleine Horneule, Knappeule.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 449. *kleine Horn-Eule.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 80. *Horneule.*

Naumann, Vogelsteller, p. 165. *Ohreule.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 258. *die Ohr-od. Fuchs-Eule.*

Günther, Nester und Eyer, Tab. 40. *Horn-oder Ohreule??*

Eberhard, Thiergesch. p. 70. *die gemeine Ohreule.*

Bechstein, Musterung schädlicher Thiere, p. 82. n. 31. *die mittlere Ohreule.*

Merklein, Thierreich, p. 314 *Or-Kautz.*

Krünitz, Encyklop. XI. p. 648. *die mittlere Ohreule, der kleine Schuffut, Kautzeule, Käutzlein.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Otus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 3. Bubo capite aurito, pennis sex.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 92. n. 4. Strix (Otus) capite auriculato, pennis senis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 10. n. 76. Strix (Otus) capite auriculato, pennis senis.

Kramer, Austr. p. 323. n. 2. Strix capite aurito, pennis sex; *Horn-Eule.*

Brünich, ornithol. bor. p. 6. n. 17. Otus.

Schäfer, Elem. ornith. Tab. 22.

Gerin. ornith. I. p. 86. Tab. 85.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 308. Noctua aurita; *ein Ohr-Kutz, Uhr-Eule, Ranz-Eule.*

Jonston, av. p. 48. Asio seu Otus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 211. n. 2. *der kleine Schubut.*

17. Brachyotos. *Die kurzöhrige Eule.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 218. n. 32. *die Eule mit kurzen Ohren.*

Latham, Vögel, I. p. 117. n. 9. *die kurzöhrigte Eule.*

Latham, Syn. Suppl. p. 43. Short-eared Owl.

Latham, Syst. ornith. I. p. 55. n. 11. Strix (Brachyotos) capite aurito, penna solitaria, corpore fusco, subtus flavescente, longitudinaliter striato, rectricibus fuscis, intermediis 4 macula lutea, pupilla fusca.

Büffon, Vögel, III. p. 60. Anm. *die kürzohrichte Eule.*

Pennant, Reise durch Schottl. I. p. 19. *die kurzöhrigte Eule.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 175. Strix brachyotos.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 211. n. 3. *die kurzöhrige Eule.*

18. Brasiliana. *Die brasilianische Ohreule.*

Müller, Natursyst. II. p. 99. *Cabure.*

Halle, Vögel, p. 241. n. 141. *die brasilische Eule.*

Klein, av. p. 57. n. 8. Ulula brasiliensis.

Klein, Vorbereitung, p. 108. n. 8. *die brasilianische Eule.*

 Klein,

(10) Flügelweite 3 Fuss. Gewicht 14 Unzen. Fliegt nie, wie andere Eulen, um Beute zu suchen, sondern sitzt ruhig auf einem Stamme, oder in langem alten Grase, wie eine Katze, und lauert auf die Mäuse. Sie besucht im May die Hudsonsbay, baut ein Nest auf dem Boden, aus trocknem Gras, und legt weisse Eyer. Im Herbst zieht sie nach Süden. In den nördlichen und waldigen Gegenden Sibiriens kommt dieser Vogel zu den nächtlichen Feuern, und fällt die Leute an, dass man ihn mit Prügeln todtschlagen kann.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 56. n. 8. *brasilianische Eule.*

Brisson, ornith. I. p. 145. n. 8. Hibou du Bresil.

Büffon, Vögel, III. p. 97. *die brasilische Ohreule.* (*Kabure.*)

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 92. *der guianische Uhu; Caburo.*

Jonston, av. p. 207. Cabure.

19. Naevia. *Die gesprengte Ohreule.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 220. *die gesprenkelte Eule.* Tab. 11.

Latham, Vögel, I. p. 119. n. 11. *die gesprengte Ohr-Eule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 55. n. 13. Strix (Naevia) capite aurito, corpore griseo ferrugineoque vario, regione periophthalmica pectorisque pennis apice nigris.

20. Indica. *Die indianische Ohreule.*

Latham, Vögel, I. p. 119. n. 12. *die indian. Ohreule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 56. n. 14. Strix (Bakkamuma), capite aurito, dorso fusco, pectore luteo, maculis sagittatis nigris, remigibus nigro alboque fasciatis.

Naturforsch. I. p. 266. n. 2. *die kleine Horneule aus Ceylon.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 188. n. 3. *die kleine indianische Horneule.*

21. Zorca. *Die Zonca.* (1)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 56. n. 15. Strix (Zorca) auricularum pennis 8-9.

22. Car-

(1) Im *Cetti* selbst steht wiederholentlich nicht *Zorca* sondern *Zonca.*

22. CARNIOLICA. *Die krainische Horneule.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 349. * *die krainische Eule.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 10 n. 9. *die Wald-Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 120. n. 13. *die kraynische Ohr-Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 56. n. 16. Strix (Giu) capite aurito, corpore cinereo-albicante, maculis striisque transversis nigricantibus variegato.

23. DEMINUTA. *Die Jaik-Ohreule.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 67. *der kleine Schuhu.*

Latham, Vögel, I. p. 120. n. 14. *die Tayk-Ohr-Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 56. n. 17. Strix (Deminuta) capite aurito, corpore rufo variegato.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 18. n. 14. Stryx *deminuta.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 176. Str. deminuta.

24. PULCHELLA. *Die sibirische Ohreule.*

Müller, Natursystem Suppl. p. 69. n. 15. *die Mignatureule.*

Latham, Vögel, I. p. 122. n. 16. *die sibirische Ohr-Eule.* Tab. 5. fig. 1.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 57. n. 19. Strix (Pulchella) minima, capite aurito, corpore pulveratim cinereo-undulato, subtus albido, alis fasciato-pulveratis, litura ad nares alba.

(2) Soll nach *Bechstein* u. a. mit Str. *Scops* einerley seyn, wovon jedoch *Latham*, *Scopoli* und *Kramer* das Gegentheil versichern.

Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſe, p. 182. *die kleine Horneule;* (ruſſ. *maloroſloi Filin.*)

Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 370. *eine Art ganz kleiner Ohreulen.*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. Anh. p. 3. n. 8. Strix *pulchella.*

5. Scops. *Die Stockeule.* (3)

Müller, Naturſyſt. II. p. 99. n. 5. *die Baumeule.* Tab. 4. fig. 2.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 329. n. 329. *die kleinſte Ohreule.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 346. n. 4. *die kleinſte Ohreule.* p. 349. *Stockeulen, Waldeulen, aſchfarbige Käutzchen, gehörnte Käutzchen, Poſſeneulen.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 287. *die kleine Ohreule.*

Ebert, Naturl. II. p. 37. *die Baumeule, Stockeule, Waldeule.*

Halle, Vögel, p. 233. n. 171. *das gehörnte aſchfarbene Käutzchen.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 46. n. 41. *die kleinſte Ohreule* u. ſ. w.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 717. *die kleinſte Ohreule.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 324 *die Baumeule.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 143. *der Kauz.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 97. *die Stockeule, Baumeule, Waldeule.*

Klein, av. p. 57. n. 7. Ulula.

Klein, Vorber. p. 108. n. 7. *gehörntes Käutzlein.*

Klein,

(3) Länge 8 Zoll. Flügelweite 17 Zoll. Nährt ſich auſser den Feldmäuſen auch von May- und Roſskäfern, Abend- und Nachtſchmetterlingen. Legt gemeiniglich 4 weiſse, abgeſtumpfte rundliche Eyer in hohle Bäume.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 55. n. 7. *gehörntes Käutzlein.*

Briſſon, ornithol. I. p. 144. n. 5. petit Duc.

Büffon, Vögel, III. p. 58. *die kleinſte Ohreule, die Stockeule, das aſchfarbige Käutzchen.*

Latham, Vögel, I. p. 120. n. 15. *die Baum-Eule, der Kauz mit Ohren.*

Latham, Synopſ. Supplem. p. 43. Scops eared Owl.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 56. n. 18. Strix (Scops) auricularum penna ſolitaria.

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 283. n. 29. *Baumeule, gehörntes Käutzlein.*

Naturforſch. VIII. p. 57. n. 29. *Baumeule.*

Batſch, Thiere, I. p. 298. *die Baumeule.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 83. n. 23. *die kleine Ohreule.*

Krünitz, Encyklop. XI. p. 684. *die kleinſte Ohreule.*

Beckmann, phyſ. ök. Bibl. VI. p. 56. *die kleinſte Ohr-Eule.*

Linné, Syſtem. Natur. Edit. X. I. p. 92. n. 5. Strix (Scops) capite auriculato, penna ſolitaria.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 348. Scops; *ein klein Keutzlein, Stockeule, kleine Waldeule.*

Charlet. onomatol. hiſtor. natur. p. 70. n. 3. Scops.

Hermann, tab. affin. anim. p. 175. Str. Scops.

Jonſton, av. p. 49. Scops.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 212. n. 4. *die Stockeule.*

** *Eu-*

** *Eulen mit glatten Köpfen. Ungeöhrte, ungehörnte Eulen. Eulen, ohne Federbüsche. Käutze.*

6. NYCTEA. *Die Schneeeule.* (4)

Müller, Naturſyſt. II. p. 100. n. 6. *die Tageule.*
Leſke, Naturgeſch. p. 235. n. 3. *die weiße Eule.*
Borowſky, Thierreich, II. p. 78. n. 3. *die Tageule.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 329. n. 4. *die Schneeeule.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 350. n. 1. *die Schneeeule.* p. 353. *große weiße Eule, weiſſe Eule, Tageule, isländiſche weiße Eule, groſſe weiße nordiſche Eule, weißbunte Eule, weißbunte ſchlichte Eule, große weiße und einzeln ſchwarz gedüpfelte Eule.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 288. *die Tageule.*
Ebert, Naturl. II. p. 39. *Tageulen.*
Halle, Vögel, p. 239. n. 179. *die große weiße nordiſche Eule.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 47. n. 43. *große weiße Eule.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 222. n. 37. *die Schneeeule, Tageule.* Titelkupf.
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 321. *die weißbunte Eule.*
Klein, av. p. 57. n. 5. Ulula alba, maculis terrei coloris.

Klein,

(4) Länge 2 Fuſs 3 Zoll. Flügelweite 5 Fuſs. Gewicht über 3 Pfund. Die Einwohner an der Hudſonsbay kochen dieſe Eule, eſſen zuerſt das Fleiſch, und trinken dann die Brühe, die ſie für etwas geſünder halten. Ihr gräſsliches Heulen iſt dem Klaggeſchrey eines Menſchen im gröſsten Unglück ähnlich; in Lappland wird ſie deshalb für ein Geſpenſt gehalten.

Klein, Vorbereit. p. 107. n. 5. *weißbunte ſchlichte Eule.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 55. n. 5. *weißbunte ſchlichte Eule.*

Briſſon, ornithol. I. p. 152. n. 8. Chat-huant blanc de la Baye de Hudſon.

Büffon, Vögel, III. p. 103. *die große weiße Eule.* Tab. 73.

Batſch, Thiere, I. p. 298. *die Tageule oder große weiße Eule.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 17. *große weiße Eule.*

Beſeke, Vögel Kurl. p. 22. n. 31. *die Tageule.*

Ellis, Reiſe nach Hudſons Meerbuſen, p. 39. *die große weiße Eule.*

Fiſcher, Zuſ. z. Naturgeſch. von Livland, p. 43. n. 490. *weißbunte Eule, Tageule.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 283. n. 30. *die Tageule.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 127. *weiße Eulen.*

Latham, Vögel, I. p. 124. n. 17. *die große weiße Eule, die Tag-Eule.*

Latham, Syn. Suppl. p. 45. Snowy Owl.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 57. n. 20. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis diſtantibus fuſcis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 11. n. 10. *die weißbunte Eule.*

Naturforſch. VIII. p. 58. n. 30. *die Tageule.*

Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Freunde, VII. p. 449. *die Tageule.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 384. n. 35. *die Schneeeule.*

Dresdn. Magaz. II. p. 394-401. m. e. Fig.

Cranz,

Cranz, Grönl. p. 112. *Eulen welche weiſs ſind.*
Egede, Beſchr. von Grönl. p. 88. *fleckige Nachteulen.*
Horrebow, Nachr. von Isl. p. 181.
Anderſon, Beſchr. von Isl. p. 46. m. 1 Fig.
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 9. Noctua Scandiaca.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 8. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis diſtantibus fuſcis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 77. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis diſtantibus fuſcis.
Brünich, ornith. bor. p. 7. Nyctea.
Fabric. fn. groenl. p. 60. n. 36. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis diſtantibus fuſcis.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 212. n. 5. *die Schnee-Eule.*

44. TENGMALMI. *Die Eule mit erbsförmigen Flecken.* (5)

Beſeke, Vögel Kurl. p. 27. ad n. 37.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 64. n. 42. Strix (Tengmalmi) capite laevi, corpore griſeo, maculis piſiformibus albis, iridibus flavis.

45. NEBULOSA. *Die geſtreifte Eule.* (6)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 223. n. 38. *die geſtreifte Eule.* Tab. 11.
Latham, Vögel, I. p. 125. n. 18. *die geſtreifte Eule.*

Latham,

(5) Nach *Beſeke* vielleicht das Weibchen von *Strix Paſſerina.*
(6) Flügelweite 4 Fuſs, Gewicht 3 Pfund, nach *Latham.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 58. n. 23. Strix (Nebulosa) capite laevi, corpore fusco, albido undulatim striato, remige sexto longiore, apice nigricante.

26. CINEREA. *Die aschgraue Eule.*(7)

Pennant, arct. Zool. II. p. 221. n. 36. *die rußschwarze Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 125. n. 19. *die aschgraue Eule.*

Latham, Syn. Suppl. p. 45. Cinereous Owl.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 58. n. 22. Strix (Cinerea) cinereo-fuliginosa, nigro transversim lineata, subtus albido cinereoque nebulosa, regione periophthalmica circulis concentricis nigris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 212. n. 6. *die rußschwarze Eule.*

27. WAPACUTHU. *Der Wapacuthu.*(8)

Pennant, arct. Zool. II. p. 220. n. 35. *der Wapacuthu.*

Latham, Vögel, I. p. 140. n. 41. *der Wapakuthu.*

Latham, Syn. Suppl. p. 49. *Wapacuthu Owl.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 58. n. 21. Strix (Wapacuthu) capite laevi, corpore albo, pallide rubro nigroque maculato, subtus albido, lineis numerosis rufescentibus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 213. n. 7. *der Wapacuthu.*

28. Cu-

(7) Flügelweite und Gewicht wie bey der vorigen.

(8) Flügelweite 4 Fuſs. Gewicht 5 Pfund. Brütet im May und soll, nach *Hutchins*, 5 bis 10 weiſse Eyer legen, worin sie, wenn die Bemerkung richtig ist, sehr von andern Gattungen abweicht.

28. CUNICULARIA. *Die Kanincheneule.* (9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 107. c. *die Kanincheneule.*

Halle, Vögel, p. 241. n. 182. *die Kanincheneule.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 219. Ulula cunicularia.

Klein, av. p. 57. n. 9. Ulula cunicularia.

Klein, Vorbereitung, p. 108. n. 9. *Erdeule.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 56. n. 9. *Erdeule.*

Briſſon, ornith. I. p. 153. n. 11. Chouette de Coquimbo.

Büffon, Vögel, III. p. 84. *Kanincheneule.*

Latham, Vögel, I. p. 134. n. 33. *die Minirer-Eule, der Pequen.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 63. n. 38. Strix (Cunicularia) capite laevi, corpore fuſco, ſubtus albo, pedibus tuberculatis, piloſis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 213. n. 8. *der Pequen.*

7. ALUCO. *Die Nachteule.* (10)

Müller, Naturſyſt. II. p. 102. n. 7. *die Nachteule.*

Borowſky, Thierr. II. p. 79. n. 4. *die Nachteule.*

Bechſtein,

(9) Nach *Büffon* eine bloſse Abänderung der europäiſchen *Steineule.*

(10) Flügelweite 3 Fuſs 4 Zoll. Dieſe Eulen ſind ſo wild daſs ſie eher verhungern als ſich gefangen füttern laſſen; und kaum laſſen ſich die noch ganz kleinen Jungen einigermaſsen zähmen. Es ſind grimmige und gefährliche Thiere, beſonders wenn ſie Junge haben, da man ſich ihren Neſtern mit Vorſicht nähern muſs. Nach *Beſeke* l. c. p. 27. n. 38. gehört *Friſch Schläfereule* Tab. 97. mit hieher, die *Gmelin* zur *Flammea* rechnet. Nach *Latham* iſt noch nicht ausgemacht, ob ſie von der *Brandeule* wirklich verſchieden ſey.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 330. n. 5. *die Nachteule.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 353. n. 2. *die Nachteule.* p. 356. *große Baumeule, gemeine Eule, Mauseule, graue Buscheule, Knappeule, Grabeule, braune Eule, rothe Eule, Huhu, Waldäuffl.*

Funke, Naturgesch. I. p. 287. *die Nachteule.*

Ebert, Naturl. II. p. 27. *die Nachteule.*

Halle, Vögel, p. 234. n. 174. *die gemeine graue Buscheule, mit weiß und braunem Schleyer.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 46. n. 42. *die gemeine Eule.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 315. *die gemeine Eule, Buscheule, Nachteule.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 97. *die Nachteule* u. s. w.

Klein, av. p. 57. n. 10. Ulula vulturina?

Klein, Vorbereit. p. 108. n. 10. *Geyereule?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 56. n. 10. *Geyereule?*

Gesner, Vögelb. p. 535. *Ul oder Nachteul*, Fig. p. 536. gut.

Brisson, ornitholog. I. p. 148. n. 3. Hulote.

Büffon, Vögel, III. p. 64. *die Nachteule, grosse Baumeule.* Tab. 66.

Batsch, Thiere, I. p. 298. *die Nachteule.*

Latham, Vögel, I. p. 126. n. 20. *die Nacht-Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 59. n. 26. Strix (Aluco) capite laevi, corpore ferrugineo, iridibus atris.

Beseke, Vögel Kurl. p. 25. n. 33. *die Nachteule.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 284. n. 31. *die Nachteule.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 68. n. 49. *gemeine Eule, Nachteule, Schleyereule.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 166. n. 3. *Nachteule.*

Krünitz, Encyklop. XI. p. 684. *die Nachteule.*

Naumann, Vogelsteller, p. 165. *Knappeule.*

Naturforsch. III. p. 58. n. 31. *Nachteule.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 56. 57. *die große Baumeule.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 12. n. 11. *die Maus-Eule.*

Eberhard, Thiergeschichte, p. 70. *die gemeine Buscheule.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 84. n. 35. *die Nachteule.*

Loniceri, Kräuterbuch, p. 671. *Eul, Nachtrapp, Nacht-Eul.* Fig. p. 672.

Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 141. *Ul oder Nacht-Eul.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Ulula.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 5. Ulula.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 93. n. 6. Strix (Aluco) capite laevi, corpore ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus serratis.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 367. Ulula; *eine Eule, Ule, Punsch-Eule, Graw-Eule.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 176. Strix Aluco.

Jonston, av. p. 50. Ulula.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 213. n. 9. *die Nachteule.*

29. Sylvestris. *Die Holzeule.* (1)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 374. n. 8. *die Holzeule.*

Scopoli,

(1) Nach *Bechstein* ist es noch nicht ausgemacht, ob diese und die folgende Eule, wirklich verschiedene Gattungen, oder bloss Varietäten sind.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 13. n. 13. *die Holz-Eule, oder wilde Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 127. n. 21. *die österreichische Eule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 61. n. 29. Strix (Sylvestris) capite laevi, corpore albo fuscoque variegato, regione periophthalmica albida.

Kramer, Austr. p. 324. n. 7. Strix capite laevi, corpore griseo? *Wald-Auffe.*

30. ALBA. *Die weißbauchige Eule.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 374. n. 9. *die weißbauchige Eule.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 13. n. 14. *die weiße Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 127. n. 22. *die weiße österreichische Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 61. n. 30. Strix (Alba) capite laevi, corpore rufo, griseoque vario, subtus albo, regione periophthalmica margine rufo, rectricibus apice albis.

31. NOCTUA. *Die braunrothe Eule.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 15. n. 15. *die Nacht-Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 128. n. 23. *die braunrothe österreichische Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 61. n. 31. Strix (Noctua) capite laevi, iridibus flavis, corpore pallide rufo, maculis longitudinalibus fuscis.

32. RUFA. *Die fuchsrothe Eule.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 356. *die fuchsrothe Eule.*

(2) Nach *Bechstein* das Weibchen von *Strix Aluco.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 14 n. 16. *die fuchsrothe Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 128. n. 24. *die rostigrothe österreichische Eule.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 62. n. 32. Strix (Rufa) capite laevi, iridibus caerulescentibus, corpore ferrugineo, fusco maculato.

33. SOLONIENSIS. *Die Sologneser Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 128. n. 25. *die sologneser Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 62 n. 33. Strix (Sologniensis) capite laevi, corpore supra atrofusco, fulvo admisto, subtus albo, cauda alba, versus apicem lineis nigricantibus decussantibus.

8. FLAMMEA. *Die Schleyereule.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 102. n. 8. *die feurige Nachteule.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 79. n. 5. *die Perleule, Kircheule, Schleuereule.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 331. n. 6. *die Schleyereule.*

Bechstein,

(3) Länge 16 Zoll. Flügelweite 3 Fuss 3 Zoll. Gewicht 11 Unzen. Hält sich am Tage auf Kirchen, Thürmen, alten Schlössern u. s. w. auf, und kommt erst in der Dämmerung hervor. Nährt sich von Ratten, Mäusen, Fledermäusen, jungen Vögeln, grossen Käfern u. s. w. ist aber auch den Taubenschlägen nachtheilig. Im Herbst besucht sie auch den Schnepfen- und Drosselnfang. Macht kein Nest, sondern legt ihre 3 bis 5 weissen Eyer, die länglicher als bey andern Eulen sind, zu Ende des Märzes oder Anfang des Aprils, in die Klüfte der Mauern, und die Kirchen- und Thurmdächer, ins Genist, Kehrig, oder verwitterten Mörtel. Das Fleisch der Jungen soll nach den ersten drey Wochen, wenn sie gut gefuttert sind, essbar seyn.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 359. n. 4. *die Schleyereule.* p. 364. *weiße Eule, Kircheule, Thurmeule, Buſcheule, Kautzeule, Todteneule, geflammte Eule, Waldkautz, Kohleule, Schleyer-Auffe.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 288. *die Steineule.*

Ebert, Naturl. II. p. 38. *die Kircheule, Thurmeule.*

Halle, Vögel, p. 238. n. 178. *die Kircheule.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 48. n. 44. *die Kircheule, Perleule, Todtenvogel,* u. ſ. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 224. n. 40. *die weiße Eule, Kircheule.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 718. *die Schleyer-Eule.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 319. *Kircheule, Todteneule.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 145. *die Schleiereule, Kircheule.*

Handb. der deutſchen Thiergeſch. p. 98. *die Perleule, Thurmeule,* u. ſ. w.

Klein, av. p. 56. n. 4. Ulula Aluco.

Klein, Vorbereit. p. 107. n. 4. *Schleyereule, Kircheule, Kautzeule.*

Klein, verb. Vögelh. p. 55. n. 4. *Schleyereule.*

Klein, Stemm. av. p. 9. Tab. 10. fig. 1. a. b. 2. a. b. 3. a. b.

Geſner, Vögelbuch, p. 537. *Schleyereul od. Kircheul.* Abbild. ziemlich gut.

Briſſon, ornithol. I. p. 147. n. 2. petit Chathuant.

Büffon, Vögel, III. p. 74. *die Kircheule.* Tab. 68.

Batſch, Thiere, I. p. 299. *die Perleule.*

Latham, Vögel, I. p. 129. n. 26. *die Schleyer-Eule, Perl-Eule.*

Latham, Syn. Suppl. p. 46. White-Owl.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 60. n. 28. Strix (Flammea) capite laevi, corpore luteo, punctis albis, ſubtus albido, punctis nigricantibus.

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 27. n. 38. *die rothe Schleyer-oder Perleule.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 285. n. 32. *die feurige Nachteule, Kircheule, gelbe Schleyereule.*

White, Naturgeſchichte von England, p. 50. *Perleulen.*

Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 62. *die Schleyereule.*

Carver, Reiſe durch Nordamerika, p. 386. *die Eule?*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännemark, p. 166. n. 8. *Krakugle.* Tab. 12.

Zorn, Petinotheol. II. p. 256. *die Schleyer-Eule.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 70. *die Kircheule.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 113. *die Kirch-oder Todteneule.*

Schneider, zool. Abhandl. p. 144. *die Nachteule.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 556. *die Kircheule.*

Valentin, Amph. zootom. II. p. 76.

Naturforſch. VIII. p. 59. n. 33. *das Käutzlein.* (Mit *Strix Ulula* verwechſelt.)

Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Freunde, VII. p. 449. n. 11. *die rothe Schleyer-oder Perleule.*

Pennant, britt. Thiergeſch. Tab. 18.

Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 349. d. *die Perleule.*

Anweiſ. Vögel zu fangen, p. 187. *Schleyereule.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 85. n. 37. *die Schleyereule.*

Beck-

Beckmann, ph. ökon. Bibl. IV. p. 57. VI. p. 56. *die Schleyereule.*

Merklein, Thierreich, p. 314. *Kircheule.*

Krünitz, Encyklop. XI. p. 685. *Schleyereule, Waldkautz.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 7. Strix Flammea.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 368. Ulula flammeata, *eine Schleier-Eule, Kircheule, Ranz-Eule.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 79. Strix (Flammea) capite laevi, corpore luteo, punctis albis, ſubtus albido, punctis nigricantibus.

Kramer, Auſtr. p. 324. n. 5. Strix capite laevi, facie alba, pone aures circuli ſegmento ochreo e pennis ſingularis ſtructurae, dorſo caeruleſcente; *Schleuer-Eule, Schleuer-Auffe.*

Schäfer, Elem. ornith. Tab. 64.

Gerin. ornith. I. p. 88. Tab. 91.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 214. n. 10. *die Kircheneule.*

9. STRIDULA. *Die Brandeule.* (4)

Müller, Naturſyſt. II. p. 103. n. 9. *die Brandeule.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 338. n. 6. *die Brandeule.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 356. n. 3. *die Brandeule.* p. 359. *die hellbraune Eule, gelbe*

(4) Länge über 16 Zoll. Flügelweite 3 Fuſs. Hält ſich beſonders gern in Schwarzwäldern auf, und kommt höchſt ſelten zu den Wohnungen der Menſchen. Nährt ſich von Feldmäuſen, Maulwürfen, Heuſchrecken und Käfern. Legt 3 bis 5 weiſse rundliche Eyer in ein Saat- oder Rabenkrähen-Eichhörnchens- oder verlaſſenes Vogelneſt. Läſst ſich jung und alt leicht zähmen.

gelbe Eule, Knarreule, Zischeule, braunschwarze Nachteule, Kirreule, Kieder, Milchsauger, Melker, Stockeule.

Ebert, Naturl. II. p. 38. *die Brandeule, Knarreule.*

Halle, Vögel, p. 236. n. 175. *die braunschwarze Eule.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 49. n. 45. *die graue Eule* u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 226. B. *die hellbraune Eule, der Milchsauger.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 718. *die graue Eule.*

Onomat. hist. natur. VII. p. 325. *die Brandeule.*

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 97. *die graue Eule, Brandeule.*

Klein, av. p. 56. n. 3. Ulula Strix.

Klein, Vorbereit. p. 106. n. 3. *braune, graue, gemeine Eule.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 55. n. 3. *gemeine Eule.*

Brisson, ornithol. I. p. 146. n. 1. Chathuant.

Büffon, Vögel, III. p. 69. *die graue Eule.* Tab. 67.

Batsch, Thiere, I. p. 298. *die graue Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 129. n. 27. *die lohgelbe Eule, Brandeule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 58. n. 25. Strix (Stridula) capite laevi, corpore ferrugineo, remige tertio longiore.

Beseke, Vögel Kurl. p. 26. n. 34. *die Brandeule.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 285. n. 33. *die graue Nachteule, Brandeule.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 68. n. 50. *Brandeule, Knarreule.*

Hassel-

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 290. n. 16. Strix (Orientalis) faciē pilosa, sutura crispato-plumosa in dorso rostri?

Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 19.

Scopoli. Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 12. n. 12. *die Knarr- oder zischende Eule.*

Naturforsch. VIII. p. 59. n. 32. *die Brandeule.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 85. n. 36. *die Brandeule.*

Tengmalm, neue schwed. Abhandl. IV. p. 45. Strix Stridula.

Krünitz, Encyklop. XI. p. 685. *die graue Eule.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 6. Strix minor.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 9. Strix (Stridula) capite laevi, corpore ferrugineo, remige tertio longiore.

Müller, zool. dan. prodr. p. 11. n. 82. Strix (Stridula) capite laevi, corpore ferrugineo, remige tertio longiore.

Brünich, ornith. bor. p. 7. n. 18. Strix Stridula.

Kramer, Austr. p. 323. n. 4. Strix capite laevi, pone aures circuli segmento nigro e pennis singularis structurae, dorso ferrugineo? *Nachteule, gemeine oder kleine Eule?*

Jonston, av. p. 52. Strix.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 214. n. 11. *die graue Eule.*

10. Ulula. *Die Steineule.* (§)

Müller, Natursyst. II. p. 104. n. 10. *das Käutzlein.*

(§) Flügelweite 2 Fuss 9 Zoll. Gewicht 19 Unzen. Liebt vorzüglich bergige Gegenden, und wohnt in Steinbrüchen, Felsenritzen, verfallenen Gebäuden, auch in Kirch- und Thurm-

Borowsky, Thierreich, II. p. 80 n. 6. *der Steinkauz.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 161. n. 2. Strix (Ulula) capite laevi, iridibus croceis, corpore ferrugineo, remige tertio longiore; *Steinkautz, Steineule.* (6)

Bechstein, Naturg. I. p. 332. n. 8. *der große Kauz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 364. n. 5. *der große Kautz.* p. 367. *Steineule, Buscheule, Steinauffe, heulende Eule, große braune Eule, Kircheule, Tschiavitle, Steinkautz, Kautz.*

Ebert, Naturl. II. p. 93. *die Steineule.*

Halle, Vögel, p. 237. n. 176. *die große braune Eule.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 49. n. 46. *die Steineule* u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 225. n. 41. *die braune Eule, der Kautz.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 99. *die Steineule, Buscheule.*

Gesner, Vögelb. p. 356. *Kautz oder Steinkautz.* Fig. p. 357.

Brisson, ornith. I. p. 149. n. 4. grande Chouette.

Büffon,

Thurmmauern. In Wäldern findet man sie gar nicht. Fängt sehr geschwind Mäuse und Wasserratten, frisst aber auch Grillen, Käfer und Nachtschmetterlinge. Legt, ohne Nest in den Klüften und Ritzen 2 bis 4 rundliche weisse Eyer zu Anfang des Märzes, und wenn das Weibchen über der Brut getödtet wird, so brütet das Männchen die Eyer aus, und futtert die Jungen auf. — Oft wird diese Gattung in den Synonymen mit *Strix passerina* verwechselt. —

(6) Der ganze hier angegebene Charakter weicht von dem bey andern Systematikern ab, und doch kann nach den franz. und engl. Synonymen keine andere als diese Gattung gemeynt seyn; auch ist *Frisch* Tab. 98. angeführt.

Büffon, Vögel, III. p. 81. *die Steineule, Buschеule.*

Batsch, Thiere, I. p. 297. *die Steineule.*

Latham, Vögel, I. p. 130. n. 28. *das Käutzgen, die Stein-Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 60. n. 27. Strix (Ulula) capite laevi, supra rufescens, maculis longitudinalibus fuscis, subtus albida, lineolis fuscis, cauda fasciis fuscis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 26. n. 36. *die Steineule.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 69. n. 51. *Käutzlein?*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 6. *gemeine Eule.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 286. n. 34. *Käutzlein, Steinkautz, Steineule.*

White, Naturgesch. von England, p. 16. *Steineule.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 80. *Steinkautz.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 450. *die Steineule.*

Naturforsch. VIII. p. 59. n. 33. *das Käuzlein.* (Mit *Str. Aluco* verwechselt.)

Naturf. XVII. p. 224. *Steineule.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 86. n. 38. *der große Kautz.*

Eberhard, Thiergeschichte, p. 70. *der Steinkautz.*

Krünitz, Encyklop. XI. p. 685. *die Steineule.*

Merklein, Thierreich, p. 314. *Steineule.*

Jablonsky, allgem. Lexicon, p. 522. *Kautz, Steinkautz.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 10. Strix (Ulula) capite laevi, corpore supra fusco, albo maculato, rectricibus fasciis albis.

Schwenk-

Schwenkfeld, aviar. Silef. p. 308. Noctua; *eine Nacht-Eule, Stein-Eule, Mittel Eule, Kautz.*

Charleton, onomat. hift. nat. p. 70. n. 6. Noctua.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 80. Strix (Ulula) capite laevi, corpore fupra fufco, albo maculato, rectricibus fafciis linearibus albis.

Hermann, tab. affin. animal. p. 175. Ulula.

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 215. n. 12. *die Steineule.*

β. Noctua minor aucuparia.

γ. Strix capite inaurito, corpore ferrugineo, fupra nigro maculato, fubtus lineolis fufcis ftriato, orbitis, roftro fafciaque fubalari nigris. *Latham*, Syftem. ornitholog. I. p. 60. n. 27. β. *

Muf. Carls. Fafc. III. Tab. 51. *Strix arctica.*

11. Funerea. *Die kanadifche Eule.*

Müller, Naturfyft. II. p. 105. n. 11. *die Steineule.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 223. n. 39. *die Habichtseule.*

Onomat. hift. nat. VII. p. 320. *die Trauereule.*

Briffon, ornithol. I. p. 151. n. 6. Chathuant de Canada.

Büffon, Vögel, III. p. 113. *der große kanadenfifche Kautz.*

Latham, Vögel, I. p. 132. n. 29. *die kanadifche Eule.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 62. n. 35. Strix (Funerea) capite laevi, corpore fufco, albo maculato, fubtus albo fufcoque fafciato, remigibus maculis albis variegatis, rectricibus albo fafciatis.

Bock,

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 286. n. 35. *die Steineule.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 69. n. 52. *Kircheule, Steineule.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark. p. 166. n. 4. *Krakugle, Klagefrau, Klage.* Tab. 12.

Naturforsch. VIII. p. 60. n. 34. *Steineule.*

Eberhard, Thiergesch. p. 70. *die kanadische Eule.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 93. n. 7. Strix (Funerea) capite laevi, corpore fusco, iridibus flavis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 11. n. 81. Strix (Funerea) capite laevi, corpore fusco, iridibus flavis.

Gerin. ornith. I. p. 88. Tab. 90.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 215. n. 13. *die Habichtseule.*

34. Hudsonia. *Die kleine Falkeneule.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 101. *die Sperbereule.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 69. n. 16. Strix Caparoch; *der Weißbacken.*

Halle, Vögel, p. 242. n. 183. *die Geiereule?*

Brisson, ornithol. I. p. 151. n. 7. Chathuant de la Baye de Hudson.

Büffon, Vögel, III. p. 100. *die kleine Falkeneule.* Tab. 72.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 19. *die kleine Falkeneule.*

Latham, Vögel, I. p. 133. n. 30. *die Habicht-Eule.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 65. n. 35. β. Strix, corporis pennis supra fuscis, margine albis, subtus

(7) Nach *Pennant* und *Latham* eine Varietät von *Strix Funerea.*

ſubtus albis, lineis transverſis nigris, roſtro iridibusque aurantiis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 23. n. 32. Caparoch.

Gerin. ornith. I. p 91. Tab. 98.

35. Uralensis. *Die Uraleule.* (8)

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 68. n. 14. *die uraliſche Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 136. n. 37. *die Ural-Eule.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 63. γ. Strix corpore albido, maculis in ſingularum pennarum medio longitudinalibus fuſcis.

Lepechin, Tageb. der ruſſiſchen Reiſe, II. p. 181. *uraliſche Eule.*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. Anh. p. 3. n. 7. Strix *uralenſis.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 174. Str. uralenſis.

36. Accipitrina. *Die Habichtseule.* (9)

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 67. n. 13. *die Habichteule.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 372. n. 7. *die Habichtseule.* p. 373. *kleine Falkeneule, Geyereule, Sperbereule.* Tab. 12.

Latham, Vögel, I. p. 136. n. 36. *die kaſpiſche Eule.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 60. n. 27. γ. Strix capite laevi, corpore ſupra luteſcente, ſubtus luteo-

(8) Länge, nach *Lepechin*, 1 Fuſs 9 Zoll 10 Linien; Flügelweite 2 Fuſs 5 Zoll. — Nach *Pennant* und *Latham* eine Varietät von *Strix Funerea.*

(9) Länge, nach *Bechſtein*, 19 Zoll; Flügelweite 2 Fuſs 4 Z. Gewicht 12 Unzen. Aus den beygefügten Synonymen erhellet, daſs *Bechſtein* dieſe Gattung mit n. 34. und 35. für einerley hält. *Latham* führt ſie als eine Varietät von *Strix Ulula* auf. Nach *Beſeke* niſtet ſie auch in Kurland.

luteo-albo, maculis longitudinalibus nigricantibus.

Beseke, Vögel Kurl. p. 26. n. 35. *die Habichteule.*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 376. *eine beſondere Eule.*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. Anh. p. 3. n. 6. Strix *accipitrina.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 88. n. 44. *die Habichtseule.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 175. Str. accipitrina.

37. Javanica. *Der Kukepluck.* (10)

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 64. n. 39. Strix (Javanica) corpore cinereo, hinc inde rufeſcente, maculis albis et nigris, ſubtus ſordide albo, hinc inde rufeſcente, maculis nigris.

38. Novae seelandiae. *Die neuſeeländiſche Eule.* (1)

Latham, Syſt. ornith. I. p. 65. n. 45. Strix (Fulva) capite laevi, corpore fuſco, marginibus pennarum fulvis, regione periophthalmica fulva, rectricibus faſciis pallidis.

Latham, Syn. Supplem. p. 48. 39. New-Zealand Owl.

β. Strix iridibus flavis, corpore ſupra fuſco-albo maculato, ſubtus fulvo. *Latham*, Syſt. ornithol. I. p. 65. n. 45. β.

Latham, Syn. p. 149. n. 39. New-Zealand Owl.

Gmelin, Syſt. Linn. p. 297. n. 38.

39. Ca-

(10) Länge 17 Zoll. Flügelweite 40 Zoll; engl. M.

(1) Auf dieſe Art hat *Latham* die Synonymen in dem Syſt. ornithol. geordnet.

39. CAYENNENSIS. *Die cayennische Eule.*

Müller, Naturſyſtem Suppl. p. 70. n. 17. *die cajennische Eule.*

Büffon, Vögel, III. p. 112. *die kayennische Eule.* Tab. 74.

Latham, Vögel, I. p. 135. n. 35. *die kayennische Eule.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 64 n. 41. Strix (Cayanenſis) capite laevi, iridibus fulvis, corpore rufo, lineis undulatis transverſis fuſcis.

40. DOMINICENSIS. *Die Eule von St. Domingo.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 70. n. 18. *die domingische Eule.*

Büffon, Vögel, III. p. 115. *der große Kautz, von St. Domingo.*

Latham, Vögel, I. p. 125. n. 34. *die St. Domînik-Eule.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 64. n. 40. Strix (Dominicenſis) capite laevi, abdomine rufo, pectore maculis ſparſis longitudinalibus.

41. TOLCHIQUATLI. *Die schwarzbunte mexikanische Eule.*

Müller, Naturſyſt. I. p. 106. *b. Tolchiquatli.*

Briſſon, ornithol. I. p. 153. n. 10. Noctua Mexicana; *Chouette du Mexique.*

Büffon, Vögel, III. p. 116. n. 2. *die schwarzbunte mexikanische Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 134. n. 32. *die Eule aus Neu Spanien.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 63. n. 37. Strix (Tolchiquatli) capite laevi, iridibus flaveſcentibus, corpore nigro-flaveſcente, albo fulvoque vario, ſubtus albo.

42. CHI-

42. CHICHICTLI. *Die rothbunte mexikanische Eule.*

Müller, Natursystem, II. p. 106. *a. Chichictli.*

Brisson, ornith. I. p. 152. Strix Mexicana; *Chat-huant du Mexique.*

Büffon, Vögel, III. p. 116. n. 1. *die mexikanische rothbunte Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 134. n. 1. *die mexikanische Eule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 63. n. 36. Strix (Chichictli) capite laevi, oculis nigris, corpore fulvo, albo, fusco nigroque vario, palpebris caeruleis.

43. ACADICA. *Die acadische Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 137. n. 38. *die akadische Eule.* Tab. 5. fig. 2.

Latham, Syst. ornith. I. p. 65. n. 44. Strix (Acadiensis) capite laevi, regione periophthalmica cinerea, corpore supra rubro-fusco maculis albis; subtus sordide albo maculis longitudinalibus ferrugineis.

12. PASSERINA. *Der kleine Kautz.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 106. n. 12. *die Zwerg-eule.*

Borowsky,

(2) Flügelweite 1 Fuss 11 Zoll; Gewicht 7 Unzen. Lebt in alten verfallenen Gebäuden, oft mitten in Städten, in Kirchen, Steinbrüchen, Gewölben u. s. w. Nistet in Mauerlöchern, auf dem Gebälke und unter den Dächern alter Gebäude, in Felsen und Steinklüften. Legt 2 weisse rundliche Eyer, die das Weibchen abwechselnd mit dem Männchen in 15 Tagen ausbrütet. Läſst sich sowohl jung als alt zähmen, und zum Vogelfange gebrauchen. Von dem Aberglauben, dass

Borowsky, Thierreich, II. p. 81. n. 7. *das Käutzchen, der Todtenvogel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 161. n. 3. Strix (Passerina) capite laevi, remigibus maculis albis, quinque ordinum.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 333. n. 9. *der kleine Kauz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 367. n. 6. *der kleine Kautz.* p. 371. *Todtenvogel, Leicheneule, Leichvogel, Leichenhühnchen, Todteneule, Zwergeule, kleine Eule, kleine Haus- Wald- und Scheuneule, Steinauffe, Lerchenkäutzchen, Spatzeneule, Käutzchen.*

Funke, Naturgesch. I. p. 288. *das Käutzchen.*

Ebert, Naturl. II. p. 39. *das Käutzlein.*

Halle, Vögel, p. 240. n. 180. *die kleine Hauseule.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 50. n. 47. *das kleine Käutzchen.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 225. n. 42. *die kleine Eule, Zwergeule.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 719. *das Käutzchen.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 323. *das Käutzlein, die Stockeule.*

Handbuch d. deutschen Thiergesch. p. 99. *das Käutzchen.*

(*Klein*, av. p. 56. n. 6. Noctua parva aucuparia.

Klein, Vorbereit. p. 107. n. 6. *Käutzlein, schlechthin also genannt, klein Käutzlein, Stockeule, kleine Wald-, Scheuer-, Hauseule.*

Klein,

dass diese Eule denjenigen Häusern, auf welchen sie sich hören lässt, einen nahen Todesfall verkündige, hat sie den Namen des *Leichvogels* erhalten. Sie hat einen hellen zischenden Laut, und wird auf eine Viertelmeile gelocket, wenn man denselben nachmacht.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 55. n. 6. *Käuzlein.*)
Mit *Strix Ulula*, und *Stridula* verwechſelt.
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 165. n. 2. *kleine Eule.*
Briſſon, ornithol. I. p. 150. n 5. petite Chouette, ou la Cheveche.
Büffon, Vögel, III. p. 88. *das Käutzchen, der Todtenvogel.* Tab. 71.
Batſch, Thiere, I. p. 299. *der Kautz.*
Seligmann, Vögel, VII. Tab. 9. *die kleine Eule.*
Latham, Vögel, I. p. 138. n. 40. *das Käutzgen.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 65. n. 46. Strix (Paſſerina) capite laevi, remigibus maculis quinque ordinum.
Beſeke, Naturgeſch. der Vögel Kurl. p. 27. n. 37. *die Zwergeule.*
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 287. n. 36. *Zwergeule, Käutzlein, Stockeule.*
Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 64. *die Steineule.*
Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 7. *Käutzlein.*
Pennant, britt. Thiergeſch. Tab. 21.
Zorn, Petinotheol. II. p. 258. *das Käutzlein.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 14. n. 17. *das Käutzlein, Haus-Eule, Stock-Eule.*
Krünitz, Encyklop. XI. p. 686. *die kleine Hauseule.*
Tengmalm, neue ſchwed. Abhandl. IV. p. 45. Strix paſſerina.
Goeze, nützl. All. II. p. 158. n. 9. *das Käutzlein.*
Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Fr. VII. p. 449. *Zwergeule.*
Naturforſch. VIII. p. 60. n. 35. *Zwergeule.*
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 87. n. 39. *der kleine Kautz.*

Eberhard, Thiergesch. p. 70. *die kleine Hauseule.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 349. e. *das Käutzchen.*

Beckmann, phys. ök. Bibl. VI. p. 57. *der kleinste Kauz.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 93. n. 11. Strix (Passerina) capite laevi, remigibus albis, maculis quinque ordinum.

Müller, zool. dan. prodr. p. 11. n. 83. Strix (Passerina) capite laevi, remigibus maculis albis quinque ordinum.

Kramer, Austr. p. 324. n. 6. Strix capite laevi, corpore fusco, remigibus albis maculis quinque ordinum; *Tschiavitl, Käutzlein.*

Brünich, ornitholog. bor. p. 7. n. 20. Strix Passerina.

Hermann, tab. affin. anim. p. 175. Strix Passerina.

Jonston, av. p. 51. Noctua minor.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 215. n. 14. *das Käuzlein.*

β. *Noctua minor.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 66. β.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Die Anzahl der Ohreulen ist um 12, der ungehörnten um 20, also das ganze Geschlecht mit 32 Gattungen vermehrt; überdem sind bey der ersten Gattung 33 bey der zehnten 2, und bey der zwölften gleichfalls 2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Un-*

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der rauhfüßige kleine Kautz.*
 Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 371. Strix Passerina dasypus.

C. *Neuere Gattungen.*

1. Die *Sumpfeule.* Strix palustris; (in Hessen und Pommern.)
 Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 344. n. 3.

2. *Die chinesische Ohreule.*
 Latham, Syn. Suppl. p. 44. Chinese eared Owl.
 Latham, Vögel, I. p. 121. n. 15.
 Latham, Syst. ornitholog. I. p. 53. n. 4. Strix (Sinensis) fronte albo, corpore fusco-rufo lineis nigris undulatis, subtus rufo-nigricante striato, fasciis albis, remigibus secundariis fasciis 4 nigricantibus.

3. *Die Ohreule von Koromandel.*
 Latham, Syn. Supplem. p. 44. Coromandel eared Owl.
 Latham, Vögel, I. p. 122. n. 15. *β*.
 Latham, Syst. ornithol. I. p. 53. n. 5. Strix (Coromanda) corpore rufo-griseo rufescente-albo maculato, subtus pallide rubro, lunulis nigris, remigibus rectricibusque fasciis rufo-albis.
 Sonnerat, voy. Ind. II. p. 186. Hibou de Coromandel.

4. *Die Brilleneule*; (in Cayenne.)
 Latham, Syn. Suppl. p. 50. Tab. 107. Spectacle Owl.
 Latham, Vögel, I. p. 141. n. 42. Tab. 6.
 Latham, Syst. orn. th. I. p. 58. n. 24. Strix (Perspicillata) capite laevi, tomentoso albo, re-

gione periophthalmica, gula, corpore supra, fasciaque pectoris rubro-fuscis, abdomine ruso-albo.

5. *Die Bergeule;* (in Sibirien.)
Latham, Syn. Suppl. p. 50. Mountain Owl.
Latham, Vögel, I. p. 141. n. 43.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 62. n. 34. Strix (Barbata) capite laevi, rostro iridibusque flavis, corpore cinereo, gula regioneque periophthalmica atris, remige sesquialtera serrata.

44. GESCHLECHT. Lanius. *Der Würger.*
Müller, Natursyst. II. p. 108. Gen. XLIV.
Leske, Naturgesch. p. 135. Gen. XIII.
Borowsky, Thierreich, II. p. 81. Gen. IV.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 162. Gen. IV.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 334. Gen. IV.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 375. Gen. IV.
Funke, Naturgesch. II. p. 289.
Ebert, Naturl. II. p. 40.
Pennant, arct. Zool. II. p. 227.
Neuer Schaupl. der Natur, VI. p. 132.
Onomat. hist. nat. IV. p. 652.
Halle, Vögel, p. 220.
Klein, av. p. 53. n. 26.
Brisson, ornithol. I. p. 197. Gen. XXI.
Büffon, Vögel, II. p. 169.
Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXI.
Latham, allg. Uebers. d. Vögel, I. p. 142. Gen. IV.
Latham, Syst. ornith. I. p. 66. Gen. IV.
Hermann, tab. affin. anim. p. 177.

Donn-

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 216. Gen. IV.

1. Forficatus. *Der Drongo.*

Müller, Natursystem, II. p. 109. n. 1. *der afrikanische Scheerschwanz.*

Müller, Natursyst. II. p. 578. ad n. 24. *Drongo.* Tab. 20. fig. 5.

Onomat. histor. natur IV. p. 658. *der schwarze Würger aus Madagaskar, mit dem getheilten Schwanze.*

Brisson, ornith. I. p. 266. n. 16. grand gobe-mouche noir hupé de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 239. *der schwalbenschwänzige Würger von Madagaskar.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 146. *der Drongo;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 144. n. 1. *der afrikanische Scheerschwanz, der Drongo.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 66. n. 1. Lanius (Forficatus) cauda forficata, crista frontali erecta, corpore nigro viridante.

Samml. zur Phys. und Naturgesch. III. p. 119. *der Drongo.*

2. Caerulescens. *Der Fingah.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 72. n. 33. *der blaue Neuntödter.*

Müller, Natursyst. II. p. 109. n. 2. *der bengalische Scheerschwanz.*

Halle, Vögel, p. 224. n. 164. *der bengalische blaue Würger.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 654. *der bengalische blaue Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 9. Lanius Bengalensis, Fingah dictus.

Klein, Vorber. p. 103. n. 9. *Fingah aus Bengala.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſtorie, p. 53. n. 34. *blauer Wrangengel.*

Briſſon, ornithol. I. p. 210. n. 22. Pie-grieche à queue fourchue de Bengale.

Büffon, Vögel, II. p. 204. *der blaue bengaliſche Würger.* Tab. 50.

Batſch, Thiere, I. p. 236. *der bengaliſche blaue Würger.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 7. *der indianiſche Neuntödter, mit dem gabelförmigen Schwanz.*

Latham, Vögel, I. p. 145. n. 2. *der bengaliſche Scheerſchwanz, Fingah.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 67. n. 2. Lanius (Caeruleſcens) cauda forficata, corpore nigro-caeruleſcente, abdomine albo.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 95. n. 8. Lanius (Caeruleſcens) cauda forficata, corpore nigro caeruleſcente, abdomine albo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 178. Lanius caeruleſcens.

5. CASTANEUS. *Der kaſtanienbraune Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 145. n. 3. *der kaſtanienbraune Würger.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 67. n. 4. Lanius (Caſtaneus) cauda cuneiformi, corpore ſupra caſtaneo ſubtus albo, vertice, nucha cerviceque cinereis.

3. CRISTATUS. *Der Charah.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 110. n. 3. *der gehaubte Neuntödter.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 655. *der bengaliſche rothe Würger, Charah.*

Briſſon,

Briſſon, ornithol. I. p. 205. n. 13. Pie-grieche rouſſe de Bengale.

Büffon, Vögel, II. p. 195. *der philippiniſche Würger.*

Halle, Vögel, p. 224. n. 163. *der bengaliſche rothe Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 8. Lanius Bengalenſis, Charah dictus.

Klein, Vorber. p. 103. n. 8. *Charah aus Bengala.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 53. n. 33. *gekrönter Wrangengel.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 3. *der gehaubte röthlich braune Neuntödter.*

Latham, Vögel, I. p. 154. n. 18. *der Charah.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 72. n. 17. Lanius (Criſtatus) cauda cuneiformi, capite criſtato, corpore rufeſcente, ſubtus fulvo fuſcoque undulato.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 1. Lanius (Criſtatus) cauda cuneiformi, capite criſtato, corpore rufeſcente, ſubtus fulvo fuſcoque undulato.

Gerin. ornith. I. p. 74. Tab. 57. fig. 2.

4. Canadensis. *Der canadiſche gehäubte Würger.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 110. n. 4. *der Canadiſche.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 652. *der canadenſiſche Neuntödter.*

Briſſon, ornithol. I. p. 205. n. 12. Pie-grieche de Canada.

Büffon, Vögel, II. p. 236. *der kanadenſiſche gehäubte Würger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 228. n. 45. *der Würger mit dem Federbuſche, der canadiſche Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 163. n. 35. *der kanadische Würger mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 72. n. 18. Lanius (Canadensis) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente, subtus albido.

Gerin, ornith. I. p. 75. Tab. 62. fig. 2.

6. Ludovicianus. *Der louisianische Würger.*

Müller, Natursyst. II. p. 111. n. 6. *der Louisianische.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 228. n. 44. *der Schwarzkopf?*

Onomat. hist. nat. IV. p. 659. *der Würger aus Ludovicien.*

Brisson, ornithol. I. p. 202. n. 8. Pie-grieche de la Louisiane.

Büffon, Vögel, II. p. 178. *der graue Würger von Louisiana.*

Latham, Vögel, I. p. 147. n. 5. *der Würger aus Louisiana.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 67. n. 8. Lanius (Ludovicianus) cauda cuneiformi, cinereus, remigibus nigris, basi rectricibusque apice albis.

7. Nengeta. *Der Nengeta.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 111. n. 7. *Brasilianische.*

Pennant,

(3) Halten sich, besonders im Innern von Guiana, häufig auf den untersten Aesten von gewissen Bäumen auf, wo sie Körner und Insekten suchen. Von Zeit zu Zeit schreyen sie alle auf einmal nach gewissen Zwischenzeiten. Ihr übrigens unangenehmes Geschrey dient verirrten Reisenden zu einem Zeichen, dass sie, wenn sie der Stimme dieser Vögel nachgehen, zu einem Flusse kommen. In Sibirien fängt und zähmt man diese Vögel. Sie fressen auch andere kleine Vögel.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 230. A. *der graue Würger.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 662. *der graue brasilianische Würger.*

Brisson, ornith. I. p. 256. n. 8. Cotinga gris.

Büffon, Vögel, II. p. 242. *der brasilianische Würger.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 158. *der Guiarou;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 163. n. 36. *der Nengeta.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 68. n. 7. Lanius (Nengeta) cauda cuneiformi, apice alba, corpore cinereo, subtus albido.

Samml. zur Physs. u. Naturgesch. II. p. 752. *der Guiarou.*

Jonston, av. p. 203. *Guiaru Nheenceta.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 216. n. 1. *der graue Würger.*

β. *Büffon*, Vögel, XIII. p. 161. *eine Abart des Guiarou.*

Latham, Vögel, I. p. 164. n. 36. Var. A.

8. CURVIROSTRIS. *Der Vanga.*

Müller, Natursyst. II. p. 112. n. 8. *Krummschnabel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 656. *der Würger von Madagaskar mit dem krummen Schnabel.*

Brisson, ornithol. I. p. 211. n. 23. Ecorcheur de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 220. *der weißbäuchige Würger von Madagaskar.* Tab. 55.

Latham, Vögel, I. p. 154. n. 19. *der krummschnäbligte Würger.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 72. n. 15. Lanius (Curvirostris) cauda cuneiformi, corpore albo, dorso nigro, remigibus primoribus 5. macula alba.

Her-

Hermann, tab. affin. animal. p. 179. Lanius curvirostris.

9. Collaris. *Der Würger mit dem Halsbande.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 112. n. 9. *der caapſche Neuntödter.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 654. *der Würger vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*

Briſſon, ornithol. I. p. 208. n. 18. Pie-grieche du Cap de bonne eſperance.

Büffon, Vögel, II. p. 179. *der Würger des Vorgebirges der guten Hoffnung.*

Latham, Vögel, I. p. 148. n. 7. *der Würger mit dem Halsbande.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 69. n. 10. Lanius (Collaris) cauda cuneiformi, corpore nigro, ſubtus albo, remigibus primoribus baſi albis.

10. Lucionensis. *Der Würger aus Luçon.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 112. n. 10. *der lucioniſche Neuntödter.*

Onomat. hiſt. natur. IV. p. 659. *der Neuntödter von der Inſel Luçon.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 204. n. 11. Pie-grieche de Luçon.

Büffon, Vögel, II. p. 244. *der lucioniſche Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 155. n. 21. *der Würger aus Luçon.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 67. n. 5. Lanius (Lucionenſis) cauda cuneiformi, corpore griſeo-rufeſcente, rectricibus apice fuſco faſciatis, macula aurium nigra.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 156. Var. A. *

11. Ex-

11. EXCUBITOR. *Der große graue Würger.* (4)

Müller, Naturſyſt. II. p. 113. n. 11. *der Wächter.*

Leſke, Naturgeſch p. 236. n. 1. *der graue Würger, die Bergelſter.*

Borowſky Thierreich, II. p. 83. n. 2. *der große europäiſche Neuntödter.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 162. n. 1. Lanius (Excubitor) cauda cuneiformi, lateribus alba, dorſo cano, alis nigris, macula alba; *der Würger, Bergälſter.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 335. n. 1. *der große graue Würger.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 376. n. 1. *der große graue Würger.* p. 382. *aſchfarbiger Würger, großer blauer Würger, gemeiner Neuntödter, großer europäiſcher Neuntödter, Würgengel, Gebüſchfalke, wilder Elſter, Speralſter, Griegelelſter, wachender Würgvogel, grauer großer Afterfalke, Buſchelſter, Thornkrätzer, Thornkraſer, Walaſthee, Neunmörder, Wildwald, Krück-, Kruckoder Krauſelſter, blauer Neuntödter, Krickelſter.* Tab. 13.

Funke, Naturgeſch. I. p. 290. *der graue Würger.*

Ebert,

(4) Länge 10 u. 3/4 Zoll Flügelweite 1 Fuſs 3 Zoll. Gewicht 4 Loth. Nährt ſich von Feldmäuſen, Goldammern, Stieglitzen, Feldſperlingen, Finken, Zeiſigen, Lerchen, Inſekten, beſonders Hirſchkäfern, Roſskäfern, Heuſchrecken, Maulwurfsgrillen u. dgl. Geht auch im Sommer auf Eidechſen, Blindſchleichen u. ſ. w. Niſtet in Wäldern und gebirgigen Gegenden auf hohen Bäumen, auf einzelnen Obſtbaumen, die im Felde dieſen Gegenden nahe liegen, und zwar auf den unterſten Zweigen derſelben, auch im Feldgeſträuche. Brütet jährlich zweymal. Die Jungen kommen nach 15 Tagen aus.

Ebert, Naturl. II. p. 46. *der aſchfarbige Neuntödter.*

Halle, Vögel, p. 220. n. 158. *der aſchfarbne Würger von der erſten Gröſse.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 51. n. 49. *die Bergelſter* u. ſ. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 227. n. 43. *der groſſe Würger, die Bergelſter.*

Neuer Schaupl. der Natur, VI. p. 132. *der groſse aſchfarbige Neuntödter.*

Onomat. hiſt. nat. I. p. 382. Ampelis caeruleſcens; *der blaulichte Ottervogel, der Warvogel.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 198. n. 2. *der groſse graue Neuntödter.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 100. *der Würger.*

Klein, av. p. 53. n. 1. Lanius cinereus maior.

Klein, Vorbereitung, p. 101. n. 1. *der gröſseſte Aſchgraue.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 52. n. 26. *gröſseſter Neuntödter.*

Klein, Stemm. av. p. 9. Tab. 9. fig. 1. a. b. c.

Klein, Vögeleyer, p. 20. Tab. 5. fig. 9.

Gesner, Vögelb. p. 501. *der aſchenfarbne Thornträ r.*

Briſſon, ornith. I. p. 197. n. 1. Pie-grieche griſe.

Büffon, Vögel, II. p. 173. *der aſchfarbige Würger.* Tab. 46.

Büffon, Vögel, XIII. p. 162.

Batſch, Thiere, I. p. 334 *der aſchfarbige Würger.*

Beſeke, Vögel Kurl. p. 27. n. 39. *der Wächter.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 287. n. 37. *der Wächter, gröſseſte Neuntödter, Würgengel.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 69. n. 53. *groſser Neuntödter.*

Cetti,

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 52. *Neuntödter.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännemark, p. 166. n. 1. *Hapax.*

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 15. *der graue Neuntödter.* IV. p. 25. Lanius Excubitor.

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 102. Lanius *excubitor.*

Naturforsch. VIII. p. 60. n. 36. *der Wächter.*

Naturforsch. XVIII. p. 232. Lanius Excubitor.

Naturf. XXV. p. 16. *Neuntödter.*

Meidinger, Vorles. I. p. 114. n. 1. *der graue Würger, oder die Bergelster.*

Eberhard, Thiergesch. p. 75. *der Neuntödter?*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 16. n. 18. *der große Neuntödter, großer Dorndräher.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 287. n. 54. *der Wächter.*

Naumann, Vogelsteller, p. 126. *Krückelster.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 248. *der große Neuntödter.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 90. n. 41. *der große graue Würger.*

Beckmann, Biblioth. VI. p. 52. *der graue Neuntödter.*

Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 294. *Neun-Tödter, Wild- oder Krück-Elster.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 731. *Neuntödter.*

Anweis. Vögel zu fangen, u. s. w. p. 417. *der Neuntödter.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 81. *Krik-Elster.*

Tänzer, notabil. venator. p. 137.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Lanio.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 30. n. 3. Collurio.

Linné,

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 94. n. 2. Lanius (Excubitor) cauda cuneiformi, lateribus alba, dorſo cano, alis nigris, macula alba.

Kramer, Auſtr. p. 364. n. 4. Ampelis caeruleſcens, alis caudaque nigricantibus; *Speralſter, Griegelalſter*, *Neuntödter*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 84. Lanius (Excubitor) cauda cuneiformi, lateribus alba, dorſo cano, alis nigris, macula alba.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 291. Lanius maior; *ein Wan-Krengel*, *War-Krengel*, *Wurg-Engel*, *Neun-Mörder*, *Waldt-Herr*, *Waldt-Höher*.

Jonſton, av. p. 24. Collurio maior.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 216. n. 2. *der große Würger*.

β. ALBUS. *Eine weiße Spielart.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 198. A. Lanius albus. *Pie-grieche blanche.*

Büffon, Vögel, II. p. 177. *ganz weiße Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 147. n. 4. Var. B.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 68. γ. L. corpore toto albo.

Aldrov. av. I. p. 387. Lanius albus.

Jonſton, av. p. 24. Collurio totus albus.

γ. MAIOR. *Eine größere Spielart.*

Briſſon, ornithol. I. p. 198. n. 2. grande Pie-grieche griſe.

Büffon, Vögel, II. p. 177. n. 61.

Latham, Vögel, I. p. 147. n. 4. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 68. β. Lanius cinereus maior.

12. COL-

12. COLLURIO. *Der Dorndreher.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 113. n. 12. *der Finkenbeißer.*

Leſke, Naturgeſch. p. 236. n. 2. *der rothköpfige Würger, Finkenbeißer.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 84. *der Dorndreher.*

Blumen-

(5) Unter den zu dieſer Gattung gehörigen Synonymen, und den dabey angenommenen Varietäten herrſcht groſse Verwechſelung, wie ich in den folgenden Noten anführen werde. *Beſeke* bemerkt ſehr richtig, daſs die *Lanii* überhaupt noch viel zu wenig beobachtet ſind, und daſs die Urſachen dieſes Mangels darin liegen, daſs ſie nur einzeln leben, ſich daher ſelten zeigen, und als kleine unbedeutende Vögel den Jäger nicht aufmerkſam machen, wozu noch kommt, daſs ſie ſich ſehr ſtill verhalten, und ſelten einmal ein Geſchrey machen, daher man ſie um ſo weniger gewahr wird. Die Gröſse des Dorndrehers iſt 8 Zoll, die Flügelweite 13 Zoll. Er gehört zu den angenehmſten Singvögeln, und ahmt andrer Vögel Stimme ſehr geſchickt nach. Zänkiſch iſt er wie alle ſeine Geſchlechtsverwandten, und beiſst ſich immer mit Grasmücken, Goldammern u. dgl. Vögeln, die ſich ſeinem Revier nähern, herum, iſt aber zu ohnmächtig ſie zu tödten. Im May richtet er unter den Maykäfern, und im Sommer unter den Miſtkäfern, Feldgrillen, und Heuſchrecken groſse Niederlagen an, ſpieſt ſie häufig an die Dornen der Schwarz- und Weiſsdornſtaude, und hält davon ordentliche Mahlzeiten. Brütet jährlich zweymal, und baut ſich zu jeder Brut ein neues Neſt. Das Neſt iſt ziemlich groſs, beſteht auswendig aus Wurzeln und groben Grasſtengeln, worauf eine Lage von Moos und Wolle, und dann die innere Ausfütterung aus lauter kleinen Wurzelfaſern folgt. Legt 5, ſeltener 6 weiſse, mit ſchmutzig gelben und aſchgrauen Pünktgen beſtreuete ſtumpfe Eyer, die in 14 Tagen von dem Weibchen ausgebrütet werden. Das Weibchen hat faſt gar nichts von der Farbe des Männchens gemein, und dies iſt die Haupturſache der Verwirrung, die unter den Schriftſtellern bey dieſer Gattung angetroffen wird. *Bechſtein.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 162. n. 2. Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo; *der Neuntödter.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 338. n. 4. *der Dorndreher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 392. n. 4. Lanius Spinitorquus; *der Dorndreher.* p. 399. *Dorntreter, kleiner bunter Würger, mandelbrauner Millwürger, blauköpfiger Würger, kleiner bunter Warkengel oder Würgengel, Dorndrechsler, rothgrauer kleinster Würger, schäckiger Würger, singender Rohrwrangel, singender Rohrwürger, großer Dornreich, Dornheher, Dorngreuel, kleiner Neuntödter.* Tab. 16. fig. 1. 2.

Funke, Naturgesch. I. p. 291. *der Neuntödter, Dorndreher.*

Ebert, Naturl. II. p. 42. *der Dorntreter, Dorndrechsler.*

Halle, Vögel, p. 224. n. 166. *der rothgraue kleinste Würger.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 53. n. 51. Lanius Spinitorquus; *der Dorntreter, Dorntraber;* u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 229. n. 47. *der Würger mit dem rothen Rücken, der Finkenbeißer.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 372. *Dorntreter.*

Onomat. hist. nat. II. p. 136. *Warkengel, aschfarbner Neuntödter.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 198. *der Wankrengel.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 100. L. Collurio; *der Dorndreher.*

Klein,

Klein, av. p. 53. n. 2. Lanius minor primo capite et collo cinereis, gutture et pectore incarnatis, alis et dorso ex aerugine et nigredine variegatis, rostro et pedibus nigris.

Klein, Vorbereitung, p. 102. n. 2. *kleiner bunter Wankrengel, Dorntraher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 52. n. 27. *kleiner bunter Wankrengel.*

Klein, Vögeleyer, p. 20. Tab 5. fig. 8.

Klein, stemm. av. p. 9. Tab. 9. fig. 2. a. b.

Brisson, ornithol. I. p. 200. n. 4 Ecorcheur.

Büffon, Vögel, II. p. 192. *der kleinste bunte Würger.* Tab. 49.

Batsch, Thiere, I. p. 535. *der kleine bunte Würger oder Dorntreter.*

Latham, Vögel I. p. 151. n. 15. *der Finkenbeißer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 52. Red-backed Shrike.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 69. n. 11. Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus 4. intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 29. n. 41. *der Finkenbeißer.*

Fischer, Zus. z. Naturgesch. von Livland, p. 44. n. 491. *kleiner Neuntödter.*

White, Naturgeschichte von England, p. 37. *Neuntödter.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 289. n. 39. *der Finkenbeißer, größter rother Neuntödter, Rothkopf.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. Lanius Collurio.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 17. n. 19. *der kleine Neuntödter, Dorndreher.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 252. *der kleine Neuntödter, Dorntretter.*

Nau, Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 248. Lanius Collurio.

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 93. n. 44. *der Dorndreher.*

Naturforsch. VIII. p. 61. n. 38. *der Finkenbeißer.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 450. n. 13. *der Finkenbeißer.*

Goeze, nützl. All. II. p. 159. n. 10. *der Neuntödter.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 102. Lanius Collurio.

Tengmalm, neue schwed. Abh. II. p. 100.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 30. n. 2. Lanius.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 94. n. 3. Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 11. n. 85. Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.

Kramer, Austr. p. 363. n. 2? *Dorngreul, Dornheher.*

Brünich, ornith. bor. p. 8. n. 23. 24. Collurio.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 292. Lanius minor varius. Spinitorquus minor; *kleiner bunter Wankrengel, klein Wahnkrengel, Dornträher.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 180. Lanius Collurio.

Jonston, av. p. 107. Merulae congener?

Moehring, av. gen. p. 28. n. 1. Collyrio.

Gerin. ornith. I. p. 73. Tab. 55. fig. 8.

β. VA-

β. VARIUS. *Der bunte Dorndreher.* (6)

Halle, Vögel, p. 224. n. 165. *der singende Rohrwürger.*

Klein, av. p. 54. n. 10. Lanius arundinum.

Klein, av. p. 186. *Passer arundinum.* Lanius arundinum.

Klein, Vorbereit. p. 103. n. 10. *singender Rohrwrangel.*

Klein, Vorbereit. p. 340. *Rohrsperling.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 53. n. 35. *singender Rohrwrangel.*

Brisson, ornith. I. p. 201. n. 5. Ecorcheur varié.

Büffon, Vögel, II. p. 194. *der schäckige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 152. n. 16. *der bunte Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 70. β. Lanius griseus, subtus rufescens, striis fuscis, scapularibus albo nigroque dimidiatis, rectricibus exterioribus 3 basi apiceque, extima extus rufoalbis.

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 103.

γ. RUFUS. *Der rothköpfige Würger.* (7)

Müller, Natursyst. Supplem. p. 71. n. 30. *der Schwarzohrige.*

 Borowsky,

(6) Nach *Klein*, *Halle*, *Brisson* u. a. eine eigne Gattung, wofür ihn auch *Latham* in der Synopf. anfänglich annahm, der aber im Syst. ornith. seine Meynung geändert hat, und mit *Büffon* eine Spielart daraus macht.

(7) In Ansehung dieser Varietät sind die Meynungen der Ornithologen sehr getheilt. Einige nehmen den *Dorndreher* und *diesen rothköpfigen Würger* nur als dem *Geschlecht* (Sexus) nach von einander verschieden an; einige stellen beyde als blosse Spielarten auf; andere als *Büffon*, *Brisson*, *Zorn*, *Klein*, *Latham*,

Borowsky, Thierreich, II. p. 83. n. 3. *der rothköpfige Würger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 337. n. 3. *der rothköpfige Würger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 387. *der rothköpfige Würger.* p. 392. *der mittlere Neuntödter, Krückelster, Rothkopf, große rothe Neuntödter, Finkenwürgvogel.* p. 390. *Finkenbeißer.* Tab. 15.

Funke, Naturgesch. I. p. 290. *der rothköpfige Würger, Finkenbeißer.*

Ebert, Naturl. II. p. 41. *der Finkenbeißer.*

Halle, Vögel, p. 223. n. 162. *der rothköpfige Würger der zwoten Größe.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 52. Lanius Collurio; *der Finkenbeißer.*

Neuer

Latham, *Halle*, *Bechstein* u. a. m. betrachten beyde als wesentlich von einander verschiedene Gattungen. Ist dies letztere, so hält es bey denenjenigen, die nur einer Gattung erwähnt, und die andere übergangen haben, sehr schwer zu entscheiden, welche gemeynt sey, weil man mehrentheils Synonymen, Charaktere und Beschreibung verwechselt, oder gar vermengt hat. Unter den Neuern hat *Bechstein* die Beschreibung von beyden umständlich geliefert. *Ihm nach* beträgt die Länge des *rothköpfigen Würgers* 8 Zoll, und die Flügelweite 1 Fuss 3 Zoll. Er beisst sich mit allen Vögeln, die in seiner Nachbarschaft wohnen, besonders aber mit Elstern, und im Herbst und Frühjahr mit Finken herum, lernt auch, wie der Dorndreher, den Gesang der meisten Vögel nachsingen, und hat auch die Nahrung mit demselben gemein. Er nistet in Wäldern, Feldern und Gärten auf hohen Bäumen in dichte Zweige, *(häufig auch in Dornhecken)* baut ein grosses Nest von Pflanzenstengeln, Moos, Gras, Schweinsborsten, Wolle und Haaren, und legt gewöhnlich 6 weissliche, ins Grüne schillernde, besonders am stumpfen Ende mit bräunlichen, bläulichen, und blassröthlichen Flecken besetzte Eyer, die in 15 Tagen ausgebrütet werden.

Neuer Schaupl. der Natur, VI. p. 133. *der rothköpfichte Neuntödter.*

Onomat. hiſtor. nat. I. p. 382. *der graue Ottervogel.*

Handb. der deutſchen Thiergeſch. p. 100. Lanius leucopis; *Finkenbeiſſer.*

Klein, av. p. 53. n. 3. Lanius minor rutilus.

Klein, Vorbereit. p. 102. n. 3. *kleiner roſtiger Neuntödter.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 52. n. 28. *kleiner roſtiger Neuntödter.*

Klein, Vögeleyer, p. 20. Tab. 5. fig. 7.

Briſſon, ornitholog. I. p. 199. n. 3. Pie-grieche rouſſe.

Büffon, Vögel, II. p. 186 *der rothköpfige Würger.* Tab. 48. M. u. W.

Batſch, Thiere, I. p. 335. *der rothköpfige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 153. n. 17. *die Waldkatze, der Rothkopf.*

Latham, Synopſ. Suppl. p. 169. 17 Woodchat.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 70. n. 12. Lanius (Rutilus) ſupra tricolor, ſubtus rufeſcente-albus, ſcapularibus totis, rectricibus a baſi ad medium, lateralibus apice albis, faſcia oculari nigra.

White, Naturgeſch. von England, p. 41. *eine ſeltene Varietät des Neuntödters.*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 166. n. 2. *Tornſkade.*

Naturforſch. VIII. p. 61. n. 39. *kleiner rother Neuntödter.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 114. n. 2. *der rothköpfige Würger oder Finkenbeiſſer.*

Zorn, Petinoth. II. p. 251. *der mittlere Neuntödter.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 92. n. 43. *der rothköpfige Würger.*

Tänzer, notabil. venator. p. 137.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 292. Lanius minor rutilus; *ein kleiner rother Wankrengel, rother Warkrengel.*

Gerin. ornith. I. p. 74. Tab. 56.

δ. SENEGALENSIS. *Der rothe senegalische Würger.* (*)

Büffon, Vögel, II. p. 195. Tab. 49. *der rothe senegalische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 153. n. 17. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 71. β.

ε. MELANOCEPHALUS. *Der schwarzköpfige senegalische Würger.*

Büffon, Vögel, II. p. 195. *der schwarzköpfige senegalische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 154. n. 7. Var. B.

Latham, System. ornithol. I. p. 71. γ.

29. ANTIGUANUS. *Der Würger aus Antigua.*

Latham, Vögel, I. p. 155. n. 20. *der Würger aus Antigua.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 72. n. 16. Lanius (Antiguanus) cauda cuneiformi, corpore flavo-rufo, iugulo pectoreque albo, capite, remigibus caudaque nigris, rectricibus lateralibus apice rufis.

30. NIGER. *Der schwarze Würger aus Jamaika.*

Latham, Vögel, I. p. 166. n. 38. *der schwarze Würger aus Jamaika.*

Latham,

*) Nach *Latham*, nebst dem folgenden, Spielarten von seinem *Lanius Rutilus*, oder *Lan. Collur. Rufus* unsers Systems.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 73. n. 21. Lanius (Niger) cauda subcuneiformi, corpore nigricante, remigibus secundariis extus margine fuscis.

31. LEVERIANUS. *Der leverianische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 170. n. 49. *der leverianische Würger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 54. Magpie-Shrike.

Latham, Syst. ornith. I. p. 73. n. 10. Lanius (Picatus) cauda cuneiformi, corpore albo nigroque vario, rectricibus omnibus apice albis.

32. ATRICAPILLUS. *Der surinamische Würger mit schwarzem Scheitel.*

Latham, Syst. ornitholog I. p. 73. n. 19. Lanius (Atricapillus) cauda cuneiformi, et vertice, cervice, humeris alisque nigris, corpore supra murino, subtus caerulescente-cinereo.

33. POMERANUS. *Der pommersche Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 70. ad n. 12. (als Spielart von *Lanius rutilus*, oder *Lan. Collurio Rufus* unsers Systems.)

13. TYRANNUS. *Der Titiri oder Pipiri.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 114. n. 13. *der Würger.* *Borowsky*,

(9) Ich habe das Citatum aus *Pennant* arct. zool. zur folgenden Varietät γ. gezogen, wohin es, mir wenigstens, nach allen Umständen, und selbst nach den, vom *Pennant*, aus *Latham*, *Catesby* und *Büffon* angeführten Synonymen zu gehören scheint, ob gleich *Pennant* auch das Synonym aus *Brisson* mit dazu rechnet. Aber der *rothe Strich*, der den Scheitel des Vogels der Länge nach theilt, scheint mir das entscheidende Merkmal zu seyn, und die von *Pennant* aus *Catesby*

Borowsky, Thierreich, II. p. 82. n. 1. *der tyrannische Würger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 340. n. 5. *der tyrannische Würger.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 665. *der kleine amerikanische Neuntödter, die rothköpfigte Drossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 267. n. 18. Tyran.

Büffon, Vögel, II. p. 245. *der tyrannische Würger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 124. *Titiri oder Pipiri* m. 1 Fig. *der schwarzköpfige Pipiri.*

Batsch, Thiere, I. p. 335. *der tyrann. Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 164. n. 37. *der Tyrann.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 84. n. 53. Lanius (Tyrannus) cinereus, subtus albus, vertice nigro, stria longitudinali fulva.

Linné, auserlesene Abhandl. II. p. 281. n. 19. *der Wütrich Neuntödter.*

Samml. zur Phys. und Naturgesch. III. p. 116. *der Titiri oder Pipiri.*

Meidinger, Vorles. I. p. 114. n. 2. *der tyrannische Würger,*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 94. n. 4. Lanius (Tyrannus) vertice nigro, stria longitudinali fulva.

Hermann, tab. affin. anim. p. 180. L. Tyrannus.

Donn-

Catesby umständlich mitgetheilte Beschreibung bestätigt solches noch mehr. Auch *Latham* führt den *Pennant* bey dieser Varietät γ an; ich kann daher nicht begreifen, warum er *Kleins Turdus corona rubra* zum *Titiri* rechnet, da doch *Klein* selbst *Catesby Tyran of Carolina* angeführt hat. *Latham* gedenkt auch der *rothen Kopfplatte* nicht, und in der *Seligmannschen* Zeichnung vermisse ich die weissen Schwanzfederspitzen. Die Stellen aus *Catesby* und *Klein* führt *Brisson* beym *Titiri* an, und gedenkt also der Spielart aus Carolina gar nicht.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 218. n. 4. *der Tyrann.*

β. Dominicensis. *Der Tyrann von Domingo.* (9)

Brisson, ornith. I. p. 267. n. 19. *Tyran de St. Domingue.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 126. *der Tyran von St. Domingo.*

Latham, Vögel, I. p. 165. A. *der Tyrann von St. Dominick.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 84. n. 53. β. Lanius griseo-fuscus, subtus albus, pectore cinerascente, rectricibus extus et apice rufescentibus.

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 117.

γ. Carolinensis. *Der Tyrann aus Carolina.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 358. n. 180. *der Tyran.*

Klein, av. p. 69. n. 25. Turdus corona rubra.

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 25. *rothköpfige Drossel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 69. n. 25. *rothköpfige Drossel.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 131. *der carolinische Tyrann*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 10. *der Fliegenstecher mit rother Platte.*

Latham, Vögel, I. p. 165. B. *der Tyrann aus Carolina.*

Latham,

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(10) Kommt in Neuyork im April an, legt 5 weisse rostfarbig gefleckte Eyer, baut in niedrigen Büschen, (*der Titiri in Baumlöcher und dickbelaubte Zweige*) macht ein Nest aus Wolle und etwas Moos, mit Federn ausgefüttert, verläst das Land wieder im August, und beobachtet die nämliche Wanderzeit in den südlichen Provinzen. (*Pennant.*)

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 82. γ. Lanius cinereus, ſubtus albus, capite caudaque nigris, rectricibus apice albis.

Samml. zur Phyſ. u. Naturgeſch. III. p. 117. *der caroliniſche Tyrann.*

δ. LUDOVICIANUS. *Der Tyrann aus Louiſiana.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 359. n. 181. *der louiſianiſche Tyrann.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 133. 141. *der louiſianiſche Tyrann.*

Latham, Vögel, I. p. 166. C. *der Tyrann aus Louiſiana.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 82. δ. Lanius plumbeus, ſubtus albus, remigibus albo marginatis, rectrice extima latere exteriore, omnibus apice albis.

Samml. zur Phyſik u. Naturgeſch. III. p. 118. *der louiſianiſche Tyrann.*

14. SCHACH. *Der Schach.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 115. n. 14. *der Schach.*

Onomat. hiſtor. natur. IV. p. 664. *der gelblichte Würger von China.*

Büffon, Vögel, II. p. 248. *der Schach.*

Latham, Vögel, I. p. 156. n. 22. *der Schach.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 75. n. 25. Lanius (Schach) luteſcens, fronte aliſque nigris.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 94. n. 6. Lanius (Schach) corpore luteſcente, fronte aliſque nigris.

15. PITANGUA. *Der Pitangua.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 15. n. 15. *Pitangua.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 662. *der Pitanga Guaca aus Braſilien.*

Briſſon,

Brisson, ornith. I. p. 269. n. 23. Tyran du Brésil.

Büffon, Vögel, II. p. 249. *der brasilische Tyrann, Pitangua.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 134. *der Pitangua Tyrann;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 167. n. 39. *der Pitangua.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 78. n. 42. Lanius (Pitangua) niger, subtus flavus, vertice stria fulva, fascia oculari alba.

Samml. zur Physſ. u. Naturgesch. III. p. 118. *der Bentaveo oder Cuiriri.*

Jonston, av. p. 210. *Pitangua Guacu Brasiliensibus.*

17. Rufus. *Der braunrothe madagaskarische Würger.*

Müller, Natursystem, II. p. 116. n. 17. *der rothe Neuntödter.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 663. *der rothe Würger aus Madagascar.*

Brisson, ornithol. I. p. 207. Pie-grieche rousse de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 224. *der braunrothe Würger von Madagaskar.* Tab. 56

Latham, Vögel, I. p. 161. n. 31. *der braunrothe Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 77. n. 35. Lanius (Rufus) rufus, subtus albidus, capite nigrovirescente.

Gerin, ornith. I. p. 75. Tab. 59. fig. 1.

18. Barbarus. *Der Gonolak.*

Müller, Natursyst. II. p. 116. n. 18. *der Schwarze.*

Brisson, ornith. I. p. 209. n. 20. Pie-grieche rouge de Senegal.

Büffon,

Büffon, Vögel, II. p. 230. *der rothe ſenegaliſche Würger*. Tab. 58.

Latham, Vögel, I. p. 156. n. 23. *der Würger aus der Barbarey*.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 79. n. 45. Lanius (Barbarus) niger, ſubtus ruber, vertice femoribusque fulvis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 179. *Gonolak.*

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 61. fig. 1.

19. SULPHURATUS. *Der ſchwefelgelbe Würger.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 116. n. 19. *der Gelbe.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 665. *der gelbe Würger aus Cayenne.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 206. n. 15. Pie-grieche jaune de Cayenne.

Büffon, Vögel, II. p. 216. *der groſsſchnäblichte Würger von Kayenne, mit gelbem Bauche.* Tab. 54.

Latham, Vögel, I. p. 167. n. 40. *der ſchwefelgelbe Würger.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 79. n. 43. Lanius (Sulphuratus) fuſcus, ſubtus flavus, capite nigricante, faſcia ambiente albida.

Gerin, ornith. I. p. 74. Tab. 58. fig. 1.

20. CAYANUS. *Der graue cayenniſche Würger.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 117. n. 20. *der Cayenniſche.*

Müller, Naturſyſt. Supplem. p. 72. n. 31. *der Schwarzkopf.*

Onomat. hiſt. nat IV. p. 653. *der graue cayenniſche Würger.*

Briſſon, ornithol. I. p. 201. n. 6. Pie-grieche griſe de Cayenne.

Büffon,

Büffon, Vögel, II. p. 214. *der graue großschnäblichte Würger von Kayenne.* Tab. 53.

Latham, Vögel, I. p. 168. n. 41. *der graue cayennische Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 47. Lanius (Cayanus) cinereus, capite, remigibus rectricibusque primoribus nigris.

β. Naevius. *Der geschäckte cayennische Würger.* (1)

Brisson, ornithol. I. p. 202. n. 7. Pie-grieche tachetée de Cayenne.

Büffon, Vögel, II. p. 214. *der gefleckte oder schäckige cayennische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 168. A. *der gefleckte cayennische Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 47. β. Lanius cayanensis naevius.

γ. *Spotted Cayenne Shrike.* *Latham*, Syn. Suppl. p. 54. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 47. γ. Variat corpore minore, *fronte* flavescente, *abdomine* griseo unicolore, macula aurium rufa.

21. Senegalus. *Der graue senegalische Würger.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 117. n. 21. *der Aschgraue.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 664. *der graue Würger aus Senegal.*

Brisson, ornitholog. I. p. 203. n. 10. Pie-grieche grise du Sénégal.

Büffon,

(1) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(2) Nach *Büffon* eine Spielart von *Lanius Excubitor.*

Büffon, Vögel, I. p. 179. *der graue Würger von Senegal.*

Latham, Vögel, I. p. 148. n. 6. *der senegalische Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 75. n. 24. Lanius (Senegalus) griseus, subtus albidus, vertice fasciaque oculari nigris, rectricibus nigris, apice albis.

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 61. fig. 1.

22. Madagascariensis. *Der Calic-Calic.*

Müller, Natursyst. II. p. 117. n. 22. *der kleine Madagaskarische.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 661. *der kleine Würger aus Madagaskar.*

Brisson, ornithol. I. p. 203. n. 9. petite Pie-grieche de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 232. *der kleine grüne madagaskarische Würger;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 157. n. 24. *der Würger aus Madagaskar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 79. n. 46. Lanius (Madagascariensis) cinereus, subtus albidus, superciliis albis, loris nigris, rectricibus rufescentibus.

3. Emeria. *Der rothgeschwänzte bengalische Würger.*

Müller, Natursystem, II. p. 118. n. 3. *der Bengalische.*

Onomat. histor. natur. V. p. 370. *der bengalische Fliegenfänger.*

Brisson, ornitholog. I. p. 206. n. 14. Pie-grieche brune de Bengale.

Büffon, Vögel, II. p. 207. *der rothgeschwänzte bengalische Würger.* Tab. 51.

Selig-

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 85. *indianiſches Rothſchwänzlein, indianiſcher Bruſtwenzel.*

Latham, Vögel, I. p. 157. n. 25. *der bengaliſche Würger.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 74. n. 23. Lanius (Emeria) ſubcriſtatus griſeus, ſubtus albus, temporibus, abdomine uropygioque albis.

27. Bicolor. *Der blaue madagaſcariſche Würger.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 558. n. 42. *der madagaskariſche Kernbeißer.*

Müller, Naturſyſt. Supplem. p. 71. n. 28. *der Zweyfarbige.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 212. n. 26. Pie-grieche bleue de Madagaſcar.

Büffon, Vögel, II. p. 181. *der blaue Würger von Madagaskar.* Tab. 47. fig. 2.

Latham, Vögel, I. p. 160. n. 29. *der blaue Würger.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 75. n. 26. Lanius (Bicolor) cauda ſubaequali, ſupra caeruleſcens, ſubtus albus, capiſtro nigro.

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 60. fig. 1.

28. Leucorhynchos. *Der weißſchnäblige Würger.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 71. n. 27. *der Weißbürzel.* Lanius Leucorinus.

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 74. n. 34. *der ſchwarze Neuntödter.* Lanius Angrajen.

Briſſon, ornithol. I. p. 207. n. 17. Pie-grieche de Manille.

Büffon, Vögel, II. p. 211. *der Würger von den manilliſchen Inſeln.* Tab. 52. fig. 1.

Latham, Vögel, I. p. 162. n. 33. *der Würger mit weißem Schnabel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 77. n. 38. Lanius (Leucorhynchos) niger, rostro, pectore, abdomine uropygioque albis.

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 62.

34. Ferrugineus. *Der Würger mit rostigrothem Bauche.*

Latham, Vögel, I. p. 149. n. 8. *der Würger mit rostigrothem Bauche.*

Latham, Syn. Supplem. p. 51. Ferrugineous-bellied Shrike.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 76. n. 33. Lanius (Ferrugineus) nigricans, iugulo pectoreque albis, uropygio fusco, abdomine crissoque ferrugineis.

35. Tabuensis. *Der tabuanische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 149. n. 9. *der tabuanische Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 76. n. 34. Lanius (Tabuanus) olivaceo-fuscus, iugulo pectoreque cinereis, abdomine flavescente-fusco, remigibus nigris, cauda fusca.

36. Pacificus. *Der Würger vom stillen Ocean.*

Latham, Vögel, I. p. 149. n. 10. *der Würger vom stillen Ocean.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 75. n. 28. Lanius (Pacificus) niger, capite colloque virescentibus, abdomine remigibus caudaque nigricantibus.

37. Septentrionalis. *Der nordamerikanische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 150. n. 11. *der Nord-Amerikanische Würger.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 76. n. 30. Lanius (Septentrionalis) fuscus, gula et pectore cinereis, rectricibus 3 exterioribus extus apice albis.

38. Viridis. *Der Tcha-chert.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 72. n. 32. *der grüne Neuntödter.*

Brisson, ornitholog. I. p. 212. n. 25. Pie-grieche verte de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 211. *der Würger von Madagaskar.* Tab. 52. fig. 2.

Latham, Vögel, I. p. 160. n. 30. *der grüne Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 75. n. 27. Lanius (Viridis) obscure viridis, subtus albus, rectricibus lateralibus nigricantibus, latere exteriore viridi.

39. Leucocephalos. *Der weißköpfige Würger.* (Tcha-chert-Be.)

Brisson, ornithol. I. p. 211. n. 24. grande Pie-griesche verte de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 227. *der große grünliche Würger von Madagaskar.*

Latham, Vögel, I. p. 161. n. 32. *der weißköpfige Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 77. n. 36. Lanius (Leucocephalus) nigro-virescens, capite, collo corporeque subtus albis.

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 59. fig. 2.

40. Dominicanus. *Der schwarze Würger von St. Domingo.* (3)

Latham, Vögel, I. p. 162. n. 33. A. *der Dominikaner-Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 78. β. Lanius niger, abdomine uropygioque albis.

O 2 41. Pa-

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *L. Leucorhynchos.*

41. PANAYENSIS. *Der rothe Würger von Panaya.*

Latham, Vögel, I. p. 163. n. 34. *der rothe Würger von Panaya.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 78. n. 40. Lanius (Panayensis) fuscus, capite, gula, iugulo, pectore abdomineque rubris.

42. ALBUS. *Der weiße Würger aus Panaya.*

Latham, Vögel, I. p. 168. n. 42. *der weiße Würger aus Panaya.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 77. n. 37. Lanius (Albus) albus, tectricibus alarum maioribus rectricibusque nigris, fascia alarum alba.

43. VARIUS. *Der Würger mit weißen Schultern.*

Latham, Vögel, I. p. 168. n. 43. *der Würger mit weißen Schultern.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 73. n. 39. Lanius (Varius) cinereo-fuscus, iugulo pectoreque flavescentibus, abdomine fusco-albo, macula humerali alba.

44. NAEVIUS. *Der gefleckte Würger.* (4)

Latham, Vögel, I. p. 169. n. 45. *der gefleckte Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 81. n. 51. Lanius (Naevius) niger, subtus cinereus, dorso, alis caudaque albo maculatis.

45. OBSCURUS. *Der dunkelfarbige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 170. n. 46. *der dunkelfarbige Würger.*

Latham,

(4) Ist nicht mit der gefleckten Spielart von *Lanius Cayanus*, n. 20. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 81. n. 52. Lanius (Obscurus) nigricans, abdomine superciliisque albis.

46. FUSCUS. *Der braune Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 170. n. 47. *der braune Würger.*

47. RUBER. *Der rothe surinamische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 170. n. 48. *der rothe surinamische Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I p. 78. n. 41. Lanius (Ruber) ruber, alis caudaque ocellatis, apice nigris.

48. AMERICANUS. *Der schwarzköpfige amerikanische Würger?* (5)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 228. n. 44. *der Schwarzkopf.*

49. MINOR. *Der kleine graue Würger.* (6)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 336. n. 2. *der kleine graue Würger.*

(5) *Pennant* und *Latham* rechnen ihn zu *Lanius Ludovicianus.*

(6) Nach *Büffon* eine Spielart von *Lanius Excubitor*, welches jedoch *Bechstein* aus eignen Erfahrungen bestreitet. Länge 9 Zoll. Flügelweite 14 Zoll. Fliegt sanft und schön, und schwimmt leicht wie ein Falk in der Luft. Ist ein Zugvogel. Nährt sich vermuthlich mehrentheils von allerley Käfern, wenigstens hat man ihn nicht so häufig nach den Vögeln stoßen gesehen, als den grossen grauen Würger. Nistet in Gärten auf Obstbäumen. Bauet ein grosses unregelmäßiges Nest, das äusserlich eine Anlage von Wolle und grünen Kräutern hat, die nach der Mitte zu mit Wolle durchwirkt sind; inwendig ist es mit Wolle und grossen und kleinen Federn dicht ausgefuttert. Legt gewöhnlich sechs rundliche, grünlich

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 382. n. 2. *der kleine graue Würger.* p. 387. *der kleine aschgraue Neuntödter, die kleine Bergelster.* Tab. 14.

Pennant, arct. Zool. II. p. 231. B. *der kleinere graue Würger.*

Büffon, Vögel, II. p. 179. *der italienische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 171. n. 50. *der kleine graue Würger.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 71. n. 13. Lanius (Italicus) cauda cuneiformi, apice alba, corpore cinereo, subtus albido, fronte fasciaque oculari nigris, remigibus nigris, macula alba.

Latham, Syn. Suppl. p. 54. Lesser grey Shrike.

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 91. n. 42. *der kleine graue Würger.*

Gerin. ornith. I. p. 72. Tab. 54.

50. Natka. *Der Würger aus Natkasund.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 229. n. 46. *der Würger aus Natkasund.*

Latham, Vögel, I. p. 172. n. 52. *der Nootka.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 80. n. 48. Lanius (Nootka) niger, superciliis, gula, collari tectricibusque alarum maioribus albis, remigibus secundariis rectricibusque quatuor extimis apice albis.

51. Melanocephalos. *Der schwarzköpfige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 150. n. 12. *der schwarzköpfige Würger.* Tab. 7.

Latham,

grünlich weisse violet und braun gefleckte Eyer, die Männchen und Weibchen in 15 bis 16 Tagen wechselsweise ausbrüten.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 76. n. 29. Lanius (Melanocephalos) olivaceus, capite nigro, cauda fascia lata nigra, apice alba.

52. Brachyurus. *Der kurzschwänzige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 150. n. 13. *der kurzgeschwänzte Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 76. n. 32. Lanius (Brachyurus) supra cinereo-griseus, subtus flavescens, fascia oculari nigra, superciliis rectricibusque lateralibus apice albis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 3. n. 5. Lanius *brachyurus*.

53. Phoenicurus. *Der Würger mit rothbraunem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 51. n. 14. *der Würger mit rothbraunem Schwanze.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 71. n. 14. Lanius (Phoenicurus) rufo-griseus, subtus albo-flavescens, cauda elongata uropygioque rufis, fascia per oculos nigricante.

Pallas, Reise, Ausz. III. p. 185. *der kleine rothschwänzige Neuntödter.*

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 4. n. 6. Lanius *phoenicurus*.

16. Doliatus. *Der schwarz und weiße Würger.*

Müller, Natursyst. II. p. 116. n. 16. *der gereifte Neuntödter.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 165. n. 2. *schwarz und weißer Neuntödter.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 657. *der schwarz und weiße Würger.*

Brisson, ornitholog. I. p. 210. n. 21. Pie-grieche rayée de Cayenne.

 Büffon,

Büffon, Vögel, II. p. 198. *der ſurinamiſche ſchwarz und weiße Neuntödter.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 5. *der ſchwarz u. weiße Neuntödter.*

Latham, Vögel, I. p. 169. n. 64. *der bunte cayenniſche Würger.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 80. n. 50. Lanius (Doliatus) cauda rotundata, corpore albo nigroque, confertim ſubfaſciato.

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 92. *der ſchwarz und weiße Fleiſchervogel.*

24. Iocosus. *Der Spaßvogel.* (7)

Müller, Naturſyſt. II. p. 118. n. 24. *der Spottvogel.*

Onomat. hiſt. nat. V. p. 180. Merula Sinenſis criſtata minor.

Briſſon, ornith. I. p. 229. n. 22. Petit merle hupé de la Chine.

Büffon, Vögel, II. p. 250. *der chineſiſche gehäubte Würger.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 317. *die kleine gehaubte Amſel von China;* m. 1 Fig.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 73. n. 22. Lanius (Iocoſus) cauda cuneiformi, capite criſtato, corpore griſeo, palpebra inferiore purpurea, ano ſanguineo.

25. Infaustus. *Der Unglücksvogel.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 119. *der Unglücksvogel.*

Borowſky,

(7) *Latham* rechnet hieher auch die *Sitta Chinenſis*, Linn. S. N. p. 442. n. 8.

(8) Im Syſt. ornithol. hat *Latham* dieſen Vogel unter das Rabengeſchlecht aufgenommen, und den *Corvus Sibiricus*, Linn. S. N. p. 373. n. 36. mit dazu gerechnet. Ueberhaupt muſs ich

Borowſky, Thierreich, II. p. 84. n. 4.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 53. n. 52. *der Unglücksvogel*, *Steinrötel*, *Gertraudsvogel*, *Bergamſel*.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 241. F. *der Unglücksvogel*, *Steinrötel*.
Onomat. hiſt. nat. V. p. 179. *die Bergamſel*.
Klein, av. p. 70. n. 32. Turdus ſ. Merula ſaxatilis.
Klein, Vorbereit. p. 132. n. 32. *Bergamſel*.
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 69. n. 32. *Bergamſel*.
Geſner, Vögelb. p. 448. *Steinrötelein*.
Briſſon, ornith. I. p. 224. n. 13. Merle de Roche.
Büffon, Vögel, II. p. 252. *der Unglücksvogel*.
Latham, Vögel, I. p. 158. n. 27. *der Unglücksvogel*, *die Stein-Amſel*.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 159. n. 22. Corvus (Infauſtus) dorſo cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus cinereis faſcia nigricante, cauda rotundata.
Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſe, II. p. 5. *Steinmerlen?*

O 5 *Pontop-*

ich bemerken, daſs unter den Synonymen *dieſer* Gattung, der dahin gerechneten Varietät, und des *Turdus Saxatilis* p. 833. n. 114. groſse Verwechſelung herrſcht; ſo, daſs die Ornithologen darüber mit ſich ſelbſt oft nicht einig ſind. *Latham* ſetzte in der Synopſ. den *Lanius infauſtus* unter die *Würger*, und nahm, wie in unſerm Syſtem, die Steinamſel als eine Spielart davon an. In dem Syſt. ornithol. ſetzt er, wie ſchon geſagt, den *L. Infauſtus* unter die *Raben*, macht aus der *Steinamſel* eine eigne Gattung unter den *Droſſeln*; zieht *Gmelins Lanius Infauſtus* und *Turdus Saxatilis*, unter ſeinen *Turdus Infauſtus* p. 335. n 32. und rechnet dazu die Synonymen aus *Brünich*, *Olin. Raj. Albin.* und *Büffon*. Einige ſehen auch den *Lanius infauſtus* Linn. als das Weibchen von *Turdus Saxatilis* Linn. XII. p. 294. n. 14. an, u. ſ. w.

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 9. *Unglücksvogel*, *Gertraudsvogel.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 142. *Giertruds-fugl.*

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 288. n. 58. *die Unglücksrabe.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 103. Lanius infaustus.

Tengmalm, neue schwed. Abh. III. p. 112. Lanius infaustus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 107. n. 12. Corvus (Infaustus) dorso cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus cinereis, fascia nigricante.

Linné, Fn. Suec. I. p. 187. Turdus rectricibus rufis, duabus intermediis cinereis, fascia nigricante, proximis apice cinereis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 12. n. 93. Corvus infaustus.

Hermann, tab. affin. animal. p. 179. 200. Lanius infaustus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 218. n. 5. *der Unglücksvogel.*

β. MINOR. *Der kleinere Unglücksvogel.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 534. n. 14. *die Steinmerle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 168. n. 7.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 396. n. 325. *die Steinamsel*, *Steinröthel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 634. *die Steindrossel, oder blauköpfige rothe Amsel.*

Klein, av. p. 67. n. 8. Turdus ruber, cyaneo capite.

Klein, Vorber. p. 126. n. 8. *blaue Drossel*, *blauköpfige rothe Drossel.*

Klein,

(9) S. die vorhergehende Anmerkung.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 67. n. 15. *blauköpfige rothe Droſſel.*

Briſſon, ornithol. I. p. 225. n. 14. petit Merle de roche.

Büffon, Vögel, IX. p. 75. *die Steinamſel.*

Batſch, Thiere, I. p. 342. *die Steinamſel.*

Latham, Vögel, I. p. 159. A, *der kleinere Unglücksvogel*, *die kleinere Steinamſel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 336. n. 33. Turdus (Saxatilis) capite caeruleo, cauda ferruginea.

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 414. n. 69. *Steinmerle.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 94. n. 137. *Steinmerle.*

Naturforſch. XVII. p. 83. n. 169. *Steinmerle.*

Lapeirouſe, neue ſchwed. Abhandl. III. p. 108. Turdus Saxatilis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 163. n. 199. *die Steindroſſel.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. *Stein-Amſel.*

Forſt-Fiſch u. Jagdlexicon, I. p. 88. *Steinamſel.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. XII. I. p. 294. n. 14. Turdus (Saxatilis) capite caeruleo, cauda ferruginea.

Kramer, Auſtr. p. 360. n. 2. Turdus capite caeruleo, cauda ferruginea. *Steinröthl.*

26. Faustus. *Der Glücksvogel.*

Müller, Naturſ. II. p. 119. n. 26. *der Glücksvogel.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 658. *der chineſiſche Würger.*

Büffon, Vögel, II. p. 254. *der Glücksvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 160. n. 28. *der Glücksvogel.*

A. *Ver-*

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 134. n. 5. Lanius Macrourus.	p. 842. n. 2. Colius Senegalensis.

In der XII. Edition hat dies Geschlecht 26 Gattungen; in der XIII. 53. es ist also hier um 27 Gattungen stärker. Da aber die fünfte Gattung aus der XII. Edit. in ein anderes Geschlecht versetzt, und an deren Stelle ein anderer Vogel gesetzt worden, so beläuft sich die Anzahl der neu hinzugekommenen Vögel auf 28. Ueberdem sind bey der 11ten Gattung *drey*, bey der 12ten *fünf*, bey der 13ten *vier*, bey der 20ten *zwey*, und bey der 25ten gleichfalls *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Ein dem Lanius Excubitor ähnlicher Vogel.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 28. n. 40.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Würger mit schwarzer Mütze;* (in Cayenne.)
Latham, Vögel, I. p. 171. n. 51.
Latham, Syn. Suppl. p. 54. Black-capped Shrike.
Latham, Syst. ornitholog I. p. 76. n. 31. Lanius (Pileatus) cristatus cinerescens, capite, iugulo pectoreque nigris, tectricibus alarum albo fasciatis, cauda apice nigra.

2. *Der malabarische Würger.*
Latham, Vögel, I. p. 172. n. 53. Tab. 8.
Latham, Syn. Supplem. p. 56. Malabar Shrike. Tab. 108.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 66. n. 2. Lanius (Malabaricus) caeruleo niger, remigibus caudaque nigris, rectricibus extimis utrinque longissimis denudatis, apice latere exteriore pennatis.

Sonnerat, voy. Ind. II. Tab. III. Gobe-mouche de Malabar.

3. *Der Boulboul*; (in Indien.)

Latham, Vögel, I. p. 173. n. 54.

Latham, Syn. Suppl. p. 57. Boulboul Shrike.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 49. Lanius (Boulboul) niger, pectore abdomineque cinerascentibus, alis fuscis, fasciis duabus albidis.

4. *Der orangefarbne Würger aus Cayenne.*

Latham, Vögel, I. p. 173. n. 54.

Latham, Syn. Suppl. p. 57. Orange Shrike.

Latham, Syst. ornith. I. p. 79. n. 44. Lanius (Aurantius) fulvo flavus, gula pectoreque rufescentibus, capite supra oculos nuchaque nigris, tectricibus alarum, remigibus caudaque fuscis.

5. *Der rothbraune amerikanische Würger mit weißer Kehle.* (10)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 69. n. 9. Lanius (Americanus) rufo-fuscus, subtus flavescens, pileo griseo, remigibus caudaque nigris, gula rectricumque apicibus albis.

Büffon, pl. enl. 397. Pie-grieche de la Louisiane.

✢ ✢ ✢

Latham rechnet das Geschlecht *Lanius* unter die Ordnung *Picae*.

ZWEYTE

(10) Das angeführte Synonym von *Büffon* rechnet *Gmelin* im System p. 296. zu *Lanius Ludovicianus*, n. 6. *Latham* trennt es

ZWEYTE ORDNUNG.

PICAE. *(Spechtartige Vögel.)*

45. GESCHLECHT. PSITTACUS. *Der Papagey, Sittig.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 121. Gen. XLV.
Leske, Naturgeſch. p. 238. Gen. XIV.
Borowsky, Thierreich, II. p. 86. Gen. V.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 163. Gen. V.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 341. Gen. V.
Halle, Vögel, p. 110.
Neuer Schaupl. der Natur, VI. p. 319.
Onomat. hiſt. nat. VI. p. 650.
Klein, av. p. 24. Gen. I.
Briſſon, ornithol. II. p. 93. Gen. LIII.
Büffon, Vögel, XIX. p. tot.
Batſch, Thiere, I. p. 300. Gen. LIII.
Latham, allg. Ueberſ. d. Vögel, I. p. 174. Gen. V.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 82. Gen. V.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 218. Gen. V.
Hermann, tab. affin. anim. p. 181.

* *Langſchwänzige, mit keilförmigem Schwanze.*

1. MACAO. *Der Aras.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 126. n. 1. *weſtindiſcher Rabe.* Tab. 28. fig. 1.
Leſke, Naturgeſch. p. 239. n. 1. *der weſtindiſche Papagey.*

Borowſky,

es davon, macht eine eigne Gattung daraus, läſst *Gmelins L. Americanus* p. 308. n. 48. eingehen, und nimmt *Pennants Black - crowned Shrike* zu ſeinem *Ludovicianus.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 89. n. 2. *der west-indische Rabe, rothe Papagey.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 1, Psittacus (Macao) macrourus ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis; *der Aras, indianische Rabe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 167. *der westindische Papagey.*

Bechstein, Naturg. I. p. 342. n. 1. *der westindische Papagey.*

Funke, Naturgesch. I. p. 334. *der indianische Rabe.*

Ebert, Naturl. II. p. 47. *indianische Raben.* Tab. 23. fig. 2.

Halle, Vögel, p. 113. n. 20. *der flachköpfige Papagey, roth mit blauen Flügelschuppen.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 683. *der rothblaue grosse Papagay.*

Klein, av. p. 24. n. 1. Psittacus alter Aldr. Macaow s. Macao.

Klein, Vorbereit. p. 46. n. 1. *der andre Papagey.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 1. *rother Papagey vom ersten Range mit blauen Flügeln und Schwanz.*

Gesner, Vögelb. p. 466. *Erythrocyanus;* mit 1 Figur.

Brisson, ornith. II. p. 94. n. 1. Ara du Brésil.

Büffon, Vögel, XIX. p. 218. *der große rothe Ara;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 53. *rother Papagey vom ersten Range mit blauen Flügeln und Schwanz.*

Latham, Vögel, I. p. 175. n. 1. *der Aras, der indianische Rabe.*

Latham,

Lathom, Syſt. ornitholog. I. p. 82. n. 1. Pſittacus (Macao) macrourus ruber, remigibus ſupra caeruleis, ſubtus rufis, genis nudis rugoſis.

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 192. n. 42. *weſtindiſcher, indianiſcher Rabe.*

Bankroft, Naturgeſch. v. Guiana, p. 93. *der roth und blaue Mackaw.*

Fermin, Beſchr. von Surinam, II. p. 153. *die erſtere Art.*

Schlözer, Erdbeſchreib. von Amer. p. 684. *der Macaw.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 19. n. 21. *der rothe Papagey von der erſten Größe mit himmelblauen Flügeln und Schwanze.*

Bock: Naturforſch. IX. p. 40. n. 41. *weſtindiſcher Rabe.*

Goeze: Naturf. XIX. p. 80. *weſtindiſcher Rabe.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 18. n. 1. Pſittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis rugoſis.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 96. n. 1. Pſittacus (Macao) macrourus ruber, remigibus ſupra caeruleis, ſubtus rufis, genis nudis rugoſis.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 343. Pſittacus Erythrocianus; *ein rothblauer Papagey, oder Sittich, Papagey von mancherley Farben.*

Barrere, Franc. equinox. p. 145. Pſittacus puniceus.

Du Tertre, hiſt. des Antill. II. p. 247. *Arras.*

Lery, Voy. au Breſil. p. 170. *Arras.*

Rochefort, hiſt. des Antill. p. 154. *Aras.*

Jonſton, av. p. 38. Pſittacus Erythrocyanus Gesneri.

Gerin. ornith. I. p. 93. Tab. 102.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 219. n. 1. *der Aras.*

52. ARA-

52. ARACANGA. *Der Aracanga.* (1)

Halle, Vögel, p. 113. n. 27. *der rothe Papagey mit der Schnabelmaske.*

Klein, av. p. 24. n. 3. Psittacus capite caeruleo.

Klein, Vorbereitung, p. 46. n. 3. *der bunte mit dem himmelblauen Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 3. *Blaukopf vom ersten Range.*

Gesner, Vögelbuch, p. 465. *rothgelber Sittich.*

Brisson, ornitholog. I. p. 95. n. 2. Ara de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XIX. p. 219. 236. *der kleine rothe Ara;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 176. n. 2. *der roth und gelbe Makao.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 83. n. 2. Psittacus (Aracanga) macr. dilute coccineus, scapularibus luteis, viridi terminatis, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis coccineis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 94. *der roth und gelbe Mackaw.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 343. Psittacus Erythroxanthus; *ein geelber Sittich, Sickust der viel geeles auff den Flügeln hat.*

Charleton, exercit. p. 74. n. 15. Psittacus erythroxantus.

Jonston, av. p. 38. Erythroxantus Gesneri.

2. Mi-

(1) Nach *Büffon* u. a. eine Varietät; — nach *Latham* vielleicht ein Junger vom vorigen. Die Synonymen zwischen beyden werden häufig verwechselt.

2. Militaris. *Der große grüne Aras.* (2)

Müller, Naturſyſt. II. p. 127. n. 2. *der grüne Huſar.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 256. *der große grüne Ara des Edwards;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 177. n. 3. *der militäriſche Makao.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 83. n. 3. Pſittacus (Militaris) macr. viridis, alis caeruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis, lineis plumoſis.

Bankroft, Naturg. v. Guiana, p. 95. *der größte Papagay von Guiana, Akushe.*

3. Ararauna. *Der blau und gelbe Aras.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 127. n. 3. *der blaugelbe Rabe.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 342. n. 2. *der Regenbogenpapagay.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 88. n. 1. *der Regenbogenpapagei.*

Halle, Vögel, p. 111. n. 22. *der blau und gelb mondirte Papagey mit langem Schwanze und Knebelbarte.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 664. *der große blaue und gelbe Papagay.*

Klein, av. p. 24. n. 4. Pſittacus vertice viridi, cauda cyanea.

Klein, Vorbereit. p. 46. n. 4. *Papagey mit dem grünen Scheitel, und laſurblauen Schwanze.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 25 n. 4. *Grünmütze mit blauem Schwanze vom erſten Range.*

Briſſon, ornithol. II. p. 96. n. 4. Ara bleu et jaune du Bréſil.

Büffon,

(2) Im Syſtem iſt das Vaterland dieſes Vogels nicht angegeben. *Latham vermuthet* Guiana. Sollte *Bankrofts Akushe* wirklich hieher gehören?

Büffon, Vögel, XIX. p. 298. *der blaue Ara;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 54. *der blaue und gelbe Papagey vom ersten Range.*

Latham, Vögel, I. p. 178. n. 4. *der blau und gelbe Makau.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 83. n. 4. Psittacus (Ararauna) macr. supra caeruleus, subtus luteus, genis nudis, lineis plumosis.

Fermin, Surinam, II. p. 153. *der blaue Aras.*

Bankroft, Guiana, p. 93. *der blau- und gelbe Makaw.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 20. n. 22. *der Papagey mit dem grünen Scheitel und lasurblauem Schwanze.*

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 18. n. 2. Psittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis, lineis plumosis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 96. n. 2. Psittacus (Ararauna) macrourus, subtus caeruleus, genis nudis, lineis plumosis.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 343. Psittacus cyanocroceus; *ein rothgelber Papagey.*

Charleton, exercit. p. 74. n. 1. Psittacus maximus cyanocroceus.

Barrere, fr. equinox. p. 145. Psittacus maximus alter Jonstonii.

Jonston, av. p. 36. Psittacus maximus cyanocroceus.

Gerin. ornith. I. p. 94. Tab. 103.

β. Caeruleus. *Der blaue Aras.* (3)

Klein, av. p. 24. n. 2. Psittacus caeruleo-luteus.

(3) Nach *Klein*, *Brisson* u. a. eine eigne Gattung.

Klein, Vorbereit. p. 46. n. 2. *der Himmelblaue gelblichte.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 2. *Blau und gelber vom ersten Range.*

Brisson, ornithol. II. p. 96. n. 3. Ara bleu et jaune de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XIX. p. 238. *der blau und gelbe Ara von Jamaika.*

Latham, Vögel, I. p. 179. A. *der blaue Makao.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 84. β. Psittacus macr. supra cyaneus, subtus croceus, genis nudis candidis, rectricibus supra cyaneis, subtus croceis.

53. Makawuanna. *Der Makawuanna.*

Latham, Vögel, I. p. 179. n. 5. *der Papagay-Makao.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 84. n. 6. Psittacus (Makavouanna) macr. viridis, genis nudis, subtus rufescens, abdomine virescente, remigibus caeruleis, apicibus extus fuscis.

Büffon, Vögel, XX. p. 78. *der Araparkit;* m. 1 Figur.

54. Ater. *Der schwarze Arat.*

Latham, Vögel, I. p. 180. n. 6. *der schwarze Makao.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 84. n. 7. Psittacus (Ater) macr. nigricans, viridi-splendidissimus, rostro oculisque rubentibus, pedibus flavis.

4. Obscurus. *Der dunkelbraune Papagey.*

Müller, Natursyst. II. p. 128. n. 4. *der braune Papagey.*

Onomat.

Onomat. histor. nat. VI. p. 688. *der braune Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 89. *brauner Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 280. n. 7. *der dunkelbraune Papagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 84. n. 8. Psittacus (Obscurus) macr. fuscus, genis nudis rubris, vertice cinereo - nigricante vario, cauda cinerea.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 3. Psittacus (Obscurus) macrourus viridis, genis nudis, vertice cinereo-nigrescente vario, cauda cinerea.

5. Nobilis. *Der edle Papagey.*

Müller, Natursyst. II. p. 129. n. 5. *der Amazon.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 687. *der edle Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 267. *Linnés grüner Papagey, mit nackten Backen und rothen Schultern.*

Latham, Vögel, I. p. 180. n. 8. *der edle Papagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 85. n. 9. Psittacus (Nobilis) macr. viridis, genis nudis, humeris coccineis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 4. Psittacus (Nobilis) macrourus viridis, genis nudis, humeris coccineis.

6. Severus. *Der Maracana.*

Müller, Natursyst. II. p. 130. n. 6. *der grüne Brasilianische.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 89. n. 3. *der grüne brasilianische Ara.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 694. *der große grüne Brasilianische Papagey.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 162. n. 1. *grüner Papagey mit blauem Scheitel und rothem Schwanze.*

Brisson, ornitholog. II. p. 98. n. 6. Ara verd du Brésil.

Büffon, Vögel, XIX. p. 245. *der grüne Ara;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 10. *der Brasilianische grüne Papagey mit blauer Scheitel und rothem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 181. n. 9. *der Brasilianische grüne Makao.*

Latham, Synops. Suppl. p. 58. Brasilian green Maccaw.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 85. n. 10. Psittacus (Severus) macr. viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque caeruleis, subtus purpurascentibus.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 21. n. 23. *der grüne Papagey mit unten rothen Flügeln und Schwanze.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 5. Psittacus (Severus) macrourus viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque caeruleis, subtus purpurascentibus.

β. *Brisson*, ornitholog. II. p. 99. n. 7. Ara verd et rouge du Bresil. *(eigne Gattung.)*

7. Eupatria. *Der Papagey aus Gingi.*

Müller, Natursystem, II. p. 130. n. 7. *die Edeldame.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 676. *die Edeldame.*

Brisson, ornitholog. II. p. 136. n. 64. Perruche de Gingi.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIX. p. 174. *der große Sittich mit röthlichen Flügeln;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 182. n. 10. *der Papagoy aus Gingi.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 85. n. 11. Psittacus (Eupatria) macr. viridis, subtus flavicans, collo inferiore cinerascente - viridi, tectricibus alarum minoribus macula rubra.

8. Japonicus. *Der japanische Papagey.*

Müller, Natursyst. II. p. 131. n. 8. *Japanische.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 680. *der japanische Papagay.*

Brisson, ornitholog. II. p. 141. n. 71. Perruche du Japon.

Büffon, Vögel, XIX. p. 181. *der grün und rothe Sittich.*

Latham, Vögel, I. p. 182. n. 11. *der japanische Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 86. n. 12. Psittacus (Japonicus) macr. viridis, subtus rectricibusque lateralibus ruber, remigibus caeruleis.

Charleton, exercit. p. 74. n. 11. Psittacus erythrochlorus macrourus.

Jonston, av. p. 38. Psittacus erythrochlorus macrourus.

9. Amboinensis. *Der Papagey aus Amboina.*

Müller, Natursyst. II. p. 131. n. 9. *der Amboinische.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 664. *der Amboinische Papagay.*

Brisson, ornithol. I. p. 146. n. 79. Perruche rouge d' Amboine.

Büffon, Vögel, XIX. p. 128. *der dreyfarbige Sittich-Lori;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 185. n. 12. *der Papagoy aus Amboina.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 86. n. 13. Psittacus (Amboinensis) macr. coccineus, dorso caeruleo, alis macula viridi, rectricibus violaceis.

10. CYANOCEPHALUS. *Der blauköpfige Papagey.*

Müller, Natursyst. II. p. 131. n. 10. *der Blaukopf.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 673. *der Blaukopf.*

Brisson, ornithol. II. p. 140. n. 70. Perruche à tête bleue.

Büffon, Vögel. XIX. p. 143. *der Sittich mit dem blauen Kopfe;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 183. n. 13. *der blauköpfige Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 86. n. 14. Psittacus (Cyanocephalus) macr. viridis, capite gulaque caeruleis.

Gerin. ornith. II. p. 20. Tab. 129.

50. HAEMATOTUS. *Der rothbrüstige Papagey.*

Müller, Natursyst. Supplem. p. 73. n. 6. *b. der Blutpapagey.*

Brisson, ornithol. II. p. 141. n. 72. Perruche variée d'Amboine.

Büffon, Vögel, XIX. p. 158. *der Sittich mit dem blauen Gesichte;* m. 1 Fig.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 163. n. 4. *rothbrüstiger Papagey.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 17. *der rothbrüstige Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 184. n. 14. *der Papagoy mit rother Brust.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 87. n. 17. Psittacus (Haematotus) macr. viridis, pectore rubro, facie caerulea, lunula cervicis flava.

β. Der

β. *Der Papagey mit orangefarbner Brust.*
Latham, Vögel, I. p. 185. n. 14. Var. A. *der Papagey mit orangefarbner Brust.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 87. n. 17. β. Psittacus macr. viridis, pectore rubro flavo vario, capite, gula abdomineque medio caeruleis.

γ. *Der blaubäuchige Papagey.*
Büffon, Vögel, XIX. p. 161. *der blaubäuchige Papagey.*
Latham, Vögel, I. p. 185. n. 14. Var. B. *der Papagey mit blauem Bauche.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 87. n. 17. γ. Ps. macr. viridis, pectore rubro, flavo vario, capite, gula abdomineque toto caeruleis.

δ. *Blue-bellied Parrot.* *Latham*, Syn. Supplem. p. 59. C. *
Latham, Syst. ornithol. I. p. 87. n. 17. δ. Ps. praecedenti similis, pennis scapularibus rubro flavoque maculatis, nuchae margine rubentibus.

55. Atricapillus. *Der schwarzköpfige Papagey.*
Halle, Vögel, p. 121. n. 45. *der blaubunte orientalische Papagai, mit grün- und rothem Halsringe.*
Brisson, ornitholog. II. p. 97. n. 5. Ara varié des Moluques.
Büffon, Vögel, XIX. p. 178. *der große Sittich mit der schwarzen Kopfbinde;* m. 1 Fig.
Klein, Vorber. p. 47. n. 16. *mit dem schwarzen Kopfe und grünen Kragen, Loeri genannt.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 20. *Schwarzkopf mit grünem Halsbande.*

 Latham,

Latham, Vögel, I. p. 185. n. 15. *der schwarzköpfige Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 88. n. 18. Psittacus (Atricapillus) macr. caeruleus, subtus viridis, rubro variegatus, pileo nigro, iugulo pectoreque rubris.

56. Tabuensis. *Der Papagey aus Taboa.*

Latham, Vögel, I. p. 186. n. 16. *der Papagoy aus Taboa;* Tab. 16.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 88. n. 19. Psittacus (Tabuensis) macr. viridis, capite, collo pectoreque subtus purpureo-coccineis, cervice basi lunula caerulea, remigibus rectricibusque caeruleis.

β. Ps. macr. viridis, capite, collo corporeque subtus coccineis, lunula cervicis, uropygioque caeruleis, alis viridibus, cauda fusca. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 88. n. 19. β.

57. Papuensis. *Der Papagey aus Papua.*

Latham, Vögel, I. p. 186. n. 17. *der Lory aus Papua.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 88. n. 20. Psittacus (Papuensis) macr. ruber, alis caudaque viridibus, nucha caerulea, cervice lunulis 2. nigris, tectricibus femorum, maculaque ad basin alarum flavis.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 187. n. 17. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 88. n. 20. β. Psittacus taenia abdominis transversa nigra margine viridi.

γ. *La-*

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 187. n. 17. Var. B.

Latham, Syſtem. ornithol. I. p. 89. γ. Pſittacus coccineus, dorſi parte poſteriore caeruleo-atra, macula inter alas viridi.

δ. *Latham*, Vögel, I. p. 187. n. 17. Var. C.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 89. δ. Pſ. abdominis medio viridi.

11. Borneus. *Der Papagey aus Borneo.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 132. n. 11. *der rothe Parkit.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 666. *der rothe Parkit.*

Briſſon, ornith. II. p. 144. n. 77. Perruche rouge de Borneo.

Büffon, Vögel, XIX. p. 124. *der rothe Sittich-Lori;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 68. *der langgeſchwänzte Scharlach-Lory.*

Latham, Vögel, I. p. 188. n. 18. *der Lory aus Borneo.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 89. n. 21. Pſittacus (Borneus) macr. ruber, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula caerulea, orbitis fuſcis.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 97. n. 6. Pſittacus (Borneus) macrourus, ruber, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula caerulea.

58. Indicus. *Der indianiſche Papagey.*

Briſſon, ornith. II. p. 145. n. 78. Perruche rouge des Indes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 126. *der violet und rothe Sittich-Lori;* m. 1 Fig.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 188. n. 19. *der indianiſche Lory.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 89. n. 22. Pſittacus (Coccineus) macr. coccineus, ſubtus fuſco violaceoque varius, capite et collo ſuperioribus, pectore et taenia pone oculos caeruleo-violaceis, remigibus rectricibusque violaceo-fuſcis.

59. Elegans. *Der prächtige Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 189. n. 20. *der prächtige Papagey.*

Latham, Syſt. ornitholog. p. 89. n. 23. Pſittacus (Elegans) macr. fuſcus, pennis rubro viridique marginatis, capite, collo pectoreque ſubtus coccineis, humeris, remigum rectricumque marginibus caeruleis.

β. *Latham*, Vögel, I p. 189. n. 20. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 90. n. 23. β. Pſitt. viridis, capite, collo pectoreque coccineis.

60. Guebiensis. *Der Papagey von der Inſel Gueby.* (4)

Büffon, Vögel, XIX. p. 118. *der rothe und violette Lori;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 189. n. 21. *der Lory aus Gueby.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 90. n. 24. Pſittacus (Guebienſis) macr. coccineus, pectore, interſcapuliis abdomineque purpureis, hoc ſaturatiore, remigibus nigris faſcia rubra.

61. Jan-

(4) Nach *Latham* gehört auch die folgende Gattung als eine Spielart mit hierher.

61. Janthinus. *Der violette Papagey.* (f)

Latham, Vögel, I. p. 190. n. 21. Var. A. *der violette Lory.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 90. n. 24. β. Psitt. macr. coccineus, pectore abdomineque violaceis, scapularibus caeruleis, alis caudaque viridibus, rubro mixtis.

Fermin, Surinam, II. p. 155. *der violenblaue Papagey.*

62. Variegatus. *Der bunte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 190. n. 22. *der bunte Lory.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 90. n. 25 Psittacus (Variegatus) macr. coccineus, dorso anteriore corporeque subtus purpureo-caeruleis, remigibus intus flavis, cauda viridi.

63. Novae Guineae. *Der Papagey von Neu-Guinea.*

Latham, Vögel, I. p. 191. *der schwarze Lori.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 91. n. 27. Psittacus (Novae Guineae) macr. caeruleo-nigricans nitidus, orbitis nudis fuscis, cauda subtus rubra.

64. Javanicus. *Der Papagey aus Java.*

Brisson, ornitholog. II. p. 146. n. 80. Perruche rouge hupée de Java.

Büffon, Vögel, XIX. p. 163. *der gehaubte Sittich.*

Latham, Vögel, I. p. 192. n. 25. *der javanische Parkit.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 92. n. 29. Psitt. (Bontii) macr. coccineus, gula grisea, alis et scapu-

(f) S. die vorhergehende Anmerkung.

scapularibus viridi variis, rectricibus lateralibus roseis, apice caeruleis.

Bont. ind. orient. p. 63. Psittacus parvus.

65. Jandaya. *Der Jandaya.*

Halle, Vögel, p. 126. n. 59. *das bläulich-gelbe Papagaychen.*

Büffon, Vögel, XX. p. 51. *der Jendaya.*

Brisson, ornithol. II. p. 152. n. 91. petite Perruche jaune du Bresil.

Latham, Vögel, I. p. 193. n. 26. *der Jandaya.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 92. n. 30. Psittacus (Jendaya) macr. viridis, capite, collo abdomineque flavis.

Jonston, av. p. 201. *Jendaya.*

12. Solstitialis. *Der gelbe Papagey aus Angola.*

Müller, Natursystem, II. p. 132. n. 12. *der gelbe Angolische.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 696. *der langschwänzige gelbe Papagay.*

Halle, Vögel, p. 120. n. 43. *der gelbe langschwänzige Papagai.*

Klein, av. p. 25. n. 15. Psittacus croceus, cauda longa, oculis in circulo rubro, extremis remigibus et penna infima caudae caeruleis.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 15. *der Saffrangelbe, mit einem langen Schwanze, rothem Zirkel um die Augen, bey dem die äußersten Ruderfedern, und die unterste Feder am Schwanze himmelblau sind.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 18. *Gelber langgeschwänzter, um die Augen roth, die äußersten Schwingfedern, und die untersten des Schwanzes blau.*

Brisson,

Brisson, ornithol. II. p. 144. n. 76. Perruche jaune d'Angola.

Büffon, Vögel, XIX. p. 148. *der gelbe Sittich;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 193. n. 27. *der gelbe Papagoy aus Angola.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 92. n. 31. Psittacus (Solstitialis) macr. luteus, alarum tectricibus viridibus, orbitis rubris, rectricibus lateralibus extus caeruleis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 7. Psittacus (Solstitialis) macrourus luteus, alarum tectricibus viridibus, cauda forficata.

66. Guarouba. *Der Guiaruba. (Quijubatui.)*

Halle, Vögel, p. 127. n. 63. *das ganz gelbe Papagaichen, mit dunkelgrünen Schwungfedern.*

Büffon, Vögel, XX. p. 71. *der Guaruba, oder der gelbe Parkit;* m. 1 Fig.

Brisson, ornithol. II. p. 14. n. 74. Perruche jaune du Brésil.

Latham, Vögel, I. p. 194. n. 28 *der Guarouba.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 92. n. 32. Psittacus (Luteus) macr. luteus, remigibus maioribus viridibus.

Gerin. ornith. II. p. 18. Tab. 122.

Jonston, av. p. 202. Quiiubatui.

β. Mexicanus. *Der mexicanische Guioruba.*

Halle, Vögel, p. 132. n. 71. *der langschwänzige rothköpfige Mexikanerpapagai.*

Brisson, ornithol. II. p. 143. n. 75. Perruche jaune du Mexique.

Büffon, Vögel, XX. p. 73. *der gelbe Parkit von Mexiko.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 194. n. 28. Var. A. *der mexikanische Guarouba.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 93. n. 32. β. Psittacus macr. luteus, capite rubescente, collo aurantio-rubro, tectricibus alarum viridi rubro et aurantio variegatis, remigibus viridibus.

13. Carolinensis. *Der carolinische Papagey.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 132. n. 13. *der grüne Carolinische.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 231. n. 48. *der carolinische Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 669. *der grüne Papagey aus Carolina.*

Klein, av. p. 25. n. 19. Pf. Carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 19. *der Karoliner.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 23. *Grüner, mit rothem Kopfe und gelbem Halse.*

Brisson, ornithol. II. p. 138. n. 67. Perruche de la Caroline ou des Amazones.

Büffon, Vögel, XX. p. 74. *der Parkit mit gelbem Kopfe;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 22. *der Papagey aus Carolina.*

Latham, Vögel, I. p. 195. n. 29. *der Papagoy aus Carolina.*

Latham, Syn. Supplem. p. 59. Carolina Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 93. n. 33. Psittacus (Carolinensis) macr. viridis, capite, collo genibusque luteis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 22. n. 25. *der grüne Papagey mit gelbem Kopfe, Halse und Schenkeln.*

Fermin,

(6) Nach *Latham* gehört der *Psittacus Ludovicianus* p. 347. n. 126. unsers Systems mit hieher.

Fermin, Surinam, II. p. 156. *die siebente Art.*

Schöpf, Reise durch Nordamerika, II. p. 386. *die kleinen.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 279. n. 2. *der Carolinische Papagey.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 8. Psittacus (Carolinensis) macrourus viridis, capite, collo genisque luteis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 220. n. 2. *der carolinische Papagey.*

14. Alexandri. *Der Alexanderspapagey.*

Müller, Natursyst. II. p. 133. n. 14. *der Kragenpapagey.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 94. n. 14. *der grüngelbe Parkit.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 2. Psittacus (Alexandri) macrourus viridis, collari pectoreque rubro, gula nigra.

Halle, Vögel, p. 124. n. 51. *das grüne Papagaichen der Alten.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 661. *der grüngelbe Papagay mit rothem Halskragen.*

Brisson, ornitholog. II. p. 130. n. 55. Perruche à collier. (7)

Büffon, Vögel, XIX. p. 131. *der große Sittich mit dem lebhaft rothen Halsbande*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 82. obere Fig. *der Papagey mit einem Halsstreif.*

Latham, Vögel, I. p. 200. n. 37. *Alexanders Papagoy.*

Latham,

(7) *Latham* rechnet dies Synonym zur folgenden Varietät β, und die im System angeführten Synonymen aus dem *Mus. Ad. Frid.* und *Amoen. acad.* zur Varietät γ.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 97. n. 46. Psittacus (Alexandri) macr. viridis, collari rubro, gula nigra, macula alarum purpurea.

Hasselquist, Reise nach Paläftina, p. 292. n. 17. Psittacus (Cubicularis) cauda cuneiformi, digito interiore postice truncato.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 23. n. 26. *der grüne Papagey mit rothem Halse und Brust.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 9 Psittacus (Alexandri) macrourus viridis, collari pectoreque rubro, gula nigra.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 343. Psittacus viridis, torque miniaceo; *ein grüngeeler Papagey, mit eim pomerantzenfarben Zirkel vmb den Hals.*

Charleton, exercit. p. 74. n. 10. Psittacus torquatus macrourus antiquorum.

Jonston, av. p. 38. Psittacus torquatus macrourus.

Plin. hist. nat. L. X. c. 41. 42. Psittacus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 220. n. 3. *der Alexanderspapagey.*

β. *Müller*, Natursyst. II. p. 135. *b. ostindianischer grüner Papagey.* (8)

Büffon, Vögel, XIX. p. 165. *der Sittich mit der rosenrothen Halsbinde;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 201. n. 37. Var. A. *Alexanders Papagoy mit rosenrothem Halsbande.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 98. β. Psittacus macr. viridis, gula nigra, collari roseo, cervice caerulescente.

Gerin. ornith. II. p. 18. Tab. 123.

γ. *Bris-*

(8) Nach *Büffon* eine eigne Gattung.

γ. *Brisson*, ornitholog. II. p. 131. n. 56. Perruche à collier des Indes. (9)

Latham, Vögel, I. p. 202. n. 37. Var. B. *Alexanders Papagoy mit purpurfarbnem Halsbande.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 98. γ. Psittacus macr. viridis, gula nigra, vertice caeruleo-viridi, collari purpureo, iugulo pectoreque roseis.

Grim. ornith. II. p. 19. Tab. 124.

δ. *Müller*, Natursyst. II. p. 135. c. *Kragenpapagey von der Insel Bourbon.* (10)

Brisson, ornith. II. p. 132. n. 57. Perruche à collier de l'Isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, XIX. p. 138. *der Sittich mit dem doppelten Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 202. n. 37. Var. C. *Alexanders Papagoy mit doppeltem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 98. δ. Ps. macr. viridis, collari roseo, antice dilatato, gula striga flava, lateribus colli sub mandibula inferiore altera nigra.

ε. *Müller*, Natursyst. II. p. 135. d. *der kleine Blaukopf aus Indien* (1)

Brisson, ornith. II. p. 155. n. 96. Perruche à tête bleue des Indes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 150. *der Sittich mit dem lasurblauen Kopfe;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 82. unt. Fig. *der blauköpfige Papagey.*

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(10) Nach *Brisson* und *Büffon* eine eigne Gattung.

(1) Nach *Brisson*, *Büffon*, und *Latham* eine eigne Gattung. Letzterer nahm ihn aber in der Synops. noch als Spielart an.

Latham, Vögel, I. p. 202. n. 37. Var. D. *Alexanders Papagoy mit azurblauem Kopfe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 86. n. 15. Psittacus (Indicus) macr. viridis, capite gulaque cyaneis, macula in alis lutea, cauda caerulea, subtus lutea.

ζ. *Latham*, Vögel, I. p. 203. n. 37. Var. E. *Alexanders Papagoy aus Java.* (2)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 87. n. 16. Psittacus (Osbeckii) macr. viridis, capite caeruleo flavoque vario, temporibus nigris, gutture pectoreque rubris, macula tectricum flava.

15. PERTINAX. *Der illinesische Papagey.*

Müller, Natursystem, II. p. 135. n. 15. *der Gelbschnabel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 94. n. 15. *der gelbbäckige Parkit.*

Halle, Vögel, p. 125. n. 56. *das blaßgrüne Papagaichen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 232. n. 49. *der illinesische Papagey.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 691. *der ilinoisische Parkit.*

Klein, av. p. 25. n. 20. Psittacus viridis, cauda longa, malis croceis.

Klein, Vorber. p. 48. n. 20. *der grüne mit dem langen Schwanze und saffrangelben Backen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 24. *grüner langgeschwänzter, mit gelbrothen Backen vom dritten Range.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 163. n. 6. *grüner Papegey mit gelben Backen.*

Brisson,

(2) Nach *Latham* eine eigne Gattung, die er aber in der Synops. noch als Spielart annahm.

Brisson, ornitholog. II. p. 138. n. 68. Perruche illinoise.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 21. *grüner Papagey mit gelben Backen.*

Buffon, Vögel, XX. p. 64. *der Apute-Juba.*

Latham, Vögel, I. p. 196. n. 30. *der illinoisische Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 94. n. 34. Psittacus (Pertinax) macr. viridis, subtus flavicans, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 98. n. 10. Psittacus (Pertinax) macrourus viridis, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus.

Jonston, av. p. 200. Tui apute iuba.

67. Leverianus. *Der Papagey mit carmoisinrothem Steiß.*

Latham, Vögel, I. p. 197. n. 31. *der leverianische Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 94. n. 35. Psittacus (Erythropygius) macr. viridis, capite colloque flavis, crisso coccineo, remigibus rectricumque apice caeruleis.

68. Smaragdinus. *D r Smaragdpapagey.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 75. *der Rostbauch.*

Buffon, Vögel, XX. p. 53. *der Smaragd-Parkit;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 197. n. 32. *der Smaragd-Papagoy.*

Latham, Syn. Suppl. p. 60. Emerald Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p 94. n. 36. Psittacus (Smaragdinus) macr. viridis nitens, abdomine postico caudaque ferrugineo-castaneis.

16. Canicularis. *Der roth- und blauköpfige Papagey.*

Müller, Natursf. II. p. 136. n. 16. *der Rothkopf.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 669. *der Rothkopf.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 27. n. 39. *Roth und Blaukopf mit langem Schwanze.*

Brisson, ornith. II. p. 124. n. 61. Perruche du Brésil.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 71. *der roth- und blauköpfigte Parakeet.*

Büffon, Vögel, XX. p. 61. *der Parkit mit der rothen Stirne;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 206. n. 40. *der roth- und blauköpfige Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 94. n. 37. Psittacus (Canicularis) macr. viridis, fronte rubra, occipite remigibusque extimis caeruleis, orbitis fulvis.

Linné, System. Natur. Edit. X. I. p. 98. n. 11. Psittacus (Canicularis) macrourus viridis, fronte rubra, occipite remigibusque extimis caeruleis.

β. Ps. macr. viridis subtus lutescens, fronte fusco-flavescente, vertice remigibusque caeruleis. *

Latham, Vögel, I. p. 217. n. 135. *der Parkit mit röthlicher Stirn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 61. n. 135. Buff-fronted Parrakeet.

Latham, Syst. ornith. I. p. 95. n. 37. β.

Büffon, pl. enl. 838. Perruhe à front jaune.

17. Aeruginosus. *Der braunkehlige Papagey.* (3)

Müller, Natursyst. I. p. 137. n. 17. *Braunkehle.*

Onomat.

(3) Nach *Latham* gehört *Psittacus Plumbeus* p. 326. n. 75. mit hieher.

Onomat. hist. nat. VI. p. 659. *der kleine Papagay mit brauner Kehle.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 27. n. 40. *Braunkehl.*

Brisson, ornithol. II. p. 239. n. 69. Perruche de la Martinique.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 72. *der Parakeet mit der braunen Kehle.*

Büffon, Vögel, XX. p. 42. *der Parkit mit der braunen Kehle;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 207. n. 41. *der Parkit mit brauner Kehle.*

f *Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 95. n. 38. Psittacus (Aeruginosus) macr. viridis, vertice remigibusque primoribus caeruleis, genis colloque inferiore cinerascentibus.

Bankroft, Naturg. v. Guiana, p. 97. *der braunkehlichte Papagoy.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 98. n. 12. Psittacus (Aeruginosus) macr. viridis, vertice remigibusque primoribus caeruleis.

18. Rufirostris. *Der rothschnäblige Papagey.* (Sincialo.)

Müller, Natursyst. II. p. 137. n. 18. *Rothschnabel.*

Halle, Vögel, p. 124. n. 52. *das grüne langschwänzige Papagaichen mit rothem Schnabel und Füßen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 27. n. 38. *grüner Langschwanz.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 70. *der langgeschwänzte grüne Parakeet.*

Büffon, Vögel, XX. p. 58. *der Sincialo;* m. 1 Fig.

Onomat. histor. natur. VI. p. 693. *der Rothschnabel.*

Brisson, ornithol. II. p. 129. n. 54. Perruche.

Latham, Vögel, I. p. 198. n. 33. *der grüne lang-geschwänzte Parkit.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 95. n. 39 Psittacus (Rufirostris) viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice caerulescentibus, orbitis incarnatis.

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 97. *der lang-geschwänzte grüne Papagey.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 98. n. 13. Psittacus (Rufirostris) macr. viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice caerulescentibus.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 343. Psittacus viridis minor; *ein grüner Papagey.*

Jonston, av. p. 38. Psittacus minor macrourus totus viridis.

Gerin. ornith. II. p. 19. Tab. 125.

Aldrov. ornithol. I. p. 678. Psittacus minor macrourus totus viridis, Hispanis Sincialo, Italis Parochino.

β. Gujanensis. *Der weißschnäblige Papagay.* (Ajuru-catinga.) (4)

Müller, Natursyst. II. p. 137. ad n. 18. *Parkite mit weißen Schnäbeln.*

Halle, Vögel, p. 122. n. 26. *der grüne lang-geschwänzte Papagai, mit rothem Augenkreise.*

Brisson, ornithol. II. p. 132. n. 58. Perruche de la Guadaloupe.

Latham, Vögel, I. p. 138. n. 33. Var. A. *der gujanische Parkit.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 96. n. 39. β. Ps. macr. viridis, rostro pedibusque candidis.

Bankroft,

(4) Nach *Brisson* u. a. eine eigne Gattung. Nach *Büffon* eine Spielart von *Psittacus Agilis*; p. 330. n. 20.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 96. *der grüne Papagay von Guiana.*
Jonston, av. p. 202. Aiurucatinga.
Jonston, av. p. 202. Aiuruapara.

19. Ornatus. *Der Paradiespapagey.*

Müller, Natursystem, II. p. 137. n. 19. *Paradiesparkit.*
Leske, Naturgesch. p. 239. n. 2. *der Paradiesparkit.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 94. n. 16. *der Paradiesparkit.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 343. n. 3. *der Paradiesparkit.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 688. *der langschwänzige Paradies Parkit.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 27. n. 37. *Papagey mit rother Kehle und blauer Scheitel, sonst grün und gelbbunt.*
Brisson, ornithol. II. p. 142. n. 73. Perruche variée des Indes.
Büffon, Vögel, XIX. p. 145. *der Lori Sittich.*
Seligmann, Vögel, VI. Tab. 69. *der Lory-Parakeet.*
Latham, Vögel, I. p. 191. n. 24. *der Papagoy-Lory.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 91. n. 28. Psittacus (Ornatus) macr. luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice cruribusque caeruleis, orbitis cinereis.
Bankroft, Guiana, p. 97. *der Lory-Papagoy.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 98. n. 14. Psittacus (Ornatus) macr. luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice auribusque caeruleis.

Hermann, tab. affin. animal. p. 182. Psittacus ornatus.

69. Jaguilma. *Der Jaguilma.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 96. n. 40. Psittacus (Jaguilma) macr. viridis, remigibus apice fuscis, orbitis fulvis.

70. Gujanensis. *Der Pavouane.*

Brisson, ornithol. II. p. 133. n. 59. Perruche de la Guiane.

Büffon, Vögel, XX. p. 39. *der Pavuane;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 199. n. 34. *der Pavouane.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 96. n. 41. Psittacus (Guianensis) macr. viridis, genis rubro-maculatis, tectricibus alarum minoribus inferioribus coccineis, maioribus luteis, armillis rubris.

71. Marginatus. *Der Papagey mit blauem Wirbel von der Insel Luçon.*

Latham, Vögel, I. p. 199. n. 35. *der Papagoy von der Insel Luçon.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 96. n. 42. Psittacus (Marginatus) macr. viridis, vertice caeruleo, tectricibus alarum nigro, fusco-flavo, caeruleoque variegatis.

72. Sonnerati. *Der Papagey mit blauem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 200. n. 36. *der Papagoy mit dem blauen Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 98. n. 47. Psittacus (Sonneratii) macr. viridis, capite, collo abdomineque griseo-viridibus, torque caeruleo, basi alarum macula rubra.

73. Pon-

73. PONDICERIANUS. *Der Papagey von Pondichery.*

Müller, Naturſyſt. Supplem. p. 74. n. 6. *f. der Weiſskopf.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 155. *der Sittich mit Knebelbärten;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 203. n. 38. *der Parkit aus Pondiſchery.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 99. n. 48. Pſittacus (Pondicerianus) macr. viridis, capite antrorſum caeruleo alboque vario, myſtacibus nigris, pectore purpuraſcente, tectricibus alarum flavo notatis.

β. *Büffon*, Vögel, XIX. p. 157. *eine Abänderung des bartigen Sittichs.*

Latham, Vögel, I. p. 203. n. 38. Var. A. *der Bart-Parkit.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 99. n. 48. β. Pſittacus macr. viridis, roſtrum inter et oculos caſtaneus, medio linea nigra, myſtacibus nigris, nucha purpuraſcente, remigibus extus caeruleis.

74. ERYTHROCEPHALUS. *Der rothköpfige Papagey aus Gingi.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 74. n. 6. *d. der Purpurkopf.*

Briſſon, ornith. II. p. 136. n. 65. Perruche à tête rouge de Gingi.

Büffon, Vögel, XIX. p. 141. *der Sittich mit dem rothen Kopf;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 204. n. 39. *der rothköpfige Parkit aus Gingi.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 99. n. 50. Pſittacus (Ginginianus) macr. viridi-flavicans, capite caeru-

caeruleo-purpurascente, gula nigra, torque nigro et pallide viridi, macula alarum obscure rubra.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 132.

β. *Halle*, Vögel, p. 130. n. 68. *das kleine Bengalerpapagaichen, mit schwarzem Halsbande und langem zertheilten Schwanze.* (5)

Klein, av. p. 25. n. 25. Psittacus sub mento niger, capite rubro, cervice purpurea, inferiore mandibula nigra, superiore crocea, pedibus caeruleis.

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 25. *der Papagey von Bengala.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 29. *Schwarzbart mit rothem Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 163. n. 5. *rosenköpfiger Ringpapegey.*

Brisson, ornitholog. I. p. 187. n. 66. Perruche de Bengale.

Büffon, Vögel, XIX. p. 169. *der kleine Sittig mit dem rosenrothen Kopfe und den langen Schwanzfedern;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 18. *der rosenköpfige Ringpapagey. (Fridytutah.)*

Latham, Vögel, I. p. 204. n. 39. Var. A. *der rothköpfige Parkit aus Bengalen.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 100. β. Psittacus macr. viridi-flavicans, capite genisque roseis, occipite caeruleo, linea faucium gulaque nigris, macula alarum obscure rubra.

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 205. n. 39. Var. B. *der rothköpfige Parkit aus Borneo.*

Latham,

(5) Nach *Brisson*, *Büffon* u. a. eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 100. γ. Psittacus macr. viridis, capite caeruleo purpurascente, sincipite viridi, linea frontali fasciaque maxillari oblique nigris, collo subtus pectoreque castaneo-nigris.

δ. *Büffon*, Vögel, XIX. p. 172. *der große Sittich mit den langen Schwanzspitzen;* m. 1 Fig. (6)
Latham, Vögel, I. p. 205. n. 39. Var. C. *der rothköpfige Parkit aus Malakka.*
Latham, Syn. Suppl. p. 60. Malacca Parakeet.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 100. δ. Ps. macr. viridi-flavicans, orbitis nuchaque roseis, tectricibus alarum medio caeruleo-viridibus.

75. Plumbeus. *Der Papagey mit bleyfarbenem Schnabel und Füßen.* (7)
Latham, Vögel, I. p. 207. n. 41. Var. A. *der Parkit mit brauner Stirn.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 95. n. 38. β. Psittacus macr. viridis, vertice caerulescente, fronte, genis gulaque fuscescentibus.

76. Olivaceus. *Der olivenfarbene Papagey.*
Büffon, Vögel, XIX. p. 163. *der Sittich mit den verbrämten Flügeln;* m. 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 208. n. 42. *der olivenbraune Parkit.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 97. n. 43. Psittacus (Olivaceus) macr. fusco-olivaceus, occipitis macula caerulescente, alis caeruleo-viridi et aurantio variegatis.
Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 130.

77. Vi-

(6) Nach *Büffon* eine eigne Gattung.

(7) Nach *Latham* eine Varietät von *Psitt. Aeruginosus*, p. 223. n. 17.

77. Virescens. *Der gelbflüglichte Papagey.*

Brisson, ornithol. II. p. 133. n. 60. Perruche de Cayenne.

Büffon, Vögel, XX. p. 46. *der Parkit mit den bunten Flügeln;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 208. n. 43. *der Parkit mit gelben Flügeln.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 100. n. 51. Psittacus (Virescens) macr. virescens, remigibus intermediis candidis, oris flavescentibus, rectricibus intus flavicante marginatis.

78. Versicolor. *Der vielfarbige Papagey.*

Büffon, Vögel, XX. p. 44. *der Parkit mit der bunten Kehle;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 209. n. 44. *der vielfarbige Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 101. n. 52. Psittacus (Versicolor) macr. viridis, capite corporeque subtus fuscis, pennis iuguli auroreo-, abdominis caeruleo-rubro undatis.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 158. *die zwote Art der Zwergpapageyen.*

79. Incarnatus. *Der rothflüglichte Papagey.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 163. n. 9 *kleiner rothflüglichter Papagey.*

Brisson, ornithol. II. p. 135. n. 63. Perruche des Indes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 176. *der Sittig mit der rothen Kehle;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 24. *der kleine Papagey mit rothen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. p. 210. n. 46. *der Parkit mit rothen Flügeln.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 101. n. 54. Psittacus (Incarnatus) macr. viridis, gula coccinea, tectricibus alarum rubris, rostro pedibusque incarnatis.

80. Murinus. *Der graubrüstige Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 153. *der Maus-Sittich*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 210. n. 47. *der Parkit mit grauer Brust.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 101. n. 55. Psittacus (Murinus) olivaceus, facie, gula et pectore argenteo-griseis, remigibus viridibus.

81. Cornutus. *Der gehörnte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 210. n. 48. *der gehörnte Papagey.* Tab. 10.

Latham, Syst. ornitholog. I p. 102. n. 56. Psittacus (Bisetis) macr. viridi-flavescens, capite coccineo, pennis duabus elongatis, torque et uropygio flavescentibus, rectricibus remigibusque exterioribus extus caeruleis.

82. Caledonicus. *Der neucaledonische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 211. n. 49. *der Neu-Kaledonische Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 102. n. 57. Psittacus (Caledonicus) macr. viridi-flavescens, capite laevi, capistro supra coccineo, subtus caeruleo, rectricibus remigibusque exterioribus extus caeruleis.

83. Novae seelandiae. *Der neuseeländische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 211. n. 50. *der Neu-Seeländische Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I p. 102. n. 58. Psitt. (Zealandicus) macr. fusco-viridis, capistro purpureo-nigro, vertice viridi-castaneo, striga per oculos, uropygioque coccineis.

84. Novae hollandiae. *Der neuholländische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 212. n. 51. *der Neu-Holländische Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 102. n. 59. Psittacus (Novae-Hollandiae) macr. fusco-olivaceus, capite e pennis senis cristato luteo, pone oculos macula coccinea, fascia alarum alba.

85. Ulietanus. *Der Papagey aus Ulietea.*

Latham, Vögel, I. p. 212. n. 52. *der Papagoy aus Ulietea.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 103. n. 61. Psittacus (Ulietanus) macr. capite fusco, uropygio obscure coccineo, corpore viridi-olivaceo, marginibus pennarum, remigibus rectricibusque nigricantibus.

86. Multicolor. *Der Papagey mit weißem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 213. n. 53. *der Papagey mit weißem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 103. n. 62. Psittacus (Semicollaris) macr. viridis, capite, gula abdomineque caeruleis, cervice lunula alba, pectore supra rubro, subtus luteo, femoribus luteo caeruleoque variis.

87. Aureus. *Der Goldpapagey.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 163. n. 7. *goldgekrönter Papagey.*

Brisson,

Brisson, ornitholog. II. p. 134. n. 62. Perruche à front rouge du Brésil.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 22. *goldgekrönter Papagey.*

Buffon, Vögel, XX. p. 68. *der mit Gold gekrönte Parkit;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 213. n. 54. *der Gold-Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 103. n. 68. Psittacus (Brasiliensis) macr. viridis, vertice aurantio, iugulo flavo - rubescente, fascia alarum remigibusque extus caeruleis.

Gerin. ornith. I. p. 19. Tab. 126.

48. Lineatus. *Der gestreifte Papagey.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 73. n. 6. *a. der linirte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 214. n 55. *der gestreifte Papagay.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 64. Psittacus (Lineatus) macr. viridis, remigibus supra fuscis, margine interiore pallidis.

88. Pacificus. *Der Papagey vom stillen Ocean.*

Latham, Vögel, I. p. 214. n. 56. *der Parkit vom stillen Ocean.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104 n. 65. Psittacus (Pacificus) macr. viridis, fronte, temporibus uropygioque lateribus rubris.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 214. n. 56. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 65. β. Psitt. macr. viridis, fronte coccineo, remigibus caeruleis.

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 215. n. 56. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 65. γ. Psittacus macr. viridis, fronte, temporibus uropygioque toto rubris.

δ. *Latham*, Vögel, I. p. 215. n. 56. Var. C.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 65. δ. Psittacus macr. viridis, fronte rubro, vertice flavo.

ε. Psittacus macr. viridis, sincipite macula suboculari et hypochondriis coccineis. *
Latham, Syst. ornithol. I. p. 105. n. 65. ε.
Mus. Carls. fascic. II. Tab. 28. Psitt. novae Zeelandiae.

89. Palmarum. *Der Palmenpapagey.*
Latham, Vögel, I. p. 215. n. 57. *der Palm-Papagoy.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 105. n. 68. Psittacus (Palmarum) submacr. viridis, rostro pedibusque rubentibus, rectricibus 3. exterioribus utrinque margine apiceque flavis.

90. Australis. *Der Papagey mit blauem Federbusche.*
Latham, Vögel, I. p. 215. n. 58. *der Parkit mit blauem Federbusche.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 105. n. 69. Psittacus (Pipilans) submacr. viridis subcristatus, vertice pallide caeruleo, collo subtus et abdomine medio coccineis, abdomine imo femoribusque extus sapphirinis.

91. Taitianus. *Der Arimanon.*
Büffon, Vögel, XIX. p. 213. *der Arimanon;* m. 1 Fig.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 216. n. 59. *der blaue otaheitiſche Parkit.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 105. n. 70. Pſittacus (Taitianus) ſubmacr. ſapphirinus, capite pennis elongatis, gula iuguloque albis, roſtro pedibusque rubris.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 182. Pſittacus Arimanon.

β. Pſ. ſubmacr. cyaneus, corpore toto ſaturate et ſplendide caeruleo. *Latham*, Syſt. ornithol. I. p. 105. n. 170. β.

Muſ. Carlſ. faſc. II. Tab. 27. Pſittacus Cyaneus.

92. Pygmaeus. *Der Zwergpapagey.*

Latham, Vögel, I. p. 217. n. 60. *der Zwerg-Parkit.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 106. n. 72. Pſittacus (Pygmaeus) ſubmacr. viridis, pennarum apice ex vireſcente-flavo, remigibus intus obſcuris.

20. Agilis. *Der Krik.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 138. n. 20. *cayenniſcher Parkit.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 92. n. 10. *der kleine grüne Papagay.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 661. *der Cajenniſche Parkit.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 26. n. 31. *Grüner mit blau, roth und gelbbunt.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 109. n. 23. Perroquet de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIX. p. 305. *der Krik;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 63. *der kleine grüne Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 249. n. 101. *der grüne Papagoy von Cayenne.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 106. n. 73. Pfittacus (Agilis) fubmacr. viridis, tectricibus remigum primorum caerulefcenti-fulvis, cauda fubtus rubra, orbitis cinereis.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 99. n. 15. Pfittacus (Agilis) fubmacrourus viridis, tectricibus remigum primorum caerulefcentium fulvis, cauda fubtus rubra.

Barrere, Fr. equinox. p. 144. Pfittacus maior vulgaris prafinus?

** *Kurzfchwänzige mit gleichen Schwänzen.*

21. Coronatus. *Der guianifche Kakadu.*

Müller, Naturfyft. II. p. 139. n. 21. *der Haubenpapagey.*

Onomat. hiftor. natur. VI. p. 671. *der Hauben-Papagay.*

Latham, Vögel, I. p. 221. n. 65. *der Kronen-Kakatoo.*

Latham, Syft. ornith. I. p. 106. n. 74. Pfittacus (Coronatus) brach. viridis, crifta plicatili rubra apice caerulea.

Bankroft, Naturgefch. von Guiana, p. 96. *der guianifche Cackatu.*

93. Aterrimus. *Der ganz fchwarze Kakadu.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 54. n. 5. *der fchwarze Kakatu.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 6. *der große fchwarze Kakatua.*

Latham, Vögel, I. p. 221. n. 66. *der fchwarze Kakatoo.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. n. 75. Psittacus (Gigas) brach. niger, crista occipitis dilutiore elongata, genis nudis rubris.

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. p. 144. n. 22. posit. ult.

94. SULPHUREUS. *Der weiße Kakadu mit schwefelgelbem Federbusch.*

Klein, av. p. 25. n. 5. Kakatoeha alba, Cakatoon, plumis croceis in capite.

Klein, Vorbereitung, p. 46. n. 5. *der weiße Kakatöha.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 6. *weißer Kakatoeha mit gelbem Busche.*

Brisson, ornitholog. II. p. 100. n. 9. Kakatoes à hupe jaune.

Büffon, Vögel, XIX. p. 41. *der Kakatu mit der gelben Haube;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 7. *der kleine weiße Kakatua mit einem gelben Federbusche.*

Latham, Vögel, I. p. 220. n. 64. *der kleine weisse Kakatoo.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 109. n. 81. Psittacus (Sulphureus) albus crista plicatili acuminata et macula infra oculos sulphureis.

Frisch, Vögel, IV. Tab. 50. *großer weißer Papagey oder Cacadou?*

Seb. thes. I. p. 94. Tab. 59. fig. 1. Avis Kakatoeha orientalis, ex insulis Moluccis, cristata, candidissima et sulphurea?

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 117.

95. PHILIPPINARUM. *Der weiße Kakadu mit rothem Steiß.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 77. n. 51. Psittacus haematuropygius; *rother Kakadu.*

Brisson, ornitholog. II. p. 102. n. 11. petit Kakatoes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 50. *der kleine Kakatu mit dem fleischfarbenen Schnabel;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 220. n. 63. *der Kakatoo mit rothem Steiß.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 108. n. 79. Psittacus (Philippinarum) albus, crista sulphurea plicatili, apice alba, orbitis flavicante-rubris, tectricibus caudae inferioribus rubris, albo punctatis.

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 119.

96. Moluccensis. *Der Kakadu mit rothem Federbusche.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 90. n. 4. *der große weiße Kakatu.* Tab. 4. B.

Halle, Vögel, p. 112. n. 23. *der weiße gehaubte Papagey mit rothem Federbusche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 5. *weißer Kakatoeha mit ponzofarbenem Busche vom ersten Range.*

Brisson, ornitholog. II. p. 101. n. 10. Kakatoes à hupe rouge.

Büffon, Vögel, XIX. p. 45. *der Kakatu mit der rothen Haube;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 55. *der größere Kakatoeha.*

Latham, Vögel, I. p. 219. n. 62. *der Kakatoo mit rothem Federbusche.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 108. n. 78. Psittacus (Rosaceus) rosaceo-albus, crista plicatili subtus rubra, rectricibus lateralibus intus a basi ad medium usque sulphureis.

Barche-

Barchewitz, ostind. Reisebeschreib. p. 147. und p. 604.
Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 118.

22. CRISTATUS. *Der gemeine Kakadu.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 139. n. 22. *Kakadu.*
Leske, Naturgesch. p. 239. n. 3. *der Kakatu.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 3. Psittacus (Cristatus) brachyurus, crista plicatili flava.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 343. n. 1. *der weiße Kakatu.*
Funke, Naturgesch. I. p. 334. *der Kakadu.*
Halle, Vögel, p. 115. n. 31. *der weiße mit rothgelbem Federbusche.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 672. *der Kakatu.*
Klein, av. p. 24. n. 6. Kakatoeha tota alba.
Klein, Vorbereit. p. 46. n. 6. *der ganz weiße Kakatoeha.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 7. *ganz weißer Kakatoeha.*
Brisson, ornithol. II. p. 99. n. 8. Kakatoes.
Büffon, Vögel, XIX. p. 39. *der Kakatu mit der weißen Haube;* m. 1 Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 302. *der große Kakatu.*
Latham, Vögel, I. p. 219. n. 61. *der große weiße Kakatoo, der gemeine Kakatoo.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 108. n. 77. Psittacus (Cristatus) albus, crista plicatili flava.
Frisch, Vögel, IV. Tab. 50. *großer weißer Papagey oder Cacadou.*
Mannichfalt. IV. p. 411. *der große Kakatu oder Kakatoeha;* m. 1 Fig.

 Linné,

(8) Unter den Synonymen dieser und der 94. Gattung, p. 330. herrscht große Verwechselung.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 99. n. 16. Psittacus (Cristatus) brachyurus albus, crista dependente flava. (*Mit Psittacus Sulphureus verwechselt.*)

Kramer, Austr. p. 333. n. 6. Psittacus albus, rostro nigro, capite cristato, crista plicatili lutea; *indianischer Wiedhopf.*

Charleton, exercit. p. 74. n. 3. Psittacus albus cristatus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 183. Ps. Cristatus.

Jonston, av. p. 36. Psittacus albus cristatus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 220. n. 4. *der Kakadu.*

23. Erythroleucus. *Der roth und weiße Papagoy.*

Müller, Natursystem, II. p. 140. n. 23. *der Rothschwanz.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 90. n. 5. *der rothschwänzige Kakatu.*

Halle, Vögel, p. 112. n. 24. *der weiße ungehaubte Papagai.*

Brisson, ornithol. II. p. 102. n. 12. Kakatoes à ailes et queue rouges.

Büffon, Vögel, XIX. p. 51. *der Kakatu mit rothen Flügeln und rothem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 222. n. 67. *der roth und weiße Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 109. n. 82. Psittacus (Erythroleucus) cinereus, uropygio, remigibus rectricibusque coccineis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 99. n. 19. Psittacus (Erythroleucus) brachyurus cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis.

Jonston, av. p. 38. Psittacus erythroleucos.

24. Eri-

24. Erithacus. *Der Jaco.*

Müller, Natursyst. II. p. 140. n. 24. *Guineischer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 4. Psittacus (Erithacus) brachyurus canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 344. n. 2. *der guineische Papagey.*

Halle, Vögel, p. 116. n. 32. *der aschfarbne Papagai, mit rothem Schwanze.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 675. *der guineische aschgraue Papagay.*

Klein, av. p. 25. n. 13. Psittacus cinereus cauda rubra.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 13. *der Aschgraue mit dem rothen Schwanze.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 26. n. 19. *grauer mit rothem Schwanze.*

Brisson, ornitholog. II. p. 126. n. 49. Perroquet cendré de Guinée.

Büffon, Vögel, XIX. p. 58. *der Jaco oder aschfarbne Papagey;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 323. n. 68. *der gemeine aschgraue Papagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 109. n. 83. Psittacus (Erithacus) canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 25. n. 30. *der aschgraue Papagey mit rothem Schwanze.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 99. n. 20. Psittacus (Erithacus) brachyurus canus, temporibus albis, cauda coccinea.

Kramer, Austr. p. 332. n. 2. Psittacus cinereus, cauda cuneiformi phoenicea; *grauer Paperl.*

Charleton, exercit. p. 74. n. 8. Psittacus cinereus.

Jonston, av. p. 32. Psittacus cinereus.

Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 112.
Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 227. n. 5. *der Jaco.*

β. *Der aschgraue Papagey mit rothen Flügeln.*

Brisson, ornithol. II. p. 127. A. Perroquet de Guinée à ailes rouges.
Büffon, Vögel, XIX. p. 75. *der guineische Papagey mit rothen Flügeln.*
Latham, Syn. I. p. 262. n. 68. A. Red-winged ashcoloured Parrot.
Latham, Vögel, I. p. 223. n. 68. Var. A. *der aschgraue Papagoy mit rothen Flügeln.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 110. β. Ps. guineensis alis rubris.

γ. *Der rothbunte Papagey.*

Brisson, ornitholog. II. p. 127. B. Perroquet de Guinée varié de rouge.
Büffon, Vögel, XIX. p. 75. *der guineische rothgeschäckte Papagay.*
Seligmann, Vögel, VI. Tab. 58. *der aschfarbne und rothe Papagey.*
Latham, Vögel, I. p. 223. n. 68. Var. B. *der roth- und aschgraue Papagoy.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 110. γ. Psittacus guineensis, rubro varius.
Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 113.

δ. *Der roth und weiße Papagey, mit rothem Schwanze und aschfarbenem Kopfe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 32. *Aschfarbner und rothbunt mit weißen Backen.*
Büffon, Vögel, XIX. p. 75. not. *.
Latham, Vögel, I. p. 224. n. 68. Var. C.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 110. δ. Psittacus capite cinereo, genis nudis, remigibus primariis ex cinereo fuscis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 26. n. 31. *der rothe Papagey mit aschfarbenem Kopfe.*

97. CINEREUS. *Der Marakana.*

Brisson, ornitholog. II. p. 127. n. 50. Perroquet cendré du Brésil.

Büffon, Vögel, XX. p. 29. *grauer Papagai.*

Latham, Vögel, I. p. 224. n. 69. *der brasilianische aschgraue Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 110. n. 84. Psittacus (Cinereus) corpore toto ex caerulescente cinereo.

Jonston, av. p. 202. Maracana Brasiliensibus *(prima)*.

98. MERIDIONALIS. *Der mittägliche Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 225. n. 70. *der mittägliche Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 110. n. 85. Psitt. (Nestor) fuscus, capite incano, collo inferiore castaneo, uropygio crissoque castaneo-rubris.

49. MASCARINUS. *Der Maskarin.* (9)

Müller, Natursyst. Supplem. p. 76. n. 49. *der Maskarin.*

Brisson, ornitholog. II. p. 128. n. 52. Perroquet Mascarin.

Büffon, Vögel, XIX. p. 87. *der Maskarin;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 225. n. 72. *der Maskarin.*

Latham,

(9) Soll, nach *Brisson*, der *P. Obscurus* Linn. seyn.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 111. n. 87. Psittacus (Mascarinus) fuscus, facie nigra, cauda albente.

99. Fuscus. *Der braune Papagey.*(10)

Brisson, ornith. II. p. 128. n. 51. Perroquet brun.

Büffon, Vögel, XIX. p. 88. *Brissons brauner Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 226. n. 73. *der braune Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 111. n. 88. Psittacus (Fuscus) totus cinereo-fuscus.

25. Garrulus. *Der Lory von Ceram.*(1)

Müller, Natursystem, II. p. 141. n. 25. *der Plauderer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 91. n. 6. *der Aurorapapagei.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 344. n. 3. *der Plauderer.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 678. *der Plauderer, Auror-Parkit.*

Klein, av. p. 25. n. 8. Psittacus Rufus femoribus alisque viridibus.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 8. *der Feuerrothe mit grünen Schenkeln und Flügeln.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 12. *ganz rother Papagey mit grünen Flügeln und Schenkeln.*

Brisson, ornitholog. II. p. 103. n. 13. Lory de Ceram.

Halle,

(10) Nach *Büffon* eine Spielart von *Psittacus Mascarinus.*

(1) Unter den zu dieser Gattung und denen Varietäten gehörigen Synonymen herrscht grosse Verwechselung. *Büffon* betrachtet auch den *Lory von Ceram* nicht als die Hauptgattung, sondern als Spielart von *Lory Noira.*

Halle, Vögel, p. 118. n. 37. *der rothe Papagai mit grünen Flügeln und Dickbein.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 104. *Lori von Ceram.*

Latham, Vögel, I. p. 228. n. 76. *der Lory von Ceram.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 113. n. 96. Psittacus (Garrulus) coccineus, orbitis cinereis, genis alisque viridibus, rectricibus medietate postica caeruleis.

Linné, Westgoth. Reis. p. 159. Psittacus Garrulus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 18. n. 3. Psitt. ruber, alis viridibus, remigibus rectricibusque introrsum purpureis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 21. Psitt. (Garrulus) brachyurus ruber, genis alisque viridibus, rectricibus medietate postica caeruleis.

β. Aurorae. *Der Aurora-Parkit.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 141. n. 25. *Aurorparkit.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 91. n. 7. *der Plauderer.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 104. *Spielart des Noira;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 229. n. 76. Var. A. *der Noira-Lory.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 113. β. Psittacus coccineus, alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis, medietate postica virescentibus.

γ. Moluccensis. *Der Lory-Noira.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 141. n. 25. *der Moluccische Laurey, Lory oder Lorry.*

Klein,

(2) Nach der Büffonschen Uebersetzung soll *Frischens ganz rother Papagay* Tab. 45. hieher gehören. Nach *Gmelin* und *Latham* ist es der *Lory von Ceram.*

(3) Nach *Brisson* u. *Klein* eine eigne Gattung.

Klein, verb. Vögelhist. p. 27. n. 36. *Scharlatvogel.*

Brisson, ornithol. II. p. 103. n. 14. Lory des Moluques.

Büffon, Vögel, XIX. p. 101. *der Lori-Noira*; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 67. *der Scharlach-Lory.*

Latham, Vögel, I. p. 229. n. 76. Var. B. *der scharlachrothe Lory.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 114. γ. Psittacus coccin. macula interscapulari tectricibusque alarum minoribus luteis, rectricibus lateralibus basi caeruleis.

Clus. exot. p. 364. Noyra.

Gerin. ornith. I. p. 94. Tab. 106.

δ. *Latham*, Vögel, I. p. 230. *eine Spielart, bey der viele von den Deckfedern der Flügel blaue Spitzen haben.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 124. δ. Psittacus tectricibus alarum plurimis caeruleo punctatis.

26. Domicella. *Der Lory mit purpurfarbener Kappe.*

Müller, Natursyst. II. p. 142. n. 26. *die Jungfer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 92. n. 8. *der Lory mit der schwarzen Kappe.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 674. *der Lory mit der schwarzen Kappe.*

Klein, av. p. 24. n. 7. Ps. rufus, vertice nigro, alis viridibus, femoribus caeruleis.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 7. *der Feuerrothe, mit einem schwarzen Wirbel, grünen Flügeln und himmelblauen Schenkeln.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 8. *Rother Papagey mit schwarzer Platte, grünen Flügeln*

geln und blauen Schenkeln vom ersten Range.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 10. *Roth mit blauer Brust, Bauch, Schwanz und Nacken, schwarzer Platte und grünen Flügeln.*

Brisson, ornithol. II. p. 104. n. 15. Lory des Indes orientales.

Büffon, Vögel, XIX. p. 107. *der Lory mit dem Halsbande*; m. 2 Figg.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 66. *der zweyte Lory mit schwarzer Kappe.*

Latham, Vögel, I. p. 230. n. 77. *der Lory mit purpurfarbner Mütze.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 184. n. 97. Psittacus (Domicella) ruber, pileo violaceo, alis viridibus, humeris genisque caeruleis, orbitis fuscis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 23. Psittacus (Domicella) brachyurus ruber, pileo fusco, alis viridibus, humeris genisque caeruleis.

Gerin. ornith. II. p. 94. Tab. 104.

β. *Der Lory mit blauer Kappe.* (4)

Halle, Vögel, p. 112. n. 25. *der Brasilische Papagai, rosenfarben mit gelbem Halsringe.* Fig. 5.

Klein, av. p. 25. n. 17. Ps. capite cyaneo, collari luteo.

Klein, Vorber. p. 47. n. 17. *mit dem lasurblauen Kopfe und bleichgelben Kragen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 21. *Blaukopf mit gelbem Halsbande.*

Brisson, ornithol. II. p. 106. n. 18. Lory à collier des Indes.

Büffon,

(4) Nach *Brisson*, u. a. eine eigene Gattung.

Büffon, Vögel, XIX. p. 109. *ostindischer Lori mit dem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 230. n. 77. Var. A. *der Lory mit blauer Mütze.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 114. n. 97. β. Psittacus coccineus, vertice remigibusque primoribus cyaneis, torque colli luteo, rectricibus purpureis fusco-rubescente adumbratis.

27. Lory. *Der Lory mit schwarzer Kappe.*

Müller, Natursyst. II. p. 142. n. 27. *der Lory.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 92. n. 9. *der Lory.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 680. *der Lory.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 11. *Roth mit schwarzer Kappe, gelbem Schnabel, gelb, blau und grün bunten Flügeln.*

Brisson, ornitholog. II. p. 105. n. 16. Lory des Philippines.

Büffon, Vögel, XIX. p. 110. *der dreyfarbige Lori*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 65. *der erste Lory mit schwarzer Kappe.*

Latham, Vögel, I. p. 231. n. 78. *der Lory mit schwarzer Mütze.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 115. n. 98. Psittacus (Lory) coccineus, pileo violaceo, alis viridibus, pectore, genibus caudaque caeruleis, orbitis incarnatis.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 100. n. 24. Psittacus (Lory) brachyurus purpureus, pileo nigro, alis viridibus, pectore, genibus caudaque caeruleis.

Gerin. ornith. I. p. 94. Tab. 105.

100. Pu-

100. PUNICEUS. *Der karmoisinrothe Papagey.*

Brisson, ornithol. I. p. 107. n. 20. Lory d'Amboine.

Büffon, Vögel, XIX. p. 113. *der karmoisinfarbne Lori*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 232. n. 79. *der karmoisinrothe Lory.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 115. n. 99. Psittacus (Puniceus) coccineus, subtus violaceus, rectricibus saturate coccineis, apice rubescentibus.

101. RUBER. *Der rothe Papagey.* (*Lory von Giloio.*)

Büffon, Vögel, XIX. p. 116. *der rothe Lori*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 232. n. 80. *der rothe Lory.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 115. n. 100. Psittacus (Ruber) coccineus, remigibus primoribus orbitisque nigris, macula alarum, tectricibusque caudae inferioribus caeruleis.

β. *Der dunkelrothe Papagey mit lichtblauen Schultern.* (§)

Latham, Vögel, I. p. 233. n. 80. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 116. n. 101 Psittacus (Moluccensis) coccineus, scapularibus imoque ventre pallide caeruleis, tectricibus alarum maioribus remigibusque secundariis apice cyaneis.

102. GRANDIS. *Der große Lory.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 219. *der große Lory*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 233. n. 81. *der große Lory.*

Latham,

(§) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 16. n. 102. Psittacus (Grandis) ruber, corpore subtus rubro, caeruleo, violaceo viridique variegato, remigibus cyaneis, cauda apice flavo.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 234. n. 81. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 116. n. 102. β. Psitt. coccineus, cauda supra fusco, viridi caeruleoque varia, pectore, imo abdomine, margine alarum remigibusque extus caeruleis, femoribus castaneis.

103. Guineensis. *Der gelbbrüstige Papagey.*
Latham, Vögel, I. p. 234. n. 82. *der Lory mit gelber Brust.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 116. n. 104. Psittacus (Guineensis) capite colloque coccineis, superciliis et pectore flavescentibus, gula, genis corporeque subtus albis, tectricibus alarum viridibus, remigibus caeruleis, flavo marginatis.

104. Paraguanus. *Der Papagay von Paraguay.*
Halle, Vögel, p. 117. n. 34. *der schwarze Papagai mit rother Brust und Rücken.*
Büffon, Vögel, XX. p. 28. *der Paragua.*
Brisson, ornitholog. II. p. 106. n. 17. Lory du Bresil.
Latham, Vögel, I. p. 234. n. 83. *der Lory von Paraguay.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 117. n. 105. Psittacus (Paraguanus) coccineus, capite, cervice, crisso, cauda, humeris alisque nigris.
Jonston, av. p. 202. Paragua.

29. Nige

29. Niger. *Der Vaza.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 143. n. 29. *der ſchwarze Papagey.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 686. *der ſchwarze Papagey aus Madagaſcar.*

Klein, av. p. 28. n. 23 Pſittacus ex nigro caeruleus, roſtro breviſſimo.

Klein, Vorbereitung, p. 48. n. 23. *der ſchwärzlich himmelblaue Papagey mit dem kürzeſten Schnabel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 26. n. 27. *ſchwarzer Papagey.*

Briſſon, ornith. II. p. 129. n. 53. Perroquet noir de Madagaſcar.

Büffon, Vögel, XIX. p. 84. *der Vaza, oder der ſchwarze Papagey;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 9. *der ſchwarze Papagey von Madagaskar.*

Latham, Vögel, I. p. 225. n. 71. *der ſchwarze Papagoy von Madagaskar.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 111. n. 86. Pſittacus (Niger) corpore caeruleſcente - nigro, roſtro orbitisque albidis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 99. Pſittacus (Niger) brachyurus niger.

Gerin, ornith. II. p. 20 Tab. 128.

28. Caeruleocephalus. *Der roth- und blaue Papagey.*

Müller, Naturſ. II. p. 143. n. 28. *der guajaniſche Blaukopf.*

Halle, Vögel, p. 122. n. 48. *der blauköpfige Papagai.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 668. *der Gujaniſche Blaukopf.*

Brisson, ornitholog. II. p. 124. n. 46. Perroquet bleu de la Guiane.

Büffon, Vögel, XIX. p. 300. *der roth und blaue Krik.*

Latham, Vögel, I. p. 235. n. 84. *der roth-und blaue Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 117. n. 106. Psittacus (Caeruleocephalus) caeruleus, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo, remigibus rectricibusque rubris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 25. Psittacus (Caeruleocephalus) brachyurus, capite, pectore dorsoque caeruleis, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo.

Jonston, av. p. 37. Psittacus erythrocyanus.

105. Varius. *Der braun-und blaubunte Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 90. Psittacus (Varius) ex fusco et cyaneo varius, genis, gula iuguloque albicantibus, remigibus rectricibusque obscure fuscis, latere exteriore cyaneis.

106. Violaceus. *Der violetköpfige Papagey.*

Brisson, ornithol. II. p. 124. n. 44. Perroquet de la Guadaloupe.

Büffon, Vögel, XIX. p. 316. *der Krik mit dem violetten Kopfe; der tapizirte Papagey;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 228. *der violette Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 91. Psittacus (Violaceus) corpore supra viridi, subtus caerulescente, capite colloque violaceis, viridi nigroque variegatis, macula tectricum rosea bifida.

Labat,

Labat, voy. aux iles de l'Amer. II. p. 214. Perroquet de la Guadeloupe.

107. FRINGILLACEUS. *Der Finkenpapagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 92. Psittacus (Fringillaceus) viridis, capite cyaneo, genis, gula, iugulo maculaque abdominis ex lacteo sanguineis, abdomine violaceo.

108. CHORAEUS. *Der Choroi.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 93. Psittacus (Choraeus) viridis, subtus cinereus, orbitis incarnatus.

109. SINENSIS. *Der chinesische Papagey.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 163. n. 3. *grün und rother Papagey aus China.*

Brisson, ornithol. II. p. 120. n. 39. Perroquet de la Chine.

Büffon, Vögel, XIX. p. 78. *der grüne Papagey*; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 13. *grün und rother Papagey aus China.*

Latham, Vögel, I. p. 235. n. 85. *der chinesische Papagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 117. n. 107. Psittacus (Sinensis) viridis, lateribus tectricibusque alarum inferioribus rubris, alis margine caeruleis, rectricibus apice fusco-flavicantibus.

110. MACRORHYNCHOS. *Der dickschnäblige Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 93. *der Papagey mit dem blutfarbigen Schnabel;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 236. n. 86. *der Großschnäbler-Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 117. n. 108. Ps. (Macrorynchos) viridis, corpore antice flavo-virescente, dorso caeruleo viridi, tectricibus alarum nigris, flavo-aureo marginatis.

111. Gramineus. *Der grasgrüne Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 95. *der große grüne Papagey mit dem blauen Kopfe;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 236. n. 87. *der grasgrüne Papagoy aus Amboina.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 118. n. 110. Psittacus (Gramineus) viridis, subtus olivaceus, pileo caeruleo, cauda subtus obscure flava.

30. Leucocephalus. *Der weißköpfige Papagey.*

Müller, Natursyst. II. p. 143. n. 30. *der Weißkopf.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 93. n. 11. *der weißköpfige Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 681. *der weißköpfige Papagay.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 27. n. 34. *Weißkopf mit blauem Wirbel.*

Brisson, ornith. II. p. 110. n. 26. Perroquet de la Martinique.

Büffon, Vögel, XIX. p. 273. *die Amazoninpapagey mit dem weißen Kopfe;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 61. *der weißköpfigte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 236. n. 88. *der Papagoy mit weißer Stirn.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 118. n. 111. Psittacus (Leucocephalus) viridis, vertice remigibusque caeruleis, gula rubra, fronte orbitisque albis.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 26. Psittacus (Leucocephalus) brachyurus viridis, remigibus caeruleis, fronte alba.

Charleton, exercit. p. 74. n. 7. Psittacus leucocephalus.

β. *Halle*, Vögel, p. 120. n. 41. *der grünblaue Papagey mit weißer Stirn.*

Klein, av. p. 25. n. 9. Psittacus viridis, fronte alba, collo rubro.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 9. *der Grüne mit weisser Stirn und rothem Halse.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 26. n. 13. *Grüner mit weißer Stirn und rothem Halse.*

Brisson, ornitholog. II. p. 111. n. 27. Perroquet à gorge rouge de la Martinique. (6)

Latham, Vögel, I. p. 237. n. 88. Var. A. *der weißköpfige Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 118. β. Psittacus viridis, fronte alba, collo subtus rubescente, marginibus pennarum albis, abdomine purpureo, remigibus extus caeruleis.

Frisch, Vögel, IV. Tab. 46. (Abbild. nicht ganz richtig.

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen. 2. Sp. 9. Psittacus viridis albo capite.

Jonston, av. p. 37. Psittacus Leucocephalus.

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 237. n. 88. Var. B. *der Papagey mit weißem Wirbel.* (7)

Latham, Syst. ornith. I. p. 119. n. 113. Psittacus (Albifrons) viridis, rostro flavo, fronte alba, vertice et remigibus caeruleis, oculorum regionibus, alulaque rubris, pedibus cinereis.

(6) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(7) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Mus. Carls. fasc. III. Tab. 52. Psittacus albifrons.

δ. *Brisson*, ornith. II. p. 112. n. 26. Perroquet à tête bleue de la Martinique. (8)

Latham, Vögel, I. p. 238. n. 88. Var. C. *der Papagoy mit aschgrauem Wirbel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 119. γ. Psittacus viridis, vertice cinereo-caeruleo, fronte alba, abdomine rubro maculato.

Büffon, Vögel, XX. p. 14. *der Papagai, mit purpurfarbenem Bauch*; m. 1 Fig.

112. Ochrocephalus. *Der gelbköpfige Papagey.*

Brisson, ornith. II. p. 117. n. 35. Perroquet Amazone du Bresil.

Büffon, Vögel, XIX. p. 265. *die Amazoninpapagey mit gelbem Kopfe*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 238. n. 89. *der gelbköpfige Amazonen-Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 119. n. 114. Psittacus (Amazonicus) viridis, vertice flavo, remigibus ex viridi, flavo, violaceo et rubro variis, margine alarum rectricibusque 4. exterioribus basi rubris.

β. *Büffon*, Vögel, XIX. p. 269. *der grün und rothe Papagey von Cayenne.*

Latham, Vögel, I. p. 239. n. 89. Var. A. *der Papagoy mit hellgelbem Wirbel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 120. β. Psittacus viridis fronte flava.

γ. *Halle*, Vögel, p. 116. n. 33. *der Harlekin; Schnabel grünblau.*

Brisson,

(8) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Briſſon, ornitholog. II. p. 116. n. 34. Perroquet Amazone à bec varié. (?)

Büffon, Vögel, XIX. p. 270. *die zweyte Spielart.*

Latham, Vögel, I. p. 239. n. 89. Var. B. *der buntſchnäblichte Papagoy.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 120. γ. Pſittacus maior poikiloryncnos.

(*Charleton*, exercit. p. 74. n. 5. Pſ. poikilorinchos.

Jonſton, av. p. 37. Pſittacus poikilorinchos.

Aldrov. av. I. p. 170. Pſ. poikilorinchos.

113. Barbadensis. *Der Papagey aus Barbados.*

Klein, av. p. 25. n. 24. Pſ. viridis et luteus, capite cinereo, Barbadenſis.

Klein, Vorbereitung, p. 48. n. 24. *der grün- und bleichgelbe mit aſchgrauem Kopfe von Barbados.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 26. n. 28. *grün und gelber Graukopf.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 108. n. 22. Perroquet de Barbades.

Latham, Vögel, I. p. 240. n. 90. *der Papagoy aus Barbados.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 120. n. 115. Pſittacus (Barbadenſis) viridis, fronte cineraſcente, vertice, genis, collo inferiore, tectricibus alarum cruribusque luteis, remigibus intermediis extus prima medietate rubris.

Albin. av. III. Tab. 2. Green and yellow Parrot from Barbadoes.

31. Luconiensis. *Der grüne Papagey von der Inſel Luçon.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 144. n. 31. *Philippiniſche.*

(9) Nach *Briſſon*, u. a. eine eigene Gattung.

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 682. *der luçoniſche Papagay.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 121. n. 41. Perroquet de l'isle de Luçon.

Latham, Vögel, I. p. 248. n. 98. *der grüne Papagoy von der Inſel Luçon.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 120. n. 116. Pſittacus (Luconienſis) viridis, occipite uropygioque caeruleis, alis nigro-caeruleo-rubroque notatis.

32. Aestivus. *Der Ajurucurau.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 144. n. 32. *bunter Amazon.*

Bechſtein, Naturg. I. p. 344. n. 4. *der Amazon.*

Halle, Vögel, p. 118. n. 38. *der grüne Papagai mit buntem Schwanze und Flügeln.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 606. *der bunte amazoniſche Papagey.*

Klein, av. p. 25. n. 10. Pſittacus viridis, capite croceo, fronte cyanea.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 10. *der Grüne, mit ſaffrangelbem Kopfe, und laſurblauer Stirne.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 26. n. 14. *Grüner mit gelbem Kopfe und blauer Stirn.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 114. n. 31. Perroquet Amazone.

Büffon, Vögel, XIX. p. 280. *der Ajurucurau*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 240. n. 91. *der gemeine Amazonen-Papagey.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 121. n. 117. Pſittacus (Aeſtivus) viridis, facie flava, fronte caerulea, humeris rectricibusque 4. extimis baſi rubro notatis.

Friſch

Frisch, Vögel, Tab. 47?

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 101. n. 27. Psittacus (Aestivus) brachyurus viridis, fronte caerulea, humeris sanguineis.

Jonston, av. p. 200. Aiurucurau.

β. *Brisson*, ornithol. I. p. 107. n. 20. Perroquet à tête jaune de Jamaique. (10)

Büffon, Vögel, XIX. p. 282. *der grüne schwarzschnablichte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 240. n. 91. Var. A. *der Papagoy aus Jamaika.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 121. β. Ps. viridis, capite pectoreque flavis, fronte gulaque caerulescentibus, margine alarum crissoque rubris.

Charleton, exercit. p. 74. n. 6. Psittacus melanorinchos.

Jonston, av. p. 37. Psittacus viridis melanorinchius.

γ. *Borowsky*, Thierreich, II. p. 93. n. 12. Psittacus Nobilis; *der Amazon.*

Brisson, ornitholog. II. p. 117. n. 36. Perroquet Amazone de la Jamaique. (1)

Büffon, Vögel, XIX. p. 284. *ein Papagey der eine Stirn von aquamarinblau hat, mit einer Binde von eben dieser Farbe über den Augen.*

Latham, Vögel, I. p. 241. n. 91. Var. B. *der See-? Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 121. γ. Psittacus viridis, vertice flavo, genis gulaque luteis, fronte caerulea, tectricibus alarum minoribus remi-

(10) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(1) Soll, nach *Brisson*, der *P. Nobilis* Linn. n. 5. seyn, daher auch die häufige Verwechselung der Synonymen zwischen beyden.

remigibus 5. intermediis prima medietate, rectricibusque 4. extimis basi intus rubris.

Charleton, exercit. p. 74. n. 4. Psittacus viridis cum alarum costa superne rubente.

Barrere, ornith. Cl. III. Gen. 2. Sp. 5. Psittacus viridis alarum costa superne rubente.

Sloane, Jamaic. p. 297. n. 7. Psittacus viridis alarum costa superne rubente.

Jonston, av. p. 36. Psittacus viridis alarum costa superne rubente.

Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 108.

δ. *Halle*, Vögel, p. 119. n. 40. *der grüne Papagai mit blauer Kehle und Platte.*

Brisson, ornitholog. II. p. 108. n. 21. Perroquet à tête bleue du Brésil. (2)

Büffon, Vögel, XX. p. 287. *Ajurucuruca.*

Latham, Vögel, I. p. 241. n. 91. Var. C. *der Papagoy mit blauem Wirbel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 121. δ. Psittacus viridis, pileo caeruleo, nigro vario, macula verticis subocularique flava, gula caerulea.

Jonston, av. p. 200. Aiurucuruca.

ε. *Klein*, av. p. 25. n. 12. Ps. viridis maior, maculis rubris luteisque, fronte caerulea.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 12. *der große Grüne, mit rothen und bleichgelben Flecken und himmelblauer Stirne.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 16. *Grüner mit gelb und rothen Flecken und blauer Stirn.*

Brisson, ornithol. II. p. 118. n. 37. Perroquet Amazone varié. (3)

Büffon,

(2) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. Ueberhaupt muſs ich bemerken, daſs die zu dieser ganzen Gattung und deren Varietäten

Büffon, Vögel, XIX. p. 289. *eine vierte Abart.*
Seligmann, Vögel, VI. Tab. 57. *der große grüne Papagey aus Westindien.*
Latham, Vögel, I. p. 241. n. 91. Var. D. *der grüne West-Indianische Papagoy.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 122. ε. Psittacus viridis, vertice, genis gulaque flavis, fronte caerulea, remigibus 5. intermediis extus rectricibusque 4. extimis intus prima medietate rubris.
Frisch, Vögel, Tab. 49.
Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 115.

ζ. Psittacus viridis, fronte caerulea, vertice, genis gula, abdomine medio genibusque flavis, axillis totis, macula remigum rectricibusque lateralibus basi rubris. *
Latham, Syst. ornithol. I. p. 122. η.

η. Psittacus viridis, capite colloque flavis, humeris, macula remigum rectricibusque lateralibus, basi rubris. *
Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. ϑ.
Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 110. Psittacus viridis, colloque flavo.

ϑ. Psittacus viridi flavoque varius, fronte caerulea, humeris, macula remigum, rectricibusque lateralibus basi rubris. *
Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. ι.
Büffon, pl. enl. 120. Perroquet Amazone varié du Brésil.

33. AMAZONICUS. *Der Amazonen-Papagey.* (4)
Müller, Naturs. II. p. 145. n. 33. *Surinamischer.*
Blumen-

rietäten gehörige Synonymen, sowohl unter sich, als auch mit der folgenden Gattung häufig verwechselt werden.

(4) Nach *Büffon* und *Latham* eine Spielart vom vorigen.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 5. Psittacus (Amazonicus) brachyurus viridis, fronte caerulea, temporibus fulvis; *Amazonen-Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 663. *der grüne amazonische Papagay mit gelber Stirn.*

Brisson, ornitholog. II. p. 114. n. 32. Perroquet Amazone à front jaune.

Büffon, Vögel, XIX. p. 291. *Amazonen-Papagey mit gelber Stirne.*

Latham, Vögel, I. p. 242. n. 91. Var. E. *der brasilianische Papagoy mit hellgelber Stirn.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 122. ζ. Psittacus viridis, pileo, genis gulaque flavis, superciliis caeruleis, remigibus 4. intermediis extus, rectricibusque lateralibus basi rubris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 221. n. 6. *der Amazonen-Papagoy.*

114. LUTEUS. *Der Papagey mit gelben Schultern.*

Latham, Vögel, I. p. 243. n. 92. *der Papagoy mit gelben Schultern.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. n. 118. Psittacus (Luteolus) viridis, pileo cyaneo, capistro subtus, gula humerisque flavis, tectricibus alarum maioribus macula magna fulva.

115. OCHROPTERUS. *Der Papagey mit hellgelben Flügeln.*

Halle, Vögel, p. 148. n. 28. *der grünbunte Papagai mit gelben Schilden.*

Klein, av. p. 25. n. 11. Ps. viridis, capite, humeris et femoribus luteis.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 11. *der Grüne, mit bleichgelben Kopfe, Schultern und Schenkeln.*

Klein,

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 26. n. 15. *Grüner, mit gelbem Kopfe, Flügelschilden und Schenkeln.*

Brisson, ornitholog. II. p. 119. n. 38. Perroquet Amazone à gorge jaune.

Büffon, Vögel, XIX. p. 294. *der Krik mit dem gelben Kopfe und der gelben Kehle;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 243. n. 93. *der Papagoy mit hellgelben Flügeln.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 123. n. 119. Psittacus (Ochropterus) viridis, fronte orbitisque albidis, vertice, genis, collo subtus femoribusque flavis, tectricibus alarum minimis extrioribus flavis, interioribus rubris, flavo marginatis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 95. *der gelbkuppichte Papagoy.*

Frisch, Vögel, Tab. 48.

116. Pulverulentus. *Der gepuderte Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 298. *der Müller, oder der gepuderte Krik;* m 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 245. n. 94. *der bestäubte grüne Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. n. 120. Psittacus (Pulverulentus) viridis, supra albo pulveratus, vertice macula flava, remigibus caeruleo-nigris, alarum macula magna rubra.

Barrere, Fr. equ. p. 144. Psittacus maior albicans, capite luteo?

117. Havanensis. *Der Papagey aus Havanna.*

Brisson, ornitholog. II. p. 115. n. 33. Perroquet Amazone à gorge bleue.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIX. p. 303. *der Krik mit dem blauen Gesichte.*

Latham, Vögel, I. p. 245. n. 95. *der Papagoy aus Havanna.*

Latham, Syst. ornithol. I p. 124. n. 121. Psittacus (Havanensis) viridis, facie, gula juguloque cinereo-caeruleis, pectoris remigumque intermediarum macula rubra, crisso flavo, rectricibus lateralibus basi rubris.

Gerin. ornith. II. p. 95. Tab. 114.

34. Paradisi. *Der Paradiespapagey aus Cuba.*

Müller, Natursystem, II. p. 145. n. 34. *gelber Papagey.*

Halle, Vögel, p. 123. n. 49. *der gelbe Paradiespapagey.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 689. *der kurzschwänzige Paradiespapagey.*

Klein, av. p. 25. n. 18. Ps. Paradisi ex Cuba.

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 18. *der Paradiespapagey aus Cuba.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 22. *gelb mit rothem Halsbande und Unterleibe.*

Brisson, ornithol II. p. 125. n. 48. Perroquet jaune de Cuba.

Büffon, Vögel, XX. p. 5. *der Paradies-Papagai;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 20. *der Paradiespapagey aus Cuba.*

Latham, Vögel, I. p. 252. n. 105. *der Paradies-Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 127. n. 132. Psittacus (Paradisi) luteus, gula, ventre rectricumque basi rubris.

50. Au-

50. AURORA. *Der gelbe Amazonenpapagey.*

Müller, Naturſyſt. Supplem. p. 76. n. 48. *Glut-papagey.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 125. n. 47. Perroquet jaune.

Büffon, Vögel, XIX. p. 277. *die gelbe Amazonin;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 252. n. 106. *der Aurora-Papagoy.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 127. n. 133. Pſittacus (Aurora) flavus, axillis lateribusque extimis alarum caudaeque rubris.

47. PASSERINUS *Der Sperlingspapagey.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 150. n. 47. *der Sperlingspapagey.*

Leſke, Naturgeſch. p. 240. n. 6. *der Sperlingspapagei.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 95. n. 17. *der Sperlingsparkit.*

Halle, Vögel, p. 126. n. 60. *das grüne blaugefleckte Papagaichen.* (Tuiete.)

Büffon, Vögel, XX. p. 88. *der Ete oder Tui Ete;* m. 1 Fig.

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 690. *der kleinſte Parkit.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 163. n. 8. *kleinſter, grün und blauer Papegey.*

Briſſon, ornithol. II. p. 147. n. 83. Petite Perruche à cul bleu du Breſil.

Latham, Vögel, I. p. 265. n. 127. *der blau-und grüne Parkit.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 133. n. 156. Pſittacus (Paſſerinus) luteo-virens, macula alarum, uropygio aliſque ſubtus caeruleis.

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 97. *der kurzschwänzigte gelblich grüne Papagoy.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 22. *der kleinste grün und blaue Papagey.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 37. Psittacus (Passerinus) brachyurus luteo-virens, macula alarum alisque subtus caeruleis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 183. Psittacus Passerinus.

Jonston, av. p. 201. Tuiete.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 221. n. 7. *der Sperlingspapagoy.*

118. Cyanolyseos. *Der Thecau.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 127. n. 134. Psittacus (Cyanolyseos) luteo-virens, collari caeruleo, uropygio rubro.

Vidaure, Chil. p. 75. *der Papagey.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 221. n. 8. *der Thecau.*

40. Sordidus. *Der graue Papagey mit blauer Kehle, grünen Flügeln und Schwanz.*

Müller, Natursyst. II. p. 148. n. 40. *grauer Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 696. *der graue Papagey.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 27. n. 35. *Blaukehl mit brauner Brust, Bauch und Schenkeln, blauer Kehle, rothem Schnabel, grünem Kopfe und Flügeln.*

Brisson, ornitholog. II. p. 124. n. 45. Perroquet de la nouvelle Espagne.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 62. *der dunkle Papagey.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XX. p. 24. *der braune Papagai;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 254. n. 110. *der Schmutzige? Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 127. n. 135. Psittacus (Sordidus) subfuscus, gula caerulea, alis caudaque viridibus, rostro crissoque rubris.

119. Dominicensis. *Der Papagey von St. Domingo.*

Latham, Vögel, I. p. 251. n. 104. *der Papagoy von St. Dominik.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 131. Psittacus (Dominicensis) viridis, remigibus caeruleis, frontis fascia rubra.

Büffon, Vögel, XX. p. 12. *der Papagai mit der rothen Stirnbinde;* mit 1 Fig.

120. Erythropterus. *Der karmoisinrothflüglichte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 251. n. 103. *der Papagoy mit karmoisinrothen Flügeln.*

Latham, Syn. Suppl. p. 60. Crimson - winged Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 130. Psittacus (Erythropterus) viridis, dorso antice nigro, postice caeruleo, rectricibus alarum coccineis.

35. Festivus. *Der Tavoua.*

Müller, Natursyst. II. p. 145. n. 35. *der Festvogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 677. *der Festvogel.*

Büffon, Vögel, XX. p. 10. *der Tavua;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 250. n. 102. *der Tavoua.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 139. Psittacus (Festivus) viridis, fronte purpurascente, superciliis gulaque caeruleis, dorso sanguineo.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 101. n. 29. Psittacus (Festivus) brachyurus viridis, fronte purpurascente, superciliis gulaque caeruleis, dorso sanguineo.

121. ROBUSTUS. *Der robuste Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 249. n. 100. *der robuste Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 94. Psittacus (Robustus) viridis, capite cinerascente, capistro nigro, tectricibus alarum nigricantibus, macula coccinea.

122. MAGNUS. *Der grüne Papagey von Neuguinea.*

Latham, Vögel, I. p. 249. n. 99. *der grüne Papagoy von Neu-Guinea.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. n. 125. Psittacus (Viridis) viridis, remigibus primoribus caeruleis, minoribus subtus rubris.

123. TARABA. *Der Taraba.*

Brisson, ornith. II. p. 109. n. 24. Perroquet à tête rouge du Brésil.

Latham, Vögel, I. p. 248. n. 97. *der Taraba.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 125. n. 124. Psittacus (Tarabe) viridis, capite, collo subtus, pectore, tectricibusque alarum minoribus rubris.

Jonston, av. p. 202. Tarabe.

36. BRASILIENSIS. *Der brasilianische grüne Papagey.* (5)

Müller, Naturs. II. p. 146. n. 36. *Brasilianischer.* Onomat.

(5) Nach *Latham* eine Spielart von *Psittacus Autumnalis.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 667. *der brasilianische Papagay.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 30. *grüner Papagay mit blauen Backen.*

Brisson, ornith. II. p. 113. n. 30. Perroquet à front rouge du Brésil.

Büffon, Vögel, XIX. p. 313. *grüne brasilianische Papagey;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 56. *der brasilianische grüne Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 247. n. 96. Var. C. *der brasilianische grüne Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. δ. Psittacus viridis, facie rubra, temporibus caeruleis, orbitis cinereis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 96. *der brasilische grüne Papagey.*

Linné, System. Natur. Edit. X. I. p. 102. n. 30. Psittacus (Brasiliensis) brachyurus viridis, facie rubra, temporibus caeruleis.

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 116.

37. Autumnalis. *Der Herbstpapagey.*

Müller, Natursystem, II. p. 146. n. 37. *Herbstpapagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 666. *der amerikanische Papagay.*

Brisson, ornitholog. II. p. 121. n. 40. Perroquet d'Amerique.

Büffon, Vögel, XIX. p. 311. *der kleine grüne Papagey;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 59. *der kleinere grüne Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 247. n. 96. Var. B. *der Herbst-Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 124. n. 122. Psittacus (Autumnalis) viridis, fronte remigumque macula coccinea, vertice remigibusque primoribus caeruleis.

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 96. *der kleinere grüne Papagoy.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 31. Psittacus (Autumnalis) brachyurus viridis, fronte remigumque macula coccinea, vertice remigibusque primoribus caeruleis.

Gerin. ornith. II. p. 22. Tab. 135.

β. *Der Papagey mit blauer Stirn und Kehle.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 162. n. 2. *grüner Papagey mit blauer Stirn und rother Kehle.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 308. *der Krik mit dem blauen Kopfe;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 13. *der grüne Papagey mit blauen Backen.*

Latham, Vögel, I. p. 246. n. 96. *der Papagoy mit dem blauen Gesichte.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 124. *b.* Psittacus viridis, capite gulaque caeruleis, iugulo pectoreque rubris, remigibus caeruleis, intermediis basi rubris.

Bankroft, Guiana, p. 95. *der blauköpfige Papagoy.*

γ. *Der Papagey mit roth- und weißbuntem Kopfe.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 310. *der Cocho, Catharina.*

Latham, Vögel, I. p. 247. n. 96. Var. A. *der Papagoy mit roth und weißem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 124. γ. Psittacus capite ex rubro et albido vario.

38. Ac-

38. Accipitrinus. *Der Papagey mit dem Geyerkopfe.*

Müller, Natursyst. II. p. 147. *Braunkopf.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 93. n. 13. *der gescheckte Papagei.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 658. *der braunköpfige Papagay.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 33. *Geyerpapagey mit braunem Geyerkopfe, sonst bunt.*

Brisson, ornith. II. p. 123. n. 43. Perroquet varié des Indes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 81. *der bunte Papagey*; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 60. *der Papagey mit dem Geyerkopfe.*

Latham, Vögel, I. p. 226. n. 74. *der Papagoy mit dem Habichtskopfe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 111. n. 89. Psittacus (Accipitrinus) viridis, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo vario, remigibus rectricibusque apice caeruleis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. Psittacus (Accipitrinus) brachyurus viridis, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo vario, remigibus rectricibusque apice caeruleis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 181. Psitt. Accipitrinus.

Gerin, ornith. I. p. 96. Tab. 120.

β. *Der gesprenkelte Geyerpapagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 82. 83. Perroquet maillé.

Büffon, Vögel, XX. p. 8. *der gefleckte Papagai.*

Latham, Vögel, I. p. 227. n. 74. Var. A. *der gesprenkelte Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 89. β.

39. Menstruus. *Der Blauhals.*
Müller, Naturfyst. II. p. 147. n. 39. *Blauhals.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 685. *der Blauhals.*
Brisson, ornitholog. II. p. 112. n. 28. Perroquet à tête bleue de la Guiane.
Büffon, Vögel, XX. p. 16. *der Papagai mit blauem Kopfe und blauer Kehle.*
Latham, Vögel, I. p. 252. n. 107. *der Blauhals.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 113. n. 95. Psittacus (Menstruus) viridis capite caerulescente, crisso rubro.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 28. n. 33. *der grüne Papagey mit dunkelblauem Kopfe.*

124. Purpureus. *Der purpurfarbne Papagey.*
Latham, Vögel, I. p. 253. n. 108. *der purpurfarbne Papagoy.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 129. n. 140. Psittacus (Purpureus) atro-fuscus, subtus purpureus, vertice genisque nigris, torque ferrugineo maculis nigricantibus.
Büffon, Vögel, XX. p. 19. *der violette Papagai;* mit 1 Fig.
Seligmann, Vögel, IX. Tab. 4. *der kleine schwärzliche Papagei.*

41. Melanocephalus. *Der schwarzplattige Papagey mit weißer Brust.*
Müller, Naturfyst. II. p. 148. n. 41. *Schwarzkopf.*
Onomat. histor. nat. VI. p. 685. *der schwarzköpfige Papagey mit weißer Brust.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 9. *roth mit weißer Brust uud schwarzer Platte.*
Brisson, ornith. II. p. 122. n. 42. Perroquet à poitrine blanche du Mexique.

Büffon,

Büffon, Vögel, XX. p. 32. *der Maipuri;* mit 1 Figur.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 64. *der weißgebrüstete Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 255. n. 112. *der Papagoy mit weißer Brust.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 128. n. 136. Psittacus (Melanocephalus) viridis, subtus luteus, pileo nigro, pectore albo, orbitis incarnatis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 33. Psittacus (Melanocephalus) brachyurus viridis, subtus luteus, pileo nigro, pectore albo.

Hermann, tab. affin. animal. p. 182. Psittacus melanocephalus.

125. Pileatus. *Der Caïca.*

Latham, Vögel, I. p. 256. n. 113. *der Caica.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 128. n. 117. Psittacus (Caïca) viridis, capite nigro, orbitis albis, collo flavo, humerorum macula et rectricum apicibus caeruleis.

Büffon, Vögel, XX. p. 36. *der Caica;* m. 1 Fig.

126. Ludovicianus. *Der orangeköpfige Papagey.* (6)

Klein, av. p. 25. n. 14. Psittacus capite luteo, fronte rubra, cauda longa.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 14. *mit dem bleichgelbem Kopfe, rother Stirn, und langem Schwanze.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 17. *Grüner, langgeschwänzter, mit gelbem Kopfe, und pomeranzfarbener Stirn.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 26. *der Papagai mit dem aurorenfarbenem Kopfe.*

(6) Nach *Latham* eine Spielart von *Psittacus Carolinensis.*

Latham, Vögel, I. p. 254. n. 111. *der orange-köpfige Papagoy.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 93. n. 33. β. Psittacus viridis capite luteo, versus rostrum rubro.
Gerin. ornith. II. p. 17. Tab. 121.
Frisch, Vögel, Tab. 52.

42. COLLARIUS. *Der Xaxabes.*

Müller, Natursystem, II. p. 148. *Rothkragen.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 671. *der gemeine Papagay von Jamaika, mit dem rothen Kragen.*
Brisson, ornitholog. II, p. 110. n. 25. Perroquet à gorge rouge de la Jamaique.
Büffon, Vögel, XX. p. 22. *der Saffebe.*
Latham, Vögel, I. p. 254. n. 109. *der Papagoy mit rother Kehle.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 128. n. 139. Psittacus (Collarius) viridis, gula rubente.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 34. Psittacus (Collarius) viridis, gula rubente.

43. SENEGALUS. *Der senegalische Papagey.*

Müller, Naturs. II. p. 149. n. 43. *Senegalischer.*
Onomat. histor. nat. VI. p. 693. *der kleine Papagey aus Senegal.*
Brisson, ornitholog. II. p. 153. n. 92. petite Perruche du Senegal.
Büffon, Vögel, XIX. p. 96. *der Papagey mit dem grauen Kopfe;* m. 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 257. n. 114. *der senegalsche Papagoy.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 128. n. 138. Psittacus (Senegalus) viridis, subtus luteus, capite cinereo, orbitis nigris nudis.

127. Tui-

127. TUIPARA. *Der Tuipara.*

Brisson, ornithol. II. p. 147. n. 82. petite Perruche à tête rouge du Brésil.

Latham, Vögel, I. p. 257. n. 115. *der Tuipara.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 129. n. 141. Psittacus (Tuipara) viridis, lunula frontis rubra, macula alarum lutea, rostro incarnato.

Jonston, av. p. 201. Tuipara.

44. CHRYSOPTERUS. *Der goldflüglichte Papagey.*

Müller, Naturs. II. p. 149. n. 44. *der Goldflügel.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 670. *der Goldflügel.*

Brisson, ornithol. II. p. 155. n. 97. petite Perruche aux ailes d'or.

Büffon, Vögel, XIX. p. 202. *der Sittich mit vergoldeten Flügeln;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 83. fig. 2. *der Papagey mit Goldflügeln.*

Latham, Vögel, I. p. 257. n. 116. *der Parkit mit goldnen Flügeln.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 129. n. 142. Psittacus (Chrysopterus) viridis, alis macula caerulea fulvaque, orbitis nudis albis.

45. PULLARIUS. *Der Zwergpapagey.*

Müller, Natursyst. II. p. 149. n. 45. *der Zwergpapagey.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 95. n. 18. *der Zwergpapagey.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 6. Psittacus (Pullarius) brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra, orbitis cinereis. *(l'inseparable.)*

Onomat.

Onomat. histor. nat. VI. p. 692. *der guineeische Parkit.*

Klein, av. p. 25. n. 21. Ps. viridis minimus, fronte et gula rubris.

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 21. *der allerkleinste Grüne, mit rother Stirn und Kehle.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 15. *kleiner Grüner mit rother Stirn und Kehle.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 164. n. 10. *kleiner rothköpfiger Papagey.*

Brisson, ornithol. II. p. 148. n. 85. petite Perruche de Guinée.

Büffon, Vögel, XIX. p. 191. *der Sittich mit dem rothen Kopfe, oder der guineische Sperling;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. XI. fig. 2. *der kleine grüne Papagey aus Ostindien.*

Latham, Vögel, I. p. 258. n. 117. *der rothköpfige guineeische Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 129. n. 143. Psittacus (Pullarius) viridis, fronte gulaque rubris, uropygio caeruleo, cauda fulva fascia nigra, orbitis cinereis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 28. n. 34. *der kleinste grüne Papagey mit rother Stirn und Kehle.*

Wirsing, Vögel, Tab. 12. *indianische Spatz.*

Boßmann, Reise nach Guinea, p. 320. fig. 23. und 24.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 35. Psittacus (Pullarius) brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 133.

128. In-

128. INDICUS. *Der roth und grüne indianische Papagey.* (7)

Brisson, ornitholog. II. p. 149. n. 86. petite Perruche des Indes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 197. *der sehr kleine grün und rothe Papagey.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. XI. fig. 1. *der kleinste grüne und rothe indianische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 259. n. 118. *der roth und grüne indianische Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 130. n. 146. Psittacus (Asiaticus) viridis, rostro, pileo dorsoque postico fulvis, remigibus rectricibusque subtus caeruleo-viridibus, orbitis pedibusque incarnatis.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 134.

46. GALGULUS. *Der Hangvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 149. n. 46. *der Hangvogel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 95. n. 19. *der Hangvogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 677. *der Hangvogel.*

Brisson, ornitholog. II. p. 148. n. 84. petite Perruche de Malaca?

Büffon, Vögel, XIX. p. 187. *der Sittich mit dem blauen Kopfe;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 83. fig. 1. *der mit Saphir gekrönte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 260. n. 119. Var. A. *der Parkit mit sapphir-blauem Wirbel.* p. 261. *Parckicki.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 131. n. 148. Psittacus (Galgulus) viridis, uropygio pectoreque coccineis,

(7) Nach *Büffon* eine Spielart vom vorigen; nach *Brisson* der *Psittacus Galgulus.*

neis, vertice caeruleo, lunula cervicis lutea, tectricibus caudae rubris.

Beckmann, Naturhist. p. 39. *Galgulus.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 103. n. 36. Psittacus (Galgulus) brachyurus viridis, uropygio pectoreque coccineis, vertice caeruleo.

β. *Der Coulacissi.* (8)

Brisson, ornithol. II. p. 150. n. 87. petite Perruche des Philippines.

Büffon, Vögel, XIX. p. 199. *der Coulacissi;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p 259. n. 119. *der Philippinen-Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 131. n. 148. β. Psitt. viridis, capite viridi-lutescente, fronte, collo subtus tectricibusque caudae rubris, nucha lunula flava.

129. ANACA. *Der Anaca.*

Halle, Vögel, p. 127. n. 62. *das braunköpfige bunte Papagaichen.*

Brisson, ornitholog. II. p. 153. n. 93. petite Perruche brune du Brésil.

Büffon, Vögel, XX. p. 49. *der Anaka.*

Latham, Vögel, I. p 261. n. 120. *der Anaka.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 131. n. 149 Psittacus (Anaca) viridis, subtus rufo-fuscus, pileo castaneo, gula cinerea, macula dorsali caudaque pallide fuscis, margine alarum rubro.

Jonston, av. p. 201. Anaca.

130. PUR-

(8) Nach *Büffon* eine eigne Gattung.

130. PURPURATUS. *Der Papagey mit purpurfarbnem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 262. n. 121. *der Parkit mit purpurfarbnem Schwanze.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 132. n. 150. Pſittacus (Purpuratus) viridis, vertice cerviceque cinereis, dorſo poſtico margineque alarum caeruleis, rectricibus lateralibus purpureis, apice nigris.

131. CANUS. *Der grauköpfige Papagey.*

Briſſon, ornithol. II. p. 151. n. 88. petite Perruche de Madagaſcar.

Büffon, Vögel, XIX. p. 204. *der Sittich mit dem grauen Kopfe;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 262. n. 122. *der grauköpfige Parkit.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 132. n. 151. Pſittacus (Canus) viridis, capite colloque ſubtus viridi-griſeis, cauda rotundata, faſcia lata nigra.

132. MELANOPTERUS. *Der ſchwarzflüglichte Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 206. *der Sittich mit den bunten Flügeln;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 263. n. 123. *der Parkit mit ſchwarzen Flügeln.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 132. n. 152. Pſittacus (Melanopterus) pallide viridis, dorſo aliſque nigris remigibus ſecundariis luteis apice caeruleis, rectricibus purpureis, faſcia nigra.

133. CAPENSIS. *Der capſche Papagey.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 80. n. 66. *der Blaurandparkit.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XIX. p. 208. *der Sittich mit den blauen Flügeln;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 263. n. 124. *der kapische Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 132. n. 153. Psittacus (Capensis) viridis, alis supra caeruleo-variis, subtus caeruleis, rostro pedibusque rubescentibus.

134. TORQUATUS. *Der Papagey mit dem Halsbande.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 209. *der Sittich mit der Halsbinde;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 264. n. 125. *der Parkit mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 133. n. 154. Psittacus (Torquatus) viridis, fascia nuchae lutescente nigro-undulata.

135. MINOR. *Der kleine grüne Papagey mit karmoisinrothem Scheitel und blauer Brust von der Insel Luçon.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 211. *der Sittich mit schwarzen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. p. 264. n. 126. *der Parkit von der Insel Luçon.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 133. n. 155. Psittacus (Minor) viridis, pileo tectricibusque caudae coccineis, pectore caeruleo.

136. TOVI. *Der Tovi.*

Brisson, ornitholog. II. p. 151. n. 89. petite Perruche à gorge jaune.

Büffon, Vögel, XX. p. 81. *der Tui mit der gelben Kehle.*

Latham, Vögel, I. p. 265. n. 128. *der Tovi.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 134. n. 157. Psittacus (Tovi) viridis, gula macula parva pallide fulva, tectricibus alarum macula castanea viridiaureo varia.

137. Tirica. *Der Tirica.*

Halle, Vögel, p. 126. n. 57. *das grüne blaufüßige Papagaichen.*

Büffon, Vögel, XX. p. 85. *der Tirica;* m. 1 Fig.

Brisson, ornithol. II. p. 147. n. 81. petite Perruche du Bresil.

Latham, Vögel, I. p. 265. n. 129. *der Tirica.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 134. n. 158. Psittacus (Tirica) viridis, rostro incarnato, pedibus caerulescentibus.

Jonston, av. p. 202. Tui-Tirica.

138. Sosove. *Der Sosové.*

Latham, Vögel, I. p. 266. n. 130. *der Sosové.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 134 n. 159. Psittacus (Sosové) viridis, macula alarum tectricumque flava, rostro pedibusque griseis.

Büffon, Vögel, XX. p. 83. *der Sosové;* m. 1 Fig.

139. Tui. *Der Tui.*

Halle, Vögel, p. 125. n. 55. *das grüne langschwänzige Papagaichen.*

Halle, Vögel, p. 126. n. 58. *das blaßgrüne Papagaichen.*

Brisson, ornithol. II. p. 152. n. 90. petite Perruche à tête jaune du Brésil.

Büffon, Vögel, XX. p. 91. *der goldköpf. Tui;* m. 1 F.

Latham, Vögel, I. p. 266. n. 131. *der Tui.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 134. n. 160. Ps. (Tui) viridis, fronte aurantia, orbitis flavis, rostro nigro.

Jonston, av. p. 201. Tui, quarta species.

140. ERYTHROCHLORUS. *Der roth und grüne Papagey mit dem Federbuſche.*

Büffon, Vögel, XX. p. 93. n. 7.

Briſſon, ornith. II. p. 154. n. 94. petite Perruche hupée.

Latham, Vögel, I. p. 267. n. 132. *der roth und grüne Parkit mit dem Federbuſche.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 134. n. 161. Pſittacus (Erythrochlorus) viridis criſtatus, occipite, alis caudaque rubris.

Jonſton, av. p. 38. Pſittacus erythrochlorus criſtatus.

141. MEXICANUS. *Der mexicaniſche Papagey mit dem Federbuſche.*

Klein, av. p. 25. n. 22. Pſittacus collo rubro, plumis in capite purpureis.

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 22. *der Vogel von Cocho mit rothem Halſe und Purpurfedern auf dem Kopfe.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 26. n. 26. *Rothhals mit purpurfarbenem Buſche.*

Halle, Vögel, p. 131. n. 70. *das ſcharlachrothe Mexikanerpapagaichen mit kurzem Kalotchen.*

Briſſon, ornithol. II. p. 154. n. 95. petite Perruche hupée du Mexique.

Büffon, Vögel, XX. p. 93. n. 8.

Latham, Vögel, I. p. 267. n. 133. *der mexikaniſche Parkit mit dem Federbuſche.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 135. n. 162. Pſittacus (Mexicanus) ruber, fronte criſtata, tectricibus alarum purpuraſcentibus, gula flava, remigibus viridibus albo marginatis.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 131.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Die Anzahl der langschwänzigen Papageyen ist um 57, der kurzschwänzigen 37, also das ganze Geschlecht mit 94 Gattungen vermehrt. Bey der *ersten* Gattung ist der *Aras* vom *Aratanga*, so auch bey der 22sten der *weiße Kakadu mit schwefelgelbem Federbusch* vom *gemeinen Kakadu* getrennt, und daraus n. 52. und 93. zwey besondere Gattungen gemacht; und eben so ist bey der *vierten* Gattung *Hasselquists Psittacus obscurus*, von *Brissons Psitt. Mascarinus* getrennt, und letzterer n. 49. als eine eigne Gattung aufgeführt. Ueberdem sind bey der 3ten Gattung *zwey*, bey der 6ten *zwey*, bey der 14ten *drey*, bey der 18ten *zwey*, bey der 24ten *vier*, bey der 25ten *zwey*, bey der 26ten *zwey*, bey der 30ten *vier*, bey der 32ten *drey*, bey der 37ten *drey*, bey der 38ten *zwey*, und bey der 46ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der grüne Papagey mit einem rothen Huth u. Stirn.*
 Scopoli, an. 1. n. 32. Psittacus pileatus.
 Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 27. n. 32.
 Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. n. 123. Psittacus (Pileatus) viridis, vertice et fronte coccineis, uropygio luteo-virescente, remigibus et rectricibus latere exteriore cyaneis.
 Büffon, Vögel, XIX. p. 314.
 Vielleicht eine Spielart von *Psittacus Brasiliensis?*

2. Psittacus cauda corpore sesquilongiore. *Indianischer Rabe.*
 Kramer, Austr. p. 332. n. 1.
 Wahrscheinlich *Psitt. Macao.*

3. Psittacus viridis, remigibus rectricibusque introrsum caeruleis, phoeniceis et flavis. *Grüner Paperl.*

Kramer, Austr. p. 332. n. 3.

4. Psittacus viridis cauda longitudine corporis. *Großes Peruquetl.*

Kramer, Austr. p. 332. n. 4.

5. Psittacus viridis rostro carneo, anteriore capitis parte miniacea. *Kleines Peruquetl.*

Kramer, Austr. p. 333. n. 5.

C. *Neuere Gattungen.*

a. *Langschwänzige.*

1. Psittacus (Hyacinthinus) macr. violaceo - caeruleus, capite colloque dilutioribus, orbitis gulaque nudis flavis.

Latham, Syst. ornith. I. p. 84. n. 5.

2. *Der Parkit mit schuppiger Brust;* (aus Cayenne.)

Latham, Syn. I. p. 246. n. 45. Scaly - breasted Parrakeet.

Latham, Vögel, I. p. 209. n. 45.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 101. n. 53. Psittacus (Squamosus) macr. viridis, capite, collo pectoreque marginibus pennarum aurantiis, humeris coccineis, uropygio abdomineque medio sanguineis.

3. *Der Pennantische Papagey;* (in Neusüdwallis.)

Latham, Vögel, I. p. 217. n. 134.

Latham, Syn. Suppl. p. 61. Pennantian Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 90. n. 26. Ps. (Pennantii) macr. coccineus, dorso antice nigro cocci-

coccineo undulato, lateribus corporis gulaque caeruleis, remigibus intus macula alba.

β. Pſ. macrourus coccineus, dorſo nigro rubro undulato, gula, alis caudaque caeruleis, medio alarum faſcia pallidiore.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 91. n. 26. β.

4. *Der unbeſtimmte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 218. n. 136.

Latham, Syn. Suppl. p. 62. Dubious Parrot.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 97. n. 44. Pſittacus (Dubius) macr. viridis, collo rufeſcente, remigibus toto, rectricibusque 4. intermediis apice caeruleis, orbitis nudis flaveſcentibus.

5. *Der Papagey mit orangefarbenem Bauche.*

Latham, Vögel, I. p. 218. n. 137.

Latham, Syn. Supplem. p. 62. Orange-bellied Parrot.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 97. n. 45. Pſittacus (Chryſogaſter) macr. viridis, tectricibus alarum maioribus extus caeruleis, intus macula alba, abdomine poſtico aurantio, rectricibus 4. extimis apice luteis.

6. *Der grüne Papagey mit zwey ſchwarzen Flecken am Halſe*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 99. n. 49. Pſittacus (Bimaculatus) macr. viridis, maculis colli duabus elongatis nigris, utriusque alae macula magna et ſulphurea.

Muſ. Carlſ. faſc. II. Tab. 30. Pſitt. bimaculatus.

7. *Der ſchöne Papagey aus Neuſüdwallis.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 103. n. 60. Pſittacus (Formoſus) macr. viridis, rectricibus 4.

intermediis nigro viridique, reliquis nigro flavoque fasciatis, remigibus medio fascia interrupta flava.

8. *Der südliche Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 66. Psittacus (Australis) macr. viridis, vertice caeruleo, nucha maculis, axillisque toto flavis.

Vielleicht eine Spielart von *Psitt. Pacificus.*

9. *Der ausländische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 218. n. 138.

Latham, Syn. Suppl. p. 62. Peregrine Parrakeet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 105. n. 67. Psittacus (Peregrinus) macr. viridis, macula alarum longitudinali fusca.

10. Psittacus (Pusillus) macr. fusco - olivaceus, capistro basique rectricum intus coccineis.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 106. n. 71.

b. *Kurzschwänzige.*

11. *Des Ritters Banks Kakatoo;* (aus Neuholland.)

Latham, Vögel, I. p. 222. n. 139. Tab. XI.

Latham, Syn. Suppl. p. 63. Tab. 109. Bankian Cockatoo.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. n. 76. Psittacus (Banksii) brach. atro - nitens subcristatus, capite tectricibusque alarum flavescente punctatis, rectricibus lateralibus medio coccineis, nigro fasciatis.

β. Ps. brach. atro - nitens subcristatus, collo, lateribus, gula iuguloque flavis, rectricibus lateralibus medio coccineis, nigro fasciatis.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. β.

γ. Psit-

γ. Psittacus brach. atro-nitens subcristatus, capite colloque fusco-olivaceis, rectricibus lateralibus medio coccineis.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. γ.

12. *Der Haubenpapagey aus Neusüdwallis.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 109. n. 80. Psittacus (Galeritus) brach. albus, crista plicatili acuminata, elongata, basique caudae sulphureis.

13. *Der Papagey aus Cochinchina.*
Latham, Vögel, I. p. 268. n. 143.
Latham, Syn. Suppl. p. 65. Cochinchina Parrot.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 116. n. 103. Psittacus (Cochinchinensis) caeruleus, fronte, nucha collo inferiore, pectore abdomineque medio coccineis, tectricibus alarum fascia, remigibus caudaque nigris.

14. *Der rothschnäblichte chinesische Papagey.*
Latham, Vögel, I. p. 268. n. 141. *der sprenglichte? chinesische Papagey.*
Latham, Syn. Supplem. p. 64. Grisled Parrot.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 118. n. 109. Psittacus (Nasutus) viridis, capite pectoreque virescentegriseis, tectricibus alarum flavis.

15. *Gerins-Papagey;* (aus Brasilien.)
Latham, Syst. ornithol. I. p. 119. n. 112. Psittacus (Gerini) viridis, capite albo, humeris remigibus intermediis, rectricibusque basi intus rubris.
Gerin. ornithol. I. p. 95. Tab. 109. Psitt. brasil. viridis capite albo.

16. *Der östliche Papagey.*
Latham, Vögel, I. p. 267. n. 140.

Latham, Syn. Suppl. p. 64. Eastern-Parrot.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. n. 126. Psittacus (Orientalis) viridis, margine alarum exteriore remigibusque primoribus caerulescentibus, cauda apice flava.

17. *Der Papagey mit blauen Wangen.*
Latham, Vögel, I. p. 268. n. 142.
Latham, Syn. Suppl. p. 64. Blue-cheeked Parrot.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 127. Psittacus (Adscitus) viridis, genis alisque caeruleis, dorso antice nigro-luteo striato, postice lutescente, crisso rubro.

18. *Der Papagey von Batavia.*
Latham, Vögel, I. p. 268. n. 144.
Latham, Syn. Suppl. p. 65. Amber-Parrot.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 128. Psittacus (Batavensis) viridis striis flavis, occipite nuchaque nigricantibus, facie femoribusque coccineis.

19. *Der Papagey mit blauem Steiß;* (aus Malacca.)
Latham, Vögel, I. p. 269. n. 146.
Latham, Syn. Suppl. p. 66. Blue-rumped Parrakeet.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 130. n. 144. Psittacus (Malaccensis) viridis, fronte uropygioque caeruleis, tectricibus alarum inferioribus rubris.
Sonner. voy. Ind. II. p. 212. petite Perruche de Malacca.

20. *Der Papagey mit rothem Nacken.*
Latham, Vögel, I. p. 269. n. 147.
Latham, Syn. Supplem. p. 66. Red-naped Parrakeet.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 130. n. 145. Psitt. (Cervicalis) viridis, fronte, lunula cervicis, collo subtus pectoreque coccineis.

21. *Der Frühlingspapagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 130. n. 147. Psittacus (Vernalis) laete viridis, alis prasinis, uropygio caudaeque pagina superiore sanguineis, rostro pedibusque pallidis.

Mus. Carls. fasc. II. 29. Psittacus vernalis.

46. GESCHLEHT. RAMPHASTOS. *Der Pfefferfraß.*

Müller, Natursyst. II. p. 153. Gen. XLVI.
Leske, Naturgesch. p. 240. Gen. XV.
Borowsky, Thierreich, II. p. 96. Gen. VI.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 165. Gen. VI.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 344. Gen. VI.
Neuer Schaupl. d. Natur, VI. p. 462. IX. p. 93.
Onomat. hist. nat. VI. p. 774.
Klein, av. p. 36. Gen. VI.
Brisson, ornithol. II. p. 156. Gen. LIV.
Batsch, Thiere, I. p. 300. Gen. LIV.
Latham, allg. Uebers. d. Vögel, I. p. 270. Gen. VI.
Latham, Syst. ornith. I. p. 135. Gen. VI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 184.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 221. Gen. VI.

1. VIRIDIS. *Der grüne Pfefferfraß aus Cayenne.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 154. n. 1. *der grüne Toukan.* Tab. 22. fig. 4.

(9) In *Latham* Syst. ornith. l. c. ist aus Versehen das Synonym aus *Edw. glean.* Tab. 329. nochmals angeführt, welches zu n. 5. gehört.

Leſke, Naturgeſch. p. 241. n. 1. *der grüne Pfeffer-fraß.* Tab. 6. fig. 3.

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 1. *grüner Toucan.*

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 783. *der grüne Toukan.*

Briſſon, ornith. II. p. 162. n. 8. Toucan verd de Cayenne.

Latham, Vögel, I. p. 276. n. 9. *der grüne Pfefferfraß.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 138. n. 9. Ramphaſtos (Viridis) abdomine flavo, uropygio luteo.

9. Pavonius. *Der Pfauen-Pfefferfraß.*

Müller, Naturſyſt. Supplem. p. 84. n. 15. Ramphaſtos pulcher; *der Scheck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 95. n. 13. *ſchöner Toucan.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 161. n. 7. Toucan du Mexique.

Latham, Vögel, I. p. 275. n. 8. *der Pfauen-Pfefferfraß.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 137. n. 8. Ramphaſtos (Pavonius) toto corpore viridi rubro pavonioque colore variegatus, roſtro luteo nigroque vario.

2. Piperivorus. *Der Koulik.* (10)

Müller, Naturſyſt. II. p. 155. n. 2. *der Pfefferfreſſer.* Tab. 5. fig. 1.

Borowſky, Thierreich, II. p. 97. n. 2. *der Pfeffervogel.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 344. *der Pfeffervogel.*

Bech-

(10) Wird oft mit *R. Tucanus* verwechſelt, wie ich auch beym *Briſſon* finde.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 165. *der eigentliche Pfeffervogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 780. *der Pfefferfresser.*

Brisson, ornitholog. II. p. 163. n. 10. Toucan à collier de Cayenne, ou queue de rat.

Batsch, Thiere, I. p. 303. *der Pfeffervogel.*

Latham, Vögel, I. p. 277. n. 11. *der Koulik.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 138. n. 12. Ramphastos (Piperivorus) viridis, antice niger, macula aurium aurea, lunula cervicis aurantia, crisso femoribusque rubris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 1. Ramphastos (Piperivorus) rostro nigro, carina crassissima.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 184. Ramphastos piperivorus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 222. n. 1. *der grüne Pfefferfraß.*

3. Aracari. *Der Aracari.*

Müller, Natursystem, II. p. 156. n. 3. *der Brasilianische.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 98. n. 3. *der brasilianische Fischer.*

Halle, Vögel, p. 158. n. 96. *der brasilianische Fischer mit gebogenem zakkigen Schnabel.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 58. n. 64. *der brasilische Fischer.*

Neuer Schauplatz d. Natur, IX. p. 94. n. 3. *Aracari.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 775. *der brasilianische Toucan.*

Klein, av. p. 30. n. 4. Cuculus brasiliensis.

Klein, Vorbereit. p. 58. n. 4. *der Kuckuck von Brasilien.*

Klein,

Klein, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 4. *brasilianischer Kuckuck.*

Brisson, ornithol. II. p. 162. n. 9. Toucan verd du Bresil.

Batsch, Thiere, I. p. 303. *der brasilian. Fischer.*

Latham, Vögel, I. p. 276. n. 10. *der Arakari.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 138. n. 11. Ramphastos (Aracari) viridis, macula aurium castanea, fascia abdominali, crisso uropygioque rubris, abdomine flavo.

Wirsing, Vögel, Tab. 41. *der kleine Toucan.*

Gerin. ornith. II. p. 61. Tab. 204.

Jonston, av. p. 211. Aracari Brasiliensibus.

10. TORQUATUS. *Der Cochicat.*

Brisson, ornithol. II. p. 161. n. 6. Toucan à collier du Mexique.

Latham, Vögel, I. p. 275. n. 7. *der Pfefferfraß mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 137. n. 7. Ramphastos (Torquatus) supra niger, collo subtus albido, abdomine viridi, postice rubro, torque rubro.

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 95. n. 12. *Rothbauch.*

4. PISCIVORUS. *Der brasilianische Pfefferfraß.*

Müller, Natursyst. II. p. 156. n. 4. *der Fischfresser.* Tab. 5. fig. 2.

Ebert, Naturl. II. p. 49. *der Toukan oder Pfefferfresser, Hohlschnäbler.* Tab. 24. fig. 2.

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 4. *Fischesser.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 781. *der Fischfresser.*

Brisson, ornithol. II. p. 158. n. 3. Toucan à gorge blanche du Brésil.

Selig-

Seligmann, Vögel, III. Tab. 23. *die brasilianische Elster, Toucan genannt.*

Latham, Vögel, I. p. 272. n. 4. *der brasilianische Pfefferfraß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 136. n. 4. Ramphastos (Piscivorus) nigricans, fascia abdominali crissoque rubris, genis, iugulo, pectore uropygioque albidis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 98. *der Toucan von Guiana.*

11. Erythrorhynchos. *Der rothschnäblige Pfefferfraß.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 164. *rothschnäbliger Toucan.*

Brisson, ornitholog. II. p. 159. n. 4. Toucan à gorge blanche de Cayenne.

Latham, Vögel, I. p. 273. n. 5. *der roth-schnäblichte Pfefferfraß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 136. n. 3. Ramphastos (Erythrorhynchus) nigricans, genis colloque subtus albis, fascia pectoris crissoque coccineis, uropygio sulphureo.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 28. *der Toucan mit rothem Schnabel.*

Wirsing, Vögel, Tab. 42. *großer Toucan.*

5. Tucanus. *Der Tucan.*

Müller, Natursyst. II. p. 156. n. 5. *der Rothschnabel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 97. n. 1. *der rothschnäblige Tukan.* Tab. 6.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 165. n. 1. Ramphastos (Tucanus) nigricans, rostro flavescente, versus basin fascia nigra, fascia abdominali flava.

Gatte-

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 58. n. 63. *der Tukan.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 5. *eigentlicher Toucan.*

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 782. *der Rothſchnabel.*

Briſſon, ornithol. II. p. 160. n. 5. Toucan à gorge jaune du Bréſil.

Batſch, Thiere, I. p. 303. *der eigentliche rothſchnäblige Tukan.*

Latham, Vögel, I. p. 272. n. 3. *der Tucan.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 136. n. 3. Ramphaſtos (Tucanus) nigricans, faſcia abdominali, criſſo uropygioque flavis.

Nau, Entdeck. a. d. Naturgeſch. I. p. 248. Ramphaſtos Tucanus. Tab. 5.

Murr, Reiſ. der Miſſionar. p. 547. *Toukan.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 107. *der Pfeffervogel.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 2. Piperivora nigra uropygio luteo.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 2. Ramphaſtos (Tucanus) roſtro rubro carina obtuſa alba.

Gerin. ornith. II. p. 61. Tab. 203.

Jonſton, av. p. 180. Tucana.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 222. n. 2. *der Tukan.*

6. Picatus. *Der Prediger.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 157. n. 6. *Elſtertoukan.*

Halle, Vögel, p. 159. n. 98. *der braſiliſche Polyphem, groſsſchnablige Pfeffervogel.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 335. *der Prediger.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 57. n. 62. *der Pfefferfreſſer.*

Neuer

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 6. *ſchwarzer Toucan.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 779. *die braſilianiſche Elſter.*

Klein, av. p. 38. n. 1. Naſutus ſimpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 73. n. 1. *der eigentliche Hohlſchnäbler.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 39. n. 1. *Hohlſchnäbler, Pfefferfraß.*

Briſſon, ornithol. II. p. 156. n. 1. Toucan.

Latham, Vögel, I. p. 274. n. 6. *der Prediger.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 137. n. 6. Ramphaſtos (Picatus) nigricans, pectore luteo, criſſo rectricumque apicibus rubris, uropygio nigro.

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 1. Pica braſilienſis, uropygio coccineo.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 3. Ramphaſtos (Picatus) roſtro rubro, apice nigro, carina compreſſa.

Jonſton, av. p. 46. Pica braſilica, aliis Ramphaſtos, Hipporynchos et Burynchos, aliis Barbara et Piperivora.

7. Discolorus. *Der gelbkehlige Pfefferfraß.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 157. n. 7. *die Gelbkehle.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 7. *Gelbbraſt.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 777. *der cayenniſche Toukan mit gelber Kehle.*

Briſſon, ornith. II. p. 157. n. 2. Toucan à gorge jaune de Cayenne.

Latham, Vögel, I. p. 271. n. 2. *der Pfefferfraß mit gelber Kehle.*

Latham,

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 135. n. 2. Ramphaſtos (Discolorus) nigricans, pectore, abdomine, criſſo uropygioque rubris, gula lutea.

12. Toco. *Der Toco.*
Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 82. n. 9. *der Toco.*
Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 94. n. 8. *Toco.*
Latham, Vögel, I. p. 271. n. 1. *der Toco.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 135. n. 1. Ramphaſtos (Toco) nigricans, collo ſubtus, uropygioque albis, orbitis, lunula pectoris criſſoque rubris.

13. Luteus. *Der ſchwarzſchnäblige Pfefferfraß.*
Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 84. n. 16. *der gelbe Toucan.*
Neuer Schaupl. d. Natur, IX. p. 95. n. 14. *gelber Toucan.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 164. n. 11. Toucan jaune.
Latham, Vögel, I. p. 278. n. 12. *der ſchwarzſchnäblichte Pfefferfraß.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 139. n. 13. Ramphaſtos (Luteus) flaveſcens, lateribus colli utrinque ſtriga longitudinali nigra, cauda et alis albo nigroque variis, tectricibus alarum minoribus flavis.
Jonſton, av. p. 171. Xochite nacatl.

14. Caeruleus. *Der blaue Pfefferfraß.*
Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 84. n. 17. *der blaue Toucan.*
Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 95. n. 15. *blauer Toucan.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 165. n. 12. Toucan bleu.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 279. n. 13. *der blaue Pfefferfraß.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 139. n. 14. Ramphaſtos (Caeruleus) caeruleus, cinereo-variegatus, roſtro corpore longiore, iridibus fulvis.

15. Dubius. *Der unbeſtimmte Pfefferfraß.*

Latham, Vögel, I. p. 279. n. 14. *der Pfefferfraß mit blauer Kehle.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 139. n. 15. Ramphaſtos (Dubius) gutture caeruleo.

16. Albus. *Der weiße Pfefferfraß.*

Latham, Vögel, I. p. 279. n. 15. *der weiße Pfefferfraß.*

8. Momota. *Der Momot.* (1)

Müller, Naturſyſt. II. p. 158. n. 8. *der Großkopf.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 98. n. 4. *der Momot.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 95 n. 16. *Momot.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 777. *der Momot.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 175. n. 1. *Momot.*

Batſch, Thiere, I. p. 303. *der Momot.*

Latham, Vögel, I. p. 281. *der braſilianiſche Großkopf.* Tab. 13.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 140. Gen. VII. Sp. 1. Momotus (Braſilienſis) viridis, fronte caeruleo-viridi, occipite violaceo, vertice et ſtriga per oculos nigris, rectricibus duabus intermediis longioribus.

Jonſton, av. p. 189. Guira Guainumbi.

Dom.

(1) *Latham* hat mit *Briſſon*, wegen Stellung der Zehen, aus dieſem Vogel ein eignes Geſchlecht gemacht. *Momotus: Roſtrum* validum, incurvatum, lateribus dentatum. *Nares tectae. Lingua* pennacea. *Cauda* cuneiformis. *Pedes* greſſorii.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 222. n. 3. *der großköpfige Pfefferfraß.*

β. *Der bunte Momot.* (2)

Brisson, ornithol. II. p. 173. n. 2. Momot varié.

Latham, Vögel, I. p. 282. n. 1. Var. A. *der bunte Großkopf.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 140. β. Momotus varius.

Jonston, av. p. 172. Jacauquitototl.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 8 Gattungen von n. 9. bis 16. vermehrt; und bey der achten Gattung sind 2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der glattschnäblige Pfefferfraß.*

Latham, Syn. Supplem. p. 67. Smooth-billed Toucan.

Latham, Vögel, I. p. 280. n. 16.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 138. n. 10. Ramphastos (Glaber) corpore viridi, subtus virescente-flavo, capite colloque castaneis, uropygio rubro, rostro lateribus glabro.

* NEUES GESCHLECHT. SCYTHROPS. *Der Trauervogel;* (3) *Fratzenvogel.*

Rostrum magnum, convexum, cultratum, apice adunco.

Nares

(2) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(3) In unserm System ist dieses Geschlecht noch nicht befindlich. *Latham* hat es im Syst. ornith. zwischen seinem *Momot* und

Nares rotundatae, nudae, ad basin rostri.
Lingua cartilaginea, apice bifida.
Pedes scansorii.

1. Novae Hollandiae. *Der Trauervogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 141. Gen. VIII. n. 1. Scythrops Novae Hollandiae. Habitat in *nova Hollandia*, magnitudine *Corvi.* — 2 ped. 3 poll. longus.
Latham, Vögel, I. 2. p. 647. n. 1. *der neuholländische Fratzenvogel.*

47. GESCHLECHT. Buceros. *Der Hornvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 160. Gen. XLVII.
Leske, Naturgesch. p. 241. Gen. XVI.
Borowsky, Thierreich, II. p. 98. Gen. VII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 165. Gen. VII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 345. Gen. VII.
Ebert, Naturl. II. p. 53.
Onomat. hist. natur. II. p. 328. IV. p. 433.
Brisson, ornith. II. p. 202. Gen. 61. Hydrocorax.
Batsch, Thiere, I. p. 301. Gen. LV.
Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. p. 282. Gen. VIII.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 141. Gen. IX.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 223. Gen. VII.

1. Bicornis. *Der philippinische Hornvogel.*
Müller, Natursyst. II. p. 160. n. 1. *Zweyhörnige.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 99. n. 2. *der philippinische Nashornvogel.*

und *Buceros* aufgeführt, daher ich es hier mit eingerückt habe.

Ebert, Naturl. II. p. 51. *der Hornvogel von den philippinischen Inseln.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 59. n. 66. *der zweyhörnige Nashornvogel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 436. *der Wasserrabe von den philippinischen Inseln.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 177. *der philippinische Calao.*

Brisson, ornithol. II. p. 203. n. 2. Calao des Philippines.

Batsch, Thiere, I. p. 304. *der philippinische Nashornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 285. n. 3. *der Philippinen-Hornvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 142. n. 3. Buceros (Bicornis) fronte ossea plana, antrorsum bicorni, corpore nigro, subtus maculaque remigum alba, rectricibus 10. intermediis nigris.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 104. n. 1. Buceros (Bicornis) fronte ossea plana, antrorsum bicorni.

β. *Der Calao oder Cayao.*

Latham, Vögel, I. p. 285. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 143. Calao vel Cayao.

8. Abyssinicus. *Der abyssinische Hornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 286. n. 4. *der abyssinische Hornvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. n. 4. Buceros (Abyssinicus) rostro nigro compresso, fronte gibbosa, orbiculata, caerulea, corpore nigro, remigibus primoribus albis, secundariis fulvo-fuscis.

Bruce, Reis. n. d. Quellen des Nils, V. p. 172. Tab. 34. *Erkoom oder Abba Gumba?*

6. Afri-

6. AFRICANUS. *Der afrikanische Hornvogel.*
Onomat. histor. nat. IV. p. 434. *der afrikanische Wasserrabe.*
Handbuch der Naturgesch. II. p. 177. *der africanische Calao.*
Brisson, ornith. II. p. 204. n. 3. Calao d'Afrique.
Latham, Vögel, I. p. 287. n. 5. *der afrikanische Hornvogel; Trompetervogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. n. 5. Buceros (Africanus) niger, subcristatus, fronte ossea, plane antrorsum subulata, corpore nigro, abdomine rectricibusque apice albis.

7. MALABARICUS. *Der malabarische Hornvogel.*
Latham, Vögel, I. p. 288. n. 6. *der malabarische Hornvogel.* Tab. 14.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. n. 6. Buceros (Malabaricus) niger subcristatus, rostro incurvato, fronte ossea antrorsum cultrata, abdomine, femoribus, crisso, remigibus rectricibusque lateralibus apice albis.
Sonnerat, Reis. n. Ostind. und China, III. p. 168. *der Nashornvogel von der Küste Malabar.* Tab. 121.

β. B. niger, rostro incurvato, fronte ossea, antrorsum cultrata, dimidiato nigra, abdomine, crisso, femoribus, macula suboculari rectricibusque lateralibus 4. toto albis. *
Latham, Syn. I. p. 350.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. β.
Büffon, pl. enl. n. 873.

γ. B. niger, rostro incurvato, fronte ossea ovata, gula, abdomine, remigibus rectricibusque albis. *
Latham, Syst. ornithol. I. p. 144. γ.

2. HYDROCORAX. *Der indianische Rabe.*

Müller, Natursyst. II. p. 162. n. 2. *der Wasserrabe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 100. n. 3. *der Wasserrabe.*

Ebert, Naturl. II. p. 53. *indianischer Rabe.*

Halle, Vögel, p. 247. n. 185. *der große schwarze Rabe, mit grauem Halsringe?*

Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 2 n. 2. *Ringelrabe.*

Onomat. hist. nat. III. p. 435. *der indianische Rab.*

Handbuch der Naturgesch. p. 177. *der moluckische Calao.*

Klein, av. p. 58. n. 2. Corvus torquatus, pedibus cinereis, rostro arcuato?

Klein, Vorbereitung, p. 110. n. 2. *Ringelrabe?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 57. n. 2. *Ringelrabe?*

Brisson, ornith. II. p. 203. n. 1. Calao.

Büffon, Vögel, VII. p. 69. *der indianische Rabe des Bontius.*

Batsch, Thiere, I. p. 304. *der Wasserrabe.*

Latham, Vögel, I. p. 290. n. 7. *der indianische Hornvogel; Wasser-Rabe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 144. n. 7. Buceros (Hydrocorax) fronte ossea plana, antice mutica, postice tegens verticem, rotundata, corpore fusco, abdomine infimo flavescente, genis gulaque nigris, albido marginatis.

Feuill. III. p. 14. Corvus torquatus, rostro arcuato, pedibus cinereis?

Moehring, av. gen. p. 31. n. 7. Caryocatactes?

Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. Hydrocorax.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 223. n. 1. *der indianische Rabe.*

3. RHI-

3. RHINOCEROS. *Der Nasehornvogel.*

Müller, Naturf. II. p. 162. n. 3. *der Naßhornvogel.* Tab. 25. fig. 6.

Leske, Naturgesch. p. 241. n. 1. *der Nashornvogel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 99. n. 1. *der Nashornvogel.* Tab. 7.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 165. n. 1. Buceros (Rhinoceros) processu rostri frontali recurvato.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 346. *der Nashornvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 171. *der Nashornvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 54. *der Naßhornvogel, Topau.*

Halle, Vögel, p. 160. n. 99. *Nasenhornvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 59. n. 65. *Nashornvogel, Jägervogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 435. *der indianische Wasserrabe.*

Klein, av. p. 38. n. 2. *Nasutus Rhinoceros.*

Klein, Vorbereit. p. 74. n. 2. *das geflügelte Nasehorn.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 39. n. 2. *geflügeltes Nasehorn, Topau.*

Brisson, ornith. II. p. 205. n. 4. Calao des Indes.

Batsch, Thiere, I. p. 304. *der eigentliche Nashornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 283. n. 1. *der Nashornvogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 69. Rhinoceros Hornbill.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 141. n. 1. Buceros (Rhinoceros) cornu mandibulari frontis recurvato, corpore nigro, abdomine infimo, uropygio crissoque albis, cauda alba fascia nigra.

Berlin. Samml. IV. p. 289. *der Trompeter.*

Moehring, av. gen. p. 30. n. 4. Tragopan.

Jonston, av. p. 46. Rhinoceros.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 223. n. 2. *der Nasehornvogel.*

8. Galeatus. *Der Helmvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 284. n. 8. *der gehelmte Hornvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 142. n. 2. Buceros (Galeatus) rostro conico, basi mandibulae superioris supra maxime gibbosa, subquadrata.

9. Panayensis. *Der Hornvogel aus Panaya.*

Latham, Vögel, I. p. 291. n. 8. *der Hornvogel aus Panaya.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 144. n. 8. Buceros (Panayensis) rostro compresso, fronte ossea, parum elevata, cultrata, corpore nigro, subtus fusco-rubro, rectricibus flavo-fuscis, apice late nigris.

10. Manillensis. *Der Hornvogel aus Manilla.*

Latham, Vögel, I. p. 292. n. 9. *der Hornvogel aus Manilla.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 145. n. 9. Buceros (Manillensis) rostro plano, supra carinato, cultrato, corpore fusco-nigricante, capite, collo, et subtus albescente, macula aurium nigra, rectricibus fascia rubra.

4. Nasutus. *Der senegalische Hornvogel; (der Tock.)*

Müller, Natursyst. II. p. 163. n. 4. *Ungehörnte.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 100. n. 4. *der senegalsche Hornvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 438. *der senegalische Wasserrabe mit schwarzem Schnabel.*

Brisson, ornitholog. II. p. 206. n. 5. Calao à bec noir du Sénegal.

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 304. *senegalische Naßhornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 292. n. 10. *der schwarzschnäblichte Hornvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 145. n. 10. Buceros (Nasutus) fronte laevi, rectricibus basi apiceque albis.

Forskål, fn. orient. p. IV. n. 4. *Crotophaga* griseo maculata; *Tullaek*, vel *Dymludj.*

β. *Der senegalische Hornvogel mit rothem Schnabel.* (4)

Onomat. histor. nat. IV. p. 437. *der Wasserrabe mit dem rothen Schnabel von Senegal.*

Brisson, ornithol. II. p. 206. n. 6. Calao à bec rouge du Senegal.

Latham, Vögel, I. p. 293. n. 10. Var. A. *der rothschnäblichte Hornvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 145. n. 10. β. Buceros rostro rubro, corpore grisescente nigroque vario, subtus colloque albido, capite gulaque nigro lineatis, rectricibus lateralibus nigris, apice albis.

11. Albus. *Der weiße Hornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 294. n. 11. *der weiße Hornvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 146. n. 11. Buceros (Albus) rostro maxime incurvato nigro, corpore niveo, pedibus nigris.

12. Obscurus. *Der unbestimmte Hornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 294. n. 12. *der Hornvogel mit gewundenem? Schnabel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 70. Wreathed Hornbill.

(4) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 146. n. 12. Buceros (Plicatus) rostro incurvo, fronte elevata septemplicata, corpore nigro, rectricibus albis.

β. B. vertice nigro, corpore griseo nigroque nebuloso, remigibus primoribus nigris apice albis, cauda nigra, rectrice extima utrinque dimidiato alba. *

Latham, Syn. Suppl. p. 71. 2.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 146. n. 12. β.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 8 Gattungen vermehrt, und bey der *ersten* und *vierten* Gattung sind 2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der unregelmäßige Rhinocerosvogel.* Schnabel wie ein Hornvogel; Beine wie ein Toucan; Zunge wie eine Krähe; Größe einer Krähe.

White Reis. nach Neu-Süd-Wallis; in dem Magazin merkw. Reisebeschr. V. p. 127.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Hornvogel aus Gingi.*

Latham, Syn. Supplem. p. 71. Gingi Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 295. n. 13.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 146. n. 13. Buceros (Ginginianus) rostro compresso incurvato, fronte ossea antrorsum subulata, corpore griseo, subtus albo, remigibus fasciaque rectricum intermediarum apice nigris.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 214. Tab. 121. Calao de Gingi.

2. *Der*

2. *Der neuholländische Hornvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 72. New-Holland Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 296. n. 14.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 147. n. 14. Buceros (Orientalis) rostro convexo, carinato, basi gibbosiore, orbitis nudis rugosis, cinereis, corpore, alis caudaque nigricantibus.

3. *Der graue Hornvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 72. Grey Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 296. n. 15.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 147. n. 15. Buceros (Griseus) fronte ossea, antice declinata, postice truncata, corpore griseo, vertice nigro, tectricibus alarum nigro variegatis, remigibus apice albis.

4. *Der Hornvogel mit grünen Flügeln.*

Latham, Syn, Supplem. p. 73. Green-winged Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 296. n. 16.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 147. n. 16. Buceros (Viridis) fronte ossea truncata, corpore nigro, alis virescentibus, rectricibus exterioribus, basi remigum abdomineque albis.

48. GESCHLEHT. BUPHAGA. *Der Ochsenhacker.*

Müller, Natursyst. II. p. 164. Gen. XLVIII.

Leske, Naturgesch. p. 242. Gen. XVII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 100. Gen. . .

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 172. Gen. VII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 346. Gen. VIII.

Bechstein

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 168. Gen. XIII.

Brisson, ornithol. I. p. 279. Gen. XXV.

Latham, allg. Uebers. d. Vögel, I. p. 297. Gen. IX.

Latham, Syst. ornith. I. p. 147. Gen. X.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 223. Gen. VIII.

1. Africana. *Der afrikanische Ochsenhacker.*

Müller, Naturs. II. p. 164. n. 1. *der Afrikanische.*

Leske, Naturgesch. p. 242. Buphaga Africana.

Borowsky, Thierreich, II. p. 100. *der Ochsenhacker, Ochsenfeind.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 172. n. 1. *Buphaga africana.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 168. *der Ochsenhacker.*

Brisson, ornithol. I. p. 279. n. 1. Pique-boeuf.

Büffon, Vögel, VII. p. 360. *der Ochsenhacker;* mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 305. *der Ochsenhacker.*

Latham, Vögel, I. p. 297. n. 1. *der afrikanische Ochsinhacker*. Tab. 15.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 147. n. 1. Buphaga Africana.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 223. *der afrikanische Ochsinhacker.*

49. GESCHLECHT. Crotophaga. *Der Madenfresser.*

Müller, Natursystem, II. p. 165. Gen. XLIX.

Leske, Naturgesch. p. 242. Gen. XVIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 101. Gen. VIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 172. Gen. XVIII.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. I. p. 347. Gen. IX.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 167. Gen. VIII.
Brisson, ornithol. II. p. 91. Gen. LII.
Batsch, Thiere, I. p. 300. Gen. LVI.
Latham, Vögel, I. p. 298. Gen. X.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 148. Gen. XI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 190.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 224. Gen. IX.

1. Ani. *Der kleine Madenfresser.*

Müller, Natursystem, II. p. 165. n. 1. *der Afrikanische.* Tab. V. fig. 4.
Leske, Naturgesch. p. 242. n. 1. *der afrikanische Madenfresser.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 101. n. 1. *der afrikanische Madenfresser.* Tab. 8.
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 172. n. 1. Crotophaga (Ani) pedibus scansoriis.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 167. *der afrikanische Madenfresser.*
Halle, Vögel, p. 253. n. 194. *die große schwarze Dohle.*
Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 351. n. 3. *Dohle mit gewölbtem Schnabel.*
Onomat. histor. nat. V. p. 219. *die große schwarze Dohle.*
Handbuch der Naturgesch. II. p. 193. *der kleine Crotophage.*
Klein, av. p. 64. n. 12. Pica nigra Jamaicensis plumis interspersis purpureis, e viridi resplendentibus, rostro novaculaeformi.
Klein, Vorbereit. p. 112. n. 7. *Dohle mit gewölbtem Schnabel.*

Klein,

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 59. n. 12. *Dohle mit gewölbtem Schnabel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 62. n. 11. *ſchwarzer Heher.*

Briſſon, ornithol. II. p. 92. n. 1. Bout-de-Petun.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 105. *die ganz ſchwarze Dohle.*

Batſch, Thiere, I. p. 305. *der afrikaniſche Madenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. p. 298. n. 1. *der kleine Madenfreſſer.* Tab. 16.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 148. n. 1. Crotophaga (Ani) nigro-violacea, marginibus pennarum cupreo-viridi micantibus, remigibus rectricibusque concoloribus.

Samml. zur Phyſik und Naturgeſch. I. p. 227. *Madenfreſſer.*

Neueſte Mannichfalt. I. p. 566. *Maritjemaat.*

Gerin. ornith. II. p. 53. Tab. 190.

Jonſton, av. p. 189. Ani Braſilienſibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 191. Crotophaga pedibus ſcanſoriis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 224. *der afrikaniſche Madenfreſſer.*

3. MAIOR. *Der groſse Madenfreſſer.*

Briſſon, ornithol. II. p. 93. n. 2. Grand Bout-de-Petun.

Latham, Vögel, I. p. 299. n. 2. *der groſse Madenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 148. n. 2. Crotophaga (Maior) nigro violacea, marginibus pennarum viridibus, remigibus obſcure viridibus, cauda concolore.

Gerin. ornith. II. p. 54. Tab. 191.

2. AM-

2. AMBULATORIA. *Der surinamische Madenfresser.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 166. n. 2. *Surinamiſcher.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 102. n. 2. *der ſurinamiſche Madenfreſſer.*

Batſch, Thiere, I. p. 305. *der ſurinamſche Madenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. p. 300. n. 3. *der ſurinamſche Madenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 149. n. 4. Crotophaga (Ambulatoria) pedibus ambulatoriis.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 191. Crotophaga pedibus ambulatoriis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit einer Gattung vermehrt, denn die dritte iſt neu hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der roth- und ſchwarzbunte Madenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 149. n. 3. Crotophaga (Varia) rufo nigroque varia.

Gerin. ornith. II. p. 54. Tab. 192. Crotophagus varius indicus.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

GLAUCOPIS. *Der Bartvogel.*

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 168. Gen. XIV.

Latham, Vögel, I. p. 300. Gen. XI.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 149. Gen. XII. Callaeas.

Donndorff, Handb. der Thiergeſchichte, p. 224. Gen. X.

1. Ci-

1. CINEREA. *Das Blauauge.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 168. *das aſchgraue Blauauge.*

Latham, Vögel, I. p. 300. n. 1. *der aſchgraue Bartvogel.* Tab. 17.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 149. n. 1. Callaeas Cinerea.

Forſter, Reiſ. Ed. in 8. I. p. 155. *der Bartvogel.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 224. *das Blauauge.*

50. GESCHLECHT. CORVUS. *Der Rabe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 167. Gen. L.

Leske, Naturgeſch. p. 243. Gen. XIX.

Borowsky, Thierreich, II. p. 102. Gen. IX.

Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 172. Gen. XIX.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 360. Gen. XV.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 401. Gen. V.

Funke, Naturgeſch. I. p. 291 ſqq.

Ebert, Naturl. II. p. 55.

Halle, Vögel, II. p. 242.

Pennant, arct. Zool. II. p. 233.

Neuer Schaupl. d. Natur, VII. p. 1. IV. p. 716.

Onomat. hiſt. nat. III. p. 424.

Klein, av. p. 57. Gen. II.

Briſſon, ornithol. I. p. 154. Gen. XIII. p. 156. Gen. XIV.

Büffon, Vögel, VII. p. 27 ſqq.

Batſch, Thiere, I. p. 316. Gen. LXIX.

Latham, Vögel, I. p. 301. Gen. XII.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 150. Gen. XIII.

Hermann, tab. affin. animal. p. 198.

Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 225. Gen. XI.

1. HOTTENTOTTUS. *Der Hottentotten-Rabe.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 167. n. 1. *hottentottiſcher Rabe.* Tab. 6. fig. 1.

Borowſky, Thierreich, II. p. 103. n. 2. *der hottentottiſche Rabe.*

Neuer Schauplatz d. Natur, VII. p. 3. n. 4. *kapſcher Rabe.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 163. n. 10. Choucas au Cap de bonne Eſpérance.

Büffon, Vögel, VII. p. 258. *die Bartdohle;* mit 1 Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 328. *die Bartdohle.*

Latham, Vögel, I. p. 314. n. 10. *die Hottentotten-Krähe.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 156. n. 12. Corvus (Hottentottus) vireſcenti-ater, cauda aequali, myſtacibus longiſſimis.

Gerin. ornith. II. p. 36. Tab. 148.

2. CORAX. *Der Kolkrabe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 168. n. 2. *der Kolkrabe.*

Leſke, Naturgeſch. p. 243. n. 1. *der Rabe.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 103. n. 3. *der gemeine Rabe.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 172 n. 1. Corvus (Corax) ater, dorſo atro caeruleſcente, cauda ſubrotunda; *der Kolk-Rabe.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 360. n. 1. *der gemeine Rabe.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 402. n. 1. *der gemeine Rabe.* p. 412. *der Rabe, Rab, Raab, Raue, ſchwarze Rabe, Aasrabe, Steinrabe, Kielrabe, größte Rabe, groſse Galgenvogel, Kolkraue, Colgrave, Golk- Kulk- Kolk- oder Goldrabe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 291. *der Kolkrabe.*

Ebert, Naturl. II. p. 55. *die eigentlichen Raben.*

Halle, Vögel, p. 242. n. 184. *der gemeine schwarze Rabe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 334. n. 280. *der Rab* u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 233. n. 50. *der Rabe.*

Beckmann, Naturhist. p. 40. a. *die gemeine Krähe.*

Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 2. n. 1. *gemeiner großer Rabe.*

Onomat. histor. nat. III. p. 410. *der Rab, der Rapp.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 158. *der Rabe.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 118. *Kolkrabe.*

Klein, av. p. 58. n. 1. Corvus simpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 109. n. 1. *der Rabe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 57. n. 1. *gemeiner Rabe, großer Galgenvogel.*

Brisson, ornithol. I. p. 156. n. 1. Corbeau.

Büffon, Vögel, VII. p. 27. *der Rabe;* m. 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 328. *der gemeine Rabe.*

Gesner, Vögelb. p. 417. *Rapp.* Fig. p. 418. gut.

Latham, Vögel, I. p. 302. n. 1. *der gemeine Rabe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 74. Raven.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 150. n. 1. Corvus (Corax) ater, dorso caerulescente, cauda subrotunda.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 30. n. 42. *der Kolkrabe.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 292. n. 43. *Colkrabe, gemeiner Rabe.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 68. *der Rabe.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 70. n. 54. *schwarzer Rabe.*

Lepechin,

Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſ. III. p. 13. *die Raben.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 128. *die Raben.*

Steller, Kamtſchatka, p. 194. *Raben.*

Kraſcheninnikow, Kamtſchatka, p. 200. *Raben.*

Cranz, Hiſt. von Grönl. p. 112. *Raben.*

Pontoppidan, Naturh. v. Norw. II. p. 172. *Raue.*

Olaſſen, Reiſe durch Island, I. p. 32. *der Rabe.* p. 118. *Raben.*

White, Naturgeſch. v. England, p. 66. n. 1. *Rabe.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 1. *der Rabe.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 401. *die Raben?*

Fabricius, Reiſ. n. Norwegen, p. 312. *Raben.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 29. n. 35. *der größte Rabe.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 288. n. 56. *Kolkrabe.*

Carver, Reiſe d. Nordamerika p. 383. *Raben.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 261. *Aas-Rabe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 82. *Kolk-Rabe.*

Naumann, Vogelſteller, p. 162. n. 1. *die Raben.*

Naturf. IX. p. 40. n. 42. *Kolkrabe.*

Anweiſ. Vögel zu fangen, u. ſ. w. p. 442. *der Rab.*

Jablonſky, allgem. Lex. p. 864. *Rabe, Kolkrabe.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 402. *der Rabe.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahnen, p. 347. *der große Golkrabe.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 96. n. 1. *der gemeine Rabe.*

Günther, Neſter und Eyer, Tab. 71. *Rabe.*

Bloch: Beſchr. der berlin. Geſellſch. IV. p. 605. *der Kolkrabe.*

Eberhard, Thiergesch. p. 71. *der gemeine Rabe.*
Oekonom. Zool. p. 67. n. 5. *der gemeine Rabe.*
Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 1. *der Rabe.*
Goeze, nützl. All. II. p. 227. n. 30. *der Kolkrabe.*
Merklein, Thierreich, p. 341. *Raab.*
Loniceri, Kräuterbuch, p. 672. *Rapp, Raabe.*
Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 254. *der Rabe.*
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Corvus.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 1. Corvus.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 105. n. 1. Corvus (Corax) ater, dorso caerulescente, cauda subrotunda.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 86. Corvus (Corax) ater, dorso atro-caerulescente, cauda subrotunda.
Kramer, Austr. p. 333. n. 1. Corvus ater dorso caerulescente.
Brünich, ornith. bor. p. 8. n. 27. Corvus Corax.
Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 244. Corvus; *ein Kol Rabe, Rabe, Rappe.*
Moehring, av. gen. p. 31. n. 6. Corvus.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. Corvus Corax.
Jonston, av. p. 38. Corvus.
Plin. hist. nat. L. X. c. 12. Corvi.
Aristot. hist. anim. L. VI. c. 6. n. 74. Κοραξ.
Gerin. ornith. II. p. 32. Tab. 14.
Rangon. diss. de Corvo. Stettin 1670. 8.
Baer. Korakophonia etc. Brem. 1700. 4.
Nessel, diss. de avibus Apollinis, Cygno et Corvo. Ups. 1725. 8.
Tourner, diss. de av. Apoll. Cygno et Corvo. Ups. 1725. 8.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 225. n. 1. *der Kolkrabe.*

β. Cor-

β. Corvus varius. *Der bunte Rabe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 171. *Cacalotl.*

Briſſon, ornithol. I. p. 157. Corbeau varié.

Büffon, Vögel, VII. p. 55. *der Rabe aus Mexico.*

Latham, Vögel, I. p. 303. n. 1. Var. A. *der bunte Rabe.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 150. β. Corvus varius.

Berlin. Samml. VIII. p. 361.

γ. Corvus albus. *Der weiſse Rabe.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 171. *weiſse Raben.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 412. *ganz weiſse Raben.*

Briſſon, ornith. I. p. 157. B. Corbeau blanc.

Büffon, Vögel, VII. p. 55. *weiſse Raben.*

Latham, Vögel, I. p. 304. n. 1. Var. B. *der weiſse Rabe.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 151. γ. Corvus candidus.

Zorn, Petinoth. II. p. 53. *ein weiſser Rabe.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 57. ad n. 1. *ein weiſſer Rabe.*

Götz: Naturforſch. XVI. p. 46. n. 2. *ein ſchneeweiſser Rabe.* n. 3. *ein weiſser Rabe.* p. 48. n. 4. *ein weiſser Rabe.*

Götz, Naturgeſch. einiger Vögel, p. 112. n. 2. *ein ſchneeweiſser Rabe.* p. 115. n. 3. *ein weiſser Rabe.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 409. *die weiſsen Raben.*

Berlin. Samml. VIII. p. 359.

Witzel: Eph. nat. curioſ. Dec. I. an. 3. obſ. 57. p. 81.

Francheville: nouv. mem. de l'acad. roy. à Berl. 1773. p. 23.

δ. *Der nördliche schwarz und weißbunte Rabe.* (5)
Müller, Natursyst. II. p. 171.
Brisson, ornitholog. I. p. 163. Corvus borealis albus; *Corbeau blanc du Nord.*
Büffon, Vögel, VII. p. 56. *der weiße nordische Rabe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 151. δ. Corvus borealis albus.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 233. ad n. 1. *eine Race von schwarz und weißer Farbe.*
Pontoppidan, Naturgesch. von Norwegen, p. 172. *halb weiße und halb schwarze Raben.*
Berlin. Samml. VIII. p. 359 *der weiß und schwarzbunte Rabe.* Titelkupf.
Eberhard, Thiergesch. p. 72. *der nordische weiße Rabe.*
Mus. Worm. p. 292. Corvus versicolor Feroensis.

30. Clericus. *Der Pfaffe.* (6)
Latham, Syst. ornithol. I. p. 152. n. 4. β. Corvus totus niger, mento albo, rostri basi cinerea.

31. Australis. *Der Süd-See-Rabe.*
Latham, Vögel, I. p. 304. n. 2. *der Süd-See-Rabe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 151. n. 2. Corvus (Australis) nigricans, gulae pennis laxioribus, remigibus fuscescentibus.

3. Corone. *Die Rabenkrähe.* (7)
Müller, Natursyst. II. p. 172. n. 2. *die schwarze Krähe.*

Leske,

(5) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(6) Nach *Latham* eine Spielart von *Corvus Corone.*

(7) Flügelweite über 3 Fuss. Gewicht 20 bis 22 Unzen. Liebt vorzüglich die Feldhölzer und Waldungen, die ans Feld gränzen.

Leske, Naturgeſch. p. 243. n. 2. *die ſchwarze Krähe.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 110. n. 11. *die ſchwarze Krähe, Rabenkrähe.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 173. n. 2. Corvus (Corone) atro-caeruleſcens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis; *die Raben-Krähe.*

Bechſtein, Naturg. I. p. 362. n. 2. *die Rabenkrähe.*

gränzen. Sie ſind Strich-und Standvögel, nachdem ihr Sommeraufenthalt beſchaffen iſt. Diejenigen, die in kleinen Feldhölzern wohnen, ſchlagen ſich im Herbſt in groſsen Schaaren zuſammen, ziehen am Ende des Octobers bey eintretender ſtürmiſchen Witterung von ihrer Heimath weg, von einer groſsen Wieſe zur andern, ſuchen im Winter am Tage bergigte Gegenden, Wieſengründe, offene Felder, wo Miſt hingefahren iſt, und ziehen des Nachts mit groſsem Geſchrey in die Wälder, wo ſie Schutz vor Sturm und Wetter haben. Im März gehen ſie wieder in ihre Heimath zurück. Diejenigen hingegen, die am Fuſs eines waldigen, vorzüglich mit Schwarzholz beſetzten Kettengebirgs wohnen, ziehen niemals weg, und begeben ſich im October in einige Familien zuſammen. Die Standvögel bauen einzeln, die Strichvögel aber zuſammen in Feldhölzern, und es giebt Gegenden, wo ſich, wie bey den Saatkrähen, 20 bis 30 Neſter auf einem Baume befinden, die oft mit ihren Unterlagen, die gewöhnlich aus Dornen beſtehen, unter einander, und mit denen auf den nahe ſtehenden Bäumen verbunden ſind. Das Weibchen legt 5 bis 6 Eyer, welche blaugrün, und mit groſsen und kleinen aſchgrauen, und olivenbraunen Flecken beſetzt ſind, die am ſtumpfen Ende zuſammenflieſsen. Männchen und Weibchen brüten ſie in 18 bis 20 Tagen gemeinſchaftlich aus. Die Landleute eſſen in manchen Gegenden das Fleiſch, und vergleichen es mit dem Taubenfleiſche. Beſſer ſind die Eyer. Sie können auch gezähmt werden, und Worte nachſprechen lernen. — *Briſſon* rechnet den *Corvus verſicolor Feroenſis*, aus dem *Muſ. Worm.* und *Latham* den vorher angeführten *Corvus Auſtralis*, als Spielart mit hieher.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 412. n. 2. *die Rabenkrähe.* p. 424. *die Krähe, Krahe, schwarze Kräha, der schwarze Rabe, der schwarze Krährabe, der kleine Rabe, die Hauskrähe;* in Thüringen: *der Rabe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 293. *die schwarze Krähe.*

Ebert, Naturl. II. p. 56. *die gemeine Krähe.*

Halle, Vögel, p. 247. n. 187. *die schwarze Rabenkrähe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 340. n. 281. *die Rabenkrähe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 234. n. 51. *die Aaskrähe.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 716. n. 1. *Rabenkrähe.*

Onomat. histor. nat. III. p. 427. *die Hauskrähe, schwarze Krähe.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 162. *die Rabenkrähe.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 118. *Rabenkrähe.*

Klein, av. p. 58. n. 1. Cornix nigra.

Klein, Vorbereit. p. 111. n. 1. *schwarze Krähe, Raben Krähe.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 58. n. 3. *Rabenkrähe.*

Gesner, Vögelb. p. 344. *Kräe* mit 1 zieml. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 157. n. 2. Corneille.

Büffon, Vögel, VII. p. 77. *die Raben - Krähe;* mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 329. *die Rabenkrähe.*

Latham, Vögel, I. p. 304. n. 3. *die Rabenkrähe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 151. n. 4. Corvus (Corone) atro - caerulescens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis.

Beseke,

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 31. n. 43. *die ſchwarze Krähe.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 293. n. 44. *ſchwarze Krähe, Rabenkrähe.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 70. n. 55. *ſchwarze Krähe.*

Lepechin, Tagebuch d. ruſſ. Reiſ. III. p. 13. *die Krähen.*

Steller, Kamtſchatka, p. 194. *Kräen.*

Carver, Reiſ. d. Nordamer. p. 383. *Krähen.*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 166. n. 2. *Blaa-Raage.*

Kraſcheninnikow, Kamtſchatka, p. 200. *Krähen.*

Forſter, Reiſ. Ed. in 8. I. p. 28. *Krähen.*

S. G. Gmelin, Reiſ. durch Ruſsl. I. p. 50.

Georgi, Reiſ. I. p. 165. *Turlak.*

Meyer, Thiere, I. Tab. 99.

Schneider, zoolog. Abhandl. p. 157. *der gemeine Rabe.*

Bloch: Beſchäfft. d. berlin. Geſellſch. IV. p. 605. *die ſchwarze Krähe.*

Krünitz, Encyklop. XLVI. p. 456. *die Rabenkrähe, ſchwarze Raubkrähe, Hauskrähe, Feld- oder Mittelrabe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 30. n. 36. *der gemeine Rabe, ſchwarze Krähe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 261. *der etwas kleinere ganz ſchwarze Rabe.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 82. *kleiner Rabe, oder ſchwarze Krähe.*

Naumann, Vogelſteller, p. 162. n. 2. *die ſchwarzen Krähen.*

Naturforſch. IX. p. 41. n. 43. *ſchwarze Krähe.*

Anweiſung Vögel zu fangen u. ſ. w. p. 145. *die Krähe.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 348. n. 11. *die schwarze Raubkrähe.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 97. n. 2. *die Rabenkrähe.*

Oekonom. Zool. p. 67. n. 6. *die Krähe.*

Schlef. patriot. ökon. Nachr. 1776. St. 12. p. 94. St. 27. p. 212. — 1772. St. 15. p. 114.

Neue Mannichfalt. IV. p. 447.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 105. n. 2. Corvus (Corone) atro-caerulescens, cauda rotundata, rectricibus acutis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 87. Corvus (Corone) atro-caerulescens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis.

Brünich, ornith. bor. p. 9. n. 29. Corvus Corone.

Hermann, tab. affin. animal. p. 199. 201. Corvus Corone.

Jonston, av. p. 40. Cornix.

Plin. hist. nat. Lib. X. c. 12. Cornix.

Lucret. de rer. nat. L. 5. v. 1083. Cornices.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 89. Κορωνη.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 226. n. 2. *die Rabenkrähe.*

β. *Die bunte Rabenkrähe.*

Müller Natursyst. II. p. 173. *Krähen mit weißen und schwarzen Federn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 110. 2. *die bunte Krähe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 424. n. 1. *weiß- und schwarz geschäckte Rabenkrähe.*

Brisson, ornitholog. I. p. 158. A. Corneille variée.

Büffon, Vögel, VII. p... *schwarz- und weißbunte Rabenkrähen.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 306. n. 3. Var. A. *die bunte Krähe.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 152. γ. Cornix varia.

γ. *Die weiße Rabenkrähe.*
Müller, Naturſyſtem, II. p. 173. *weiße Krähen.*
Borowſky, Thierreich, II. p. 110. b. *die weiße Krähe.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 424. n. 2. *eine weiße Rabenkrähe.*
Briſſon, ornithol. I. p. 158. B. Corneille blanche.
Buffon, Vögel, VII. p. 85. *weiße Krähen.*
Latham, Vögel, I. p. 306. n. 3. Var. B. *die weiße Krähe.*
Latham, Syn. I. p. 372. White Crow.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 152. δ. Cornix candida.
Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 243. Cornix candida; *eine weiße Krähe.*
Salerne, ornithol. p. 91. n. 9.

δ. *Eine Rabenkrähe mit grauem Halsbande.* *
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 424. n. 3.

4. Frugilegus. *Die Saatkrähe.* (8)
Müller, Naturſyſt. II. p. 173. *die Saatkrähe.*
Leske,

(8) Länge 1 Fuſs 7 Zoll. Flügelweite 3 Fuſs 7 Zoll. Vermehrt ſich zweymal im Jahre, und legt ſchon zu Ende des Märzes zum erſten Male Eyer. Die Eyer ſind grünlich, mit vielen blauen Flecken, beſonders am ſtumpſen Ende bezeichnet, der Anzahl nach 3 bis 5. Dieſe Thiere halten ſich meiſtens in groſsen Geſellſchaften beyſammen, lieben beſonders Feldhölzer, und ziehen im Herbſt in Schaaren weg. In Frankreich verkündigen ſie als Zugvögel die Ankunft des Winters, und im nördlichen Deutſchland die Ankunft des Frühlings.

Leske, Naturgesch. p. 243. n. 3. *die Saatkrähe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 105. n. 4. *die schwarze Saatkrähe, Karechel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 173. n. 3. Corvus (Frugilegus) ater, fronte cinerascente, cauda subrotunda; *die Saatkrähe, der Karechel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 362. n. 3. *die Saatkrähe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 4. *die Saatkrähe.* p. 438. *die schwarze Saatkrähe, schwarze Feldkrähe, Saatrabe, Kranveitl (?) Karechel; Ackerkrähe, Rocke, Rooche, Rouch, Rauch, Rück, Karok, Roek, Rouck, der pommersche Rabe;* in Thüringen: *Nachtschnabel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 293. *die Saatkrähe.*

Ebert, Naturl. II. p. 56. *die Saatkrähe.*

Halle, Vögel, p. 250. n. 189. *die schwarze Saatkrähe, um den Schnabel weiß, krätzig.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 343. n. 282. *die Saatkrähe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 238. A. *die Saatkrähe.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 119. *Saatkrähe.*

Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 3. n. 5. *der Getraidefresser.*

Onomat. histor. nat. III. p. 425. *Karechel.*

Klein, av. p. 59. n. 3. Cornix nigra, frugilega.

Klein, Vorbereit. p. 111. n. 3. *Karechel, Rooke, Rooche, Rouch.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 58. n. 6. *Karechel.*

Klein, stemmat. av. p. 10. Tab. 10. fig. 3. a. b.

Klein,

Frühlings. In manchen Provinzen Deutschlands wird nicht nur das Fleisch der jungen, sondern auch der alten als schmackhaft gegessen. Auch die Eyer werden zu diesem Gebrauch ausgenommen.

Klein, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 10.
Briſſon, ornithol. I. p. 158. n. 3. Corneille moiſſonneuſe.
Büffon, Vögel, VII. p. 98. *die Saat-Krähe;* mit 1 Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 330. *die Saatkrähe.*
Latham, Vögel, I. p. 307. n. 4. *die Saat-Krähe.*
Latham, Syn. Supplem. p. 76. Rook.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 152. n. 5. Corvus (Frugilegus) ater, fronte cineraſcente, cauda ſubrotundata.
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 293. n. 45. *Saatkrähe.*
Fiſcher, Zuſ. z. Naturgeſch. von Livland, p. 44. n. 492. *ſchwarze Saatkrähe, Ackerkrähe.*
White, Naturgeſch. von Engl. p. 66. n. 4. *ſchwarze Krähe.*
Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 166. n. 3. *Raage.*
Pallas, Reiſe, I. p. 98. II. p. 290. *Kornkrähen.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 11. *die Kornkrähen.*
Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 288. n. 61. *die Saatkrähe.*
Naturforſch. VIII. p. 41. n. 44. *Saatkrähe.*
Döbel, Jägerprakt. p. 83. *Rücke.*
Naumann, Vogelſteller, p. 163. *die ſchwarzen Feldkrähen.*
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 100. n. 4. *die Saatkrähe.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 72. *die Saatkrähe.*
Meidinger, Vorleſ. I. p. 116. n. 3. *die Saatkrähe.*
Goeze, nützl. All. II. p. 306. n. 1. *die Saatkrähe.*
Krünitz, Encykl. XLVI. p. 488. *die Saat-Krähe.*
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 2. Cornix frugivora.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 105. n. 3. Corvus (Frugilegus) ater fronte cinerascente.

Kramer, Austr. p. 333. n. 2. Corvus ater; *schwarze Kran, schwarze Krähe.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 242. Cornix nigra frugilega; *ein Rooke*, sil. *Rooche*, *Rouch*, *schwarze Kraye.*

Jonston, av. p. 41. Cornix frugivora.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 226. n. 3. *die Saatkrähe.*

5. Cornix. *Die Nebelkrähe.* (9)

Müller, Natursf. II. p. 174. n. 5. *die Nebelkrähe.*

Leske, Naturgesch. p. 244. n. 4. *die Nebelkrähe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 105. n. 5. *die Nebelkrähe, der Mehlrabe.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 173. n. 4. Corvus (Cornix) cinerascens, capite, iugulo, alis caudaque nigris; *die Krähe, Nebelkrähe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 664. n. 4. *die Nebelkrähe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 425. n. 3. *die Nebelkrähe.* p. 432. *Krähe, Kräge, Holzkrähe,*

(9) Länge 1 Fuſs 10 Zoll. Flügelweite 3 Fuſs 3 Zoll. Gewicht 23 bis 24 Unzen. Hat in ihrer Lebensart fast alles mit der Rabenkrähe gemein, mit welcher sie sich auch im Nothfall zuweilen paart. Nistet gern in lebendigen Hölzern, auch in Gärten, des Jahrs zweymal. Das Nest steht einzeln, ist nicht allezeit hoch angelegt, besteht aus kleinen, fest zusammen gebauten Reisern, mit Wolle und Haaren ausgefüttert. Legt 4 bis 6 längliche, hellgrüne mit feinen braunen Strichen und Flecken versehene Eyer, die 18 Tage bebrütet werden. Stellt besonders den Enten-, Hühner-, Fasanen- u. a. Eyern nach. Kömmt bey groſser Kälte häufig in Städte und Dörfer, und friſst alles was ihr vorkömmt. Das Fleisch ist völlig ungenieſsbar.

krähe, Aſtkrähe, Aaskrähe, Winterkrähe, Schildkrähe, Sattelkrähe, bunte und graue Krähe, grauer Rabe, grauer Krähraabe, Mehlrabe, graubunte Krähe, Kranveitl, Urana.

Funke, Naturgeſch. I. p. 294. *die graue Krähe, Mantelkrähe.*

Ebert, Naturl. II. p. 57. *die Nebelkrähe.*

Halle, Vögel, p. 249. n. 122. *die graue Krähe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 346. n. 283. *die Nebelkrähe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 239. B. *die Nebelkrähe.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 716. n. 2. *graubunte Krähe.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 424. *die Schildkrähe.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 162. *die Nebelkrähe.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 119. *die Nebelkrähe.*

Klein, av. p. 59. n. 2. Cornix cinerea.

Klein, Vorbereitung, p. 111. n. 2. *graue bunte Krähe.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 58. n. 5. *graubunte Krähe.*

Klein, ſtemm. av. p. 9. Tab. 11. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 9.

Gesner, Vögelb. p. 347. *Nebelkräe;* mit 1 Fig.

Briſſon, ornithol. I. p. 150. n. 4. Corneille mantelée.

Büffon, Vögel, VII. p. 114. *die graue Krähe;* mit 1 Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 330. *die Nebelkrähe.*

Latham, Vögel, I. p. 308. n. 5. *die Nebelkrähe, Holzkrähe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 77. Hooded Crow.

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 153. n. 9. Corvus (Cornix) cinerafcens, capite, iugulo, alis caudaque nigris.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 31. n. 44. *die Nebelkrähe.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 294. n. 46. *Nebelkrähe, gemeine Krähe.*

Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 70. *die Nebelkrähe.*

Fiſcher, Livland, p. 70. n. 56. *gemeine Krähe.*

Leem, Lappland, p. 128. *Krähen.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 4 *Krähe.*

Pontoppidan, Norwegen, p. 156. *Krage, Kraako, die Krähe.*

White, Engl. p. 61. n. 4. *graue Krähe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 31. n. 37. *graubunte Krähe.*

Linné, auserleſ. Abh. II. p. 288. n. 62. *die Nebelkrähe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 263. *die Krahe, Nebelkrähe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 82. *Krähe.*

Naumann, Vogelſteller, p. 162. *Schildkrähen.*

Naturforſch. IX. p. 41. n. 45. *Nebelkrähe.*

Anweiſ. Vögel zu faugen, p. 347. *Nebelkrähe.*

Mellin, Wildbahn. p. 348. n. 12. *die Nebelkrähe, Schild- oder Sattelkrähe.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 99. n. 3. *die Nebelkrähe.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 247. *Nebelkrähe.*

Loniceri, Kräuterb. p. 672. *Kräe.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 116. n. 4. *die Nebelkrähe.*

Goeze, nützl. All. II. p. 362. n. 2. *die Nebelkrähe.*

Krünitz, Encyklop. XLVII. p. 509. *die graue oder graubunte Krähe.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Cornix.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 18. n. 3. Cornix cinerea.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 105. n. 4. Corvus (Cornix) cinerascens, capite, gula, alis caudaque nigris.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 88. Corvus (Cornix) cinerascens, capite, iugulo, alis caudaque nigris.
Kramer, Austr. p. 333. n. 3. Corvus] capite, gula, alis caudaque nigris, trunco cinerascente.
Brünich, ornith. bor. p. 9. n. 3. Corvus Cornix.
Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 241. Cornix cinerea; *eine Schilt-Krahe,* sil. *Nabelkraye, Winter-Krahe.*
Hermann, tab. affin. anim. p. 199. C. Cornix.
Jonston, av. p. 41. Cornix cinerea.
Gerin. ornith. II. p. 35. Tab. 146. 147.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 277. n. 4. *die Nebelkrähe.*

β. *Die weiße Nebelkrähe.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 1.
Bock, Preussen, IV. p. 295.
Büffon, Vögel, VII. p. 131.
Masch: Naturforsch. XIII. p. 17.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. ad n. 88.

γ. *Die schwarz- und weißbunte Nebelkrähe.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 2.

δ. *Die schwarze Nebelkrähe.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 3.
Büffon, Vögel, VII. p. 131.

22. Dauricus. *Der daurische Rabe.*
Büffon, Vögel, VII. p. 153. *der daurische Rabe.*

Latham, Vögel, I. p. 310. n. 6. *die daurische Krähe.* Tab. 18.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 154. n. 8. Corvus (Dauricus) ater, nucha canescente, cervice pectoreque albis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 4. n. 8. Corvus *dauricus;* Mongalo-Buraetis *Alactu.*

β. *Büffon*, Vögel, VII. p. 153. *eine beynahe ganz schwarze Abart.*

Latham, Vögel, I. p. 311. *eine fast ganz schwarze Spielart.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 154. β. Corvus totus niger, cervice iuguloque fuscis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 4. Varietas fere tota nigra.

23. CALCEDONICUS. *Die neucaledonische Krähe.*

Latham, Vögel, I. p. 311. n. 7. *die Neu-Kaledonische Krähe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 154. n. 9. Corvus (Calcedonicus) cinereus, rostro, pedibus, palpebris caudaque nigris.

24. JAMAICENSIS. *Die Krähe aus Jamaica.*

Brisson, ornithol. I. p. 160. n. 5. Corneille de la Jamaique.

Büffon, Vögel, VII. p. 134. *die jamaikaische Krähe.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 351. n. 4. *Dohle mit weißen Nasenlöchern.*

Klein, av. p. 59. n. 5. Cornix nigra, garrula.

Klein, Vorbereitung, p. 112. n. 5. *Dohle mit weiten Nasenlöchern.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 59. n. 13. *Dohle mit weiten Naselöchern.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 311. n. 8. *die Krähe aus Jamaika.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 154. n. 10. Corvus (Jamaicensis) toto corpore artubusque nigris.

6. MONEDULA. *Die Dohle.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 174. n. 6. *die Dohle.*

Leske, Naturgesch. p. 244. n. 5. *die Dohle.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 106. n. 6. *die Dohle.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 173. n. 5. Corvus (Monedula) fuscus, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris; *die Dohle.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 364. n. 4. *die Dohle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 439. *die Dohle.* p. 446. *Tul, Dhul, Thale, Dachicke, Tole, graue Dohle, Zschokerll, Tahe, Doel, Aelke, Kayke, Gacke, Schneegacke, Thalk, Klaas, Wachtel, Schneedohle.*

Funke, Naturgesch. I. p. 295. *die Dohle.*

Ebert, Naturl. II. p. 57. *die Dohle.*

Halle, Vögel, p. 251. n. 190. *die Dohle.*

Meyer, Thiere, p. 6. Tab. 20.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 354. n. 284. *die Dohle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 239. C. *die Dohle.*

Beckmann, Naturhist. p. 41. *b. die Dohle.*

(10) Ein scheuer, furchtsamer Vogel, der schwer zu schiessen ist. Lebt gern in Gesellschaft der Rabenkrähen und Saatkrähen. Brütet jährlich zweymal. Frisst Regenwürmer, Erdmaden, Getraide, Hülsenfrüchte, grüne Saat, Kirschen u. d. seltener Fleisch. Sucht auch die Rebhühner- und Lercheneyer auf. Lernt sprechen. Die gezähmten stehlen wie die Raben, alles was glänzt; ja die in der Freyheit rauben sich sogar unter einander die Materialien zum Bau des Nestes. Ist in den nördlichen Gegenden Zugvogel. Das Fleisch wird in verschiedenen Ländern gegessen.

Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 350. *Dohle.*
Onomat. hist. nat. V. p. 217. *die Dohle, Thole.*
Handbuch der Naturgesch. II. p. 163. *die Dohle.*
Handbuch d. deutschen Thiergesch. p. 119. *die Dohle.*
Klein, av. p. 59. n. 4. Cornix gracula, Monedula, Graculus, Garrulus.
Klein, Vorbereit. p. 112. n. 4. *Dohle, Thale, Thole, Aelke.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 59. n. 10. *Dohle.*
Klein, stemmat. av. p. 10. Tab. 11. fig. 2. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 4.
Gesner, Vögelb. p. 532. *Tul.* Fig. p. 534.
Brisson, ornithol. I. p. 160. n. 6. Choucas.
Büffon, Vögel, VII. p. 137. *die Dohle.* p. 145. *die graue Dohle;* m. 1 Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 328. *die Dohle.*
Latham, Vögel, I. p. 312. n. 9. *die gemeine Dohle.*
Latham, Syn. Suppl. p. 78. *Jackdaw.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 154. n. 11. Corvus (Monedula) fusco-nigricans, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris.
Beseke, Vögel Kurl. p. 32. n. 45. *die Dohle.*
Bock, Preussen, IV. p. 296. n. 47. *die Dohle.*
Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 71. *die schwarze Dohle?*
Fischer, Livl. p. 71. n. 57. *Dohle.*
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 166. n. 5. *Dohle.*
Pontoppidan, Norwegen, II. p. 124. *Allike, Kaa, Kaye, Raage.*
Georgi, Reise d. Russl. I. p. 165.
Pallas, Reise, II. p. 290. *Dohlen.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 11. *Dohlen.*

Scopoli,

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgefch. I. p. 32. n. 38. *die Dohle oder Thole.*

Linné, auserlef. Abh. II. p. 289. n. 63. *die Dohle.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 141. 263. *die Dohle.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 83. *die Dohle.*

Naumann, Vogelfteller, p. 163. n. 5. *die Dohlen oder Schneekrähen.*

Naturforfch. IX. p. 42. n. 46. *Dohle.*

Anweif. Vögel zu fangen, p. 145. *die Dohle.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 273. *Dohle.*

Krünitz, Encyklop. IX. p. 358. *Dohle.*

Bechftein, Mufterung fchädl. Th. p. 101. n. 5. *die Dohle.*

Günth. Neft. u. Eyer, p. 51. Tab. 11. *Dohle.*

Eberhard, Thiergefch. p. 72. *Dohlen.*

Oekonom. Zool. p. 67. n. 7. *die Dohle.*

Meidinger, Vorlef. I. p. 116. n. 5. *die Dohle.*

Merklein, Thierreich, p. 333. *Doolen oder Tulen.*

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 239. *Dohlen.*

Loniceri, Kräuterbuch, p. 672. *Dohle;* m. 1 mittelmäfs. Fig.

Linné, Syft. Nat. Edit. II. p. 52. Monedula.

Linné, Syft. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 5. Monedula.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 5. Corvus (Monedula) fufca, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 89. Corvus (Monedula) fufcus, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris.

Kramer, Auftr. p. 334. n. 4. Corvus fronte nigra, occipite incano, corpore fufco, alis caudaque nigris; *Tagerl*, *Dohle*, *Tfchockerl.*

Brünich, ornith. bor. p. 9. n. 31. Corvus Monedula.

Schwenkfeld, aviar. Silef. p. 305. Monedula; *ein Thale, Tole, Tule, Aelcke.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. Monedula.
Jonston, av. p. 42. Monedula.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. L. 17. c. 14. Monedula.
Aristot. hist. anim. L. IX. c. 31. n. 199. Λυκος.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 228. n. 5. *die Dohle.*

β. *Die Dohle mit dem Halsbande.*
Müller, Natursyst. II. p. 175. a. *die Schweitzerdohle mit weißem Kragen.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 106. a. *die Schweitzerdohle mit weißem Kragen.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 446. n. 1. *die Dohle mit dem Halsbande.*
Brisson, ornithol. I. p. 161. A. Choucas à collier.
Büffon, Vögel, VII. p. 146. *die Dohle aus der Schweitz.*
Latham, Vögel, I. p. 313. n. 9. Var. A. *die Dohle mit dem Halsbande.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 155. β. Monedula torquata.
Jonston, av. p. 43. aliud Monedulae genus.

γ. *Die weiße Dohle.*
Müller, Natursystem, II. p. 175. b. *der schlesische kleine weiße Rabe.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 106. b. *die weiße Dohle.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 446. n. 2. *die weiße Dohle.*
Brisson, ornith. I. p. 161. B. Choucas blanc.
Büffon, Vögel, VII. p. 146. *die weißen Dohlen.*
Latham, Vögel, I. p. 313. n. 9. Var. B. *die weiße Dohle.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 155. γ. Monedula candida.

δ. *Die*

δ. *Die schwarze Dohle.* [1]

Müller, Natursystem, II. p. 175 c. *die schwarze Dohle.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 107. c. *die schwarze Dohle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 3. *die schwarze Dohle.*

Brisson, ornithol. I. p. 162. n. 7. Choucas noir.

Büffon, Vögel, VII. p. 145. *die schwarze Dohle, Chough, Chouc;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 313. n. 9. Var. C. *die schwarze Dohle.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 155. δ. Corvus splendide niger, punctulis albis, oculos ambientibus.

ε. *Die ganz schwarze Dohle mit rothen Schnabel und Füßen.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 155. ε. Monedula nigerrima, rostro pedibusque miniatis.

ζ. *Die krummschnäblige Dohle.*

Büffon, Vögel, VII. p. 147. *Dohle mit weißen Flügeln, und krummem Schnabel.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 306. Monedula rostro adunco; *krumbschnablichte Tale.*

η. *Die Kreutzdohle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 4. *die Kreutzdohle.*

Büffon, Vögel, VII. p. 147. *Dohle, mit kreutzweise gelegtem Schnabel.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 306. Monedula crucigera; *eine Creutz-Tale.*

θ. *Die bräunliche Dohle mit weißen Schultern.*

(1) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

ι. *Die bunte Dohle.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 5. *Bunte Dohle, vorzüglich mit weißen Schwanz und Flügeln.*

κ. *Die ganz schwarze Dohle, mit grauem Hinterkopfe.* *
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 156. ζ. Corvus totus niger, occipite incano.
Philos. Transact. lvii. p. 347. Monedula tota nigra.

7. GLANDARIUS. *Der Holzheher.*(2)
Müller, Natursyst. II. p. 175. *der Holzhäher*.
Leske, Naturgesch. p. 244. n. 6. *der Nußheher*.
Borowsky, Thierreich, II. p. 108. n. 8. *der Holzhäer; Nußbeißer, Waldhäher.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 174. n. 6. Corvus (Glandarius) tectricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo-variegato; *der Holzheher, Marcolph, Hetzle, Herrenvogel.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 366. n. 7. *der Holzheher.*
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 149. n. 7. *der Holzheher.* p. 457. *Nußheher, Waldheher, Nußbeißer, Heher, Heyer, Eichelheher,*

(2) Einer der schönsten europäischen Vögel. Wird nicht so leicht gezähmt, als Raben und Krähen, lernt aber doch leichter als jene Worte nachsprechen. Hält sich vorzüglich in Schwarz- und Laubhölzern auf. Wandert vom Ende des Octobers bis im März in Gesellschaft von zweyen bis sechsen, wo immer einer *hinter* dem andern herfliegt. Nistet auf Eichen, Buchen und Fichten, hoch und niedrig. Legt 5 bis 7 grünlich graue, mit kleinen schwarzen Flecken bezeichnete Eyer. Brütet 16 Tage. Wird 8 bis 10 Jahr alt. Das Fleisch ist, vorher gekocht, und dann gebraten, essbar.

her, Eichelrabe, Hätzler, Hatzler, Baumhazel, Jäk, Marcolph, Holzschreyer, Horrevogel, Häger, Markwart, Markolfus, Heerholz, Herold, Nußhacker, Bröſexter, Eichelköhr, Schoia.

Funke, Naturgeſch. I. p. 297. *der Nußheher.*

Halle, Vögel, p. 258. n. 203. *der rothgraue Holzſchreier, Eichelheher.*

Meyer, Thiere, II. p. 13. Tab. 45.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 356. n. 285. *der Heher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 240. E. *der Nußheher.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 741. n. 1. *Holzheher.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 434. *der Holzheher.*

Handbuch der Naturgeſch. II. p. 167. *der Holzheher, Hatzler.*

Handb. der deutſchen Thiergeſch. p. 120. *Holzheher, Jäk.*

Klein, av. p. 61. n. 2. Pica glandaria.

Klein, Vorbereit. p. 115. n. 2. *Holzheher, Heerholz, Holzſchreyer, Hatzler.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 60. n. 2. *Holzheher.*

Klein, ſtemmat. av. p. 10. Tab. 12. fig. 4. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 22. Tab. 8. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 26. *Häher oder Hatzler.* Fig. p. 27. gut.

Briſſon, ornithol. I. p. 168. Geay.

Büffon, Vögel, VII. p. 219. *der Heher;* m. 1 Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 326. *der Holzhäher.*

Latham, Vögel, I. p. 318. n. 19. *der Nußheker, Holzheher.*

Latham, Syn. Supplem. p. 79. Jay.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 157. n. 18. Corvus (Glandarius) tectricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 32. n. 46. *der Holzheher.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 297. n. 48. *der Holzheher.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 75. *der Nußheher.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 71. n. 58. *Heher, Marquard.*

Lepechin, Tagebuch d. russ. Reis. II. p. 5. *Nußheher.*

Georgi, Reis. d. Russl. I. p. 165.

S. G. Gmelin, Reis. durch Sibirien, I. p. 50.

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 6. *Schwarzspecht.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 33. n. 39. *der Waldhäher.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 288. n. 59. *Holzheher.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 265. *der Wald-Heher.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 50. *Heyer, Nuß-Heyer.*

Naumann, Vogelsteller, p. 129. *Häger, Nußheher.*

Naturforsch. IX. p. 43. n. 47. *der Holzhäher.*

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 15. *der Häher.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 451. n. 14. *der Holzheher.*

Anweisung Vögel zu fangen u. s. w. p. 274. *der Häher.*

Loniceri, Kräuterb. p. 673. *Heher, Jäckel.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 103. n. 7. *der Holzhäher.*

Goeze, nützl. All. II. p. 362. n. 3. *der Holzheher.*

Jablonsky,

Jablonsky, allgem. Lex. p. 441. *Heher.*
Krünitz, Encyklop. XX. p. 637. *Holzhäher.*
Meidinger, Vorlef. I. p. 116. n. 6. *der Nußheher.*
Merklein, Thierreich, p. 251. *Hähr.*
Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 242. *Hetzel oder Häher.*
Linné, Syft. Nat. Edit. II. p. 52. Glandaria.
Linné, Syftem. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 7. Pica glandaria.
Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 7. Corvus (Glandarius) tectricibus alarum caeruleis, lineis transverfis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 90. Corvus (Glandarius) tectricibus alarum caeruleis, lineis transverfis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato.
Kramer, Auftr. p. 334. n. 7. Corvus variegatus, tectricibus alarum caeruleis, lineis transverfis albis nigrisque; *Nußheher.*
Brünich, ornithol. bor. p. 9. n. 33. Corvus Glandarius.
Schwenkfeld, aviar. Silef. p. 336. Pica glandaria; *ein Nus-Här, Nuß-Hecker, Hätzler, Holzfchreier, Herrenvogel, Marcolfus.*
Hermann, tab. affin. anim. p. 198. C. Glandarius.
Jonfton, av. p. 44. Pica glandaria.
Gerin. ornith. II. p. 43. Tab. 161.
Schaefer, elem. ornith. Tab. 39.
Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 228. n. 6. *der Holzheher.*

β. *Der weiße Holzheher.*

Bechftein, Naturgefchichte Deutfchl. II. p. 456. *der weiße Holzheher.*

Brisson, ornithol. I. p. 169. A. Geay blanc.

Büffon, Vögel, VII. p. 229. *der weiße Heher.*

Latham, Vögel, I. p. 319. n. 19. Var. A. *der weiße Heher.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 158. Garrulus albus *Briss.*

Gerin. ornith. II. p. 44. Tab. 162.

γ. *Der geschäckte Holzheher.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 457. n. 2.

25. Argyrophthalmus. *Die Krähe von Karthagena.* (3) (Vogel von Plata.)

Latham, Vögel, I. p. 329. Corvus Argyrophthalmus.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 164. n. 38. Corvus (Argyrophthalmus) viridi-nitens, nucha cyanea, remigibus primoribus apice caeruleis, rectricibus apice albis.

26. Dubius. *Der unbestimmte Rabe.*

8. Cristatus. *Der Haubenheher.*

Müller, Natursystem, II. p. 176. n. 8. *der Haubenhäher.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 102. n. 1. *der Haubenhäher, der blaue Häher mit dem Federbusch.* Tab. 9. A.

Halle, Vögel, p. 260. n. 204. *der blaue Heher mit dem Federbusche.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 237. n. 54. *die blaue Krähe, der blaue Nußheher.*

Neuer Schauplatz d. Natur, III. p. 741. n. 2. *blauer Holzheher, Schopfheher, gehaubter Heher.*

Onomat.

(3) Nach *Latham* mit *Corvus Surinamensis* p. 375. n. 43. einerley.

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 433. *der blaue Holzheher, der Herold.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 168. *blaue Hazler.*

Klein, av. p. 61. n. 3. Pica glandaria criſtata, purpureo caerulea.

Klein, Vorbereit. p. 116. n. 3. *blauer Holzheher, Heerold.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 60. n. 3. *blauer Holzheher.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 166. n. 1. *blauer Heher.*

Briſſon, ornithol. I. p. 170. n. 4. Geay bleu de Canada.

Büffon, Vögel, VII. p. 246. *der blaue nordamerikaniſche Heher;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 30. *der blaue Heher.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 29. *der blaue Häher.*

Batſch, Thiere, I. p. 326. *der blaue nordamerikaniſche Häher.*

Latham, Vögel, I. p. 320. n. 20. *der blaue Heher, Haubenheher.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 158. n. 19. Corvus (Criſtatus) tectricibus alarum lineis transverſis nigris, corpore caeruleo, collari nigro.

Carver, Reiſ. durch Nordamer. p. 390. *der blaue Häher.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 106. n. 8. Corvus (Criſtatus) tectricibus alarum lineis transverſis nigris, corpore caeruleo, collari nigro.

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 229. n. 7. *die blaue Krähe.*

27. Stelleri. *Stellers Krähe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 237. n. 55. *Stellers Krähe.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 320. n. 21. *Stellers Krähe.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 158. n. 20. Corvus (Stelleri) ſubcriſtatus, corpore atro, alis caeruleis, transverſim ſtriatis, caudaque caerulea.

9. Cayanus. *Der cayenniſche Häher.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 177. n. 9. *cajenniſcher Häher.*
Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 3. n. 6. *Schwarzkehle.*
Briſſon, ornitholog. I. p. 169. n. 2. Geay de Cayenne.
Büffon, Vögel, VII. p. 242. *der cayenniſche Heher.*
Latham, Vögel, I. p. 321. n. 22. *der kayenniſche Heher.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 160. n. 24. Corvus (Cayanus) ſubviolaceus, ſubtus candidus, iugulo fronteque nigris, cauda apice alba.

10. Caryocatactes. *Der Nußheher.* (4)

Müller, Naturſyſt. II. p. 177. n. 10. *der Nußhäher.* Tab. 6. fig. 4.
Leske, Naturg. p. 244. n. 7. *der Tannenheher.*
Borowſky, Thierreich, II. p. 108. n. 9. *der Nußhäher.*
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 174. n. 7. Corvus (Caryocatactes) fuſcus, alboque punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis; *der Nußheher.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 366. n. 8. *der Tannenheher.*

Bechſtein,

(4) *Bechſtein* will das Durchbohren der Bäume nach Art der Spechte bey dieſem Vogel nicht zugeben. *Pennant* und *Büffon* behaupten es, und mir iſt es von glaubwürdigen Jagdverſtändigen verſichert worden.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 457. n. 8. *der Tannenheher.* p. 462. *Nußheher, Nußbrecher, Nußpicker, Nußkretscher, Nußknacker, Nußhacker, Waldstael, türkischer Holzschreyer, schwarzer Markward, Marcolph, Nußkrähe, Steinheher, Tannenelster, (türkischer, italienischer, afrikanischer Vogel) Nußbeißer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 298. *der Tannenheher.*

Ebert, Naturl. II. p. 58. *der Nußheher.*

Halle, Vögel, p. 261. n. 205. *der rothbraune Nußheher, mit herzförmigen Flecken und kurzer Zunge.*

Halle, Vögel, p. 261. n. 206. *der schwarzbraune Tannenheher, mit dichten weißen herzförmigen Schuppen.*

Meyer, Thiere, II. p. 13. Tab. 46.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 359. n. 286. *der Nußheher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 240. D. *der Nußknacker, Tannenheher.*

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 741. n. 3. *Nußheher.*

Onomat. histor. nat. II. p. 659. *der Nußbrecher.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 168. *der Nußheher.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 120. *Nußhehr.*

Klein, av. p. 61. n. 4. Pica nucifraga. Nucifragus.

Klein, Vorbereit. p. 116. n. 4. *Nußbrecher, Nußbreischer, Nußheher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 60. n. 4. *Nußheher.*

Klein, verb. Vögehist. p. 166. n. 2. *Nußbrecher.*

Klein, stemm. av. p. 10. Tab. 12. fig. 2. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 385. *Nußbreeher.* Fig. p. 386. zieml. gut.

Brisson, ornithol. I. p. 171. n. 1. Casse-noix.

Büffon,

Büffon, Vögel, VII. p. 251. *der Nußheher.*
Seligmann, Vögel, VII. Tab. 30. *der Nußbeißer.*
Batſch, Thiere, I. p. 326. *der Nußhäher.*
Latham, Syn. I. p. 400. n. 38. *Nutcracker.*
Latham, Syn. Suppl. p. 82. Nutcracker.
Latham, Vögel, I. p. 332. n. 38. *der Tannenheher, die Nußkrähe.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 164. n. 39. Corvus (Caryocatactes) fuſcus albo punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis.
Beſeke, Naturgeſch. der Vögel Kurl. p. 32. n. 47. *der Nußheher.*
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 298. n. 49. *Nußhäher, Nußkrähe, Tannenheher.*
Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 71. n. 59. *Nußheher, Nußpicker.*
Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſ. II. p. 5. *Nußbrecher.*
Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 166. n. 7. *Nußbeißer.*
Pontoppidan, Naturh. v. Norw. II. p. 168. *Nödde-Skriger.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 34. n. 40. *der Nußbrecher.*
Linné, auserl. Abh. II. p. 288. n. 60. *der Nußheher.*
Günther, Neſter und Eyer, Tab. 38. *Nußhäher.*
Georgi, Reiſ. d. Ruſsl. I. p. 165.
Zorn, Petinotheol. II. p. 268. *der Nuß-Heher.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 81. *Tannen-Heyer, oder ſchwarzer Holz-Schreyer.*
Naumann, Vogelſteller, p. 129. *Tannenheher.*
Naturf. IX. p. 44. n. 48. *der Nußhäher.*
Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Fr. VII. p. 451. n. 15. *der Nußheher.*

Bechſtein,

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 104. n. 8. *der Tannenheher*.

Wittenberg. Wochenbl. XV. p. 9. *Nußheher*.

Eberhard, Thiergesch. p. 73. *Nußkrähe*.

Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 7. *der Tannenheher*.

Krünitz, Encyklop. XLVI. p. 519. *die Nuß-Krähe*.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Caryocatactes.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 6. Caryocatactes.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 106. n. 9. Corvus (Caryocatactes) fuscus alboque punctatus, alis, caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 91. Corvus (Caryocatactes) fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis.

Kramer, Austr. p. 334. n. 5. Corvus alis cauda, pedibus rostroque nigris: trunco fusco, excepto vertice, maculis albis guttato.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 310. Nucifraga; *ein Nußbicker, Nußhacker*.

Brünich, ornith. bor. p. 9. n. 34. Corvus Caryocatactes.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 200. C. Caryocatactes.

Schäffer, elem. ornith. Tab. 49.

Gerin. ornith. II. p. 44. Tab. 163.

Jonston, av. p. 107. Merula Saxatilis. Tab. 40. Caryocatactes.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 229. n. 8. *der Nußheher*.

α. *Der braunrothe Nußheher.* *

Müller, zool. dan. prodr. p. 12. ad n. 91. Corvus Rufus.

β. *Der schwarz und weiß gefleckte Nußheher.* *

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. ad n. 91. C. albo nigroque maculatus.

γ. *Der weiße Nußheher.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 462.

11. Balicassius. *Der Balicassio.*

Müller, Natursyst. II. p. 178. n. 11. *die philippinische Dohle.*

Brisson, ornitholog. I. p. 163. n. 9. Choucas des Philippines.

Büffon, Vögel, VII. p. 170. *der philippinische Balicassio;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 315. n. 12. *der Balicassio.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 156. n. 13. Corvus (Balicassius) virescenti-ater, cauda forficata.

Gerin. ornith. II. p. 40. Tab. 154.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 200. Corvus Balicassius.

28. Novae guineae. *Die Dohle von Neu-Guinea.*

Büffon, Vögel, VII. p. 162. *die Dohle von Neu-Guinea;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 315. n. 3. *die Neu-Guineische Krähe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 156. n. 14. Corvus (Novae Guineae) cinereus, capistro, fascia per oculos caudaque nigris, dorso postico, uropygio, abdomine, femoribus crissoque albo nigroque fasciatis.

β. Cor-

β. Corvus cinereus, capite colloque caerulescentibus, capistro fasciaque per oculos nigris, pectore abdomineque pallide ferrugineis. *
Latham, Syn. Supplem. p. 78.
Latham, Vögel, I. p. 215.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 156. n. 14. β.

29. Papuensis. *Der Choucari.*
Büffon, Vögel, VII. p. 164. *der Choucari;* m. 1 F.
Latham, Vögel, I. p. 316. n. 14. *die papuanische Krähe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 157. n. 15. Corvus (Papuensis) cinereo-griseus, abdomine albo, remigibus fusco-nigricantibus, macula per oculos nigra.

30. Nudus. *Der Colnud.*
Batsch, Thiere, I. p. 327. *der Colnud.*
Büffon, Vögel, VII. p. 166. *der Colnud von Cayenne;* m. 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 316. *der kayennische Kahlhals.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 190. n. 4. Gracula (Nuda) nigra, capite tomentoso, sericeo, postice et lateribus subcalvo, remigibus extus oblique grisescentibus.

31. Calvus. *Die glatzige Dohle.*
Batsch, Thiere, I. p. 327. *die glatzige Dohle.*
Büffon, Vögel, VII. p. 160. *die glatzige Dohle;* mit 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 317. n. 16. *der kayennische Kahlkopf.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 153. n. 6. Corvus (Calvus) ferrugineo fuscus, subtus rufescens, facie ultra oculos nuda.

32. Pacificus. *Die Krähe vom ſtillen Ocean.*
Latham, Vögel, I. p. 317. n. 17. *die Krähe vom ſtillen Ocean.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 157. n. 16. Corvus (Pacificus) cinereus, ſubtus rufeſcens, capiſtro pallido, occipite, nucha, alis caudaque nigricantibus, apicibus remigum rectricumque lateralium albidis.

33. Tropicus. *Die Krähe von der Inſel O-why-hee.*
Latham, Vögel, I. p. 318. n. 18. *die Wendezirkel-Krähe.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 157. n. 17. Corvus (Tropicus) niger nitidus, ſubtus niger, criſſo, hypochondriisque albo variegatis, alis caudaque viridi-nigris.

34. Erythrorhynchos. *Der rothſchnäblige Heher.*
Büffon, Vögel, VII. p. 233. *der chineſiſche Heher mit rothem Schnabel;* m. 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 322. n. 24. *der rothſchnäblichte Heher.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 161. n. 29. Corvus (Erythrorhynchos) violaceo-fuſcus, ſubtus albicans, fronte, collo ſubtus pectoreque nigris, cauda baſi violacea, medio nigra, apice alba.

35. Sinensis. *Der chineſiſche Heher.*
Latham, Vögel, I. p. 323. n. 25. *der chineſiſche Heher.*

36. Sibiricus. *Der ſibiriſche Heher.* (5)
Büffon, Vögel, VII. p. 240. *der ſibiriſche Heher;* mit 1 Fig.

Latham,

(5) Nach *Latham* eine Spielart von *Lanius infauſtus.*

Latham, Vögel, I. p. 323. n. 26. *der ſibiriſche Heher.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 159. n. 22. β. Corvus cineraſcens, ſubcriſtatus, facie colloque ſubtus caeruleſcenti-albis, uropygio, corpore ſubtus rectricibusque lateralibus ferrugineo-fulvis.

37. Peruvianus. *Der peruaniſche Heher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 235. *der peruaniſche Heher;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 324. n. 27. *der peruaniſche Heher.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 161. n. 30. Corvus (Peruvianus) dilute viridis, fronte caerulea, vertice colloque ſupra albidis, gula iuguloque atris, abdomine rectricibusque lateralibus flavis.

38. Flavus. *Der gelbbäuchige Heher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 244. *der gelbbäuchige Heher;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 324. n. 28. *der Heher mit gelbem Bauche.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 162. n. 31. Corvus (Flavigaſter) vireſcente fuſcus, ſubtus flavus, vertice ſtriga aurea, ſuperciliis gulaque albis.

12. Afer. *Die afrikaniſche Dohle.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 178. n. 12. *die afrikaniſche Dohle.*

39. Cyaneus. *Die Chadara.*

Büffon, Vögel, VII. p. 218. *die blaue Elſter.*

Latham, Vögel, I. p. 326. n. 30. *die blaue Krähe.*

 Latham,

(6) Iſt nach *Latham* mit *Corvus Senegalenſis* p. 374. n. 14. einerley.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 159. n. 21. Corvus (Cyanus) cinereus, vertice atro nitido, alis caudaque cuneiformi cyaneis, rectricibus intermediis apice albis.

Pallas, Reise, Ausz. III. p. 211. Corvus Cyanus.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 4. n. 7. Corvus *Cyanus*. Mongola-Dauris *Chadara.*

13. Pica. *Die Aelster.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 179. n. 13. *die europäische Elster.*

Leske, Naturgesch. p. 244. n. 8. *die Elster.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 109. n. 10. *die Elster.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 174. n. 8. Corvus (Pica) albo nigroque varius, cauda cuneiformi; *die Aelster, Atzel, Aegerste, Heister.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 365. n. 6. *die Elster.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 462. n. 9. *die Elster.* p. 469. *Aelster, Atzel, Hutsche, Schalaster, Alaster, Aegerst, Agelaster, Agerluster, Algarte, Häster, Heister, Egester, Aster, Heste, gemeiner Heher, Alelster, Egerste, Elsterrabe, Praka.*

Funke, Naturgesch. I. p. 296. *die Elster.*

Ebert,

(7) Gewicht 9 Unzen. Legt 7 bis 8 Eyer. Brütet 16 Tage. Fliegt schwer. Kann über 20 Jahr alt werden. Fleisch essbarer als das von den Krähen. Dass eine Elster, wenn man ihr das Nest zerstört, oder in Unordnung bringt zum zweyten und dritten male ein neues macht, auch zum zweyten und dritten male, wiewohl immer weniger, Eyer legt, hat seine Richtigkeit; ob sie aber überhaupt, der Regel nach, zweymal brütet, und ob Männchen und Weibchen bey diesem Geschäfte abwechseln oder nicht, ist nicht so ganz ausgemacht. Das Nest ähnelt dem russischen Fahrwerke *Kibitka*, ohngefähr wie eine Postkalesche mit halbem Verdeck.

Ebert, Naturl. II. p. 57. *die gemeine Aelſter.*
Halle, Vögel, p. 256. n. 202. *die gemeine Elſter.*
Meyer, Thiere, II. p. 22. Tab. 100.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 360. n. 287. *die Elſter.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 235. n. 52. *die Elſter.*
Beckmann, Naturhiſt. p. 41. c. *die Elſter.*
Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 111. *die gemeine Aelſter.*
Onomat. hiſt. nat. VI. p. 488. *die gemeine Elſter.*
Handbuch der Naturgeſch. II. p. 165. *die Aelſter.*
Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 120. *Elſter.*
Klein, av. p. 60. n. 1. Pica ruſticorum; vulgaris.
Klein, Vorbereitung, p. 114. n. 1. *gemeiner Heher, Alelſter, Aleſter.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 60. n. 1. *gemeine Elſter.*
Klein, ſtemm. av. p. 10. Tab. 12. fig. 1. a. b. c.
Klein, Vögeleyer, p. 22. Tab. 8. fig. 3.
Gesner, Vögelb. p. 24. *Aegerſt oder Atzel;* Fig. p. 25. mittelm.
Briſſon, ornithol. I. p. 164. n. 1. Pie.
Büffon, Vögel, VII. p. 173. *die Elſter;* m. 1 Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 327. *die Elſter.*
Latham, Syn. I. p. 392. n. 29. Magpie.
Latham, Syn. Supplem. p. 80. Magpie.
Latham, Vögel, I. p. 324. n. 29. *die gemeine Aelſter, Azel.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 162. n. 32. Corvus (Pica) albo nigroque varius, cauda cuneiformi.
Beſeke, Vögel Kurl. p. 32. n. 48. *die Elſter.*
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 298. n. 50. *Elſter, Heiſter.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 71. n. 60. *Elster*

Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 281. *Elstern*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 129. *die Elster.*

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 28. *Elstern.*

Steller, Kamtschatka, p. 194. *Aelstern.*

Kraschenninikow, Kamtschatka p. 200. *Elstern.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 166. n. 8. *Elster, Hauselster.*

Pontoppidan, Naturhist. von Norwegen, p. 178. *Skade, Skiare, Skiör.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 35. n. 41. *die Elster.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 288. n. 57. *die Aelster.*

Pallas, nord. Beytr. I. p. 315. IV. p. 24. *die Elster.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 141. 264. 553. *die Aelster.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 83. *Alaster oder Elster.*

Georgi, Reis. d. Russl. I. p. 165.

Günther, Nester und Eyer, Tab. 53. *Aelster.*

Naumann, Vogelsteller, p. 164. *die Elster.*

Naturf. IX. p. 44. n. 49. *Elster.*

Anweisung Vögel zu fangen, p. 85. *Alster oder Hetze.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 27. *Aglaster, Atzel, Elster.*

Geoffroy, mat. med. p. 646. *Elster.*

Eberhard, Thiergesch. p. 72. *die gemeine Elster.*

Oekonom. Zool. p. 68. n. 8. *die Elster.*

Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 8. *die Elster.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahnen, p. 348. n. 13. *die Elster.*

Loniceri, Kräuterb. p. 673. *Atzel, Hetz, Alster.*

Bechstein,

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 104. n. 9. *die Elster.*

Merklein, Thierreich, p. 247. *Atzel.*

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 241. *Aglaster.*

Mannichfalt. I. p. 249. *die Elster.*

Krünitz, Encyklop. X. p. 768. *Elster.*

Bonnet, Betracht. über die Natur, II. p. 431. *die Aelster.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 19. n. 8. Pica caudata.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 10. Corvus (Pica) albo nigroque varius, cauda cuneiformi.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 92. Corvus (Pica) albo nigroque varius, cauda cuneiformi.

Kramer, Austr. p. 335. n. 8. Corvus cauda cuneiformi; *Alster.*

Brünich, ornith. bor. p. 9. n. 32. Corvus Pica.

Heerkens, av. Fris. p 27. Pica.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 333. Pica; *ein Aglaster, Algaster, Algarte, Atzle, Egerste.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 178. Corvus Pica.

Gerin. ornith. II. p. 40. Tab. 155.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 56.

Philos. Transact. lxii. p. 387.

Jonston, av. p. 44 Pica varia seu caudata..

Martial. epigr. XIV. 76. Pica.

Plin. hist. nat. Lib. X. c. 29 c. 39. Picae?

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 20. n. 169. Κιττα?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 229. *die Aelster.*

β. Pica candida. *Die weiße Aelster.*

Müller, Naturs. II. p. 179. *ganz weiße Elstern.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 469. n. 1. *die weiße Elster.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 60. *eine weiße Elster.*
Brisson, ornithol. I. p. 165. A. Pie blanche.
Büffon, Vögel, VII. p. 186. *weiße Elstern.*
Latham, Vögel, I. p. 326. n. 29. Var. A. *die weiße Elster.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 162. *β.* Pica candida.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 299. *zwo weiße Elstern.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 35. t. *eine ganz weiße Elster.*
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 166. n. 8.
Naturforscher, I. p. 61. n. 2. *eine ganz weiße Elster.*
Mus. Wormian. p. 293. Pica alba.

γ. Pica corpore longitudinaliter albo nigroque striato. *Mus. Lev.* *
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 163. *γ.*

δ. C. corpore fuliginoso alboque vario, oculis rubicundis, rostro pedibusque nigris. *
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 163. *δ.*
Mus. Carls. fasc. III. Tab. 53. Corvus Pica, var.

ε. *Die bunte Elster.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 470. n. 2.
Günther: Naturforsch. I. p. 62. n. 3.

ζ. *Die aschgrau und weiß gefleckte Elster.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 470. n. 3.

14. Senegalensis. *Die senegalische Elster.*
Müller Natursyst. II. p. 179. n. 14. *die senegallische Elster.*
Brisson, ornitholog. I. p. 166. n. 2. Pie du Sénegal.

Büffon,

Büffon, Vögel, VII. p. 192. *die ſenegaliſche Elſter;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 326. n. 31. *die ſenegalſche Krähe.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 163. n. 33. Corvus (Senegalenſis) nigro-violaceus, cauda cuneiformi, remigibus rectricibusque fuſcis.

40. Caribaeus. *Die caribäiſche Krähe.*

Halle, Vögel, p. 262. n. 208. *der blaubraune indianiſche Heher.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 176. n. 6. Rollier des Antilles.

Büffon, Vögel, VII. p. 201. *die Elſter der Antillen.*

Latham, Vögel, I. p. 327. n. 32. *die karibäiſche Krähe.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 163. n. 35. Corvus (Caribaeus) ferrugineus, ſubtus albus, collo caeruleo, torque albo, uropygio luteo, rectricibus caeruleis, albo variis.

Du Tertre, hiſt. des Antilles, II. p. 258. Pie des Antilles.

Willughb. ornitholog. p. 90. n. 1. Pica caudata indica.

Aldrov. ornith. I. p. 788. Pica caudata indica.

Jonſton, av. p. 44. Pica caudata indica.

41. Africanus. *Die afrikaniſche Krähe.*

Latham, Vögel, I. p. 327. n. 33. *die afrikaniſche Krähe.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 163. n. 34. Corvus (Africanus) ſubcriſtatus fuſcus, abdomine cineraſcente, capite colloque purpureis, cauda cuneiformi, rectricibus apice albis.

42. Me-

42. MEXICANUS. *Der Hozitzanatl.*(8)
Brisson, ornithol. I. p. 167. n. 4. grande Pie du Mexique.
Büffon, Vögel, VII. p. 209. *der Hozitzanatl.*
Latham, Vögel, I. p. 328. n. 34. *die große mexikanische Krähe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 164. n. 36. Corvus (Mexicanus) totus caeruleo-niger.

43. SURINAMENSIS. *Die surinamische Krähe.*(9)
Latham, Syn. Suppl. p. 81. Surinam Crow.
Latham, Vögel, I. p. 328. n. 35. *die surinamische Krähe.*

44. ZANOE. *Der Tsanahoei.*
Brisson, ornitholog. I. p. 167. n. 5. petite Pie du Mexique.
Büffon, Vögel, VII. p. 217. *der Tsanahoei.*
Latham, Vögel, I. p. 329. n. 36. *die kleine mexicanische Krähe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 164. n. 37. Corvus (Zanoe) nigricans, cauda longissima, capite colloque subfulvis.

15. BRACHYURUS. *Die kurzschwänzige Krähe.*
Müller, Natursystem, II. p. 180. n. 15. *der kurzgeschwänzte Rabe.*
Brisson, ornith. I. p. 246. n. 56. Merle verd des Moluques.
Büffon, Vögel, IX. p. 190. *bengalische Breve;* mit 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 329. n. 37. *die kurzgeschwänzte Krähe.*

Latham,

(8) Das Fleisch ist schwarz, aber von gutem Geschmack.

(9) Ist, nach *Latham*, mit *Corvus Argyrophthalmus* p. 369. n. 25. einerley.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 166. n. 43. Corvus (Brachyurus) viridis, subtus lineisque capitis fulvescentibus, alis macula alba.

Hermann, tab. affin. anim. p. 200. Corvus brachyurus.

β. Corvus philippensis. *Die philippinische kurzschwänzige Krähe* (10)

Brisson, ornithol. I. p. 246. n. 57. Merle verd à tête noire des Moluques.

Büffon, Vögel, IX. p. 187. *der philippinische Breve oder Kurzschwanz;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 330. n. 37. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 166. β. C. viridis, capite colloque nigris, uropygio tectricibusque alarum caeruleo-viridibus, caudae inferioris roseis, rectricibus nigris.

γ. Corvus bengalensis. *Die bengalische kurzgeschwänzte Krähe.*

Klein, av. p. 115. n. 2. Coturnix capensis.

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 2. *Kaapwachtel.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 119. n. 2. *Caapwachtel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 188. *kurzgeschwänzte ostindische Aelster;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. XIV. *die Aelster mit kurzem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 330. n. 37. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 167. γ. C. viridis, subtus lutescens, capite colloque nigris, aurantio alboque lineatis, remigibus rectricibusque nigris.

δ. Cor-

(10) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

δ. Corvus madagascariensis. *Die kurzgeſchwänzte madagaſcariſche Krähe.*

Büffon, Vögel, IX. p. 191. *madagaſcariſche Breve;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 331. n. 37. Var. C.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 167. δ. Corvus viridis, ſubtus luteſcens, capite nigricante-fuſco, nucha flaveſcente, lunula cervicis faſciaque ſub oculis bifida nigris.

ε. *Die malakkiſche kurzgeſchwänzte Krähe.* *

Latham, Syn. Supplem. p 81. 37.

Latham, Vögel, I. p. 331. n. 37. Var. D.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 167. ε. Corvus capite ceviceque nigris, ſuperciliis vireſcentibus caeruleo marginatis, gula alba, iugulo dorſoque viridibus, abdomine ruſo, criſſo rubro.

Sonner. voy. Ind. II. p. 190. Tab. 110. Breve de Malacca.

ζ. *Die malabariſche kurzgeſchwänzte Krähe.* *

Latham, Syn. Supplem. p. 82. E.

Latham, Vögel, I. p. 331. n. 37. Var. E.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 167. ζ. Corvus capite colloque nigris, vertice faſciaque longitudinali rufa, gula alba, pectore rufeſcente, abdomine, femoribus criſſoque rubris.

Sonner. voy. Ind. II. p. 191. Breve de la cote de Malabar.

η. *Die chineſiſche kurzgeſchwänzte Krähe.* *

Latham, Syn. Suppl. p 82. F.

Latham, Vögel, I. p. 332. n. 37. Var. F.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 167. η. Corvus viridis, vertice fuſco, collo torque albo, nucha

vittaque

vittaque per oculos ducta nigra, abdomine albo, medio macula, crissoque coccineis.

16. CANADENSIS. *Der canadische Heher.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 180. n 16. *der canadische Rabe.* Tab. 6. fig 3.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 236. n. 53. *die aschgraue Krähe.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 10. *die dunkelbraune Dohle aus Canada.*

Brisson, ornithol. I. p. 170. n. 4. Geay bleu de Canada.

Büffon, Vögel, VII. p. 237. *der braune kanadische Heher;* mit 1 Fig

Latham, Vögel, I. p. 322. n. 23 *die kanadische Krähe.*

Latham. Syst. ornitholog. I. p. 160. n. 23. Corvus (Canadensis) fuscus, fronte flavicante, subtus rectricumque apicibus albidis.

Philos. transact. lxii p. 386.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 230. n. 10. *der canadische Heher.*

17. PYRRHOCORAX. *Die Bergdohle.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 180. n. 17. *die Bergdohle.*

Gatte-

(1) Flügelweite 15 Zoll. Gewicht dritthalb Unzen. Hat 2, selten 3 Junge auf einmal. Die Jungen sind ganz schwarz, und bleiben es auf einige Zeit. Stirbt in der Gefangenschaft. Diese Vögel sind so dreist, dass sie in die Zelte kommen, und die Speisen aus den Schüsseln fressen.

(2) Nach *Lapeirouse* ist die schwarze Farbe der Füsse kein sichres Merkmal, weil sie sich nach Alter und Geschlecht ändert, und bald schwarz, bald pomeranzenfarben, bey den Alten aber allemal zinnoberfarben seyn soll.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 363. n. 288. *die Bergdohle, Bergdol, Bergtul, Wildetul, Steinhez, Alpkachel, Alprapp, Feuerrabe.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 351. n. 7. *wilde Duhle, Alpkachel.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 435. VI. p. 724. Pyrrhocorax.

Gesner, Vögelb. p. 33. *Alprappe;* m. 1 Fig.

Briſſon, ornitholog. I. p. 162. n. 8. Choucas des Alpes.

Büffon, Vögel, VII. p. 154. *die Bergdohle;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 314. n. 11. *die Alpenkrähe.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 168. n. 40. Corvus (Pyrrhocorax) nigricans, roſtro luteo, pedibus nigris.

Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 285. n. 52. *die Krähendohle?*

Lapeirouſe: neue ſchwed. Abhandl. III. p. 104. Corvus (Pyrrhocorax) nigricans, roſtro luteo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. Pyrrhocoraces.

Jonſton, av. p. 42. Pyrrhocorax.

Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 48. Pyrrhocorax.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 230. *die Bergdohle.*

18. Graculus. *Der Waldrabe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 181. n. 18. *die Schweitzerkrähe.*

Leske, Naturg. p. 244. n. 9. *die Schweizerkrähe.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 174. n. 9. Corvus (Graculus) violaceo-nigricans, roſtro pedibusque luteis; *der Waldrabe, Alprabe.*

Bechſtein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 6. *die Steindohle.* p. 449. *Steintule, Steintahle, Steinkrähe, Krähendohle, Schweitzerkrähe, Schweitzerrabe, Feuerrabe, schwarzer Geist mit feurigen Augen.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 363. n. 289. *die Steindohle.*

Halle, Vögel, p. 253. n. 195. *die schwarze Krähedohle.*

Neuer Schaupl. d. Natur, III. p. 741. n. 7. *Bergheher.*

Onomat. hist. nat. III. p. 284. *die Bergdohle;* (mit der vorhergehenden verwechselt.)

Handb. der Naturgesch. II. p. 161. *die Bergkrähe.*

Klein, av. p. 60. n. 11. Cornix rostro pedibusque rubris. Coracias.

Klein, Vorbereit. p. 113. n. 11. *schwarze Geist mit feurigen Augen, rothen Schnabel und Füßen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 58. n. 7. *schwarzer Geist mit feurigen Augen.*

Gesner, Vögelb. p. 532. *Taha, mit roten Schnabel vnd Füßen; Steintahen.*

Brisson, ornithol. I. p. 155. n. 1. Coracias.

Büffon, Vögel, VII. p. 5. *die Steindohle;* [mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 333. n. 39. *die Schweitzerkrähe, Steinkrähe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 165. n. 41. Corvus (Graculus) violaceo-nigricans, rostro pedibusque luteis.

Pallas, Reise, III. p. 185. *die sogenannten Steinrappen, mit rothen Füßen und Schnabel.*

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 294. Monedula Pyrrhocorax.

Shaw, Reise, p. 161. *Graab el Sahara.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 41. n. 46. *der Feuer-Rabe.*
Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 33.
Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 104. Corvus (Coracias) violaceo-nigricans, rostro pedibusque miniatis.
Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 102. n. 6. *die Steindohle.*
Eberhard, Thiergesch. p. 71. *Krähendohle.*
Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 9. *die Schweitzerkrähe.*
Krünitz, Encyklop. XLVI. p. 522. *Alpen-Krähe, Schweitzer-Krähe.*
Hermann, tab. affin. anim. p. 196. Corv. Gracula.
Jonston, av. p. 42. Coracia.
Gerin. ornith. II. p. 37. Tab. 149.
Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 231. n. 12. *der Waldrabe.*

β. *Der weiße Waldrabe.* *
Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 104.

45. Australis. *Die cayennische Krähe.* (3)
Latham, Vögel, I. p. 334. n. 14. *die kayennische Krähe.*

19. Eremita. *Der Alpenrabe.* (4)
Müller, Natursyst. II. p. 181. n. 19. *der Eremit.*
Leske, Naturgesch. p. 244. n. 10. *der Eremit.*

Borowsky,

(3) Der Trivialname *Corvus Australis* kommt im System schon p. 3(?)5. n. 21. vor. Vielleicht könnte man den *letztern Corvus Maculatus* nennen, wenn er anders nicht, wie *Latham* im Syst. ornith. I. p. 206. n. 18. annimmt, mit *Bucco cinereus* einerley ist.

(4) *Blumenbach* bezweifelt die Wirklichkeit dieses Vogels, und hält ihn mit *Corvus Graculus* für einerley. S. Handb. der Naturgesch. a. a. O.

Borowsky, Thierreich, II. p. 107. n. 7. *der Alpenrabe, Berg-Eremit.* Tab. 9. b.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 470. n. 10. *der Alpenrabe.* p. 472. *Waldrabe, Waldrapp, Steinrapp, Steinrabe, Nachtrabe, Thurmwiedehopf, Klausrapp, Eremit, Eremitrabe, Bergeremit, Schweitzereremit, Scheller.*

Halle, Vögel, p. 516. n. 598. *der Thurmwiedehopf, Schweitzereremit.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 364. n. 290. *der Waldrabe.*

Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 3. n. 12. *Einsiedler.*

Onomat. histor. nat. III. p. 283. *der Alpenrapp, der Einsiedler.*

Klein, av. p. 111. n. 16. Upupa montana. Eremita montanus helveticus.

Klein, Vorbereitung, p. 205. n. 16. *Waldrappe, Steinrappe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 116. n. 3. *Waldhoff, Schweitzereinsiedler, Bergeinsiedler.*

Gesner, Vögelb. p. 424. *Waldrapp;* m. 1 Fig.

Brisson, ornith. I. p. 155. n. 2. Coracias hupé.

Büffon, Vögel, VII. p. 22 *der Waldrabe oder Scheller;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 334. n. 41. *der Eremit, Waldrabe, Alprabe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 166. n. 42. Corvus (Eremita) virescens, capite flavescente, occipite subcristato, rostro pedibusque rubris.

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 105. n. 10. *der Alpenrabe.*

Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 10. *der Eremit.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 245. Corvus alpinus; *ein Alprappe, Waldrappe, Nachtrabe, Steinrabe.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 199. Eremita.
Jonſton, av. p. 131. Corvus Sylvaticus.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 26 Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung ſind *vier*, bey der 3ten *drey*, bey der 6ten *acht*, bey der 7ten *zwey*, bey der 13ten *zwey*, und bey der 15ten gleichfalls *zwey* Varietäten aus einander geſetzt.

B. *Unbeſtimmtere Thiere.*

1. *Der weiſshälſige Rabe.*
Latham, Syn. Suppl. p. 75. 2. South-Sea Raven.
Latham, Vögel, I. p. 304. ad n. 2.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 151. n. 3. Corvus (Albicollis) nigricans, roſtro carinato valido, tectricibus alarum fuſceſcentibus, lunula cervicis lata alba.
Vielleicht eine Spielart von *Corvus Auſtralis* p. 365. n. 21?

2. Corvus leucopyx. *Die weiſsbäuchige Elſter.*
White, Reiſ. nach Neuſüdwallis; in dem Magazin merkw. Reiſebeſchreib. V. p. 128.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der weiſsöhrige Heher.*
Latham, Syn. Suppl. p. 83. White-eared Jay.
Latham, Vögel, I. p. 335. n. 42.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 160. n. 25. Corvus (Auritus) ſubcriſtatus fuſco-cinereus, capiſtro gulaque nigris, macula frontis auriumque alba, remigibus nigris griſeo maculatis.

Sonner.

Sonner. voy. Ind. II. p. 188. Tab. 107. Petit Geay de la Chine.

2. *Die purpurköpfige Krähe;* (in China.)

Latham, Syn. Supplement. p. 83. Purple-headed Crow.
Latham, Vögel, I. p. 336. n. 43.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p 161. n. 26. Corvus (Purpuraſcens) rufeſcens, ſubtus luteus, capite purpuraſcente, remigibus caudaque longiore nigris.

3. *Die Macao-Krähe;* (in China.)

Latham, Syn. Suppl. p. 84. Macao Crow.
Latham, Vögel, I. p. 336. n. 44.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 161. n. 27. Corvus (Sinenſis) cinereo-griſeus, dorſo, tectricibus alarum criſſoque rufis, ſincipite nigro, remigibus caudaque nigris, ſecundariis albo bimaculatis.
Sonner. voy. Ind. II. p. 187. Pie de Macao.

4. *Die braunrothe Krähe;* (in China.)

Latham, Syn. Suppl. p. 84. Rufous Crow.
Latham, Vögel, I. p. 336. n. 45.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 161. n. 28. Corvus (Rufus) rufus, ſubtus rufo-albus, capite colloque fuſcis, tectricibus alarum maioribus remigibusque ſecundariis griſeis, rectricibus lateralibus fuſco griſeoque dimidiatis apice albis.
Sonner. voy. Ind. II. p. 186. Tab. 106. Pie rouſſe de la Chine.

51. GESCHLECHT. Coracias. *Der Birkheher. (Blaukrähe, Racke.)*

Müller, Naturſyſt. II. p. 182. Gen. LI.
Leske, Naturgeſch. p. 245. Gen. XX.
Borowsky, Thierreich, II. p. 110. Gen. X.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 175. Gen. XX.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 367. Gen. XVI.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 472. Gen. VI.
Onomat. hiſt. nat. III. p. 286.
Briſſon, ornithol. I. p. 172. Gen. XVIII. *Galgulus.*
Büffon, Vögel, VII. p. 275 ff.
Batſch, Thiere, I. p. 316. Gen. LXVIII.
Latham, allgem. Ueberſ. der Vögel, I. p. 337. Gen. XIII.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 168. Gen. XIV.
Hermann, tab. affin. anim. p. 197.
Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 231. Gen. XII.

1. Garrula. *Die Mandelkrähe.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p 182. n. 1. *die Mandelkrähe.* Tab. 6. fig. 5.

Leske,

(5) Länge 13 Zoll. Flügelweite 2 Fuſs 3 Zoll. Zieht aus Deutſchland im September weg, und kehrt erſt im May zurück Ueberwintert vermuthlich in der Barbarey und am Senegal, weil man ſie im Herbſt ſchaarenweiſe daſelbſt bemerkt hat. Niſtet auf Bäumen, auch in Höhlungen alter Bäume. Legt 4 bis 7 Eyer, welche von beyden Geſchlechtern in 20 Tagen ausgebrütet werden Die Jungen laſſen ſich durchaus nicht zähmen, und ſterben ſchon in den erſten 14 Tagen, ob gleich der Vogel im Stande der Freyheit ein zähes Leben hat. Seine vollkommene Schönheit erhält er erſt im dritten Jahre. Merkwürdig iſts, daſs die jungen Weibchen mehr Eyer legen als die ältern.

Leſke, Naturgeſch. p. 245. n. 1. *die Mandelkrähe.*
Borowſky, Thierreich, II. p. 111. n. 1. *die Mandelkrähe.* Tab. 10.
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 175. Coracias (Garrula) caerulea dorſo rubro, remigibus nigris; *die Mandelkrähe, Racke, Blauracke.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 367. n. 1. *der gemeine Birkheher.*
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 472. n. 1. *die Mandelkrähe.* p. 477. *der blaue Rabe, Heidenelſter, Kugelelſter, Kriechelelſter, blaue Krähe, Garbenkrähe, wilde Goldkrähe, Straßburger Krähe, Grünkrähe, blaue Holzkrähe, Galgenregel, Helkregel, Gelsregel, Halsregel, Racker, Racher, Rake, Raake, Rackervogel, Plauderrackervogel, deutſche Papagey, Birkheher, Meerheher, Roller, Blaurack, Blabrach, Blaurock, leberfarbiger Birkheher, europäiſcher Racker.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 299. *der Birkheher.*
Ebert, Naturl. II. p. 18. *der Birkheher.*
Halle, Vögel, p. 264. n. 212. *der leberfarbige Birkheher.*
Meyer, Thiere, II. p. 14. Tab. 47.
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 365. n. 291. *die Mandelkrähe.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 241. G. *die Mandelkrähe.*
Beckmann, Naturhiſt. p. 41. *die blaue Krähe.*
Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 758. *Birkheher.*
Neuer Schaupl. d. Natur, V. p. 350. *Mandelkrähe.*
Onomat. hiſt. nat. III. p. 292. *die Mandelkrähe.*
Handbuch der Naturgeſch. II. p. 169. *der Birkheher.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 121. *die Mandelkrähe.*

Klein, av. p. 62. n. 7. Pica ſeu garrulus argentoratenſis.

Klein, Vorbereit. p. 117. n. 7. *Mandelkrähe, Racker, Galgenrekel, Galskregl, wilde Goldkrähe.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 61. n. 6. *Mandelkrähe.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 62. n. 9. *vielfarbige Aelſter.*

Klein, ſtemmat. av. p. 10. Tab. 12. fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 348. *wilde Holzkrähe;* mit einer ſchl. Fig.

Briſſon, ornithol. I. p. 173. n. 1. *Rollier.*

Büffon, Vögel, VII. p. 275. *der europäiſche Racker;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 4. *die Mandelkrähe.*

Latham, Vögel, I. p. 337. n. 1. *die Mandelkrähe.*

Latham, Syn. Supplem. p. 85. Roller.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 168. n. 1. Coracias (Garrula) caerulea, dorſo rubro, remigibus nigris.

Batſch, Thiere, I. p. 324. *die Mandelkrähe.*

Beſeke, Vögel Kurl. p. 33. n. 49. *die Mandelkrähe, kurländiſche Papagey.*

Bock, Preuſſen, IV. p. 300. n. 51. *Mandelkrähe.*

Fiſcher, Livl. p. 72. n. 61. *Mandelkrähe.*

Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſ. I. p. 262. *blaue Krähen.*

Adanſon, Reiſe nach Senegal, p. 24. *die blaue Raake.* p. 86. *die blaue Krähe.*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 167. n. 1. *Ellekrage.*

Scopoli,

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 38. n. 44. *die Mandelkrähe.*

Shaw, Reiſe, p. 162. *Shagarag?*

Linné, auserleſ. Abh. II. p. 289. n. 64. *die Mandelkrähe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 141. 267. *der Birkheher.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 53. *Mandelkrähe, Blabrack.*

Naumann, Vogelſteller, p. 163. *die blauen oder Mandelkrähen.*

Naturforſch. IX. p. 45. n. 50. *Mandelkrähe.*

Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Fr. VII. p. 451. n. 16. *die Mandelkrähe.*

Hellenius: neue ſchwed. Abhandl. VIII. 2. p. 15. *Mandelkrähe.*

Lange, Briefe über die Naturgeſch. p. 37. *Blaukrähe.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 106. n. 11. *die Mandelkrähe.*

Wirſing, Vögel, Tab 5. *Nußheher.*

Lichtenberg u. *Voigt*, Magaz. f. d. Neueſte u. ſ. w. VI 1. p. 145. *Mandelkrähen.*

Goeze, nützl. All. II. p. 363. n. 4. *Mandelkrähe.*

Anweiſung Vögel zu fangen u. ſ. w. p. 348. *Blau-Krähe.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 117. *die Mandelkrähe.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 635. *Mandel-Krähe, Blarack, Grün-Krähe.*

Krünitz, Encyklop. XLVI. p. 516. *die Blau-Krähe.*

Neue geſellſch. Erzähl. I. p. 168. *Mandelkrähe.*

Neu-Hamburg. Magazin, St. 116. p. 105.

Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 52. Garrulus argent.

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 4. Cornix caerulea.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 107. n. 1. Coracias (Garrulus) caerulea, dorſo rubro, remigibus nigris.

Linné, fn. Suec. I. 73. Corvus dorſo ſanguineo, remigibus nigris, rectricibus viridibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 12. n. 94. Coracias (Garrula) caerulea, dorſo rubro, remigibus nigris.

Kramer, Auſtr. p. 334. n. 6. Corvus caeruleo viridis, dorſo ex rufo luteſcente; *Mandlkran, Meerheher.*

Brünich, ornithol. bor. p. 10. n. 35. Coracias Garrulus.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 243. Cornix caerulea; *ein Mandel-Krahe, Rache, Heiden-Elſter, Kugel-Elſter, Holz-Krae, Gals-Kregel.*

Moehring, av. gen. p. 30. n. 5. Coracias.

Muſ. Worm. p. 296. Cornix caerulea.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 35.

Gerin. ornith. II. p. 45 Tab. 164.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias Garrula.

Jonſton, av. p. 41. Cornix caerulea.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 231. n. 1. *die Mandelkrähe.*

2. Indica. *Der indianiſche Birkheher.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 183. n. 2. *der oſtindiſche Häher.*

Latham, Vögel, I. p. 341. n. 7. *die indianiſche Racke.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 170. n. 7. Coracias (Indica) caerulea, antice teſtacea, pileo viridi.

6. Caffra. *Der äthiopische Birkheher.*

Müller, Natursyst. II. p. 183. n. 3. *die äthiopische Dohle.*

Büffon, Vögel, VII. p. 310. *der äthiopische Raker.*

Latham, Vögel, I. p. 342. n. 8. *die Kap-Racke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 170. n. 8. Coracias (Caffra) caerulea, remigibus margine exteriore luteis.

7. Abyssinica. *Der abyssinische Birkheher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 292. *der abyssinische Raker*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 339. n. 2. *die abyssinische Racke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 169. n. 5. Coracias (Abyssinica) rufo-fusca, capite, collo, corpore subtus tectricibusque alarum viridibus, humeris, remigibus primoribus uropygioque cyaneis; rectricibus extimis longissimis.

Bruce, Reis. n. d. Quellen des Nils, V. p. 185. Tab. 37. *Sheregrig?*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias abyssinica.

8. Senegalensis. *Der senegalische Birkheher.* (6)

Büffon, Vögel, VII. p. 294. *der senegalische Raker*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 339. n. 3. *die senegalsche Racke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 169. n. 4. Coracias (Senegala) rubro-fusca, subtus, capite, cauda alarumque parte superiore caerulescente-thalassinis, facie alba, humeris remigibusque caeruleis, rectricibus extimis longissimis.

Shaw,

(6) Nach *Büffon* eine Spielart von der vorhergehenden.

Shaw, Reiſe, p. 162. *Shagarag?*

Büffon, Vögel, VII. p. 286. *der Shagarag?*

9. Madagascariensis. *Der madagaskariſche Birkheher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 306. *der madagaskariſche Raker;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 342. n. 11. *die madagaskariſche Racke.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 170. n. 10. Coracias (Madagaſcarienſis) purpureo-fuſca, uropygio, criſſo rectricibusque caeruleo-viridibus, remigibus primoribus nigris, extus caeruleis, rectricibus ad apicem caeruleo-nigricantibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias madagaſcarienſis.

4. Orientalis. *Der orientaliſche Birkheher.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 183. n. 4. *Morgenländer.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 175. n. 4. Rollier des Indes.

Büffon, Vögel, VII. p. 304. *der indianiſche Raker;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 341. n. 6. *die orientaliſche Racke.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 170. n. 6. Coracias (Orientalis) viridis, iugulo caeruleo ſtriato, rectricibus apice nigris.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias orientalis.

5. Bengalensis. *Der Cuit.*

Müller, Naturſ. II. p. 183. n. 5. *bengaliſcher Rabe.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 112. n. 2. *der bengaliſche Rabe.*

Briſſon,

Briſſon, ornitholog. I. p. 174. n. 2. Rollier de Mindanao.

Büffon, Vögel, VII. p. 297. 302. *der mindanoiſche Raker;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 340. n. 5. *die bengaliſche Rake.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 168. n. 2. Coracias (Bengalenſis) ſubfulva, ſubtus caeruleſcens, collo ſubtus violaceo pallido ſtriato, cauda integra.

β. *Der Birkheher aus Goa.* *

Büffon, Vögel, VI. p. 301. *ein neuer Raker von Goa.*

Latham, Vögel, I. p. 341. *eine Spielart aus Goa.*

6. Caudata. *Der angoliſche Birkheher.* (7)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 184. n. 6. *Langſchwanz.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 112. n. 3. *der angoliſche Rabe.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 174. n. 3. Rollier d'Angola.

Büffon, Vögel, VII. p. 297. *der angoliſche Raker;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 339. n. 4. *die angoliſche Racke.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 169. n. 3. Coracias (Caudata) ſubfulva, ſubtus caeruleſceus, collo violaceo, pallido ſtriato, rectricibus extimis longiſſimis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias angolenſis.

10. Cae-

(7) Nach *Büffon* eine Spielart vom vorhergehenden.

10. Caerulea. *Der blaugrüne Birkheher.*
Latham, Vögel, I. p. 342. n. 9. *die blaue Racke.*

11. Cyanea. *Der ultramarinblaue Birkheher.*
Latham, Vögel, I. p. 342. n. 10. *die Ultramarin-Racke.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 170. n. 9. Coracias (Vivida) caerulea tota vividiſſima.

12. Cayennensis. *Der cayenniſche Birkheher.*
Büffon, Vögel, VII. p. 273. *der cayenniſche Roller;* mit 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 344. n. 15. *die cayenniſche Racke.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 170. n. 16. Coracias (Cayana) fuſco-viridis, ſuperciliis albis, lateribus gulae vitta nigra, collo ſubtus pectoreque cinerafcentibus, cauda cuneiformi.

13. Mexicana. *Der mexicaniſche Birkheher.*
Halle, Vögel, p. 263. n. 209. *der graurothe mexikaniſche Heher.*
Klein, av. p. 62. n. 5. Pica, merula mexicana.
Klein, Vorber. p. 117. n. 5. *mexikaniſcher Nußheher, Nußkrähe.*
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 61. n. 5. *mexicaniſcher Nußheher.*
Briſſon, ornitholog. I. p. 177. n. 8. Rollier du Mexique.
Büffon, Vögel, VII. p. 308. *der mexicaniſche Raker.*
Latham, Vögel, I. p. 343. n. 12. *die mexikaniſche Racke.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 171. n. 11. Coracias (Mexicana) griſeo-rufeſcens, ſubtus aliſque pallide griſeis, flammeo colore variegatis.

14. Stria-

14. STRIATA. *Der blaugestreifte Birkheher.*

Latham, Vögel, I. p. 343. n. 13. *die blaugestreifte Racke.* Tab. 19.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 171. n. 13. Coracias (Striata) caeruleo-atra, striis virescente-caeruleis, rostro, cauda pedibusque nigris.

15. VARIA. *Der bunte Birkheher.*

Latham, Vögel, I. p. 344. n. 16. *die bunte Rake.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 173. n. 22. Coracias (Varia) nigra, alis albo-variegatis, dorso postico, uropygio corporeque subtus albis, rectricibus lateralibus albo terminatis.

16. SINENSIS. *Der chinesische Birkheher.*

Brisson, ornitholog. I. p. 175. n. 5. Rollier de la Chine.

Büffon, Vögel, VII. p. 170. *der schinesische Roller;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 343. n. 14. *die chinesische Racke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 171. n. 14. Coracias (Sinensis) viridis, subtus viridi-flavicans, fascia per oculos alisque nigricantibus, remigibus secundariis caudaque cuneiformi, apicibus albis.

Murr, Naturgesch. von Jap. u. Chin. *im Naturf.* VII. p. 39. Galgulus Sinensis Brissonii.

17. DOCILIS. *Der gelehrige Birkheher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 311. *der gelehrige Raker.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 172. n. 17 Coracias (Docilis) alba cum rubicundo interspersо, subtus badia, pedibus luteis, rectricibus nigris apice albo.

A. *Ver-*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 11 Gattungen vermehrt, und alſo n. 7 bis 17 neu hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der blaue Birkheher mit ſchwarzen, blau gefleckten Flügeln;* (in Indien.)
 Latham, Syn. Suppl. p. 87. n. 21. Fairy Roller.
 Latham, Vögel, I. p. 346. n. 21. *die Feen-? Racke.*
 Latham, Syſt. ornithol. I. p. 171. n. 12. Coracias (Puella) caerulea, collo antice et lateribus, pectore, abdomine, tectricibus alarum maioribus remigibusque nigris.

2. *Der graugeſchwänzte Birkheher;* (in Indien.)
 Latham, Syn. Suppl. p. 86. Grey-tailed Roller.
 Latham, Vögel, I. p. 346. n. 20.
 Latham, Syſt. ornithol. I. p. 171. n. 15. Coracias (Vagabunda) capite colloque nigris, corpore ſupra ferrugineo-fuſco, ſubtus cinereo, alis medio albis, cauda longiſſima cuneiformi, griſea, apice nigra.

3. *Der ſchwarze Birkheher.*
 Latham, Syn. Supplem. p 85. Black Roller.
 Latham, Vögel, I. p. 245. n. 17.
 Latham, Syſt. ornithol. I. p. 172. n. 18. Coracias (Nigra) corpore toto artubusque nigris, cauda longiore.

4. *Der afrikaniſche Birkheher.*
 Latham, Syn. Supplem. p. 86. n. 18. African Roller.
 Latham, Vögel, I. p. 345. n. 18.

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 172. n. 19. Coracias (Afra) teſtaceo-rubra, ſubtus purpureo-rubeſcens, criſſo caeruleo-viridi, remigibus rectricibusque caeruleis, apice nigricantibus.

5. *Der ſchwarzköpfige Birkheher;* (in China.)

Latham, Syn. Suppl. p 86. n. 19. Black-headed Roller.

Latham, Vögel, I. p. 346. n. 19.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 172. n. 20. Coracias (Melanocephala) caeruleo-purpurea, capite colloque nigris, corpore ſubtus albo, remigibus fuſcis, cauda cuneiformi, apice alba.

6. *Der Birkheher von Norfolk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 173. n. 21. Coracias (Strepera) nigra, macula alarum, criſſo caudaque baſi et apice nigris.

52. GESCHLECHT. ORIOLUS. *Der Pirol. (Gelbvogel, Troupial.)*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 185. Gen. LII.

Leſke, Naturgeſch. p. 245. Gen. XXI.

Borowſky, Thierreich, II. p. 115. Gen. XI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 178. Gen. XXVI.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 368. Gen. XVII.

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 477. Gen. VII.

Pennant, arct. Zool. II. p. 243.

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 509. V. p. 717. VII. p. 863.

Briſſon, ornithol. I. p. 178. Gen. XIX. Icterus.

Büffon, Vögel, VIII. p. 54 ff.

Batſch, Thiere, I. p. 316. Gen. LXVII.

Latham, Vögel, I. 2. p. 347. Gen. XIV.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 173. Gen. XV.
Hermann, tab. affinit. anim. p. 202.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 232. Gen. XIII.

1. GALBULA. *Der Pfingstvogel.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 185. n. 1. *die Golddrossel.* Tab. 6. fig. 6.
Leske, Naturg. p. 245. n. 1. *der gemeine Pirol.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 116. n. 2. *die Golddrossel.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 178. n. 1. Oriolus (Galbula) luteus, pedibus nigris, rectricibus exterioribus postice flavis; *die Golddrossel.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 368. n. 1. *der gemeine Pirol.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 478. *der gemeine Pirol.* p. 483. *Kirschvogel, Kirschdieb, Kirschhold, Kersenriefe, Weidwall, Wiedewall, Wittewald, Wittewalch, Viduel, Wittwell,*

(8) Ein muthiger, schwerfliegender, zänkischer und scheuer Vogel. Verläſst Deutschland schon im August, und kömmt erst im May wieder, wenn die Bäume schon ausgeschlagen sind. Nach seiner Ankunft weiſs man zuverläſsig, daſs keine Nachtfröste mehr kommen. Verbirgt sich wenn er singt, und hält oft den ganzen Tag an, besonders wenn es schwüle und gewitterhaft ist. Ist schwer zu zähmen und stirbt bald in der Gefangenschaft. Die Insekten, womit er, in Ermanglung andrer Nahrung, seine Jungen füttert, sind vorzüglich Nachtfalter und ihre Raupen. Auch hat man seinen Magen oft voll eyrunder groſser brauner Insekteneyer gefunden. *Sparrmanns* (schwed. Abh. a. a. O. mitgetheilte Nachricht, daſs dieser Vogel in der Biandrie lebe, verdiente eine nähere Untersuchung.

well, Pyrol, Byrolt, gemeine Pyrole, Pirold, Bierhold, Bierholf, Bruder Berolft, Tyrolt, Birole, Gerolft, Biersel, Gelbvogel, Gelbling, Bülau, Bülow, der Vogel Bloh, Schulz von Milo, Golddrossel, Goldamsel, Golamerle, Gutmerle, Olimerle, Sommerdrossel, Regenkatze, Kirschdrossel, Weihrauchsvogel, Gugelfahraus, Pfingstvogel, Weihrauch.

Funke, Naturgesch. I. p. 304. *der Kirschvogel.*

Halle, Vögel, p. 288. n. 239. *die gelbe Kirschdrossel*

Meyer, Thiere, II. p. 2. Tab. 7. *Kirschvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 370. n. 298 *der Kirschvogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 319. F. *die Golddrossel.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 507. *Kirschvogel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 289. *der Galbulavogel, Kirschendieb, gelbe Vogel von Benghalen.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 205 *die Golddrossel, der Kirschvogel*

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 121. *Goldamsel.*

Klein, av. p. 66. n. 7. Turdus aureus, Merula aurea. Oriolus.

Klein, Vorbereitung, p. 126. n. 7. *Golddrossel, Witthewale, Beerhold, Goldmeerle.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 66. n. 7. *Golddrossel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 67. n. 11. *bengalische Golddrossel.*

Klein, stemm. av. p. 11. Tab. 14. fig. 8. a. b. c.

Klein, Vögeleyer, p. 23. Tab. 9. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 144. *Chlorion.*

Gesner, Vögelb. p. 483. *Wittewal;* m. 1 zieml. guten Figur.

Brisson, ornithol. I. p. 247. n. 58. Loriot.

Büffon, Vögel, VIII. p. 170. *der Pirol;* mit Abbild. des M. des W. und des Nests.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 80. *Golddrossel.*

Batsch, Thiere, I. p. 322. *der Pfingstvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 369. n. 43. *der gemeine Pyrol.*

Latham, Syn. Supplem. p. 89. Golden Oriole.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 186. n. 45. Oriolus (Galbula) luteus, loris artubusque nigris, rectricibus exterioribus postice flavis.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 33. n. 50. *die Golddrossel.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 302. n. 52. *Golddrossel.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 78. *die Golddrossel.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 72. n. 62. *Pfingstvogel, Wittewahl.*

Lepechin, Tagebuch d. russ. Reis. I. p. 197. *der Kirschvogel.*

Georgi, Reis. d. Russl. I. p. 165.

Oekonom. Zool. p. 206. *der Pfingstvogel.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 39. n. 44. *die Golddrossel, Bierhold.*

Lange, Briefe über d. Naturgesch. p. 39. *Pfingstvogel.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 144. et 320. *die Gold-Amsel.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 55. *Weyrauch-, Kirsch-, oder Pfingstvogel.*

Naumann, Vogelsteller, p. 144. *Pfingstvogel.*

Naturforsch. IX. p. 46. n. 51. *Golddrossel.*

Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 342. *Kirschvogel.*

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. V. p. 610. *der Schulz von Bülau.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 451. n. 17 *Golddrossel.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 116. n. 22. *der Pirol.*

Linné: schwed. Abh. XII. p. 130. *ein Vogel.*

Sparrmann: neue schwed. Abhandl. VII. p. 68. *Golddrossel.*

Lichtenberg u. *Voigt*, Magaz. f. d. Neueste u. s. w. IV. 4. p. 105. *Golddrossel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 533. *Kirsch-Vögel, Gugel-oder Kugel-sihaus.*

Meidinger, Vorles. I. p. 117. *Golddrossel.*

Stutg. sel. phys. oecon. I. p. 324. *Pyrohl oder Goldamsel.*

Comment. Lips. III. p. 204.

Zückert, Speisen a. d. Thierreich, p. 98.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 1. Oriolus (flavus, alis extremaque cauda nigris, pupillis rubris) Gesn.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 107. n. 3. Coracias (Oriolus) flava, alis caudaque nigris.

Kramer, Austr. p. 360. n. 1. Turdus flavus, alis extremaque cauda nigris; *Gugelfahraus.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 312. Oriolus; *ein Bierholt, Beerold, Kirschholt.*

Moehring, av. gen. p. 33. n. 10. Turdus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 203. Oriolus Galbula.

Jonston, av. p. 112. Picus nidum suspendens.

Philos. Transact. XXIII. n 285. p. 1397. 41.

Hist. de la Prov. I. p. 491. l'Auriol.

Plin. hist. nat. Lib. X. c. 25 33 Galgulus. c. 29. Chlorion. L. 30 c. 11 Icterus avis. L. 37. c. 10. ales luridus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 232. n. 1. *die Golddrossel.*

β. *Der bengalische Pirol.* (9)

Klein, verb. Vögelhist. p. 64. n. 5. *gelber Staar.*

Brisson, ornitholog. I. p. 180. n. 6. Troupiale fauve de Madrast.

Büffon, Vögel, VIII. p. 187. 192. *Edwards gelber indianischer Staar.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 81. *der gelbe indianische Staar.*

Latham, Syn. II. p. 451. n. 43 B.

Latham, Vögel, I 2 p. 372. n. 43. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 187. γ. O. flavus, maculis nigricantibus variis, capite, collo, remigibus rectricibusque nigricantibus.

γ. *Der indische Pirol.* (10)

Brisson, ornitholog. I. p. 248. n. 60. Loriot des Indes.

Büffon, Vögel, VIII. p. 189 *der indische Pirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 373. n. 43. Var. D.

Latham, Syn. II. p. 452. n. 43. D.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 188. ε. Oriol. luteus, fascia capitis transversali caerulea, rectricibus luteis fascia caerulea.

2. CHI-

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung eines ganz andern Geschlechts. Nach *Büffon* das Weibchen von *Oriolus Melanocephalus*; und diesen Oriolus Melanocephalus nimmt *Latham* wieder als Spielart von *Oriolus Galbula* an. Welche Verwechselung!

(10) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

2. Chinensis. *Der Coulavan.* (1) (*Cochinchinensis?*)

Müller, Naturſyſt. II. p. 186. n. 2. *die chineſiſche Droſſel.*

Onomat. hiſt. nat. V. p. 718. *die chineſiſche Droſſel.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 248. n. 59. Loriot de la Cochinchine.

Büffon, Vögel, VIII. p. 184. *der Coulavan;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. 2. p. 373. n. 43. Var. C.

Latham, Syn. II. p. 452. n. 43. C.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 188. δ. O. luteus, artubus nigris apice luteis, faſcia capitis nigra.

3. Melanocephalus. *Der ſchwarzköpfige Pirol.* (2)

Müller, Naturſyſt. II. p. 187. n. 3. *Braunkopf.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 67. n. 10. *ſchwarzköpfige Golddroſſel.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 249. n. 61. Loriot de Bengale.

Büffon, Vögel, VIII. p. 186. *der chineſiſche Pirol;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 372. n. 43. A.

Latham, Syn. II. p. 451. n. 23. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 287. β. O. luteus, capite apicibusque rectricum intermediarum nigris.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 49. *ſchwarzköpfigter Ammer.*

Scopoli, ann. hiſtor. nat. I. p. 130. n. 190. Sturnus luteolus.

(1) Nach *Latham* eine Spielart von *Oriolus Galbula.*

(2) Nach *Latham* eine Spielart von *Oriolus Galbula.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 155. n. 190. *der gelbe Staar.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 167. n. 2. Sturnus (Luteus) capite fusco, pectore maculato, alis fusco-luteis.

Gerin. ornith. II. p. 41. Tab. 158. Pica americana luteo-nigra varia.

21. RADIATUS. *Der gestreifte Pirol.*

Brisson, ornitholog. I. p. 249. n. 62. Loriot à tête rayée.

Büffon, Vögel, VIII. p. 194. *der gestreifte Pirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 373. n 44. *der gestreifte Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 188. n. 46. Oriolus (Radiatus) luteo-rubescens, capite colloque subtus nigricantibus albo-punctatis, tectricibus alarum remigibusque nigris, margine albis.

Jonston, av. p. 107. Merula bicolor.

22. PICUS. *Der Spechtpirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 374. n. 45. *der Spechtpirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 188. n. 47. Oriolus (Picus) rufus, capite, collo pectoreque albo variegatis, cauda elongata, rectricibus apice subulatis.

4. ICTERUS. *Der Troupial.*

Müller, Natursyst. II. p. 187. n. 4. *der Schwarzkopf.*

Onomat. histor. nat. III. p. 294. *der schwarzköpfige Ammer.*

Halle, Vögel, p. 296. n. 254. *die gelbbäuchige Drossel?*

Klein, av. p. 63. n. 10. Pica ex luteo et nigro varia.

Klein,

Klein, Vorber. p. 119. n. 10. *tarnaiſcher Heher.*
Klein, av. p. 69. n. 20. Turdus oculis caeruleis.
Klein, Vorber. p. 130. n. 20. *blauäugige Droſſel.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 68. n. 21. *blauäugige Droſſel.*
Klein, av. p. 70. n. 33. Turdus luteo-niger, gutture piloſo, capite, gula, roſtro, dorſo caudaque nigris, cervice, uropygio et toto ventre luteis, alis nigris, tectricibus albo fimbriatis, roſtro unciali.
Klein, Vorbereit. p. 133. n. 33. *die gelbſchwarze Droſſel.*
Briſſon, ornithol. I. p. 178. n. 1. *Icterus;* Troupiale.
Büffon, Vögel, VIII. p. 67. *der Troupial;* m. 1 F.
Batſch, Thiere, I. p. 323. *der Trupial.*
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 106. *der ſchwarze und gelbe Heher.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 351. n. 6. *der gemeine Trupial.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 176. n. 7. Oriolus (Icterus) fulvus, capite, iugulo, dorſo remigibusque nigris, macula alarum alba.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 36. n. 42. Coracias Xanthornus.
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 9. Ciſſa nigra cirrhata, cauda lutea.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 6. Coracias (Xanthornus) flava, capite remigibusque primoribus nigris.
Jonſton, av. p. 189. Guira-Tangeima.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Troupialis.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 233. n. 2. *der Troupial.*

23. Novae Hispaniae. *Der Acalchichi.*

Halle, Vögel, p. 276. n. 230. *der ſchwarzgelbe Staar mit gelbem Schnabel.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 179. n. 2. Troupiale du Mexique.

Büffon, Vögel, VIII. p. 73. *der Acalchichi des Seba.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 352. n. 7. *der mexikaniſche Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 176. n. 8. Oriolus (Novae Hiſpaniae) luteus, capite, gula, alis rectricibusque nigris, tectricibus alarum maioribus apice luteis.

24. Annulatus. *Der Ocotzinitzcan.*

Halle, Vögel, p. 256. n. 201. *die gelbe Krähe mit dem Mohrenkopfe.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 511. *die gelbe Krähe.*

Onomat. hiſtor. nat. V. p. 658. *Ocotzinitzan.*

Klein, av. p. 59. n. 8. Cornix flava.

Klein, Vorbereit. p. 112. n. 8. *gelbe Krähe.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 58. n. 9. *gelbe Krähe.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 179. n. 3. Troupiale à queue annelée.

Büffon, Vögel, VIII. p. 75. *der Troupial mit dem Bogen auf dem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 352. n. 8. *der ringſchwänzige Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 177. n. 9. Oriolus (Annulatus) flavus, capite colloque nigris, remigibus nigris luteo marginatis, cauda nigricante annulata.

25. Brasiliensis. *Der brasilianische Pirol.* (3)
Onomat. histor. nat. IV. p. 511. *die gelbbraune Grasmücke.*
Brisson, ornitholog. I. p. 181. n. 8. Troupial du Bresil.
Büffon, Vögel, VIII. p. 77. *Sloanens gelb und brauner Fliegenschnäpper.* p. 78. *der kleine Vogel des Sloane.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 352. n. 9. *der brasilianische Pirol.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 177. n. 10. Oriolus (Brasiliensis) flavus, pectore maculato, capite dorsoque fasciis nigro-maculatis, abdomine albo, cauda alisque fuscis, apice albis.

26. Japacani. *Der Japacani.*
Klein, av. p. 75. n. 12. Luscinia pullo-lutea.
Klein, Vorb. p. 141. n. 13. *gelbbraune Grasmücke.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 76. n. 13. *gelbbraune Grasmücke.*
Büffon, Vögel, VIII. p. 77. *der Japacani.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 353. n. 10. *der Japakani.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 177. n. 11. Oriolus (Japacani) fusco-nigroque, subtus albo-flavoque varius, lineis transversis nigricantibus, capite caudaque nigricantibus.
Marcgr. Brasil. p. 212. Japacani.
Jonston, av. p. 207. Japacani brasiliensis.

27. Costototl. *Der Xochitototl oder Coztototl.*
Brisson, ornithol. I. p. 182. n. 10. Troupiale de la nouvelle Espagne.

Büffon.

(3) Wird von *Brisson*, *Klein* u. a. m. mit der folgenden Gattung verwechselt, und beyder Synonymen zusammen gezogen.

Büffon, Vögel, VIII. p. 80. *der Xochitototl und der Coztototl.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 353. n. 11. *der neuſpaniſche Trupial.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 177. n. 12. Oriolus (Coſtototl) niger, pectore, abdomine, criſſo caudaque fulvis, nigro variegatis, tectricibus alarum ſubtus albo nigroque variis.

Jonſton, av. p. 174. Xochitototl.

28. Griseus. *Der graue Pirol.*

Onomat. hiſtor. nat. V. p. 656. *der ſpechtartige Ococolin.*

Briſſon, ornithol. I. p. 182. n. 11. Troupiale gris de la nouvelle Eſpagne.

Büffon, Vögel, VIII. p. 84. *der graue Troupial.*

Raj. Syn. p. 163. Ococolin.

Latham, Vögel, I. 2. p. 354. n. 12. *der graue Trupial.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 178. n. 13. Oriolus (Cinereus) flavo nigroque varius, dorſo-femoribus abdomineque cinereis.

5. Phoeniceus. *Der Commendeur.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 187. n. 5. *die Purpurdroſſel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 372. n. 300. *der Commandeur.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 243. n. 56. *der Pirol mit rothen Flügeln, der Commendeur.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 518. *der ſchwarze Caroliner-Staar, Waſſerſtaar.*

Klein, av. p. 64. n. 2. Sturnus niger, alis ſuperne rubentibus.

Klein, Vorber. p. 121. n. 2. *Karoliner Staar mit rothen Schultern.*

Klein,

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 63. n. 2. *Staar mit rothen Schultern.*

Briſſon, ornithol. I. p. 182. n. 12. Troupiale aux ailes rouges.

Büffon, Vögel, VIII. p. 87. *der Commandeur;* mit 1 Figur.

Batſch, Thiere, I. p. 324. *der Kommandeur-troupial.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 26. *der ſchwarze Staar mit den rothen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 354. n. 13. *der rothflügelige Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 178. n. 14. Oriolus (Phoeniceus) niger, alarum tectricibus fulvis.

Jonſton, av. p. 222. Pterophoenicus Indiarum.

Du Pratz, hiſt. de la Louiſ. II. p. 91.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 233. n. 3. *der Commandeur.*

29. Americanus. *Der americaniſche Pirol.*

Halle, Vögel, p. 293. n. 245. *die indianiſche Amſel?*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 512. *die zinnoberbrüſtige Droſſel.*

Klein, av. p. 69. n. 24. Turdus ſive merula Indica, pectore cinnabrino.

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 24. *zinnoberbrüſtige Droſſel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 69. n. 25. *zinnoberbrüſtige Droſſel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 92. *der ſchwarze, unten von der Kehle bis zum Bauche rothe Troupial.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 355. n. 14. *der cayenniſche Trupial.*

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 178. n. 15. Oriolus (Americanus) niger, gula, iugulo pectoreque ruberrimis, margine alarum rubro.

β. Oriolus niger, vertice, gula, iugulo, pectore margineque alarum rubris. *

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 179. β.

Bankroft, Naturgeſchichte von Guiana, p. 107. *Spottvogel.*

Schlötzer, Erdbeſchreib. von Amerika, p. 238. *der Mockvogel.*

30. Oryzivorus. *Der Reispirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. n. 5. *der Reiſspirol.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 176. n. 5. Oriolus (Oryzivorus) niger, capite, collo pectoreque purpureo-nitentibus.

31. Ludovicianus. *Der louiſianiſche Pirol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 248. n. 63. *der Pirol mit dem weiſsen Kopfe.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 147. *der louiſianiſche Caſſike;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. n. 4. *der weiſsköpfige Pirol.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 175. n. 4. Oriolus (Leucocephalus) nigro alboque varius, capite, collo, abdomine uropygioque albis, cauda cuneiformi.

β. Or. fuſco-nigricans, collo, pectore alisque nigro-maculatis, capite albo, macula verticis nigra. *

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. ad n. 4. *Woupawchou chuckithow.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 175. β.

Latham, Syn. Suppl. p. 88. White-headed Oriole.

32. Hun-

32. HUDSONIUS. *Der Pirol von der Hudsonsbay.* (4)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 248. n. 64. *der Pirol mit dem weißen Kopfe von der Hudsonsbay.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. ad n. 4.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 175. n. 4. γ. Or. viridi-nigricans, capite, gula, remige exteriore, femoribus strigisque pectoris albis.

33. CRISTATUS. *Der gehäubte Pirol.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 142. *der Cassike mit dem Zopf von Cayenne;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 349. n. 3. *der gehaubte Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 174. n. 3. Oriolus (Cristatus) ater cristatus, dorso infimo, uropygio crissoque castaneis, rectricibus lateralibus flavis.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 3. *der allergrößte Gelbvogel, oder so genannte Citronvogel.*

β. Or. fulvo-olivaceus cristatus, dorso infimo, uropygio, abdomine, crisso rectricibusque 2. intermediis castaneis, lateralibus flavis.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 175. n. 3. β.

Latham, Vögel, I. 2. p. 349. n. 3. Var. A.

γ. *Büffon*, Vögel, VIII. p. 141. *der grüne Cassike von Cayenne;* m. 1 Fig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 175. n. 3. γ. Or. capite cristato, corpore antice viridi, postice casta-

(4) Flügelweite 13 1/2 Zoll. Gewicht 1 3/4 Unzen. Nach *Pennant* und *Latham* eine Varietät vom vorhergehenden.

castaneo, remigibus rectricibusque 2. intermediis nigris, lateralibus flavis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 349. n. 3. Var. B.

6. HAEMORRHOUS. *Der rothschwänzige Pirol.*

Müller, Natursystem, II. p. 187. n. 6. *der Blutschwanz.*

Brisson, ornith. I. p. 183 n. 13. Cassique rouge.

Büffon, Vögel, VIII. p. 138. *der Jupujuba;* mit 1 Figur.

Batsch, Thiere, I. p. 323. *der Jupujuba.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 348. n. 2. *der Pirol mit rothem Steiße.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 174. n. 2. Oriolus (Haemorrhous) niger, uropygio crissoque coccineis.

β. *Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 174. n. 2. β. Or. fusco nigricans, uropygio tectricibusque caudae vinaceis, crisso flavo.

Latham, Vögel, I. 2. p. 348. n. 2. Var. A.

7. PERSICUS. *Der Jupujuba.*

Müller, Natursystem, II. p. 188. n. 7. *die amerikanische Drossel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 117. n. 3. *der Jupujaba.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 179. n. 2. Oriolus (Persicus) niger, dorso postico maculaque tectricum alarum, basique rectricum luteis; *der Jupujaba.*

Halle, Vögel, p. 293. n. 246. *die brasilische Drossel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 516. *die brasil. Drossel.*

Brisson, ornitholog. I. p. 183. n. 14. Cassique jaune.

Büffon,

Büffon, Vögel, VIII. p. 134. *der brasilianische Japu*; mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 323. *der brasilianische Japu.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 347. n. 1. *der brasilianische Japu.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 173. n. 1. Oriolus (Persicus) niger, dorso postico, macula tectricum alarum basique rectricum luteis.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 2. Cissa nigra alis caudaque luteis.

Jonston, av. p. 189. Jupujuba seu Jabu Brasiliensibus.

Hermann, tab. affin. animal. p. 204. Oriolus persicus.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 234. n. 4. *der Jupujuba.*

β. *Büffon*, Vögel, VIII. p. 137. *Japu oder Jupujuba des Marcgrav.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 347. n. 1. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 419. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 174. n. 1. β. Or. niger, dorso postico, macula tectricum rectriceque extima supra basi flavis, omnibus subtus luteo nigroque dimidiatis.

γ. *Büffon*, Vögel, VIII. p. 137. *Edwards schwarz und gelbe Elster.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 9.

Latham, Vögel, I. 2. p. 347. n. 1. Var. B.

Latham, Syn. II. p. 419. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 174. n. 1. γ. Oriolus purpureo-niger, dorso postico, uropygio, abdomine, crisso maculaque alarum luteis.

8. MEXICANUS. *Der mexicanische Pirol.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 188. n. 8. *mexicaniſche Droſſel.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 512. *die dunkelbraune Droſſel aus Neuſpanien.*

Briſſon, ornith. I. p. 183. n. 17. Troupiale brun de la Nouvelle Eſpagne.

Büffon, Vögel, VIII. p. 109. *der Troupial mit der ſchwarzen Kopfplatte;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 357. n. 17. *der Trupial mit ſchwarzer Mütze.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 179. n. 18. Oriolus (Mexicanus) nigricans, ſubtus capiteque luteus.

34. RUBER. *Der rothe Pirol.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 196. *der rothe Troupial von Antigua.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 356. n. 16. *der rothe Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 179. n. 17. Oriolus (Ruber) cinnabrinus, abdomine, remigibus rectricibusque nigro-ſericeis.

Sonnerat, Reiſ. nach Neuguinea, p. 41. *die rothe Golddroſſel.*

9. GUIANENSIS. *Der guianiſche Pirol.*(5)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 188. n. 9. *gujaniſche Droſſel.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 185. n. 18. Troupiale de la Guiane.

Büffon,

(5) Nach *Büffon* eine Spielart von *Oriolus Americanus*, n. 29. womit ihn auch *Briſſon* für einerley hält, wie ich aus den von ihm angeführten Synonymen erſehe. *Pennant* rechnet hieher auch den *Xochitototl* des *Fernandez*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 93. Troupiale de la Guiane.

Latham, Vögel, I. 2. p. 356. n. 15. *der gujanische Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 179. n. 16. Oriolus (Guianensis) nigricans, pennis margine griseis, pectore colloque subtus rubris.

95. Flavus. *Der goldgelbe Pirol.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 197. *der gelbe Troupial von Antigua.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 357. n. 8. *der Troupial von Antigua.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 179. n. 19. Oriolus (Flavus) flavus, cervice, dorso, alis caudaque sericeo-nigris.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 41. *die gelbe Golddrossel von Antigua.* Tab. 41. fig. a.

10. Baltimore. *Der Baltimore.*

Müller, Natursyst. II. p. 188 n. 10. *Baltimore.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 115. n. 1. *die Baltimoredrossel.* Tab. 11.

Halle, Vögel, p. 294. n. 248. *die Tulpendrossel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 245. n. 58 *der Baltimore.* Tab. 12. Männchen, Weibchen und Nest abgebildet.

Onomat. histor. nat. III. p. 287. *der Baltimorevogel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 514. *die gelbbunte Drossel, Wittewall.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 170. *die gelbbunte Drossel.*

Klein, av. p. 68. n. 15. Turdus Icterus ex auro nigroque varius.

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 15. *gelbbunte Drossel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 67. n. 8. *gelbbunte Drossel.*

Brisson, ornitholog. I. p. 186. n. 19. Baltimore.

Büffon, Vögel, VIII. p. 125. *der Baltimore;* mit 1 Figur.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 96. *der Baltimorevogel.*

Batsch, Thiere, I. p. 322. *der Baltimorevogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 357. n. 19. *der Baltimore.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 180. n. 20. Oriolus (Baltimore) nigricans, subtus fasciaque alarum fulvus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Oriolus Baltimore.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 4. Coracias (Galbula) fulva, capite, dorso remigibusque nigris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 234. n. 3. *der Baltimore.*

11. Spurius. *Der unächte Baltimore.*

Müller, Natursystem, II. p. 189. n. 11. *Bastarddrossel.*

Halle, Vögel, p. 294. n. 247. *die schwarzköpfige Drossel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 246. n. 59. *der Bastard Baltimore.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 515. *der schwarzbärtige Wittewall.*

Klein, av. p. 68. n. 14. Turdus minor, gutture nigro.

Klein, Vorbereit. p. 128. n. 14. *schwarzbärtiger Wittewall.*

Klein,

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 67. n. 14. *ſchwarzbärtiger Wittewall.*

Briſſon, ornithol. I. p. 186. n. 20. Baltimore Baſtard.

Büffon, Vögel, VIII. p. 129. *der unächte Baltimore.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 98. *der Baltimore-Baſtard.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 358. n. 2. *der Baſtard-Baltimore.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 180. n. 21. Oriolus (Spurius) niger, ſubtus fulvus, faſcia alarum alba.

36. TEXTOR. *Der Mohrenkopf.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 119. *der Mohrenkopf;* mit 2 Figg.

Latham, Vögel, I. 2. p. 359. n. 21. *der Weberpirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 180. n. 22. Oriolus (Textor) fulvo-luteus, capite fuſco-aureo, remigibus rectricibusque nigris, margine fulvis.

12. BONANA. *Der Piſangvogel.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 189. n. 12. *Piſangdroſſel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 117. n. 4. *die Piſangdroſſel.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 372. n. 299. *der Xochitototl, Piſangvogel.*

(6) *Latham* hat *Sloane's* Tab. 258. fig. 3. bey *dieſer* und der *folgenden* Gattung angeführt. Das *erſte* iſt wohl ein Schreibfehler. Beym *Klein* a a O. ſind die Synonymen dergeſtalt unter einander geworfen, daſs ſich nicht mit Gewiſsheit beſtimmen läſst: ob Oriolus *Bonana* oder *Nidipendulus* gemeynt ſey.

Onomat. hist. nat. IV. p. 519. *die bunte Drossel.*

Klein, av. p. 68. n. 13. Turdus minor varius?

Klein, Vorbereit. p. 128. n. 13. *die kleine bunte Drossel?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 67. n. 13. *spanischer bunter Wittewal?*

Brisson, ornithol. I. p. 187. n. 22. Carouge.

Büffon, Vögel, VIII. p. 148. *der Pisangvogel;* mit 2 Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 323. *der Pisangvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 360. n. 22. *der Pisangpirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 181. n. 23. Oriolus (Bonana) fulvus, capite pectoreque castaneis, dorso, remigibus rectricibusque nigris.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Oriolus Bonana.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 235. n. 7. *die Pisangdrossel.*

37. Nidipendulus. *Der jamaicaische Pirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 360. n. 23. *der Hangnestpirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 181. n. 24. Oriolus (Nidipendulus) rubro-fuscus, alis albo variis, pectore, abdomine colloque lateribus testaceo-ferrugineis, medio linea nigra.

38. Varius. *Der bunte Pirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 361. n. 24. *der bunte Pirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 181. n. 25. Oriolus (Castaneus) niger, dorso infimo, uropygio corporeque subtus castaneo-ferrugineis, remigibus secundariis albo-marginatis.

13. Xanthornus. *Der kleine Gelbsteiß von Cayenne.*

Müller, Naturs. II. p. 189. n. 13. *gelbe Drossel.*

Halle, Vögel, p. 223. n. 162. *der goldfarbene singende Würger.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 513. *der goldfarbene singende Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 7. Lanius *Ayoquantotl* dictus.

Klein, Vorbereit. p. 102. n. 7. *Golden-Wrangengel.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 53. n. 32. *Golden Wrangengel.*

Brisson, ornitholog. I. p. 188. n. 23. Carouge du Mexique.

Büffon, Vögel, VIII. p. 153. 159. *der kleine Gelbsteiß von Cayenne;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 33. *der kleine Vogel Bonana.*

Batsch, Thiere, I. p. 323. *der kleine Gelbsteiß von Cayenne.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 361. n. 25. *der kleine Pisangpirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 181. n. 26. Oriolus (Xanthornus) luteus, gula, remigibus rectricibusque nigris.

14. Dominicensis. *Der Pirol von St. Domingo.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 190. n. 14. *Domingodrossel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 517. *die Amsel von St. Domingo.*

Brisson, ornitholog. I. p. 189. n. 25. Carouge de S. Domingue, ou Demoiselle.

(7) Nach *Büffon* das Weibchen vom vorhergehenden.

Büffon, Vögel, VIII. p. 158. 162. n. 2. *das Weibchen vom vorigen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 362. n. 26. *der Pirol von St. Domingo.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 182. n. 27. Oriolus (Dominicenſis) niger, corpore poſtico tectricibus alarum maculaque luteis.

39. Jamacaii. *Der Jamac.* (8)

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 514. Icterus luteus.

Briſſon, ornitholog. I. p. 189. n. 24. Carouge du Bréſil.

Büffon, Vögel, VIII. p. 157. 163. n. 5. *der Jamac des Marcgrav.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 362. n. 27. *der braſilianiſche Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 182. n. 28. Oriolus (Jamacaii) flavus, capite, collo ſubtus, remigibus rectricibusque nigris, dorſo faſcia nigra, tectricum macula alba.

15. Cayennensis. *Der Pirol von St. Thomas.* (9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 190. n. 15. *Gelbflügel.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 517. *die Amſel von St. Thomas.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 190. n. 26. Carouge de Cayenne.

Büffon, Vögel, VIII. p. 156. 162. n. 4. *Xanthorn von St. Thomas.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 362. n. 28. *der cayenniſche Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 182. n. 29. Oriolus (Cayennenſis) niger, macula alarum lutea.

Her-

(8) Nach *Büffon* eine Spielart von *Oriolus Xanthornus.*

(9) Nach *Büffon* eine Spielart von *Oriolus Xanthornus.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Oriolus Cayennenſis.

40. LEUCOPTERUS. *Der ſchwarze Pirol mit weiſsgefleckten Flügeln.* (10)

Latham, Vögel, I. 2. p. 363. n. 29. *der weiſsflügelige Pirol.* Fig. 32.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 183. n. 31. Oriolus (Leucopterus) niger, macula alarum alba.

Muſ. Carlſ. faſc. II. Tab. 31. Oriolus melaleucus.

β. *Der Pirol mit weiſsem Rücken.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 245. n. 57.

Kalm, it. II. p. 274.

16. ICTEROCEPHALUS. *Der gelbköpfige Pirol.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 190. n. 16. *Gelbkopf.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 864. *die gelbköpfige Droſſel aus Cayenne.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 190. n. 27. Carouge à tête jaune de Cayenne.

Büffon, Vögel, VIII. p. 164. *der gelbköpfige Xanthorn*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 13. *der gelbköpfige Staar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 363. n. 30. *der gelbköpfige Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 183. n. 32. Oriolus (Icterocephalus) niger, capite colloque luteis.

(10) *Latham* rechnet hieher auch die *Tanagra nigerrima* (Linn. Syſt. Nat. p. 899. n. 45.) nimmt *Büffons Tanagra noir* IV. p. 257. Pl. enl. n. 179. fig. 2. und ſeinen eignen *Guiana Tanager*, Syn. III. p. 225. n. 15. für das Männchen, und *Büffons Tanagra roux*, pl. enl. n. 711. für das Weibchen an.

17. Melancholicus. *Der Trauerpirol.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 190. n. 17. *misfärbige Droſſel.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 977. *der braune amerikaniſche Ammer.*

Klein, av. p. 98. n. 17. Fringilla ex fuſco et nigro varia, americana; cauda ſuperbiens.

Klein, Vorbereit. p. 183. n. 17. *bunter braun und ſchwarzer Diſtelfinke aus Amerika.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 98. n. 17. *braun und ſchwarzbunter Fink.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 191. n. 29. Carouge tacheté.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 65. *der braune amerikaniſche Ammer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 363. n. 31. *der gefleckte Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 184. n. 3. Oriolus (Melancholicus) griſeus nigro-punctatus faſcia oculorum *alba;* (ein Druckfehler für *nigra*.)

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 7. Fringilla (Melancholica) griſea nigro-punctata, area a roſtro per latera colli atra.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 203. Oriolus melancholicus.

β. *Büffon*, Vögel, VIII. p. 111. *der gefleckte Troupial von Cayenne;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 364. n. 31. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 442. n. 31. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 184. n. 33. β. Or. fuſco-nigricans, corporis ſuperioris pennis margine flavis; inferioris, alarum caudaeque fulvis, faſcia oculorum gulaque albis.

18. Ca-

18. CAPENSIS. *Der capſche Pirol.*
Müller, Naturſyſtem, II. p. 190. n. 10. *capſche Droſſel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 248. n. 65. *der olivenfarbige Pirol.*
Briſſon, ornitholog. I. p. 191. n. 30. Carouge du Cap de bonne Eſperance.
Büffon, Vögel, VIII. p. 166. *der olivenfarbige Xanthorn;* mit 1 Fig.
Latham, Vögel, I. 2. p. 365. n. 35. *der capſche Pirol.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 184. n. 36. Oriolus (Capenſis) fuſco-olivaceus, ſubtus luteus.

41. CAERULEUS. *Der blaue Pirol.*
Briſſon, ornitholog. I. p. 190. n. 28. Carouge bleu.
Büffon, Vögel, VIII. p. 198. *der kleine blaue Xanthorn.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 185. n. 38. Oriolus (Caeruleus) cinereo-nigricans, capite, alis caudaque caeruleis.
Latham, Vögel, I. 2. p. 366. n. 36. *der blaue Pirol.*
Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 5. * *die kleine acht u. zwanzigſte Gattung des Briſſon.*

42. VIRIDIS. *Der grünliche Pirol.*(1)
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 249. n. 66. *der Pirol mit gelber Kehle.*
Latham, Syn. Suppl. p. 89.

Latham.

(1) Die Benennung *Or. Viridis* kommt im Syſt. p. 395. n. 51. nochmals vor. Zum Unterſchiede könnte man die erſtere nämlich die 42ſte Gattung mit *Latham Vireſcens* nennen, wenn ſie nicht, wie dieſer vermuthet, eine Spielart von *Oriolus Capenſis* iſt.

Latham, Vögel, I. 2. p. 374. n. 46. *der gelbkehlige Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 185. n. 37. Oriolus (Virescens) virescens, genis, gula superciliisque luteis, tectricibus alarum albo-maculatis.

43. Ferrugineus. *Der rostfärbige Pirol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 247. n. 62. *der rostfarbige Pirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 374. n. 47. *der rostfarbige Pirol.*

Latham, Syn. Suppl. p. 89.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 176. n. 6. Oriolus (Ferrugineus) niger, pennis ferrugineo-marginatis, capite cerviceque purpurascentibus, abdomine obscuro, macula per oculos ad nucham nigra.

44. Fuscus. *Der braunköpfige Pirol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 247. n. 61. *der Pirol mit braunem Kopfe.*

45. Niger. *Der schwarze Pirol.* (2)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 247. n. 60. *der schwarze Pirol.*

Brisson,

(2) Hier herrscht unter den Synonymen grosse Verwechselung. In der XIIten Edition hatte *Linné* den *Icterus niger Briss.* so wie *Sloane's* und *Raj Monedula tota nigra,* zu *Gracula Barita* gerechnet. *Gmelin* und *Latham* ziehen mit *Pennant* den *Icterus niger,* zum *Oriolus niger.* *Latham* rechnet hieher auch *Klein: Cornix parva profunde nigra,* und die Synonymen aus *Sloane* und *Rajus* zu *Gracula Barita.* *Klein* aber führt ausdrücklich den *Sloane* und *Rajus* an; und selbst *Brisson* zieht die Synonymen von *Sloane*, *Rajus* und *Klein* zu seinem *Icterus niger.* *Pennant* giebt die Länge des Vogels an 9 Zoll; die Flügelweite 1 Fuss, und das Gewicht zu 2 1/2 Unzen an.

Briſſon, ornitholog. I. p. 164. n. 15. Troupiale noir.

Büffon, Vögel, VIII. p. 104. *der groſse ſchwarze Troupial;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. 2. p. 366. n. 37. *der groſse ſchwarze Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 185. n. 39. Oriolus (Niger) nigro-vireſcens, remigibus rectricibusque lateralibus intus ſubtusque nigris.

Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 234. n. 6. *der ſchwarze Pirol.*

46. Minor. *Der kleine ſchwarze Pirol.* (3)

Pennant, arct. Zool. II. p. 247. n. 60. in fin.

Büffon, Vögel, VIII. p. 107. *der kleine ſchwarze Troupial;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 367. n. 38. *der kleine ſchwarze Pirol.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 185. n. 40. Oriolus (Minor) niger nitidus, capite caeruleſcente.

47. Olivaceus. *Der olivenfarbige Pirol.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 117. *der olivenfarbige Troupial von Cayenne;* mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. 2. p. 368. n. 39. *der olivenfarbige Pirol.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 186. n. 41. Oriolus (Olivaceus) olivaceus, capite, gula iuguloque fuſcis nitidis, pectore flaveſcente.

48. Aunalaschkensis. *Der Pirol von Unalaſchka.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 449. n. 67. *der Pirol von Unalaſchka.*

Latham,

(3) Nach *Pennant* eine Varietät vom vorigen.

Latham, Vögel, I. 2. p. 368. n. 40. *der Pirol von Unalaſchka.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 186. n. 42. Oriolus (Aoonalaſchkenſis) fuſcus, collo ſubtus ferrugineo-fuſco, loris macula alba, gula albida, ſtriga fuſca bifida.

49. Caudacutus. *Der ſpitzſchwänzige Pirol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 249. n. 68. *der Pirol mit zugeſpitztem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 368. n. 41. *der ſpitzſchwänzige Pirol.* Tab. 20.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 186. n. 43. Or. (Caudacutus) varius, rectricibus apice acuminatis.

50. Sinensis. *Der Kink.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 168. *der Kink;* m. 1 F.

Latham, Vögel, I. 2. p. 369. n. 42. *der Kink.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 186. n. 44. Oriolus (Sinenſis) albus, capite, collo, dorſo anteriore pectoreque griſeo-cinereis, remigibus chalybeis, rectricibus albo chalybeoque dimidiatis.

19. Aureus. *Der goldfarbige Pirol.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 191. n. 19. *oſtindianiſche Golddroſſel.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 287. *der goldene Paradiesvogel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 67. n. 9. *Merle mit ſchwarzem Bart.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 122. n. 3. *der goldfarbne Paradiesvogel.*

Briſſon, ornithol. I. p. 192. n. 31. Troupiale des Indes.

Büffon, Vögel, VII. p. 312. *der Paradies-Raker;* mit 1 Fig.

Batſch,

Batſch, Thiere, I. p. 332. *Paradiesracker.*

Seligmann, Vögel, VII. p. 312. *Paradiesracker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 396. n. 8. *der goldfarbige Paradiesvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 197. n. 11. *Paradiſea* (Aurea) flavo-fulva, capiſtro, gula, remigibus rectricibusque nigris.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 108. n. 5. *Coracias* (Aurea) flavo-fulva, gula, tectricibus primariis extremitateque rectricum nigris.

51. VIRIDIS. *Der Pfeifer.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 515. *der grüne Wittewall.*

Briſſon, ornith. I. p. 187. n. 21. Baltimore verd, ou Siffleur.

Büffon, Vögel, VIII. p. 123. *der Pfeifer;* m. 1 F.

Latham, Vögel, I. 2. p. 365. n. 34. *der Pfeiferpirol.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 184. n. 35. Or. (Viridis) fuſco-olivaceus, ſubtus uropygioque viridi-olivaceus, remigibus fuſcis, extus olivaceis, intus albicantibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 203. Sibilator.

52. FURCATUS. *Der Pirol mit getheiltem Schwanze.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 512. *der Staar mit getheiltem Schwanze.*

Klein, av. p. 64. n. 4. Sturnus cauda diviſa.

Klein, Vorber. p. 122. n. 4. *Staar mit getheiltem Schwanze.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 64. n. 4. *Staar mit getheiltem Schwanze.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 185. n. 16. Troupiale à queue fourchue.

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 365. n. 33. *der Pirol mit dem Gabelschwanze.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 184. n. 34. Oriolus (Furcatus) niger, supra ad caeruleum inclinans, tectricibus caudae inferioribus albis, cauda bifida.

Seba, th. I. p. 107. Tab. 65. fig. 4. Turdus niger mexicanus. *Abbild. schlecht.*

20. CHRYSOCEPHALUS. *Der goldköpfige Pirol.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 191. n. 20. *amerikanische Golddrossel.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 863. *die gelbköpfige Drossel aus Amerika.*

Brisson, ornitholog. I. p. 192. n. 32. Carouge à tête jaune d'Amerique.

Büffon, Vögel, VIII. p. 155. 162. *Brissons schwarzköpfigter Xanthorn.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 364. n. 32. *der goldköpfige Pirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 183. n. 30. Oriolus (Chrysocephalus) niger, pileo tectricibus alarum caudaeque luteis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 32 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *drey*, bey der 7ten *drey*, und bey der 19ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

53. GE-

(4) Nach *Büffon* eine Varietät von *Oriolus Xanthornus.*

53. GESCHLECHT. GRACULA. *Die Azeldohle.*

Müller, Naturfyst. II. p. 192. Gen LIII.
Leske, Naturgesch. p. 246. Gen. XXII.
Borowsky, Thierreich, II. p. 118. Gen. XII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 175. Gen. XXI.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 369. Gen. XVIII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 169. Gen. XVII.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 250.
Onomat. hist. nat. IV. p. 32.
Büffon, Vögel, IX. p. 193 sqq.
Batsch, Thiere, I. p. 316. Gen. LXVI.
Latham, allgem. Uebers. der Vögel, I. 2. p. 376. Gen. XV.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 189. Gen. XVI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 195.
Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 235. Gen. XIV.

1. RELIGIOSA. *Der Mino.*

Müller, Naturfyst. II. p. 193. n. 1. *der Plapperer.* Tab. 6. fig. 8.
Leske, Naturgesch. p. 246. n. 1. *der Mino.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 118. n. 1. *der Mino.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 175. n. 1. Gracula (Religiosa) nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis nuda, flava.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 369. *der Plauderer.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 169. *der Mino.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 374. n. 303. *der indianische Staar.*
Halle, Vögel, p. 254. n. 197. *die kleine Dohle mit dem gelben Nackenschleife.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 36. *die Dohle mit gelbem Nacken-Schleiff.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 203. *der Mainate.*

Klein, av. p. 60. n. 12. Cornicula ſeu Monedula Indiae Orient.

Klein, Vorbereit. p. 113. n. 12. *Dohle mit gelbem Nackenſchleif;* (die kleinere.)

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 59. n. 14. *Dohle mit gelbem Nackenſchleif;* (die kleinere.)

Briſſon, ornith. I. p. 242. n. 49. Mainate.

Büffon, Vögel, IX. p. 193. *der Mino;* m. 1 Fig.

Büffon, Vögel, IX. p. 196. n. 1. *der Mino des Herrn Briſſon.* n. 2. *der Mino des Bontius.* p. 197. n. 3. *der kleine Mino des Edwards.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 33. *der Minor oder Mino;* obere Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 321. *der Mino oder Plapperer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 376. n. 1. *der Mino.*

Latham, Syn. Suppl. p. 90. Minor Grakle.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 189. n. 1. Gracula (Religioſa) nigro-violacea, macula alarum alba, faſcia occipitis nuda, flava.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 108. n. 1. Gracula (Religioſa) nigro-violacea, macula alarum alba, faſcia occipitis nuda, flava.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 235. n. 1. *der Mino.*

β. *Der größere Mino.* (5)

Halle, Vögel, p. 254. n. 196. *die ſchwarzſchielende Dohle mit gelbem Nackenſchleife.*

Klein, Vorbereit. p. 113. n. 12. *der größere.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 59. n. 14. *der größere.*

Briſſon,

(5) Nach *Briſſon* eine eigne Gattung.

Briſſon, ornith. I. p. 243. n. 50. Grand Mainate.
Büffon, Vögel, IX. p. 197. n. 4. *der groſse Mino des Herrn Edwards.*
Seligmann, Vögel, I. Tab. 33. untere Figur.
Latham, Vögel, I. 2. p. 377. n. 1. Var. A. *der groſse Mino.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 189. n. 1. β. Mainatus maior.

2. CALVA. *Der Kahlbacken.*
Müller, Naturſ. II. p. 194. n. 2. *der Kahlbacken.*
Onomat hiſt. nat. IV. p. 34. *die grünlicht - ſilberfarbene Amſel.*
Briſſon, ornithol. I. p. 236. n. 36. Merle chauve des Philippines.
Büffon, Vögel, IX. p. 200. *der Kahlbacken.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 377. n. 2. *die kahle Atzel.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 189. n. 2. Gracula (Calva) ſubcinerea, ſubtus fuſco-griſea, capite utrinque nudo, pectore, remigibus rectricibusque fuſco-nigricantibus.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 235. *der Kahlbacken.*

3. FOETIDA. *Der Stinkvogel.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 194. n. 3. *der Stinkvogel.*
Onomat. hiſt. nat. IV. p. 35. *die ſtinkende Droſſel.*
Büffon, Vögel, VII. p. 168. *der Stinkvogel.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 190. n. 5. Gracula (Foetida) nigra, remigibus extus caeruleſcentibus, faſcia collari nuda.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 108. n. 2. Gracula (Foetida) nigra, remigibus extus caeruleſcentibus, faſcia collari nuda.

4. Barita. *Der Schiffschwanz.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 194. n. 4. *Piſangdohle.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 33. *die pechſchwarze kleine Krähe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 251. n. 70. *der Schiffſchwanz, die Piſangazeldohle.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 119. n. 2. *die Piſangdohle.*

Klein, av. p. 59. n. 6. Cornix parva, profunde nigra?

Klein, Vorbereit. p. 112. n. 6. *pechſchwarze kleine Krähe?*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 59. n. 11. *ganz ſchwarze Dohle?*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 191. n. 6. Gracula (Barita) ſubgriſea, humeris caeruleis, remigibus extus viridibus.

Latham, Vögel, I. 2. p. 379. n. 5. *die bootſchwänzige Atzel.* Tab. 21.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 109. n. 3. Gracula (Barita) ſubgriſea, humeris caeruleis, remigibus extus viridibus.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 236. n. 3. *der Schiffſchwanz.*

5. Cristatella. *Die gehäubte chineſiſche Azeldohle.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 195. n. 5. *Haubenmerle.*

Onomatol. hiſt. nat. IV. p. 35. *der Staar mit weiſſem Touppé.*

Klein, av. p. 64. n. 3. Sturnus crinibus cinereis, et delibutis calamiſtro in vallum ad frontem compoſitis.

Klein,

(6) Länge nach *Pennant* 13 Zoll. S. *die vorhergehende zweyte Anmerkung.*

Klein, Vorbereit. p. 122. n. 3. *Staar mit weißem Touppé.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 64. n. 3. *Staar mit weißem Touppee.*

Briſſon, ornithol. I. p. 228. n. 21. Merle hupé de la Chine.

Büffon, Vögel, IX. p. 103. *gehaubte chineſiſche Amſel.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 37. *der chineſiſche ſchwarze Staar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 382. *die gehaubte Atzel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 90. Creſted Grakle.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 192. n. 8. Gracula (Criſtatella) nigra, remigibus primoribus baſi rectricibusque apice albis, roſtro flavo.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 109. n. 4. Gracula (Criſtatella) nigra, remigibus primoribus baſi rectricibusque apice albis, roſtro flavo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 151. 196. Gracula Criſtatella.

6. Saularis. *Die bengaliſche Azeldohle.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 195. n. 6. *bengaliſche Dohle.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 37. *der ſchwarze bengaliſche Finke.*

Klein, av. p. 98. n. 14. Fringilla nigra.

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 14. *ſchwarzer bengaliſcher Finke.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 98. n. 14. *ſchwarzer Fink.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 70. n. 36. *Purpurroſſel mit bunten Flügeln.*

Briſſon, ornith. I. p. 209. n. 19. Pie-grieche noire de Bengale.

Büffon, Vögel, IX. p. 206. *die bengalische Dohle.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 76. *die kleine indianische Aelster.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 382. n. 8. *die bengalische Atzel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 91. Dial Grakle.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 192. n. 9. Gracula (Saularis) nigro-caerulescens, abdomine, macula alarum rectricibusque lateralibus albis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 109. n. 5. Gracula (Saularis) nigro-caerulescens, abdomine, macula alarum rectricibusque lateralibus albis.

Gerin. ornith. II. p. 41. Tab. 157. Pica minor bengalensis.

7. QUISCULA. *Der Maysdieb.*

Müller, Natursyst. II. p. 196. n. 7. *der Raupentödter.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 119. n. 3. *der Raupentödter, die Purpurdohle.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 175. n. 2. Gracula (Quiscula) nigro-violacea, cauda rotundata; *der Maisdieb.*

Halle, Vögel, p. 255. n. 198. *die purpurblaue Dohle.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 375. n. 305. *die Purpurdohle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 250. n. 69. *die Purpurazeldohle, Azeldohle von Jamaica.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 38. *die Purpurdohle.*

Klein, av. p. 60. n. 13. Monedula purpurea, Cornix purpurea.

Klein, Vorbereit. p. 114. n. 13. *Purpurdohle.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 59. n. 15. *Purpurdohle.*

Brisson,

Briſſon, ornitholog. I. p. 166. n. 3. Pie de la Jamaique.

Büffon, Vögel, VII. p. 194. *die Elſter von Jamaika;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 24. *die purpurfarbene Dohle.*

Batſch, Thiere, I. p. 322. *die Elſter von Jamaika.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 380. n. 6. *die Purpuratzel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 90. Purple Grakle.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 191. n. 7. Gracula (Quiſcula) nigro-violacea, cauda rotundata.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 109. n. 6. Gracula (Quiſcula) nigro-violacea, cauda ſubcuneiformi.

Raj. Syn. p. 168. n. 21. Izanatl?

Hermann, tab. affinit. animal. p. 196. Gracula Quiſcula.

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 236. n. 4. *der Maysdieb.*

β. Gr. corpore albo nigroque, capite albo, remigibus caudaque nigris. *

Latham, Syn. Suppl. p. 90.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 191. n. 7. β.

Latham, Vögel, I. 2. p. 381.

8. Atthis. *Die ägyptiſche Azeldohle.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 196. n. 8. *egyptiſche Dohle.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 32. *die grünlicht-blaue Droſſel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 208. *die egyptiſche Gracula.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 383. *die ägyptiſche Atzel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 192. n. 10. Gracula (Atthis) viridi-caerulea, abdomine ferrugineo, pedibus ſanguineis.

Haſſelquiſt, Reiſe nach Paläſtina, (Ed. germ.) p. 296. n. 20. Corvus aegyptius.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 109. n. 7. Gracula (Atthis) viridi-caerulea, abdomine ferrugineo, pedibus ſanguineis.

Philoſ. transact. lvii. p. 347. 2. Gr. corpore viridi, dorſo caeruleſcente, abdomine ferrugineo, pedibus rubris.

9. Longirostra. *Die langſchnäblige Azeldohle.*

Büffon, Vögel, IX. p. 212. *die langſchnäblichte Gracula.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 119. n. 4. *die langſchnäblichte Atzel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 384. n. 10. *die langſchnäblige Atzel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 193. n. 11. Gracula (Longiroſtra) cinereo-fuſca, ſubtus flaveſcens, capite, collo caudaque nigris, rectricibus apice maculaque alarum albis.

Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VII. p. 7. *die langſchnäblichte Azel.* Tab. 2. fig. 2.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 151. 194. Gracula longiroſtris.

10. Sturnina. *Die dauriſche Azeldohle.*

Büffon, Vögel, IX. p. 211. *die dauriſche Gracula.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 193. n. 12. Gracula (Sturnina) cana, macula verticis, dorſoque inter alas violaceo-atro, alis caudaque violaceo-viridibus, harum ſtriga gemina alba.

Pallas,

Pallas, Reiſ. Ausz. Anh. III. p. 5. n. 11. Gracula *Sturnina.*

11. CAYENNENSIS. *Die geſtreifte cayenniſche Azeldohle.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 193. n. 14. Gracula (Scandens) corpore transverſim ſtriato, ſupra ruſo, ſubtus luteſcente, capite ruſo alboque vario, rectricibus apice denudatis aculeatis.
Latham, Vögel, I. 2. p. 384. n. 11. *die cayenniſche Atzel.*

12. CARUNCULATA. *Die Azeldohle vom Cap?*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 324. n. 7. Sturnus (Gallinaceus) cinereus, regione oculorum nuda, ad baſin mandibulae inferioris palea duplici criſtaque verticis membranacea, bifida, erecta, fulva.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 4 Gattungen vermehrt, und bey der *erſten* Gattung ſind *zwey* Varietäten aus einander geſetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Die Azeldohle von Neuholland.*

Latham, Syn. Suppl. p 91. Yellow-faced Grakle.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 193. n. 13. Gracula (Icterops) nigra, faſcia alarum corporeque ſubtus albis, regione oculorum nuda rugoſa.
Latham, Vögel, I. 2. p. 385. n. 12. *die neuholländiſche Atzel.*

54. GESCHLECHT. PARADISEA. *Der Paradiesvogel.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 197. Gen. LIV.
Leſke, Naturgeſch. p. 246. Gen. XXIII.
Borowſky, Thierreich, II. p. 120. Gen. XIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 176. Gen. XXII.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 373. Gen. XXII.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 169. Gen. XVIII.
Halle, Vögel, p. 267. 2.
Neuer Schauplatz der Natur, VI. p. 342.
Onomat. hiſt. nat. V. p. 79. VI. p. 164.
Klein, av. p. 63. Gen. XI.
Briſſon, ornith. I. p. 193. Gen. XX. *Manucodiata.*
Büffon, Vögel, VII. p. 316 ff.
Batſch, Thiere, I. p. 316. 331. Gen. LXX.
Latham, allg. Ueberſicht der Vögel, I. 2. p. 386. Gen. XVI.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 194. Gen. XVII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 201.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 237. Gen. XV.

1. APODA. *Der groſse Paradiesvogel.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 197. n. 1. *Luftvogel.* Tab. 26. fig. 5.
Leſke, Naturgeſch. p. 246. n. 1. *der groſse Paradiesvogel.*
Borowſky, Thierreich, II. p. 121. n. 2. *der Luftvogel.*
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 176. n. 1. Paradiſea (Apoda) brunnea, pennis hypochondriis luteis corpore longioribus, rectricibus duabus intermediis longis ſetaceis.

Bechſtein,

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 374. n. 1. *der groſse Paradiesvogel.*

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 171. *der groſse Paradiesvogel.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 335. *der eigentliche Paradiesvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 59. *Paradiesvogel.* Tab. 24. fig. 1.

Halle, Vögel, p. 267. n. 216. *der gelbrothe Paradiesvogel, mit goldgelbem Kopfe und zwey Ruderfedern.*

Halle, Vögel, p. 268. n. 217. *der röthlich braune Paradiesvogel.*

Halle, Vögel, p. 268. n. 218. *der weiſsbraune langleibige Paradiesvogel.*

Halle, Vögel, p. 269. n. 220. *der gemeine Paradiesvogel.*

Halle, Vögel, p. 271. n. 224. *der gröſste röthliche Paradiesvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 366. n. 292. *der Paradiesvogel, Gottesvogel.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 42. n. 7. *der Paradiesvogel.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 166. Paradiſea apoda.

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 194. *der Paradiesvogel.* Tab. 3.

Klein, av. p. 63. n. 1. Manucodiata, Avis Paradiſi.

Klein, Vorbereit. p. 119. n. 1. *Paradiesvogel mit goldgelbem Kopfe.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 63. n. 1. *Paradiesvogel mit goldgelbem Kopfe.*

Klein, av. p. 63. n. 3. Manucodiata III. *Aldrov.*

Klein, Vorb. p. 121. n. 5. Manucodiata III. *Aldr.*

Klein,

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 63. n. 3. *Reutervogel.*
Klein, av. p. 63. n. 5. Manucodiata V. ſeu vulgaris.
Klein, Vorber. p. 120. n. 5. *der gemeine.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 63. n. 5. *gemeiner Paradiesvogel.*
Klein, av. p. 63. n. 6. Manucodiata Rex.
Klein, Vorbereit. p. 120. n. 6. *Königsheher.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 63. n. 6. *Königsheher.*
Klein, av. p. 64. n. 8. Sebae avis parad. Aroeſica.
Klein, Vorbereit. p. 120. n. 8. *der aroeſiſche des Seba.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 63. n. 9. *röthlicher Paradiesvogel.*
Gesner, Vögelb. p. 392. *Paradiſsvogel oder Lufftvogel.* Fig. p. 393. ſchl.
Briſſon, ornitholog. I. p. 193. n. 1. Oiſeau-de-Paradis.
Büffon, Vögel, VII. p. 316. *der groſse Paradiesvogel;* mit 1 Fig.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 5. *der groſse Paradiesvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 387. n. 1. *der groſse Paradiesvogel.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 194. n. 1. Paradiſea (Apoda) caſtanea, collo ſubtus viridi-aureo, pennis hypochondriis corpore longioribus, rectricibus duabus intermediis longis ſetaceis.
Batſch, Thiere, I. p. 333. *der groſse Paradiesvogel.*
Scopoli, an. hiſt. nat. I. p. 43. Paradiſea apoda.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 42. n. 47. *der ohnbeinigte Paradiesvogel.*
Neue Mannichfalt. III. p. 292. *Himmelsvögel.*

Aller-

Allerneueste Mannichfalt. III. p. 98. *der große Paradiesvogel.*

Sonnerat, Reise n. Neuguinea, p. 56. n. 1.

Sander, über die Grösse und Schönheit der Natur, IV. p. 131. *der große Paradiesvogel.*

Goeze, nützl. All. II. p. 364. n. 5. *der Paradiesvogel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 776. *der größere Paradiesvogel.*

Valentin. muſ. muſeor. I. p. 462. *Paradiſzvögel.*

Loniceri, Kräuterb. p. 662. *Luftvogel, Paradiß-Vogel.* Fig. p. 663. mittelm.

Linné, Syſt. Natur. Edit. II. p. 52. Avis Paradiſaea.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 1. Paradiſea lutea, cauda, pectore abdomineque brunneis, gula azurea.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 110. p. 51. n. 1. Paradiſea (Apoda) pennis hypochondriis corpore longioribus, rectricibus intermediis longis ſetaceis.

Moehring, av. gen. p. 28. n. 2. Paradiſea.

Jonſton, av. p. 170. Tab. 55. Manucodiata Aldr. p. 71. Hippomanucodiata.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 167. Paradiſea apoda.

Gerin. ornith. I. p. 76. Tab. 63.

Pennant, ind. Zool. p. 31. n. 1.

Kirchmaier, de ave Paradiſi Manucodiata. Witt. 1662. 8.

Scaliger, Apodes ab India, et Manucodiata: De ſubtil. ex 228. p. 718. 722.

Helwig, de ave manucodiata ſeu paradiſiaca: *Eph. nat. cur.* Dec. I. an. 9. et 10. obſ. 194. p. 453.

Bartholin

Bartholin. de ave paradisiaca Hist. anat. Cent. 6. hist. 56. p. 292.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 237. n. 1. *der große Paradiesvogel.*

β. *Latham,* Vögel, I. 2. p. 389. n. 1. Var. A. *der kleine Paradiesvogel.*

Latham, Syn. II. p. 474. n. 1. A. Smaller bird of Paradise.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 194. n. 1. β. Paradisea minor papuana.

Pennant, ind. Zool. p. 33. n. 2.

2. Regia. *Der Königsparadiesvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 199. n. 2. *der Königsvogel.* Tab. 6. fig. 9.

Leske, Naturg. p. 246. n. 2. *der kleine Paradiesvogel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 120. n. 1. *der Königsvogel.* Tab. 13.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 374. n. 2. *der kleine Paradiesvogel.*

Halle, Vögel, p. 269. n. 221. *der König der Paradiesvögel.*

Halle, Vögel, p. 270. n. 222. *der König der großen Paradiesvögel.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 367. n. 293. *der Königsparadiesvogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 168. *der Königsvogel.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 195. *der kleine Paradiesvogel.*

Klein, av. p. 64. n. 7. Rex avium paradisiacarum maioris moduli.

Klein, Vorbereit. p. 120. n. 7. *der große Paradiesvogelkönig.*

Klein,

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 63. n. 7. *größerer Königsheher.*

Briffon, ornitholog. I. p. 195. n. 2. Petit oifeau-de-Paradis.

Büffon, Vögel, VII. p. 332. *der Königs-Paradiesvogel;* mit 1 Figur.

Batfch, Thiere, I. p. 333. *der Königsparadiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 390. n. 2. *der Königs-Paradiesvogel.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 194. n. 2. Paradifea (Regia) caftaneo-purpurea, fubtus albida, fafcia pectorali viridi-aurea, rectricibus 2. intermediis filiformibus, apice lunato-pennaceis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 6. *der fogenannte König der größern Paradiesvögel.*

Sander, über die Gröfse u. Schönheit in der Nat. IV. p. 131. *der kleinere Paradiesvogel.*

Valentin, muf. mufeor. I. p. 463. Manucodiata regia; *Königsvogel.*

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 56. n. 2. *Königsvogel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 776. *der kleinere Paradiesvogel.*

Linné, Syft. Nat. Edit. II. p. 52. Manucodiata.

Linné, Syft. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 2. Manucodiata.

Linné, Syft. Nat. Ed. X. I. p. 110. n. 2. Paradifea (Regia) cirrhis caudalibus filiformibus, apice lunato pennaceis.

Jonfton, av. p. 196. Tab. 55. Rex avium paradifiacarum.

Grützmann, diff. de avibus paradifiacis, earumque rege. Ien. 1657.

Gerin. ornith. I. p. 79. Tab. 66.

Pennant,

Pennant, ind. Zool. p. 36. n. 7.
Petiver, gazophyl. Dec. I. Tab. 53. fig. 2.

3. TRISTIS. *Der philippiniſche Paradiesvogel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 201. n. 3. *Baſtard.*
Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 170. Paradiſea triſtis.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 368. n. 294. *der philippin. Paradiesvogel*
Briſſon, ornitholog. I. p. 235. n. 35. Merle des Philippines.
Büffon, Vögel, VII. p. 356. *der philippiniſche Paradiesvogel.*
Büffon, Vögel, IX. p. 214. *der Martin;* m. 1 F.
Latham, Vögel, I. 2. p. 378. n. 3. *der Martin.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 190. n. 3. *Gracula* (Triſtis) caſtaneo-fuſca, capite colloque fuſcis, area pone oculos triangulari nuda, macula remigum tectricibusque lateralibus apice albis.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 202. Paradiſea triſtis.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 238. n. 2. *der philippiniſche Paradiesvogel.*

4. MAGNIFICA. *Der prächtige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 339. *der prächtige Paradiesvogel;* mit 1 Figur.
Batſch, Thiere, I. p. 333. *der prächtige Paradiesvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 391. n. 3. *der prächtige Paradiesvogel.* Tab. 22.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 195. n. 3. Paradiſea (Magnifica) caſtaneo-fuſca, capiſtro nigro, cervice cirrhata flava, collo ſubtus pectoreque viridi-nigris, medio nitentibus.

Sonne-

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguin. p. 158. *der fünfte od. prächtige Paradiesvogel.*
Pennant, ind. Zool. p. 38. n. 3.

5. NIGRA. *Der ſchwarze Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 392. n. 4. *der Paradiesvogel mit dem Halsbande.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 196. n. 5. Paradiſea (Gularis) purpureo-nigricans, capiſtro genisque tomentoſis, cervice faſciaque pectorali viridi-nitentibus, ſub gula lunula cuprea-aurea, fulgidiſſima.

6. SUPERBA. *Der violetkehlige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 344. *der violetkehligte Paradiesvogel;* mit 1 Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 332. *der violetkehlige Paradiesvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 392. n. 5. *der violetkehlige Paradiesvogel.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 196. n. 7. Paradiſea (Superba) fronte criſtata, capite, cervice abdomineque viridibus, gula violacea ſericea, cauda mediocri caeruleſcenti-atra.
Sonnerat, Reiſ. nach Neuguinea, p. 57. *der dritte, violetkehligte Paradiesvogel.*
Hermann, tab. affinit. animal. p. 166. Paradiſea ſuperba.
Pennant, ind. Zool. p. 38. n. 4.

7. AUREA. *Der goldkehlige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 347. *der ſechsfädigte Paradiesvogel;* mit 1 Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 332. *der ſechsfadige Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 395. *der sechsfädige Paradiesvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 196. n. 9. Paradisea (Sexsetacea) cristata atra, vertice, genis gulaque violaceo-nigris, iugulo, macula cervicis pectoreque viridi-nitentibus, regione aurium utrinque pennis setaceis tribus longissimis.

Neue Mannichfalt. VI. p. 587. *der guineische Paradiesvogel, die Goldkehle genannt.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 166. 202. Paradisea sexfilis.

Pennant, ind. Zoolog. p. 38. n. 4.

8. Viridis. *Der stahlfarbige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 353. *der stahlfarbige Paradiesvogel;* mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 332. *der stahlfarbige Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 396. n. 7. *der stahlblaue Paradiesvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 197. n. 10. Paradisea (Chalybea) caeruleo-viridis, capite sericeo nigro tomentoso, dorso, uropygio, abdomine caudaque chalybeo-nitentibus.

Sonnerat, Reis. n. Neuguinea, p. 59. n. 6. *der grüne Paradiesvogel.*

Pennant, ind. Zoolog. p. 38. n. 6.

9. Alba. *Der weiße Paradiesvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 197. n. 12. Paradisea (Alba) tota alba.

Allerneueste Mannichfalt. III. p. 103. *der weiße Paradiesvogel.*

β. Der

β. *Der schwarz- und weiße Paradiesvogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 197. n. 12. β. Paradisea anterius nigra, posterius alba, pennis 12. setaceis pene nudis incurvis.
Allerneueste Mannichfalt. III. p. 103. *der schwarz und weiße Paradiesvogel.*
Gerin. ornith. I. Tab. 65. fig. 1?

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 6 Gattungen vermehrt, und bey der *ersten* sind 2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der schwarze Paradiesvogel mit stehendem Busche.*
Halle, Vögel, p. 268. n. 219.
Klein, av. p. 63. n. 4. Manucodiata IV. Aldr.
Klein, Vorber. p. 120. n. 4. *mit krausen Haaren.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 63. n. 4. *Straußvogel.*
Brisson, ornithol. I. p. 195. Species quarta *Aldr.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 195. n. 4. Paradisea (Cirrhata) capite, collo alisque nigris, cirrho prope cervicem capistroque flavis.
Aldr. av. I. p. 811. Tab. 814. Manucodiata 4ta, seu cirrhata.
Raj, Synops. p. 21. n. 4.
Will. ornith. p. 92. Crested Bird of Paradise.
Vielleicht eine Spielart von *Paradisea magnifica?*

2. Paradisea (Furcata) nigra, fasciculo sub alis tomentoso, medio abdominis pennis caudae furcatae instar viridi-splendentibus.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 196. n. 8.
Ein unvollständiger Vogel.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der weißflügelichte Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 397. n. 9. *der weißflügelige Paradiesvogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 92. White-winged Paradise-Bird.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 196. n. 6. Paradisea (Leucoptera) nigra, cervice cupreo-splendente, remigibus albis extus nigro-marginatis, cauda longissima cuneiformi.

55. GESCHLECHT. Trogon. *Der Baumhacker.* (Kuruku.)

Müller, Natursyst. II. p. 202. Gen. LV.

Leske, Naturgesch. p. 247. Gen. XXIV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 122. Gen. XIV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 176. Gen. XXIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 165. Gen. VI.

Onomat. hist. nat. VII. p. 590 sqq.

Brisson, ornith. II. p. 87. Gen. LI.

Batsch, Thiere, I. p. 321.

Latham, Vögel, I. 2. p. 398. Gen. XVII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 198. Gen. XVIII.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 184. 186.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 238. Gen. XVI.

1. Strigilatus. *Der gestreifte Baumhacker.*

Müller, Natursyst. II. p. 202. 1. *gestreifte Baumhacker.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 592. *der graue oder gestreifte Baumhacker aus Cayenne.*

Brisson,

Briſſon, ornithol. II. p. 88. n. 1. Couroucou cendré de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 401. n. 3. *der aſchgraue Kuruku.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 20. n. 4. Trogon (Strigilatus) cinereus, abdomine fulvo, alis ſtrigis albis, rectricibus nigris, 3 lateralibus extus albo faſciatis, apice albis.

2. Curucui. *Der Curucui.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 203. n. 2. *Schwarzkehle.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 123. n. 1. *der ſchwarzkehlige Baumhacker.* Tab. 14.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 165. *der ſchwarzkehlige Baumhacker.*

Halle, Vögel, p. 179. n. 87. *der rauhfüßige amerikaniſche Baumhacker.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 535. VII. p. 592. *Curucui.*

Klein, av. p. 28. n. 16. Picis congener Curucui.

Klein, Vorbereit. p. 54. n. 16. *der ſpechtartige Curucui.*

Briſſon, ornithol. II. p. 90. n. 4. Couroucou verd du Bréſil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 398. n. 1. *der rothbäuchige Kuruku.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 198. n. 1. Trogon (Curucui) viridi-aureus, ſubtus fulvo-miniaceus, gula nigra, tectricibus alarum rectricibusque 3. extimis albo nigroque faſciatis.

Eberhard, Thiergeſch. p. 106. *Couroucou.*

Moehring, av. gen. p. 85. n. 114. Trogon.

Jonſton, av. p. 205. Curucui.

Gerin. ornith. II. p. 53. Tab. 187.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 238. n. 1. *der Curucui.*

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 399. n. 1. Var. A.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 198. β. Tr. tectricibus alarum fuscis, macula nuda infra oculos nulla.

γ. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 399. n. 1. Var. B.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. δ. Tr. viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra, tectricibus alarum rectricibusque 3. extimis, albo nigroque fasciatis.

δ. *Latham*, Syn. II. p. 486. n. 1. B.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 198. γ. Tr. griseo-cinereus, viridi-nitens, abdomine postico rubro, cauda longiore.

3. Viridis. *Der grüne Baumhacker.*
Müller, Natursystem, II. p. 203. n. 3. *der grüne Baumhacker.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 123. n. 2. *der grüne Baumhacker.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 176. n. 1. Trogon (Viridis) viridi-aureus, subtus luteus, gula nigra.
Onomat. hist. nat. VII. p. 593. *der grüne Baumhacker aus Cayenne.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 192. *der grüne Curucui.*
Brisson, ornithol. II. p. 88. n. 2. Couroucou verd de Cayenne.
Latham, Vögel, I. 2. p. 400. n. 2. *der gelbbäuchige Kurukn.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. n. 2. Trogon (Viridis) viridi-aureus, subtus luteus, gula

gula nigra, rectricibus utrinque tribus extimis oblique et dentatim albis.

Gerin. ornith. II. p. 53. Tab. 189.

β. *Brisson*, ornitholog. II. p. 89. n. 3. Couroucou verd à ventre blanc de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 401. n. 2. Var. A. *der weißbäuchige Kuruku.*

Latham, Syn. I. p. 489. n. 2. A. White-bellied Curucui.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. n. 2. β.

4. RUFUS. *Der braunrothe Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 402. n. 4. *der gelbrothe Kuruku.* Tab. 24.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 200. n. 5. Trogon (Rufus) rufus, corpore subtus flavo, alis griseo nigroque striatis, rectricibus 3. utrinque lateralibus albo nigroque fasciatis, apice albis.

5. VIOLACEUS. *Der violetfarbige Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 402. n. 5. *der violette Kuruku.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. n. 3. Trogon (Violaceus) violaceus, dorso viridi, tectricibus alarum remigibusque secundariis albo maculatis, rectricibus 3. lateralibus albo nigroque fasciatis, apice albis.

6. MACULATUS. *Der braune, weißgefleckte Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 403. n. 6. *der gefleckte Kuruku.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 201. n. 7. Trogon (Maculatus) fusco et nigricante fasciatus, vertice viridi, tectricibus alarum remigibusque

 secun-

ſecundariis viridibus apice albis, cauda nigricante faſciis albis.

7. Fasciatus. *Der bandirte Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 403. n. 7. *der Band-Kuruku.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 200. n. 6. Trogon (Faſciatus) dorſo ferrugineo, corpore ſubtus fulvo-rubro, capite colloque nigricantibus, faſcia pectorali alba, alis albo nigroque faſciatis, cauda apice nigra.

Murr: Naturforſch. I. p. 267. *der Curucu mit der Binde.*

Berlin. Samml. IX. p. 191. n. 5. *der bandirte Kuruku.*

Neueſte Mannichfalt. I. p. 188. n. 5. *der bandirte Kuruku.*

β. Trogon fuſco-flaveſcens, ſubtus rubro-flavicans, capite nigricante, collo et pectore cinereis, tectricibus alarum albo-ſtriatis, cauda nigra. *

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 200. n. 6. β.
Latham, Syn. Suppl. p. 93.
Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 591. *der ceyloniſche Baumhacker.*
Briſſon, ornithol. II. p. 91. n. 7. Couroucou de Ceylon.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit vier Gattungen vermehrt, und bey der zweyten ſind 4 Varietäten aus einander geſetzt.

B. *Neue-*

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der grüne aſiatiſche Baumhacker, mit blauer Kehle.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 405. n. 8. *der blauwangige Kuruku.*

Latham, Syn. Suppl. p. 93. Blue-cheeked Curucui.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 201. n. 8. Trogon (Aſiaticus) viridis, fronte, vertice cerviceque rubris, gula caerulea macula rubra, remigibus rectricibusque nigris.

2. *Der ſchwärzliche indianiſche Baumhacker, mit blauem Schnabel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 94. Indian Curucui.

Latham, Vögel, I. 2. p. 405. n. 9. *der indiſche Kuruku.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 201. Trogon (Indicus) nigricans, ſupra ferrugineo maculatus, ſubtus flaveſcens nigricante faſciatus, capite nigro albo ſtriato, cauda longiſſima faſciata.

56. GESCHLECHT. Bucco. *Das Groſsmaul.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 204. Gen. LVI.

Leske, Naturgeſch. p. 247. Gen. XXV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 124. Gen. *

Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 177. Gen. XXIV.

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 168. Gen. XII.

Briſſon, ornitholog. II. p. 67. Gen. XLIX.

Latham, allgem. Ueberſ. der Vögel, I. 2. p. 406. Gen. XVIII.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 201. Gen. XIX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 184.

Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 238. Gen. XVII.

2. TAMATIA. *Die Tamatia.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 406. n. 1. *der brasilianische Bartvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 95. Spotted - bellied Barbet.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 201. n. 1. Bucco (Tamatia) rufo - fuscus, subtus rufo - albus, nigro maculatus, gula fulva, collo lunula rufo nigroque varia, pone oculos macula nigra.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 239. n. 1. *die Tamatia.*

3. CAYENNENSIS. *Das cayennische Großmaul.*

Brisson, ornitholog. II. p. 68. n. 2. Barbu de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 407. n. 2. *der cayennische Bartvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 202. n. 2. Bucco (Cayennensis), niger, pennis margine griseo-aureis, subtus albo - flavicans, fronte gulaque rubris, superciliis albis.

Gerin. ornith. II. p. 51. Tab. 183.

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 408. n. 2. Var. A. *der schwarzgefleckte Bartvogel.*

Latham, Syn. II. p. 496. n. 2. A. Black - spotted Barbet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 202. n. 2. β. B. nigricans, subtus - albo - flavescens, fronte gulaque rubris, collo subtus, pectore et lateribus maculis nigris.

Brisson, ornitholog. II. p. 68. n. 3. Barbu tacheté de Cayenne. (7)

1. CAPEN-

(7) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

1. CAPENSIS. *Die Tamatia mit dem Halsbande.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 204. n. 1. *Capſche.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 124. *das capiſche Groſsmaul.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 177. n. 1. Bucco (Capenſis) rufus, faſcia humerali fulva, pectorali nigra.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 168. *das capiſche Groſsmaul.*

Briſſon, ornithol. II. p. 67. n. 1. Barbu.

Batſch, Thiere, I. p. 326. *das kapiſche Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 408. n. 3. *der Bartvogel mit dem Halsbande.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 202. n. 3. Bucco (Collaris) rufus, faſcia humerali fulva, pectorali nigra.

Gerin. ornithol. II. p. 51. Tab. 182.

4. ELEGANS. *Das bunte Groſsmaul.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 88. n. 2. Bucco Verſicolor; *der Scheck.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 69. n. 5. Barbu des Maynas.

Latham, Vögel, I. 2. p. 409. n. 4. *der ſchöne Bartvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 203. n. 4. Bucco (Maynanenſis) viridis, capite gulaque rubris caeruleo-marginatis, iugulo et pectore flavo, abdominis macula rubra.

5. MA-

(8) Da das Vaterland dieſes Vogels nicht das Vorgebirge der guten Hoffnung ſondern Guiana iſt, ſo iſt der Linneiſche Trivialname nicht richtig, der Lathamſche hingegen weit anpaſſender.

5. MACRORHYNCHOS. *Das großschnäblichte Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 409. n. 5. *der große bunte Bartvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 203. n. 5. Bucco (Macrorhynchos) niger, fronte, gula, iugulo, abdomine rectricibusque apice albis, fascia pectorali nigra.

6. MELANOLEUCOS. *Das schwarz- und weiße Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 410. n. 6. *der kleine bunte Bartvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 203. n. 6. Bucco (Melanoleucos) niger, corpore subtus, fronte, gula, macula scapulari strigaque pone oculos albis, fascia pectorali lata nigra.

7. PHILIPPINENSIS. *Das philippinische Großmaul.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 88. n. 3. Bucco Haemacephalus; *der Blutkopf.*

Brisson, ornithol. II. p. 69. n. 4. Barbu des Philippines.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 203. n. 7. Bucco (Philippensis) viridis, subtus flavicans maculis olivaceis, genis colloque subtus flavis, fronte fasciaque pectorali rubris.

Latham, Vögel, I. 2. p. 411. n. 7. *der philippinische Bartvogel.*

8. NIGER. *Das schwarze Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 411. n. 8. *der schwarzkehlige Bartvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 204. n. 8. Bucco (Niger) niger, supra flavo-varius, sincipite rubro,

rubro, lateribus colli ſtriga bifida, pectore abdomineque albis.

β. *Latham*, Syſt. ornitholog. I. p. 204. n. 8. β. (Vielleicht ein junger Vogel?)

Latham, Vögel, I. 2. p. 412. n. 8. Var. A.

9. Parvus. *Das kleine ſenegaliſche Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 412. n. 9. *der kleine Bartvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 204. n. 9. Bucco (Parvus) fulvo-nigricans, ſubtus albus fuſco-ſtriatus, gula lutea, ſtriga ſuboculari alba.

10. Grandis. *Das groſse chineſiſche Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 113. n. 10. *der groſse Bartvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 204. n. 10. Bucco (Grandis) viridis verſicolor, remigibus nigro-variegatis, criſſo rubro.

β. B. ſordide viridis, ſubtus vireſcens, remigibus nigris, orbitis nudis rubicundis. *

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 204. n. 10. β.

Latham, Syn. Supplem. p. 95. Grand Barbet.

11. Viridis. *Das grüne Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 413. n. 11. *der grüne Bartvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 205. n. 11. Bucco (Viridis) viridis, capite colloque griſeo-fuſcis, ſupra poneque oculum utrinque macula alba.

12. Lathami. *Das olivenfarbige Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 413. n. 12. *der Bartvogel mit gelblichem Geſichte.* Tab. 25.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 205. n. 12. Bucco (Lathami) olivaceus, remigibus caudaque obſcuris,

ſcuris, facie mentoque ex ſubfuſco rufeſcente.

13. Fuscus. *Das braune Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 414. n. 13. *der weiſsbrüſtige Bartvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 206. n. 17. Bucco (Fuſcus) fuſcus, ſcapis pennarum flaveſcentibus, capite tumido, pectoris macula triquetra alba.

14. Rubricapillus. *Das rothköpfige Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 414. n. 14. *der rothköpfige Bartvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 205. n. 13. Bucco (Rubricapillus) viridis, vertice gulaque coccineis, humeris macula albida, pectore flavo, faſcia rubra, nigro marginata, abdomine albo.

15. Zeylanicus. *Das zeilaniſche Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 415. n. 15. *der gelbwangige Bartvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 205. n. 15. Bucco (Zeylanicus) viridis, capite colloque pallide fuſcis, genis nudis flavis, tectricibus alarum albo maculatis.

16. Dubius. *Das Groſsmaul aus der Barbarey.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 415. n. 16. *der Barbikan.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 206. n. 16. Bucco (Dubius) niger, ſubtus ruber, faſcia pectoris, femoribus, criſſoque nigris.

β. Buc-

β. Bucco caeruleo-nigricans, dorſo macula alba, corpore ſubtus, lunula pone oculos faſciaque alarum rubris. *

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 206. n. 16. β.
Latham, Syn. Suppl. p. 96. Doubtful Barbet.
Latham, Vögel, I. 2. p. 416.

17. CINEREUS. *Das aſchgraue cayenniſche Groſsmaul.* (9)

Latham, Vögel, I. 2. p. 416. n. 17. *der rothſchnäblige Bartvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 446. n. 42. *der ſchwarze cayenniſche Kuckuck.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 206. n. 18. Bucco (Calcaratus) niger, ſubtus cinereus, tectricibus alarum albo marginatis, flexura ſpinula alba.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit *ſechszehen* Gattungen vermehrt, denn die XII. Edition hat nur *eine* Gattung.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Das indianiſche Groſsmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 417. *der indiſche Bartvogel.*
Latham, Syn. Supplem. p. 97. Indian Barbet.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 205. n. 14. Bucco (Indicus) viridis, ſupra albus ſtriis viridibus, capite

(9) Nach *Latham* gehört hieher auch der *Cuculus Tranquillus* p. 417. n. 38. und der *Corvus Auſtralis* p. 377. n. 45. des Linneiſchen Syſtems, und die daſelbſt angeführten Synonymen.

capite nigro, fronte iuguloque rubris, genis, gula maculaque pectoris flavis.

2. *Das braunrothe indianische Großmaul mit blauen Flügeln und Schwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 207. n. 19. Bucco (Gerini) rufus, pectore albido, capite superiore, dorso, alis caudaque caeruleis, macula verticis, gula iuguloque nigris.

Gerin. ornith. II. p. 51. Tab. 181. Picus indicus magna ex parte caeruleus.

57. GESCHLECHT. CUCULUS. *Der Kuckuck.*

Müller, Natursystem, II. p. 205. Gen. LVII.

Leske, Naturgesch. p. 247. Gen. XXVII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 124. Gen. XV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 177. Gen. XXV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 354. Gen XIV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 484. Gen. VIII.

Halle, Vögel, p. 148 ff.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 252.

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 852 ff.

Onomat. hist. nat. III. p. 480 sqq.

Klein, av. p. 29. Gen. III.

Brisson, ornith. II. p. 70. Gen. L.

Batsch, Thiere, I. p. 316. 319. Gen. LXV.

Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. 2. p. 418. Gen. XIX.

Latham, Syst. ornith. I. p. 207. Gen. XX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 185.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 239. Gen. XVIII.

1. CA-

1. CANORUS. *Der gemeine europäische Kuckuck.* (10)
Müller, Naturſyſt. II. p. 305. n. 1. *gemeine europäiſche.*
Leſke, Naturgeſch. p. 247. n. 1. *der europäiſche Kukuk.*

Borowsky,

(10) Ein unruhiger und ſcheuer Vogel, deſſen Naturgeſchichte von den älteſten Zeiten her mit vielen Fabeln durchwebt geweſen iſt. Er hat einen ſchwimmenden kurzen, unterbrochenen und niedrigen Flug, liebt vorzüglich waldige Gegenden, wo in der Nähe Wieſen liegen, und leidet auſser ſeinem Weibchen, in einem Bezirke von ohngefähr einer Stunde im Umfange, den beyde täglich geſellſchaftlich durchſtreichen, keinen ſeines Gleichen. Daſs das Weibchen des Kuckucks, (wenigſtens in *Deutſchland*) nicht ſelbſt brütet, iſt auſser Zweifel, und es iſt, *Barringtons* u. a. Behauptung ohnerachtet, nicht wahrſcheinlich, daſs es ſich in England u. ſ. w. anders verhalte. Die Urſache hievon ſcheint weder im äuſsern noch innern Bau des Vogels, ſondern in ſeinem kurzen Aufenthalt in unſern Zonen, und im Ruf der Natur, eine zahlreiche Nachkommenſchaft hervorzubringen, zu liegen. Eben ſo wird auch von den allermehreſten Ornithologen einſtimmig die Behauptung anderer verworfen, daſs der *Kuckuck* kleine Vögel verzehre, und alſo gewiſſer Maſsen als Raubvogel zu betrachten ſey. In ſeinem Magen hat man Fliegen und Käfer von verſchiedener Art, kleine Schnecken mit unzerbrochenen Häuschen, Grashüpfer, Raupen, Stückchen von Pferdebohnen, Weitzen, kleine Wicken, und andere Pflanzentheile gefunden. So viel iſt aber gewiſs, daſs der ganz junge Kuckuck die mit ihm zugleich ausgekommenen Grasmücken ſowohl, als die neben ihm liegenden Eyer aus dem Neſte ſchiebt, welches er jedoch zu thun nachläſst, ſo wie er mehrere Tage älter wird. Das Kuckucksey wird in vierzehn Tagen ausgebrütet. In drey Wochen iſt der junge Kuckuck flügge, und dann vergehen gewöhnlich noch fünf Wochen, ehe er allein freſſen kann. Er wächſt ungewöhnlich ſchnell. Seine Stimme gleicht, ſo lange er an ſeinem Geburtsorte verweilt, nie dem Geſang des erwachſenen Kuckucks. *Alte* ſterben gleich in der Gefangenſchaft.

Borowſky, Thierreich, II. p. 125. n. 2. *der gemeine Kukkuk.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 177. n. 1. Cuculus (Canorus) cauda rotundata, nigricante albo-punctata; *der Kuckuck.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 355. n. 1. *der gemeine Kuckuck.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 484. *der gemeine Kuckuck.* p. 595. *der europäiſche Kuckuck, aſchgraue Kuckuck, ſingende Kuckuck, Guckguck, Guckgu, Gugug, Guckaug, Gugauck, Gukker, Guckufer,* krain. *Kukauza.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 328. *der Kukuk.*

Ebert, Naturl. II. p. 51. *der Guckguck.*

Halle, Vögel, p. 148. n. 89. *der gemeine Kukkuk.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 368. n. 295. *der Kuckuck.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 252. A. *der europäiſche Kukuk.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 39. n. 2. *der gemeine Guckuck.*

Neuer Schauplatz d. Natur, IV. p. 852. *Kukuk.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 483. *der Kuckug, Guckauch, Gucker, Guckufer.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 188. *der Kukuck.*

Handbuch d. deutſchen Thiergeſch. p. 121. *der Kuckuck.*

Klein, av. p. 30. n. 1. Cuculus vulgaris, noſtras.

Klein, Vorbereit. p. 57. n. 1. *Guckauch, Gucker, Guckufer.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 33. n. 1. *gemeiner Kuckuck.*

Klein, ſtemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 5. a. b. c.

Gesner, Vögelb. p. 147. *Gucker;* mit 1 mittelm. Figur.

Briſſon,

Briſſon, ornitholog. II. p. 70. n. 1. Coucou.
Batſch, Thiere, I. p. 320. *der gemeine Kukkuk.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 419. n. 1. *der gemeine Kuckuck.*
Latham, Syn. Suppl. p. 98. Common Cuckow.
Latham, Syſt. ornitholog. I p. 207. n. 1. Cuculus (Canorus) cinereus ſubtus albidus fuſco transverſim ſtriatus, cauda rotundata nigricante, albo punctata.
Beſeke, Vögel Kurlands, p. 34. n. 52. *der gemeine europäiſche Kukkuk.*
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 304. n. 53. *gemeiner Guckguck.*
Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 86. *der Kukuk.*
Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 73. n. 63. *gemeiner Kuckuk.*
White, Naturgeſch. von England, p. 33. n. 6. p. 59. n. 8. p. 69. p. 133. *der Kukuk.*
Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 167. *Giögen.*
Pontoppidan, Naturhiſtorie von Norwegen, II. p. 142. *Gög.*
Fabricius, Reiſ. n. Norwegen, p. 173. *der Kukuk.*
Pallas, Reiſe d. Ruſsl. III. p. 188. *der Kukuk.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 15. *der Kukuk.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 43. n. 48. *der gemeine Kukuk.*
Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 289. n. 65. *der gemeine Kukkuk.*
Zorn, Petinotheol. I. p. 360. II. p. 89. 126. 245. 553. 716. *der Guguck.*
Döbel, Jägerpraktik, I. p. 61. *Kuckuck.*
Naumann, Vogelſteller, p. 133. *Guckguk oder Kuckuk.*

Naturforscher, IX. p. 48. n. 52. *gemeiner europäischer Guckguck.*

Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 267. *Guckgu.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 562. *Kuckuck.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 423. *der Kukkuk.*

Lichtenberg u. *Voigt*, Magaz. f. d. Neueste u. s. w. I. 2. p. 15. — 3. p. 69. *der Kukuk.*

Bechstein, in *Lichtenbergs* u. *Voigts* Magaz. u. s. w. VI. 1. p. 60. *der gemeine aschgraue Kuckuck.*

Jenner, in *Lichtenbergs* u. *Voigts* Magaz. u. s. w. VI. 4. p. 45. *Kukkuk.*

Schwed. Abh. XXXVIII. p. 294. 296. *Gukkuck.*

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 46. *Guguck.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 451. n. 18. *der gemeine europäische Guckguck.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 107. n. 12. *der Kuckuk.*

Goeze, nützl. Allerley, I. p. 27. II. p. 312. *der Kukuk.*

Beckmann, phys. ökon. Bibl. VII. p. 584. *der Kukuk.*

Oekonom. Zool. p. 207. *der Kuckuck.*

Eberhard, Thiergesch. p. 105. *der Kukuk.*

Meidinger, Vorles. I. p. 118. *der europäische Kukuk.*

Loniceri, Kräuterbuch, p. 673. *Guckguck, Gutzgauch, Gauch.*

Merklein, Thierreich, p. 274. *Guckug.*

Hamburg. Magazin, IV. p. 414. *Kukuk*

Wirsing, Vögel, Tab. 38. 39. 40. *Kuckuck.*

Neues bremisches Magazin, II. p. 102. (warum das Weibchen des Kukkuks nicht brütet?)

Heinsii,

Heinsii, diss. de impio alite Cuculo. Witt. 1638. 4. pl. 3.

Vinhold, progr. de Cuculo. Cygn. 1711. fol. pl. 1.

Le Coucou. Discours apologetique sur le Coucou; par *Lottinger*. Nancy 1775. 8.

Der Kukuk, von H. A. I. *Lottinger*; a. d. Franz. übersetzt. Strasb. 1776. 5½ B. kl. 8.

Clauder: Ephem. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 172. p. 330.

Comment. Lips. Dec. III. Suppl. p. 545.

Barchewitz, ostind. Reisebeschreib. L. 2. c. 11. p. 227.

Wiegand, de Cuculo, umbra nocturna, capella coelesti, Bubone et Margarita. Regiomont. 1588. 4. 4½ Bogen.

Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 53. Cuculus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 1. Cuculus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 110. n. 1. Cuculus (Canorus) cauda aequali nigricante, albo punctata.

Müller, zool. dan. prodr. p. 12. n. 95. Cuculus (Canorus) cauda rotundata nigricante, albopunctata.

Kramer, Austr. p. 337. n. 1. Cuculus rectricibus nigricantibus, punctis albis.

Brünich, ornithol. bor. p. 10. n. 36. *Cuculus Canorus*.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 249. Cuculus; *ein Kuckuck, Guckauch, Gucker*. p. 251. Cuculus iunior; *ein junger Kuckuck*.

Moehring, av. gen. p. 34. n. 12. Cuculus.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 31.

Gerin. ornith. I. p. 80. Tab. 67. 69.

Jonston, av. p. 26. Cuculus.

Plin. hiſt. nat. L. X. c. 9. Coccyx.
Ariſtot. hiſt. anim. L. VI. c. 4. n. 14. Κοκκυξ.
Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 239. n. 1. *der gemeine europäiſche Kuckuck.*

β. *Der rothbraune Kuckuck.*

Bechſtein, Naturgeſch. p. 359. n. 2. *der braunrothe Kuckuck?*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 495. n. 2. *der rothbraune Kuckuck.* Tab. 18?
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 108. n. 13. *der rothbraune Kuckuk?*
Bechſtein, in *Lichtenbergs* u. *Voigts* Magaz. u. ſ. f. VI. 1. p. 69. n. 2. *der braune Kuckuck?*
Briſſon, ornitholog. II. p. 72. A. Coucou roux.
Friſch, Vögel, Tab. 42.
Latham, Vögel, I. 2. p. 423. n. 1. Var. *der braunrothe Kuckuck.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 49. *der rothbraune Kuckuck?*
Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 49. *der rothbraune Kuckuk?*
Latham, Syn. II. p. 512. n. 1. A. Rufous Cuckow.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 208. n. 1. β. Cuculus rufus.
Gerin. ornith. I. p. 80. Tab. 68. Cuculus ex rufo et albo varius.

γ. *Der aſchgraue Kuckuck.* (1)

Beſeke, Naturgeſch. d. Vögel Kurl. p. 34. n. 53. 54. p. 36. Cuculus cinereus.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 208. n. 1. γ. C. griſeo-undulatus, rectricibus intermediis ordine

(1) *Beſeke* hält ihn für eine ganz eigene Gattung.

ne punctorum alborum duplici notatus, roſtro, orbitis pedibusque ſulphureis.

23. CAPENSIS. *Der Kuckuck vom Cap.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 90. n. 23. *der caapſche Guguck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 15. *kapſcher Kuckuck.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 40. n. 25. *der Edolio?*

Latham, Vögel, I. 2. p. 424. n. 2. *der capſche Kuckuck.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 208. n. 2. Cuculus (Capenſis) viridi-fuſcus, collo ſubtus tectricibusque alarum rufis, corpore ſubtus albo, nigro transverſim lineato, cauda rufa, apice alba.

2. ORIENTALIS. *Der orientaliſche Kuckuck.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 208. n. 2. *der aſiatiſche Guckguck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 855. n. 2. *der oſtindiſche Kuckuck.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 491. *der ſchwarze indianiſche Kuckug.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 81. n. 18. Coucou noir des Indes.

Latham, Vögel, I. 2. p. 427. n. 10. *der orientaliſche ſchwarze Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 210. n. 10. Cuculus (Orientalis) cauda rotundata, corpore nigro-virente nitente, roſtro fuſco.

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 427. n. 10. Var. A.
Latham, Syn. II. p. 518. n. 10. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 210. n. 10. β. Cuculus caeruleo-nigricante nitens, remige extima breviore.

3. MINDANENSIS. *Der Kuckuck von Mindanao.*

Müller, Natursystem, II. p. 209. n. 3. *Philippinische.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 855. n. 3. *der Gefleckte aus Mindanao.*

Onomat. histor. nat. III. p. 495. *der gefleckte Kuckug von Mindanao.*

Brisson, ornithol. II. p. 77. n. 12. Coucou tacheté de Mindanao.

Latham, Vögel, I. 2. p. 425. n. 5. *der mindanaische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 209. n. 5. Cuculus (Mindanensis) cauda rotundata, corpore viridi-aureo, fusco-albo maculato, subtus albo-nigricante undulato.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 76.

4. VETULA. *Der langschnäblichte jamaicaische Kuckuck.* (Tacco.)

Müller, Natursyst. II. p. 209. n. 4. *Langschnabel.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 4. *Langschnabel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 490. *der langschnäblichte Kuckug von Jamaica.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 747. *das alte Weib.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 369. *der Langschnabel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 129. n. 3. *der langschnäblichte Kukkuk.*

Klein, av. p. 31. n. 8. *Sloan.* Fig. 2.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 8. *Sloan.* Fig. 2.

Klein,

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 33. n. 8. *noch eine andere Art.*

Briſſon, ornithol. II. p. 74. n. 5. Coucou à long bec de la Jamaique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 440. n. 32. *der Takko.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 218. n. 36. Cuculus (Vetula) cauda cuneiformi, corpore ſubfuſco, ſubtus teſtaceo, ciliis rubris.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 111. n. 3. Cuculus (Vetula) cauda cuneiformi, corpore ſubfuſco, ſubtus teſtaceo, ciliis rubris.

Gerin. ornith. I. p. 83. Tab. 79.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus longiroſtris. — Cuculus Vetula.

Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 240. n. 2. *der langſchnäblichte Kuckuck.*

24. Pluvialis. *Der groſſe jamaicaiſche Kuckuck.*

Halle, Vögel, p. 157. n. 95. *der groſſe Kukuk aus Jamaika.*

Klein, av. p. 31. n. 8. Cuculus jamaicenſis maior.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 8. *der Groſſe von Jamaika.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 33. n. 8. *jamaicaiſcher Kuckuck.*

Briſſon, ornith. II. p. 73. n. 4. Coucou de la Jamaique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 441. n. 33. *der Regenkuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 218. n. 37. Cuculus (Pluvialis) cauda cuneiformi, corpore cinereo-olivaceo, ſubtus rufo, collo inferiore albo, rectricibus lateralibus nigris, extimis latere interiore, omnibus apice albis.

25. MINOR. *Der kleine cayennische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 442. n. 34. *der kleine Kuckuk.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 219. n. 38. Cuculus (Seniculus) cauda cuneiformi breviore, corpore cinereo, subtus rufescente, gula alba.

5. GLANDARIUS. *Der Kuckuck von Andalusien.*

Müller, Natursyst. II. p. 210. n. 5. *der Afrikanische.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 125. n. 1. *der africanische, andalusische Kuckuck.* Tab. 15.

Halle, Vögel, p. 157. n. 92. *der gelbbäuchige Kuckuk mit liegendem Federbusche.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 7. *spanischer Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 489. *der gefleckte Kuckug von Andalusien.*

Klein, av. p. 3. n. 5. Cuculus Andalusiae.

Klein, Vorbereit. p. 58. n. 5. *der Kuckuck von Andalusien.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 5. *andalusischer Kuckuck.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 33. n. 9. *pyrenäischer Kuckuck.*

Brisson, ornith. II. p. 76. n. 10. Coucou d'Andalousie.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 9. *der große gefleckte Kukuk.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 424. *der große gefleckte Kuckuk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 208. n. 3. Cuculus (Glandarius) cauda cuneiformi, capite subcristato, alis albo et cinerascente maculatis, fascia oculari nigra.

Linné,

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 111. n. 4. Cuculus (Glandarius) cauda cuneiformi, capite ſubcriſtato, faſcia oculari nigra.

Gerin. ornith. I. p. 81. Tab. 70.

26. Serratus. *Der ſchwarze gehäubte Kuckuck.* (2)

Latham, Vögel, I. 2. p. 428. n. 11. *der ſchwarze gehaubte Kuckuk.*

Latham, Syn. II. p. 519. n. 11. Creſted black Cuckow.

Latham, Syn. Supplem. p. 100. Creſted black Cuckow.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 211. n. 12. Cuculus (Serratus) cauda cuneiformi, capite criſtato, corpore nigro nitido, macula alarum ſerratiformi alba.

27. Tahitius. *Der Kuckuck vom ſtillen Ocean.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 424. n. 4. *der otaheitiſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 209. n. 4. Cuculus (Taitenſis) fuſcus ferrugineo maculatus, ſubtus candidus longitudinaliter fuſco ſtriatus, cauda cuneiformi, faſciis ſublunatis ferrugineis.

Muſ. Carlſ. faſc. II. Tab. 32. Cuculus taitenſis.

6. Senegalensis. *Der ſenegaliſche Kuckuck.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 210. n. 6. *der Senegalliſche.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 129. n. 4. *der ſegaliſche Kukkuk.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 6. *ſenegalſcher Kuckuck.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 496. *der Kuckug von Senegal.*

Briſſon,

(2) Iſt nach *Latham* mit *Cuculus Ater* p. 415. n. 35. einerley.

Briſſon, ornitholog. II. p. 75. n. 7. Coucou du Sénégal.

Latham, Vögel, I. 2. p. 433. n. 18. *der ſenegaliſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 213. n. 19. Cuculus (Senegalenſis) cauda cuneiformi, corpore griſeo ſubtus albo, pileo rectricibusque nigricantibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Senegalenſis.

28. Bengalensis. *Der bengaliſche Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 433. n. 19. *der bengaliſche Kuckuck.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 214. n. 20. Cuculus (Bengalenſis) cauda cuneiformi, corpore ferrugineo, albo nigroque longitudinaliter ſtriato, abdomine fuſco-flaveſcente, remigibus rectricibusque lateralibus rufis nigro-faſciatis.

7. Honoratus. *Der malabariſche Kuckuck. Cuil.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 210. n. 7. *der Malabariſche.* Tab. 7. fig. 4.

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 7. *bunter Kuckuck.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 79. n. 15. Coucou tacheté de Malabar.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 214. n. 21. Cuculus (Honoratus) cauda cuneiformi, corpore nigricante albo-maculato, ſubtus albo cinereoque faſciato.

Eſſ. philoſoph. p. 68. Cuil.

8. Punctatus. *Der ſchwärzliche, braunroth punctirte Kuckuck.*

Müller, Naturſ. II. p. 211. n. 8. *der Geſprenkelte.*

Neuer

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 8. *gesprenkelter Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 491. *der gefleckte indianische Kuckug.*

Brisson, ornitholog. II. p. 79. n. 14. Coucou tacheté des Indes.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 210. n. 8. Cuculus (Punctatus) cauda cuneiformi, corpore nigricante rufo-punctato, subtus rufo striis nigris, rectricibus fusco-fasciatis.

29. PANAYANUS. *Der schwarzbraune gefleckte Kuckuck von der Insel Panay.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 426. n. 9. *der panayische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 210. n. 9. Cuculus (Panayus) cauda integra, corpore fusco, rufo-flavo maculato, subtus caudaque rufo-nigro fasciata, gula nigra maculis flavis.

9. NAEVIUS. *Der gefleckte Kuckuck von Cayenne.*

Müller, Natursystem, II. p. 211. n. 9. *der Gefleckte.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 856. n. 9. *gestreifter Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 187. *der gefleckte Kuckug von Cayenne.*

Brisson, ornitholog. II. p. 77. n. 11. Coucou tacheté de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 443. n. 38. *der gesprenkelte Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 220. n. 42. Cuculus (Naevius) cauda cuneiformi, corpore fusco-ferrugineo, iugulo striis fuscis, rectricibus apice rufescentibus.

β. *La-*

β. *Latham*, Syſt. ornitholog. I. p. 220. n. 42. β. C. gula griſea, rectricibus lateralibus apice abdomineque albis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 444. ad n. 38.

30. PUNCTULATUS. *Der braune, röthlich punctirte Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 426. n. 8. *der rothgefleckte Kuckuck.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 220. n. 43. Cuculus (Punctulatus) cauda cuneiformi, corpore fuſco nitente, maculis rufeſcentibus, abdomine criſſoque albidis.

31. RIDIBUNDUS. *Der Lachkuckuck.*

Onomatol. hiſt. nat. VI. p. 737. *der mexicaniſche Gukuk.*

Briſſon, ornithol, II. p. 74. n. 6. Coucou du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 443. n. 37. *der Lachkuckuck.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 220. n. 41. Cuculus (Ridibundus) fulvus, ſubtus niger, collo ſubtus pectoreque cinereis, rectricibus fulvonigricantibus.

Jonſton, av. p. 172. Quapachtototl.

32. GUIRA. *Der braſilianiſche gehäubte Kuckuck.*

Onomat. hiſtor. nat. III p. 483. *der braſilianiſche roth gehaubte Kuckug.*

Briſſon, ornithol. II. p. 81. n. 19. Coucou hupé du Bréſil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 442. n. 36. *der gehaubte braſilianiſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 219. Cuculus (Guira) albo-flaveſcens criſtatus, capite, collo, tectrici-

ctricibusque alarum fuſco flaveſcenteque variis, rectricibus fuſcis, apice albis.

Halle, Vögel, p. 159. n. 97. *der americaniſche Halbſpecht.*

Jonſton, av. p. 210. Guira Acangatara.

Moehring, av. gen. p. 85. n. 14. Trogon.

10. Americanus. *Der karoliniſche Kuckuck.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 211. n. 10. *der Americaniſche.*

Halle, Vögel, p. 156. n. 9. *der graue Kukuk aus Carolina.*

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 856. n. 10. *weſtindiſcher Kuckuck.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 479. *der americaniſche Kuckuck.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 251. n. 71. *der caroliniſche Kukuk.*

Klein, av. p. 30. n. 2. Cuculus Carolinenſis.

Klein, Vorbereit. p. 57. n. 2 *der Caroliner.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 33. n. 2. *Caroliner.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 73. n. 3. Coucou de la Caroline.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 18. *der Guckguck aus Carolina.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 442. n. 35. *der caroliniſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 219. n. 39. Cuculus (Americanus) cauda cuneiformi, corpore ſupra cinereo ſubtus albo, maxilla inferiore lutea.

Linné, auserl. Abh. II. p. 279. n. 3. *der americaniſche Kokkuk.*

Schlözer, Erdbeſchreib. von Amerika, p. 281. *Kuckucke.*

Linné,

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 111. n. 7. Cuculus (Americanus) cauda cuneiformi, corpore ſupra cinereo, ſubtus albo, maxilla inferiore lutea.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 240. n. 2. *der caroliniſche Kuckuck.*

11. SCOLOPACEUS. *Der Schnepfenkuckuck.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 211. n. 11. *der Stachelſchnabel.*

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 856. n. 11. *Schnepfkuckuck.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 496. *der ſchwarze Kuckug von Benghala.*

Klein, av. p. 31. n. 7. Cuculus bengalenſis, ex fuſco, rufo et cinereo, a capite ad caudam varius.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 7. *der braune von Bengala.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 33. n. 7. *größerer bengaliſcher Kuckuck.*

Briſſon, ornithol. II. p. 78. n. 13. Coucou tacheté de Bengále.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 13. *der braune, gefleckte indianiſche Guckguck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 425. n. 6. *der indianiſche gefleckte Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 209. n. 6. Cuculus (Scolopaceus) cauda cuneiformi, corpore undique griſeo fuſcoque nebuloſo.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 111. n. 5. Cuculus (Scolopaceus) cauda cuneiformi, corpore undique griſeo fuſcoque nebuloſo.

33. MACULATUS. *Der gefleckte chineſiſche Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 425. n. 7. *der chineſiſche gefleckte Kuckuck.*

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 209. n. 7. Cuculus (Maculatus) cauda elongata, corpore viridi-griſeo, fuſco nitente albo variegato, ſubtus faſciato, capite nigro.

12. Niger. *Der ſchwarze bengaliſche Kuckuck.* (3)

Müller, Naturſyſt. II. p. 212. n. 12. *der Schwarze.*

Halle, Vögel, p. 157. n. 93. *der ſchwarzblaue Kukuk.*

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 856. n. 12. *ſchwarzer Kuckuck.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 495. *der ſchwarze Kuckug von Benghala.*

Klein, av. p. 31. n. 6. Cuculus ex caeruleſcente niger, roſtro flavo, pedibus brevibus ſordide luteis; Bengalenſis.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 6. *der blauſchwarze Kuckuck.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 33. n. 6. *bengaliſcher Kuckuck.*

Briſſon, ornithol. II. p. 80. n. 17. Coucou noir de Bengale.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 11. *der ſchwarze indianiſche Guckguck.*

Latham, Syn. II. p. 519. B. Black Indian Cuckow.

Latham, Vögel, I. 2. p. 427. n. 10. Var. B. *der ſchwarze Kuckuck.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 211. n. 10. γ. Cuculus cauda cuneiformi, corpore nigro, roſtro flavo.

Eſſ. philoſoph. p. 68. Coukeel.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 72.

Linné,

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *Cuculus Orientalis* p. 410. n. 2.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 111. n. 6. Cuculus (Niger) cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo.

34. Ater. *Der schwarze Kuckuck vom Vorgeb. der guten Hoffnung.*

Ist nach Latham mit *Cuculus Serratus* p. 212. n. 26. einerley.

35. Melanoleucos. *Der schwarz- und weiße Kuckuck von Coromandel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 429. n. 12. *der gehäubte coromandelsche Kuckuk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 211. n. 13. Cuculus (Melanoleucos) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore supra nigro, subtus, macula alarum rectricibusque apice albis.

36. Pisanus. *Der Kuckuck von Pisa.* (4)

Latham, Vögel, I. 2. p. 429. n. 13. *der pisaische Kuckuk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 211. n. 14. Cuculus (Pisanus) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore nigro alboque vario, subtus albo, gula, pectore, crisso remigibusque rufis.

Gerin. ornithol. I. p. 81. Tab. 71. Cuculus ex nigro et albo mixtus.

37. Madagascariensis. *Der olivenfarbige Kuckuck von Madagascar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 429. n. 37. *der große madagascarische Kuckuk.*

Latham,

(4) Dieser Kuckuck hat ein einziges Mal im Jahr 1739. in den Hecken um Pisa genistet, und vier Junge ausgebracht. Seit der Zeit hat man ihn nicht weiter beobachtet.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 212. n. 15. Cuculus (Madagaſcarienſis) olivaceus fuſco undulatus, gula luteſcente, pectore abdomineque antice fulvis, cauda cuneiformi, rectricibus lateralibus apice albis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 521. n. 15. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 430. n. 14. Var. A.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 212. n. 15. β. C. olivaceus fuſco undulatus, ſubtus fulvus, pileo nigro, vertice nudo caeruleo rugoſo.

13. Dominicus. *Der Kuckuck von St. Domingo.*
Müller, Naturſyſtem, II. p. 212. n. 13. *der Antilliſche.*
Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 856. n. 13. *domingoſcher Kuckuck.*
Onomat. hiſtor. nat. III. p. 488. *der Kuckug von St. Dominique.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 72. n. 2. Coucou de S. Domingue.
Latham, Vögel, I. 2. p. 445. n. 40. *der Kuckuck von St. Domingo.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 221. n. 44. Cuculus (Dominicanus) cauda cuneiformi, corpore griſeo-fuſco, ſubtus albido, rectricibus lateralibus tribus apice albis.

14. Cayanus. *Der dunkelpurpurfarbene cayenniſche Kuckuck.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 212. n. 14. *der Cajenniſche.*
Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 14. *cayenniſcher Kuckuck.*
Onomat. hiſt. nat. IV. p. 487. *der Kuckug von Cayenna.*

Brisson, ornitholog. II. p. 75. n. 8. Coucou de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 445. n. 41. *der cayennische braune Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 221. n. 45. Cuculus (Cayanus) cauda cuneiformi, corpore castaneo-purpurascente, subtus cinereo, rectricibus omnibus apice albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 185. Cuculus cayanus.

β. *Der kleinere cayennische Kuckuck.* (5)

Onomat. hist. nat. III. p. 487. Cuculus cayennensis minor.

Brisson, ornitholog. II. p. 76. n. 9. Petit Coucou de Cayenne.

Latham, Syn. II. p. 542. n. 41. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 221. n. 45. β.

Latham, Vögel, I. 2. p. 445. n. 41. Var. A.

γ. *Der rothschnäblichte cayennische Kuckuck.*

Latham, Syn. II. p. 543. n. 41. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 221. n. 45. γ. Cuculus subtus cinereo niger, capite cinereo, gula pectoreque rufis, rostro rufo.

Latham, Vögel, I. 2. p. 446. n. 41. Var. B.

38. TRANQUILLUS. *Der schwarze cayennische Kuckuck.*

Soll, nach *Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 206. n. 18. mit *Bucco calcaratus*, oder *Bucco cinereus Linn.* p. 409. n. 7. einerley seyn.

39. TENE-

(5) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

39. Tenebrosus. *Der kleine ſchwarze ſurinamiſche Kuckuck.*

Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 1. p. 116. *der kleine ſchwarze Kukuk aus Surinam.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 446. n. 43. *der geſchäckte cayenniſche Kuckuck.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 221. n. 46. Cuculus (Tenebroſus) cauda cuneiformi, *(das iſt er aber nach Pallas Abbildung nicht)* corpore nigro, dorſo infimo, uropygio, abdomine, criſſo femoribusque albis, faſcia pectorali fulva. *(Auch dies finde ich an Pallas Abbild. nicht.)*

40. Pyrrhocephalus. *Der rothköpfige zeilaniſche Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 447. n. 44. *der rothköpfige Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 222. n. 47. Cuculus (Pyrrhocephalus) cauda cuneiformi longiſſima, corpore nigro, pectore abdomineque albis, pileo genisque coccineis.

Naturforſch. I. p. 269. n. 6. *der Kuckuck mit rothem Kopfe.*

Berlin. Samml. IX. p. 192. n. 6. *der rothköpfige Kukuk von Zeylon.*

Neueſte Mannichfalt. I. p. 188. n. 6. *der rothköpfige Kukuk von Zeylon.*

15. Caeruleus. *Der blaue Kuckuck von Madagaſcar.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 213. n. 15. *der Blaue.*

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 856. n. 18. *der blaue Kuckuck.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 493. *der blaue Kuckug von Madagaſcar.*

Briſſon, ornithol. II. p. 85. n. 26 Coucou bleu de Madagaſcar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 437. n. 29. *der blaue madagaſcariſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 217. n. 33. Cuculus (Caeruleus) cauda rotundata, corpore caeruleo.

Gerin, ornith. I. p. 82. Tab. 78.

16. SINENSIS. *Der blaue chineſiſche Kuckuck.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 213. n. 16. *der Chineſiſche.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 19. *chineſiſcher Kuckuck.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 497. *der blaue Kuckug aus China.*

Briſſon, ornithol. II. p. 85. n. 27. Coucou bleu de la Chine.

Latham, Vögel, I. 2. p. 437. n. 28. *der blaue chineſiſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 217. n. 32. Cuculus (Sinenſis) cauda cuneiformi longa, corpore caeruleo, ſubtus albo, rectricum apicibus macula alba.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Sinenſis.

Gerin. ornith. I. p. 83. Tab. 80.

41. AFER. *Der afrikaniſche Kuckuck.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 494. *der groſſe Kuckug von Madagaſcar.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 96. n. 28. grand Coucou de Madagaſcar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 438. n. 30. *der afrikaniſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 217. n. 34. Cuculus (Afer) viridi-aeneus, ſubtus griſeus, capite

pite colloque cinereis, vertice ſplendide nigro, cauda ſubtus nigra.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus discolor. *Vourou-driou.*

β. *Briſſon*, ornitholog. II. p. 86. n. 28. Femina.

Büffon, pl. enl. 588. Femelle du grand Coucou de Madagaſcar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 438. n. 30. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 532. n. 30. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 217. n. 34. β. Cuculus corpore ſupra cum capite fuſco ruſoque ſtriato, ſubtus ruſeſcente, maculis nigricantibus, rectricibus fuſcis, apice ruſis.

42. INDICATOR. *Der Honigkuckuck.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 130. n. 6. *der Honigkukkuk, Honigzeiger.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 178. n. 2. Cuculus (Indicator) cauda cuneiformi, fuſco-et albido-maculata, alis fuſcis maculis flavis, pedibus nigris; *der Honigkuckuck, Sengo, Mook.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 359. n. 3. *der Honigkuckuck.*

Batſch, Thiere, I. p. 320. *der Honigkuckuk vom Cap.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 329. *der Honigkukuk.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 369. n. 297. *der Honigkuckuk.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 439. n. 31. *der Honigkuckuk.*

Latham, Syn. Suppl. p. 103. Honey-Cuckow.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 218. n. 35. Cuculus (Indicator) cauda cuneiformi, corpore ferrugineo-griſeo, ſubtus albido, humeris macula

 flava,

flava, rectricibus tribus exterioribus basi macula nigra.

Sparrmann, Reise n. d. Vorgeb. der g. Hoffn. p. 482-487. *der Bienen-verräther-kukuk.*

Le Vaillant, Reis. n. Afrika, I. p. 296. *Honigweiser.*

Allamand u. *Klockner*, Vorgeb. d. g. Hoffn. III. p. 123.

Sander, über die Grösse u. Schönheit in der Nat. II. p. 73. *Honigweiser.*

Goeze, nützl. Allerley, II. p. 365. n. 6. *der Honigkukuk.*

Hannöv. Magaz. 1779. p. 1039. *Honigkukuk.*

Gent. Magaz. xlvii. p. 468. Honney-Guide.

Hermann, tab. affin. anim. p. 186. C. Indicator.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 240. n. 4. *der Honigkuckuck.*

17. Persa. *Der Touraco.*

Müller, Natursystem, II. p. 213. n. 17. *der Persianer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 130. n. 5. *der persische oder mexikanische gehäubte Kukkuk.* Tab. 15.

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 19. *Touraco.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 543. *der grüne Gugkuk aus Guinea mit dem Federbusch.*

Halle, Vögel, p. 172. n. 113. *der guineeische Kronvogel.*

Klein, av. p. 36. *Touraco.*

Klein, Vorbereit. p. 69. *Kronvogel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 37. *Kronvogel.*

Brisson, ornithol. II. p. 84. n. 24. Coucou verd hupé de Guinée.

Batsch,

Batſch, Thiere, I. p. 320. *der guineiſche Kronenvogel.*
Seligmann, Vögel, I. Tab. 13. *der Touraco.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 447. n. 46. *der Turako.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 222. n. 49. Cuculus (Perſa) cauda aequali, capite criſtato, corpore viridi-caeruleſcente, remigibus ſanguineis.
Scopoli, an. hiſt. I. n. 49. Cuculus Perſa.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 44. n. 49. *der Kronvogel.*
Lichtenbergs u. *Voigts* Mag. f. d. Neueſte u. ſ. w. VII. 2. 120. *Tourako.*
Le Vaillant, Reiſe nach Afrika, II. p. 112. *Tourako.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 3. n. c. *Tourako.*
Boſsmann, Guin. p. 271. fig. 12.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 111. n. 2. Cuculus (Perſa) cauda aequali, capite criſta erecta, remigibus primoribus rubris.
Moehring, av. gen. p. 81. n. 106. Cuculo adfinis.
Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 73.
Hermann, tab. affin. anim. p. 186. Cuculus Perſa.

18. Brasiliensis. *Der rothe braſilianiſche Kuckuck.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 214. n. 18. *der Braſilianiſche.*
Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 857. n. 21. *braſilianiſcher Kuckuck.*
Onomat. hiſtor. nat. III. p. 483. *der braſilianiſche rothgehaubte Kuckug.*
Briſſon, ornith. II. p. 84. n. 25. Coucou rouge hupé du Bréſil.
Latham, Vögel, I. 2. p. 447. n. 45. *der rothe braſilianiſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 222. n. 48. Cuculus (Braſilienſis) cauda ſubaequali, capite criſtato, corpore rubro, remigibus flaveſcentibus.

Moehring, av. gen. p. 80. n. 103. Columbae adfinis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 185. Cuculus braſilienſis.

19. CRISTATUS. *Der gehäubte madagaſcariſche Kuckuck.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 214. n. 19. *der Haubenguckguck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 857. n. 22. *gehaubter Kuckuck.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 490. *der gehaubte Kuckug von Madagaſcar.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 85. n. 22. *Coucou hupé de Madagaſcar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 430. n. 15. *der gehäubte madagaſcariſche Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 212. n. 16. Cuculus (Criſtatus) cauda rotundata, capite criſtato, corpore cinereo-vireſcente, abdomine rufo-albo, rectricibus lateralibus apice albis.

Gerin. ornithol. I. p. 83. Tab. 77.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Criſtatus.

43. AEGYPTIUS. *Der ägyptiſche Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 430. *der ägyptiſche Kuckuck.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 212. n. 17. Cuculus (Aegyptius) cauda cuneiformi, corpore viridifuſco, ſubtus rufo-albo, capite, cervice caudaque viridi-chalybeis, alis rufis.

β. *Der glänzend schwarze Kuckuck mit fuchsrothen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 431. n. 16. Var. A.
Latham, Syn. II. p. 523. n. 16. A.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 213. n. 17. β. C. splendide niger, alis rufis.

γ. *Der Kuckuck mit kastanienbraunen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 431. n. 16. Var. B.
Latham, Syn. II. p. 523. n. 16. B.
Latham, Syn. Supplem. p. 100.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 213. n. 17. γ. C. viridi-nigricans, alis rubro-fuscis, cauda nigra, ungue postico interiore recto subulato.

44. Radiatus. *Der schwarzbraune Kuckuck, mit gelbem schwarz gestreiften Bauche.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 434. n. 21. *der panayische gestreifte Kuckuck.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 214. n. 22. Cuculus (Radiatus) fusco-nigricans, genis gulaque vinaceis, pectore abdomineque flavescentibus nigro fasciatis, rectricibus nigris albo fasciatis.

45. Flavus. *Der gelbbäuchige Kuckuck von Panay.*

Latham, Vögel, I. 2 p. 434. n. 22. *der gelbbäuchige Kuckuck.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 215. n. 26. Cuculus (Flavus) cauda cuneiformi, corpore pallide fusco, subtus rufo-flavescente, pileo gulaque cinereis, rectricibus nigris albo-fasciatis.

46. Auratus. *Der goldgrüne Kuckuck vom Cap.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 435. n. 23. *der Goldkukuk.*

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 215. n. 27. Cuculus (Auratus) cauda cuneiformi, corpore ſupra viridi-aureo, ſubtus albo, capite ſtriis quinque albis, rectricibus 2. extimis latere exteriore, omnibus apice albis.

47. LUCIDUS. *Der neuſeeländiſche Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 435. n. 24. *der glänzende Kuckuk.* Tab. 26.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 215. n. 28. Cuculus (Lucidus) fulgidus, cauda ſubaequali, corpore ſupra viridi-aureo, ſubtus albicante viridi-aureo fuſcoque undulato.

20. COROMANDUS. *Der ſchwarze Kuckuck mit weiſſem Halsbande von Coromandel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 214. n. 20. *der Coromandeliſche.* Tab. 7. fig. 2.

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 857. n. 23. *Koromandelſcher.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 488. *der gehaubte Kuckug von Coromandel.*

Briſſon, ornithol. II. p. 82. n. 21. Coucou hupé de Coromandel.

Latham, Vögel, I. 2. p. 436. n. 26. *der Kuckuck mit dem Halsbande.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 216. n. 30. Cuculus (Coromandus) cauda cuneiformi, capite criſtato, corpore nigro, ſubtus torqueque collari albo.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 74.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Coromandus.

21. CORNUTUS. *Der gehörnte Kuckuck.*

Müller, Naturſ. II. p. 214. n. 21. *der Gehörnte.*

Neuer

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 857. n. 24. *gehörnter Kuckuck.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 482. *der gehörnte Kuckug.*

Briſſon, ornithol. II. p. 82. n. 20. Coucou cornu du Bréſil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 436. n. 27. *der gehörnte Kuckuk.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 216. n. 31. Cuculus (Cornutus) cauda cuneiformi, capite criſta bifida, corpore fuliginoſo, cauda apice alba.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus cornutus.

Jonſton, av. p. 210. Atinguacu camacu.

22. Paradiseus. *Der ſiamiſche Kuckuck.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 215. n. 22. *der Siamiſche.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 857. n. 25. *der ſiamſche Kuckuck.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 496. *der grüne gehaubte Kuckug von Siam.*

Briſſon, ornithol. II. p. 83. n. 23. Coucou verd hupé de Siam.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 216. n. 29. Cuculus (Paradiſeus) caudae rectricibus binis longiſſimis, apice dilatatis, capite criſtato, corpore viridi.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 186. Cuculus paradiſaeus.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 75.

48. Tolu. *Der Tolu.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 90. n. 25. *Toulou.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 856. n. 17. *Toulou.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 492. *der Kuckug von Madagaſcar.*

Briſſon,

Briſſon, ornitholog. II. p. 80. n. 16. *Coucou de Madagaſcar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 432. n. 17. *der Tolu.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 213. n. 18. Cuculus (Tolu) cauda cuneiformi, corpore vireſcenti-atro, alis caſtaneis, capite, collo dorſoque antice nigricantibus, rufo-ſtriatis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 26 Gattungen vermehrt. Und wenn, nach Latham, die 34ſte p. 415. mit der 26ten p. 412 einerley iſt, ſo bleiben der neu hinzu gekommenen Gattungen noch 25. — Bey der erſten Gattung ſind *drey*, bey der 2ten *zwey*, bey der 9ten *zwey*, bey der 13ten *zwey* Varietäten aus einander geſetzt, und bey der 14ten iſt noch eine Varietät hinzugekommen.

B. *Unbeſtimmtere Thiere.*

1. *Der Maroc.*

Bruce, Reiſ. n. d. Quellen des Nils, V. p. 181. Tab. 36. *der Maroc, Bienenkukuk.*

Lobo, Abyſſin. p. 52. *Moroc.*

An Cuculus Indicator?

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der indianiſche Kuckuck.*

Latham, Syn. Suppl. p. 99. Eaſtern black Cuckow.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 211. n. 11. Cuculus (Indicus) cauda rotundata, corpore nigro, alis rectricibusque ad apicem lineis transverſis tribus nigris.

2. *Der grauköpfige indianische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 448. n. 47. *der braunköpfige Kuckuk.*

Latham, Syn. Supplem. p. 102. Grey - headed Cuckow.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 214. n. 23. Cuculus (Poliocephalus) cauda subcuneiformi, corpore supra fusco-cinereo, subtus albo griseo fasciato, capite colloque pallide griseis, rectricibus albis, fasciis obscuris.

3. *Der kleine rothbraune schwarzbandirte indianische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 48. *der Sonneratskuckuk.*

Latham, Syn. Suppl. p. 102. n. 48. Sonnerat's Cuckow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 215. n. 24. Cuculus (Sonneratii) nigro fasciatus, supra rufo-fuscus, subtus albus, rectricibus nigro maculatis.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 211. le petit Coucou des Indes.

4. *Der leberfarbene Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 215. n. 25. Cuculus (Hepaticus) cauda cuneiformi, corpore brunneo nigroque undulato, uropygio ferrugineo, rostro, alarum apicibus caudaque fasciis nigris, subtus albicans nigro undulatus, pedibus flavis.

Mus. Carls. fascic. III. Tab. 55. Cuculus hepaticus.

58. GESCHLECHT. YUNX. *Der Wendehals.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 216. Gen. LVIII.
Leſke, Naturgeſch. p. 247. Gen. XXVII.
Borowſky, Thierreich, II. p. 131. Gen. XVI.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 167. Gen. IX.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 354. Gen. XIII.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 527. Gen. XI.
Briſſon, ornith. II. p. 42. Gen. XLVI.
Batſch, Thiere, I. p. 315. 318. Gen. LXIII.
Latham, allg. Ueberſicht der Vögel, I. 2. p. 451. Gen. XX.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 223. Gen. XXI.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 241. Gen. XIX.

1. TORQUILLA. *Der gemeine Wendehals.* (6)
Müller, Naturſyſtem, II. p. 216. n. 1. *Drehhals.*
Leſke, Naturgeſch. p. 247. *der Wendehals.*
Borowſky, Thierreich, II. p. 132. n. 1. *der Wendehals.*
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 167. n. 1. Jynx (Torquilla) cauda explanata, faſciis fuſcis quatuor; *der Drehhals, Wendehals, Natterwindel.*

Bechſtein,

(6) Niſtet zu Anfang des Julius. Das Neſt beſteht aus einer bloſsen Unterlage von klarem Moos, Grashalmen, Haaren, und Wolle. Beyde Gatten brüten vierzehn Tage, aber jährlich nur einmal. Die Baumhöhle, worin ſie einmal geniſtet haben, ſuchen ſie alle Jahr wieder auf. Das Fleiſch iſt wohlſchmeckend und im Auguſt und September ſehr fett. Im Herbſt freſſen ſie, in Ermanglung der Inſekten, auch Hollunderbeeren. Zahm kann man ſie mit Mehlwürmern und Nachtigallenfutter unterhalten.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 354. n. 1. *Wendehals.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 527. n. 1. *der Wendehals.* p. 533. *Drehhals, Drehvogel, Otterwindel, Natterwindel, Halsdreher, Halswinder, Natterhals, Grauspecht.*
Funke, Naturgesch. I. p. 328. *der Wendehals.*
Ebert, Naturl. I. p. 60. *der Wendehals.*
Halle, Vögel, p. 144. n. 85. *der Halsdreher.*
Meyer, Thiere, II. Tab. 39.
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 63. n. 77. *der Drehhals.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 253. *der Drehhals.*
Neuer Schauplatz d. Natur, II. p. 398. *Drehhals.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 574. *der Halsdreher.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 170. *der Drehhals.*
Handbuch d. deutsch. Thiergesch. p. 102. *Wendehals, Natterzwang* u. s. w.
Klein, av. p. 28. n. 14. Picus Torquilla; Jynx.
Klein, Vorber. p. 54. n. 14. *Drehhals oder Wendehals.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 14. *Drehhals.*
Klein, stemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 4. a. c. d.
Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 5.
Brisson, ornithol. II. p. 43. n. 1. Torcol.
Gesner, Vögelb. p. 553. *Windhals;* mit 1 Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 318. *der Wendehals.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 451. *der gemeine Wendehals.*
Latham, Syn. Suppl. p. 103. Wryneck.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 223. n. 1. Yunx (Torquilla) grisea, fusco nigricanteque varia, abdomine rufescente-albo maculis nigricantibus, rectricibus maculis, striis fasciisque nigris undulatis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 36. n. 55. *der Drehhals.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 308. n. 54. *Drehhals.*

Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 84. *der Wendehals.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 75. n. 64. *Wendehals, Natterhals.*

Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſ. II. p. 5. *Wendehälſe.*

White, Naturgeſch. von England, p. 33. n. 2. p. 56. *der Wendehals.*

Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 167. n. 1. *Wendehals, Dreyhals.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 395. n. 7. *die Lang-Zungen?*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 45. n. 50. *der gemeine Wendehals.*

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 290. n. 66. *Drehhals, Natternhals.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 147. 276. *der Otter- oder Natterwindel.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 60. *Wendehals.*

Naumann, Vogelſteller, p. 138. n. 6. *der Grauſpecht oder Wendehals.*

Naturforſch. IX. p. 53. n. 53. *Drehehals.*

Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Fr. VII. p. 453. n. 30. *der Drehhals.*

Anweiſung Vögel zu fangen, u. ſ. w. p. 415. *Natterwindel.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 117. *Wendehals.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1380. *Wendehals.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 104. *der Wendehals.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 118. *der Wendehals.*

Lemmery. Materiallex. p. 589.

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 53. Torquilla ſ. Jynx.

Linné,

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 1. Torquilla.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 112. n. 1. Jynx (Torquilla.)

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 96. Jynx Torquilla.

Kramer, Auſtr. p. 336. n. 1. Jynx; *Natterwindl, Wendlhals.*

Brünich, ornithol. bor. p. 10. n. 37. Jynx Torquilla.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 356. Torquilla; *ein Windhals, Wendehals, Trayhals, Naterwendel.*

Moehring, av. gen. p. 34. n. 13. Jynx.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 66.

Gerin. ornith. II. p. 52. Tab. 186.

Hermann, tab. affin. anim. p. 188. Jynx.

Lange, de ave Ιυγξ. Epiſt. medicinal. L. 2. ep 59. p. 762.

Plin. hiſt. nat. L. XI. c. 47. Jynx.

Ariſtot. hiſt. anim. L. II. c. 15. n. 95. Ιυγξ.

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 241. n. 1. *der Wendehals.*

β. *Der geſtreifte Wendehals.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 44. A. Torcol rayé.

Latham, Vögel, I. 2. p. 454. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 549.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 223. β. Yynx ſupra ferruginea maculis transverſis, ſubtus albida, ſtriis longitudinalibus flavis.

Jonſton, av. p. 113. Jyngi congener.

γ. *Der weiße Wendehals.* *

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 532. *weiße Wendehälſe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 454. Var. B. *der weiße Wendehals.*

2. MINUTISSIMA. *Der cayennische Wendehals.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 491. n. 48. *der kleinste Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 243. n. 55. Picus (Minutus) griseo-rufus, subtus albidus fusco-undulatus, vertice rubro, occipite nigro, lateribus capitis albo-maculatis.

Brisson, ornitholog. II. p. 64. n. 32. petit Pic de Cayenne.

Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. s. w. II. 1. p. 118. n. 2. *der allerkleinste Specht oder Wendehals aus Südamerika.*

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 150. *ein kleiner Specht?*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit einer Gattung vermehrt, und bey der ersten sind zwey Varietäten aus einander gesetzt.

59. GESCHLECHT. PICUS. *Der Specht.*

Müller, Natursyst. II. p. 218. Gen. LIX.

Leske, Naturgesch. p. 248. Gen. XXVIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 133. Gen. XVII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 166. Gen. VIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 347. Gen. X.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 498. Gen. IX.

Funke, Naturgesch. I. p. 300 ff.

Ebert,

Ebert, Naturl. II. p. 44 ff.
Halle, Vögel, p. 132 ff.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 254 ff.
Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 326 ff.
Onomat. hist. nat. VI. p. 491 sqq.
Klein, av. p. 26. Gen. II.
Brisson, ornith. II. p. 44. Gen. XLVII.
Batsch, Thiere, I. p. 306. Gen. LVII.
Latham, allgem. Uebers. der Vögel, I. 2. p. 454. Gen. XXI.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 224. Gen. XXII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 187.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 242. Gen. XX.

1. Martius. *Der Schwarzspecht.* (7)
Müller, Natursyst. II. p. 219. n. 1. *der Fouselier.*
Leske, Naturgesch. p. 248. n. 1. *der Schwarzspecht, die Luderkrähe.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 134. n. 2. *der große Schwarzspecht.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 166. n. 1. Picus (Martius) niger, vertice coccineo; *der Schwarzspecht, gemeine Specht, Hohlkrähe.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 348. n. 1. *der Schwarzspecht.*

(7) Flügelweite 29 Zoll. Gewicht 11 Unzen. Der allerschlaueste unter dem ganzen Geschlechte, der sehr schwer zu schiessen ist. Liebt grosse, besonders gebirgige Waldungen, und zieht die Schwarzwälder den Laubwäldern vor. Nistet in Baumhöhlen, die er sich entweder selbst macht oder vorfindet, und legt seine Eyer auf das blosse Holzmehl, ohne alle Unterlage. Läst sich zähmen, und frisst alsdann Wallnüsse, lebt aber nicht lange in der Gefangenschaft. Das Fleisch ist wohlschmeckend. Einige dieser Vögel haben eine rothe Platte.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 499. n. 1. *der Schwarzspecht.* p. 505. *der große Schwarzspecht, gemeiner Specht, tapfere Specht, Krähenspecht, Spechtkrähe, Holzkrähe, Holzkrahe, Hohlkrähe, Holzhuhn, Füselier.*

Funke, Naturgesch. I. p. 300. *der Schwarzspecht.*

Ebert, Naturl. II. p. 45. *der große schwarze Specht.*

Halle, Vögel, p. 133. n. 72. *der größte europäische schwarze Baumhacker.*

Meyer, Thiere, II. Tab. 34.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 60. n. 68. *der Schwarzspecht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 261. A. *der Schwarzspecht.*

Beckmann, Naturhist. p. 40. *der Specht, oder Baumhacker*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 327. n. 1. *der Schwarzspecht.*

Onomat. hist.nat. VI. p. 499. *der große Schwarz-Specht, Spechtkrähe.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 171. *der Specht.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 101. *großer schwarzer gemeiner und Krähenspecht.*

Klein, av. p. 26. n. 1. Picus niger, maximus nostras.

Klein, Vorbereit. p. 50. n. 1. *Schwarzspecht.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 28. n. 1. *schwarzer großer Specht.*

Gesner, Vögelb. p. 477. *Kräspecht;* Fig. p. 479. zieml. gut.

Brisson, ornith. II. p. 47. n. 6. Pic-noir.

Batsch, Thiere, I. p. 307. *Schwarzspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 554. n. 1. *der Schwarzspecht.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 104. Great black Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 324. n. 1. Picus (Martius) niger, pileo coccineo.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 37. n. 56. *der Schwarzspecht.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 309. n. 55. *der schwarze Specht.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 81. *der Specht.*

Molina, Chili, p. 209. *der Schwarzspecht.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 76. n. 65. *Schwarzspecht.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 167. n. 1. *Hakkespett.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 184. *Schwarzspechte.*

Pallas, Reise, II. p. 20. 30. *Schwarzspecht.*

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 14. *der Schwarzspecht.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *der Schwarzspecht.*

Fermin, Surinam, II. p. 149. *der Schwarzspecht.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 46. n. 51. *der Schwarzspecht, Hohlkrähe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 269. *Schwarz-Specht, Hohl-Krähe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. *Schwarz-Specht.*

Naumann, Vogelsteller, p. 137. *der Schwarzspecht.*

Naturf. IX. p. 54. n. 54. *der Fouselier.*

Anweisung Vögel zu fangen u. s. w. p. 113. *Hohlkrähe.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1098. *Schwarzspecht.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 110. n. 14. *der Schwarzspecht.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 104. *der ſchwarze Specht.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 119. n. 1. *der Schwarzſpecht.*

Loniceri, Kräuterbuch, p. 678. *Specht.*

Kraſt, Ausrott. grauſ. Thiere, I. p. 443. *Kräh-Specht.*

Neue geſellſch. Erzähl. I. p. 268. *Holz-Krähe.*

Hamburg. Magazin, IV. p. 414.

Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 53. Picus niger.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 1. Picus niger.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 112. n. 1. Picus (Martius) niger, pileo coccineo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 97. Picus (Martius) niger, pileo coccineo.

Kramer, Auſtr. p. 335. n. 1. Picus pedum digitis duobus anticis, poſticis duobus, corpore nigro, vertice coccineo; *Hohlkran*, *Schwarzſpecht.*

Brünich, ornith. bor. p. 11. n. 38. Picus Martius.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 338. Picus niger, ſeu formicarius; *ein Holkrahe*, *Holz-Krahe*, *Krah-Specht*, *Holtz-Hun.*

Valent. Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. obſ. 53. p. 335. *(anatome.)*

Philoſ. Transact. XXIX. n. 350. p. 509. Tab. 1. *(anat.)*

Gerin. ornith. II. p. 47. Tab. 172.

Jonſton, av. p. 110. Picus maximus.

Plin. hiſt. nat. Lib 10. c. 18. 28. 33. L. 11. c. 37. L. 31. c. 16. Picus martius?

Ariſtot. hiſtor. anim. L. IX. c. 13. n. 147. δρυοκολαπτης, το τριτον γενος.

Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 242. n. 1. *der Schwarzſpecht.*

22. Ligna-

22. Lignarius. *Der chilesische Specht.*

Molina, Naturgesch. von Chili, a. a. O. *der Zimmermann.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 494. n. 52. *der Holzhackerspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 224. n. 2. Picus (Lignarius) pileo coccineo, corpore albo caeruleoque vittato.

2. Principalis. *Der Weißschnabel.*(8)

Müller, Natursyst. II. p. 220. n. 2. *der Grenadier.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 135. n. 3. *der Haubenspecht.*

Halle, Vögel, p. 135. n. 73. *der größte schwarze amerikanische Baumhakker.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 61. n. 69. *der amerikanische Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 254. n. 72. *der Weißschnabel.*

Neuer Schaupl der Nat. VIII. p. 227. n. 2. *schwarzer Specht mit weißem Schnabel.* p. 329. n. 2. *Weißschnabel.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 506. Picus principalis. (Mit n. 4. verwechselt.)

Klein, av. p. 26. n. 2. Picus niger, rostro albo, priori maior.

(8) Gewicht 20 Unzen. Brütet in Mexico um die Regenzeit, daher die Benennung *Picus imbrifoetus* beym *Nieremb.* Bey den Spaniern heißen diese Vögel *Carpenteros* oder *Zimmerleute*, weil sie so viele Späne aus den Bäumen hacken, denn ein einziger hackt in einer Stunde wohl ein Maas Späne aus. Canada hat diese Vögel nicht. Aber die Indianer aus Canada achten die Schnäbel sehr hoch, und kaufen sie von den Wilden der südlichen Gegenden das Stück um 2 oder 3 Bockhäute, um die Kränze ihrer Sachems und Krieger daraus zu machen.

Klein, Vorbereit. p. 50. n. 2. *Schwarzſpecht mit weiſsem Schnabel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 28. n. 2. *ſchwarzer Specht mit weiſsem Schnabel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 49. n. 9. Pic noir hupé de la Caroline.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 32. *der gröſste Specht mit dem weiſsen Schnabel.*

Batſch, Thiere, I. p. 307. *der Haubenſpecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 456. n. 2. *der weiſsſchnäblichte Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 225. n. 3. Picus (Principalis) niger, criſta coccinea, linea utrinque collari remigibusque ſecundariis albis. *(Mas.)*

Schöpf, Reiſe durch Nordamerika, II. p. 13. Picus Principalis.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 113. n. 2. Picus (Principalis) niger, criſta coccinea, linea utrinque collari remigibusque ſecundariis albis.

Jonſton, av. p. 222. *Picus imbrifoetus. Quatotomomi.*

Laſiteau, moeurs des Sauvages, II. p. 60.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 243. n. 2. *der Weiſsſchnabel.*

β. Picus niger, occipite criſtato, linea utrinque collari, remigibusque ſecundariis albis. (Foemina.) *

Latham, Vögel, I. 2. p. 457. *das Weibchen.*

Latham, Syn. Suppl. p. 105. n. 2.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 225. n. 3. β.

Discrepat pileo corpore concolore, minime rubro.

3. PILEATUS. *Der Haubenſpecht.* (9)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 221. n. 3. *der Haubenſpecht.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 62. n. 72. *der virginiſche Haubenſpecht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 255. n. 73. *der Haubenſpecht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 327. n. 3. *ſchwarzer Specht mit bleyfarbenem Schnabel und feuerrothem Kopfe.* p. 329. n. 3. *gehaubter Specht.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 305. *der ſchwarze amerikaniſche Haubenſpecht.*

Klein, av. p. 26. n. 3. Picus niger, toto capite rubro, roſtro plumbeo.

Klein, Vorbereit. p. 50. n. 3. *Schwarzſpecht mit feurigem Kopf.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 28. n. 3. *ſchwarzer Specht mit bleyſarbigem Schnabel und feuerrothem Kopf.*

Briſſon, ornithol. II. p. 50. n. 10. Pic noir hupé de Virginie.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 34. *der groſse Specht mit dem rothen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 458. n. 3. *der virginiſche Haubenſpecht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 105.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 225. n. 4. Picus (Pileatus) niger, criſta rubra, temporibus aliſque maculis albis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 41. n. 11. Picus niger, criſta coccinea.

Linné,

(9) Gewicht 9 Unzen. Die Indianer ſchmücken ihre Calumets mit den Kopfbüſchen dieſer Vögel.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 3. Picus (Pileatus) niger, capite criſtato rubro, temporibus aliſque albis maculis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 243. n. 3. *der Haubenſpecht.*

β. Picus niger, criſta rubra, fronte loriſque flavicantibus, abdomine faſciis obſcuris albis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 105.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 206. n. 4. *β.*

4. Lineatus. *Der Ipecu.* (10)

Müller, Naturſyſt. II. p. 221. n. 4. *der geſtreifte Specht.* Tab. 7. fig. 6.

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 4. *bandirter Specht.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 564. *Ipecu; der große ſchwarze amerikaniſche Baumhacker.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 305. *der ſchwarze amerikaniſche Haubenſpecht.*

Halle, Vögel, p. 135. n. 74. *der große ſchwarze amerikaniſche Baumhakker.*

Briſſon, ornithol. II. p. 51. n. 11. Pic noir hupé de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 459. n. 4. *der große geſtreifte cayenniſche Specht.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 226. n. 5. Picus (Lineatus) niger, criſta coccinea, linea a roſtro utrinque collari ad medium dorſum alba, corpore ſubtus rufo-albido, faſciis nigris.

Fermin, Surin. II. p. 150. *ein anderer Buntſpecht.*

Raj, Syn. p. 162. Tlauhquechultototl?

23. Rubri-

(10) Wird oft mit *Picus Principalis* verwechſelt, weil *Linné* in der XIIten Edition den *Ipecu* des *Marcgr.* mit dazu rechnete.

23. Rubricollis. *Der rothhälſige Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 460. n. 5. *der rothhälſige Specht.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 226. n. 6. Picus (Rubricollis) fuſcus, occipite criſtato, corpore ſubtus teſtaceo-albo, capite colloque coccineis.

24. Melanoleucos. *Der ſchwarz- und weiſse Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 461. n. 6.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 226. n. 7. Picus (Melanoleucos) nigricans, pileo criſtato flaveſcente, fronte ſuperciliis nuchaque nigris, linea collari utrinque ad dorſum alba, corpore ſubtus albido, faſciis nigris.

5. Hirundinaceus. *Der Schwalbenſpecht.* (1)
Müller, Naturſyſt. II. p. 222. n. 5. *der Schwalbenſpecht.*
Halle, Vögel, p. 136. n. 75. *der kleinſte ſchwarze amerikaniſche Baumhakker.*
Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 328. n. 8. *kleinſter Schwarzſpecht.* p. 329. n. 5. *Schwalbenſpecht.*
Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 497. *der kleinſte Schwarzſpecht aus Amerika.*
Klein, av. p. 27. n. 4. Picus niger minimus.
Klein, Vorbereit. p. 51. n. 4. *kleinſter Schwarzſpecht.*
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 29. n. 8. *kleinſter Schwarzſpecht.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 48. n. 7. Pic noir de la nouvelle Anglettere.

Latham,

(1) Nach *Latham* gehört *Pennants yellow-legged Woodpecker*, woraus in unſerm Syſtem p. 438. n. 49. eine eigne Gattung gemacht worden, mit hieher.

Latham, Vögel, I. 2. p. 461. n. 7. *der Schwalbenspecht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 227. n. 8. Picus (Hirundinaceus) niger, occipite cristato rubro, humeris albido-punctatis, abdomine inferiore albo.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 113. n. 4. Picus (Hirundinaceus) niger, occipite coccineo, humeris albido punctatis.

β. *Latham,* Syn. II. p. 559. n. 7. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 227. n. 8. β. Picus niger, macula verticis medioque pectore rubris, occipite flavo vario, superciliis uropygioque variis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 461. n. 7. Var. A.

γ. *Latham,* Syn. II. p. 560. n. 7. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 227. n. 8. γ. Picus niger, macula verticis rubra, lateribus ad nucham albis, nucha ipsa aurea, pectore medio lateribusque coccineis, uropygio albo.

Latham, Vögel, I. 2. p. 462. n. 7. Var. B.

6. Passerinus. *Der Sperlingsspecht.*

Müller, Natursyst. II. p. 222. n. 6. *der Sperlingsspecht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 6. *Sperlingsspecht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 505. *der kleine Specht von St. Domingo.*

Brisson, ornithol. II. p. 62. n. 29. petit Pic de S. Domingue.

Latham, Syn. Suppl. p. 110. Passerine Woodpecker.

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 238. n. 40. Picus (Paſſerinus) olivaceo-flavicans, ſubtus fuſco candicanteque faſciatus, capite ſupra rubro.

25. STRIATUS. *Der geſtreifte Specht von St. Domingo.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 91. n. 24. *der geſtreifte Specht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 24. *geſtreifter Specht.*

Briſſon, ornithol. II. p. 59. n. 25. Pic rayé de S. Domingue.

Latham, Vögel, I. 2. p. 485. n. 36. *der geſtreifte Specht von S. Domingo.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 238. n. 39. Picus (Striatus) niger olivaceo-ſtriatus, ſubtus olivaceus, vertice, occipite uropygioque rubris, collo ſubtus pectoreque griſeo-fuſcis.

β. *Der Specht mit ſchwarzem Scheitel.*

Briſſon, ornith. II. p. 60. n. 26. petit Pic rayé de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 486. n. 36. Var. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 238. n. 39. β. Picus corpore ut in priore, vertice nigro, occipite rubro.

Latham, Syn. II. p. 588. n. 36. A.

26. MELANOCHLOROS. *Der gelb- und ſchwarze Specht.*

Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 329. n. 25. *gelber Specht.*

Briſſon, ornithol. II. p. 51. n. 12. Pic varié hupé d'Amerique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 486. n. 38. *der cayenniſche Haubenſpecht.*

Latham,

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 239. n. 41. Picus (Melanochloros) fulvo nigroque undato-maculatus, genis rubicundis, criſta fulvo-aurea, rectricibus nigris.

Gerin. ornithol. II. p. 41. Tab. 174. Picus niger cayennenſis criſtatus.

β. P. fulvo nigroque undato-maculatus, vertice nigro, occipite criſtato rubro, maxillae inferioris myſtace purpuraſcente. *

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 239. n. 41. β.

Büffon, hiſt. nat. des oiſ. VII. p. 30. — Pl. enl. 719. le grand Pic rayé de Cayenne.

27. Flavescens. *Der gelbgehaubte Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 487. n. 39. *der braſilianiſche Haubenſpecht.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 239. n. 42. Picus (Flaveſcens) niger, flavo-faſciatus, capite criſta dependente, gula, genis cerviceque flavis.

28. Cayennensis. *Der olivenfarbige ſchwarz geſtreifte cayenniſche Specht.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 61. n. 27. Pic rayé de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 487. n. 40. *der kleine geſtreifte cayenniſche Specht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 111.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 239. n. 43. Picus (Cayanenſis) olivaceus nigro ſtriatus, ſubtus flavicans, occipite rubro, vertice nigro, genis albidis.

29. Exalbidus. *Der gelbliche Specht von Cayenne.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 228. c. *der weiße cajenniſche Specht.*

Briſſon,

Briſſon, ornithol. II. p. 63. n. 31. Pic blanc de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 488. n. 41. *der Gelbſpecht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 240. n. 44. Picus (Flavicans) occipite criſtato, remigibus fuſcis, rectricibus nigris.

Fermin, Surin. II. p. 150. *der gelbe Specht.*

30. Cinnamomeus. *Der zimmtfarbige Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 257. n. 75. *der roſtfarbige Specht.* Tab. 13. unt. Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 489. n. 42. *der roſtfarbene Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 240. n. 45. Picus (Cinnamomeus) ferrugineo-cinnamomeus, maculis ſparſis flavicantibus, capitis criſta dorſoque infimo flavis, cauda nigra.

31. Multicolor. *Der vielfärbige Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 489. n. 43. *der vielfarbige Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 240. n. 46. Picus (Multicolor) criſtatus rufus, capite, gula cerviceque ſupremo fulvis, infimo iugulo, pectore alarumque maculis albis.

7. Erythrocephalus. *Der rothköpfige Specht.* (²)

Müller, Naturſyſt. II. p. 222. n. 7. *der Rothkopf.* Tab. 7. fig. 7.

Borowsky,

(²) Gewicht 2 Unzen. Wandert bey Herannäherung des Winters gegen Süden; und wenn ſie zu der Zeit noch häufig in den Wäldern verweilen, ſo halten es die Einwohner von Penſylvanien u. a. für ein Zeichen einer milden Witterung.

Borowsky, Thierreich, II. p. 136. n. 4. *der rothköpfige Specht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 12. *rothköpfichter Virginianer.* p. 329. n. 7. *Rothkopf.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 496. *der Rothkopf.*

Halle, Vögel, p. 143. n. 83. *der karolinische Hausspecht.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 61. n. 70. *der Rothkopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 257. n. 76. *der Rothkopf.*

Klein, av. p. 28. n. 12. Picus capite colloque rubris.

Klein, Vorbereit. p. 53. n. 12. *Rothkopf.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 12. *rothköpfiger Virginianer.*

Brisson, ornitholog. II. p. 56. n. 19. Pic à tête rouge de Virginie.

Batsch, Thiere, I. p. 307. *der rothköpfige Specht.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 40. *der Specht mit dem rothen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 462. n. 8. *der rothköpfige Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 227. n. 9. Picus (Erythrocephalus) capite toto rubro, alis caudaque rubris, abdomine remigibusque secundariis albis.

Carver, Reise d. Nordamerika, p. 389. **** Picus erythrocephalus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 5. Picus (Erythrocephalus) capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomine albo.

Gerin. ornith. II. p. 50. Tab. 176.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 243. n. 4. *der Rothkopf.*

31. Ruber.

31. RUBER. *Der rothe Specht von Cayenne.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 464. n. 8. *der rothe cayennische Specht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 106.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 228. n. 10. Picus (Ruber) niger, capite, collo et pectore coccineis, macula alarum longitudinali alba, abdomine medio flaveſcente-albo.

32. OBSCURUS. *Der dunkelfarbige nordamerikaniſche Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 464. n. 10. *der Specht mit weißem Steiße.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 228. n. 11. Picus (Obſcurus) nigricans, ſubtus uropygioque albus, ſupra tectricibusque alarum minoribus albo variegatis, remigibus primoribus apice nigris.

33. FASCIATUS. *Der bandirte Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 465. n. 11. *der bandirte Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 229. n. 12. Picus (Faſciatus) fuſco-nigricans, vertice, loris ſtrigaque ſubmaxillari coccineis, abdomine albo nigroque ſtriato, rectricibus apice albis.

8. AURANTIUS. *Der pomeranzenfarbige Specht.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 223. n. 8. *der pomeranzenfarbige Specht.*

Neuer Schaupl. d. Natur, VIII. p. 329. n. 8. *Orangenſpecht.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 493. *der pomeranzenfarbige Specht.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 63. n. 30. Pic du Cap de bonne eſperance.

Latham, Vögel, I. 2. p. 483. n. 32. *der orangefarbige Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 237. n. 35. Picus (Aurantius) ſupra aurantius, nucha, uropygio tectricibusque nigris.

Gerin. ornith. II. p. 50. Tab. 175.

34. Senegalensis. *Der ſenegaliſche Specht.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 91. n. 22. *der Gelbrücken.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 329. n. 22. *der Gelbrücken.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 484. n. 33. *der ſenegaliſche Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 237. n. 36. Picus (Senegalenſis) fronte genisque fuſcis, pileo rubro, dorſo remigibusque fulvo-aureis, corpore ſubtus griſeo fuſco alboque undulato.

35. Capensis. *Der graukäpfige Specht vom Cap.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 484. n. 34. *der capſche Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 237. n. 37. Picus (Capenſis) griſeus, collo, pectore dorſoque fuſco-olivaceis, cauda nigra, tectricibus uropygioque rubris.

β. P. pallide griſeus, dorſo et alis olivaceo-fuſcis, pileo, uropygio abdomineque rubris. *

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 238. n. 37. β.

9. Auratus. *Der Goldſpecht.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 223. n. 9. *der Goldflügel.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 134. n. 1. *der Goldſpecht.* Tab. 17.

Gatte-

(5) Gewicht 5 Unzen.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 61. n. 71. *der Goldſpecht.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 256. n. 74. *der Goldflügel.*

Neuer Schaupl. d. Natur, VIII. p. 329. n. 9. *Goldſpecht.*

Onomat. hiſtor. nat. III. p. 481. *der Ringel-Kuckug mit vergoldeten Flügeln.*

Halle, Vögel, p. 156. n. 91. *der bunte Kukuk mit vergoldeten Flügelkielen und ſchwarzem Bruſtringe.*

Klein, av. p. 30. n. 3. Cuculus alis deauratis.

Klein, Vorbereit. p. 58. n. 3. *Ringelkuckuck mit vergoldeten Flügeln.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 33. n. 3. *Ringelkuckuck mit vergoldeten Flügeln.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 61. n. 28. Pic rayé de Canada.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 36. *der Specht mit vergüldeten Flügeln.*

Batſch, Thiere, I. p. 307. *der Goldſpecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 492. *der Goldſpecht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 111. Gold-winged Woodpecker.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 242. n. 52. Picus (Auratus) griſeo-nigroque transverſim ſtriatus, lateribus gulae pectoreque nigris, nucha rubra, uropygio albo.

Carver, Reiſ. durch Nordamer. p. 389. *** Picus auratus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 112. n. 8. Cuculus (Auratus) cauda forcipata, gula pectoreque nigris, nucha rubra.

Philoſ. Transact. lxii. p. 387. Picus auratus.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 187. P. auratus.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 344. n. 5. *der Goldflügel.*

36. Cafer. *Der Aſtergoldflügel.*

Latham, Syn. II. p. 599. n. 49. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 493. n. 49. Var. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 242. n. 53. Picus (Cafer) ſupra fuſcus, ſubtus vinaceus, maculis rotundis nigris, alis ſubtus ſcapisque remigum et rectricum miniatis.

37. Olivaceus. *Der olivenfarbige Specht vom Cap.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 493. n. 50. *der rothbrüſtige Specht.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 242. n. 54. Picus (Olivaceus) olivaceo-fuſcus, uropygio ſaturate, pectore pallide coccineo, corpore toto maculis pallidis, criſſo faſcia fuſca.

10. Carolinus. *Der caroliniſche Specht.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 224. n. 10. *der caroliniſche Specht.*

Halle, Vögel, p. 143. n. 82. *der rothbäuchige Baumhakker.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 258. n. 77. *der caroliniſche Specht.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 328. n. 11. *rothbrüſtiger Specht.* p. 329. n. 10. *caroliniſcher Specht.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 495. *der rothbäuchige Baumhacker oder bunter Specht aus Jamaica.*

Klein, av. p. 28. n. 11. Picus capite colloque rubris.

Klein, Vorber. p. 53. n. 11. *Rothbauch.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 29. n. 11. *rothbrüſtiger Specht.*

Briſſon,

Brisson, ornitholog. II. p. 58. n. 23. Pic varié de la Jamaique.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 38. *der Specht mit dem rothen Leib.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 34. *der jamaicaische Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 472. n. 17. *der carolinische Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 231. n. 18. Picus (Carolinus) pileo nuchaque rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis nigro-punctatis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 6. Picus (Carolinus) pileo nuchaque rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis albis, nigro-punctatis.

Mem. de l' Acad. d. Sciences de Paris 1709. p. 85. Tab. 3.

β. *Latham*, Syn. II. p. 571. n. 17. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 472. n. 17. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 231. n. 18. β. Picus fronte genisque pallide fuscescentibus, abdomine fusco-flavescente, rectricibus 2. intermediis albo nigroque fasciatis.

γ. *Latham*, Syn. II. p. 571. n. 17. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 473. n. 17. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 231. n. 18. γ. P. pileo rubescente, gula genisque rubro variis, rectricibus duabus intermediis et extimis albo nigroque variis, reliquis nigris.

δ. Picus albo nigroque varius, pileo, nucha abdomineque rubris, fronte colloque subtus flavo-griseis, lateribus colli a rictu oris linea nigra. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 231. n. 18. δ.

Gerin. ornith. II. p. 48. Tab. 171. P. varius indicus.

37. Undatus. *Der rothbackige Specht.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 224. n. 11. *der Rothbacken.*
Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 11. *gelbrother Specht mit ſchwarzen Wellen.*
Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 508. *der rothbackigte Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 490. n. 44. *der gujaniſche Specht.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 241. n. 47. Picus (Undatus) teſtaceus nigro undulatus, temporibus ſanguineis.

38. Rufus. *Der braunrothe Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 490. n. 45. *der gelbrothe Specht.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 241. n. 48. Picus (Rufus) rufus nigro-undulatus, alis, cauda, corporeque ſubtus ſaturatioribus.

β. Picus rufus nigro undulatus, pectore nigro, ſub oculis macula magna coccinea. *
Latham, Syn. Suppl. p. 111.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 241. n. 48. β.

39. Chlorocephalus. *Der gelbköpfige Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 491. n. 46. *der gelbköpfige Specht.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 241. n. 49. Picus (Icterocephalus) ſubcriſtatus olivaceo-fuſcus, ſubtus albo-maculatus, capite colloque flavis, pileo rubro.

40. Miniatus. *Der rothe javaniſche gehäubte Specht, mit blauem Schnabel und Schwanz.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 491. n. 47. *der rothflügelige Specht.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 241. n. 50. Picus (Miniatus) obscure ruber, capite cristato, iugulo roseo, abdomine albo, remigibus nigris albo maculatis, rectricibus cyaneis.

Naturforsch. I. p. 266. n. 4. *der rothe Specht.*

Berlin. Samml. IX. p. 191. n. 4. *der rothe Specht.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 188. n. 3. *der rothe Specht.*

41. Pitiu. *Der Pitiu.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 234. n. 26. Picus (Pitius) fuscus, albo guttatus, cauda brevi.

Latham, Vögel, I. 2. p. 495. n. 53. *der Pitiuh.*

12. Viridis. *Der Grünspecht.*(4)

Müller, Natursystem, II. p. 224. n. 12. *der Grünspecht.* Tab. 38 fig 4.

Leske, Naturgesch. p. 248. n. 2. *der Grünspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 136. n. 5. *der Grünspecht.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 167. n. 2. Picus (Viridis) viridis, vertice coccineo; *der Grünspecht, Grasspecht.*

Bechstein, Naturgesch. p. 349. n. 2. *der Grünspecht.*

(4) Flügelweite 20 Zoll. — Ein scheuer aber munterer Vogel, der im Winter bleibt, und sich den Sommer hindurch vorzüglich in grofsen Eich- und Buchwäldern aufhält. Fliegt in Absätzen, und hat einen hüpfenden Gang. Nährt sich besonders von Ameisen, Raupen, und Puppen des Goldkäfers. Brütet jährlich nur einmal, und das Weibchen legt die Eyer auf das blofse faule Holz hin. Zur Paarungszeit schreyet das Männchen so stark, dafs man es eine halbe Stunde weit hören kann. — Hat ein schmackhaftes Fleisch. Das Weibchen hat keine schwarze Backen und keine Platte; auch spielt die grünliche Farbe desselben mehr ins Graue.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 505. n. 2. *der Grünspecht.* p. 510. *der Zimmermann, Grasspecht.*

Funke, Naturgesch. I. p. 300. *der Grünspecht.*

Ebert, Naturl. II. p. 45 *der Grünspecht.*

Halle, Vögel, p. 136. n. 76. *der grüne Baumhakker mit rother Platte.* Fig. 6.

Meyer, Thiere, II. Tab. 35.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 62. n. 73. *der Grünspecht.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 262. B. *der Grünspecht.*

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 532. *Grünspecht.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 510. *der gemeine Grünspecht.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 172. *der gemeine Grünspecht.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 101. *der große Grünspecht.*

Klein, av. p. 27. n. 5. Picus viridis.

Klein, Vorbereit. p. 51. n. 5. *Grünspecht oder Grasespecht.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 29. n. 4. *Grünspecht.*

Klein, stemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 481. *Grünspecht;* Abbild. schl.

Brisson, ornith. II. p. 44. n. 1. Pic-verd.

Batsch, Thiere, I. p. 307. *der Grünspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 478. n. 25. *der Grünspecht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 110. Green Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 234. n. 27. Picus (Viridis) viridis, vertice coccineo.

Beseke, Naturgesch. d. Vögel Kurl. p. 37. n. 57. 58. *der Grünspecht.*

Bock,

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 311. n. 56. *der große Grünſpecht.*

Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 81. *der Grünſpecht.* *

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 76. n. 66. *Grünſpecht.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 167. n. 2. *Grönſpett.*

Pontoppidan, Naturhiſt. v. Norwegen, II. p. 184. *Grünſpechte.*

Haſſelquiſt, Reiſe nach Paläſtina, p. 342. n. 11. Picus viridis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 47. n. 52. *der Grünſpecht, Graſeſpecht.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 270. *der Grün-Specht.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. n. 2. *Grün-Specht.*

Naumann, Vogelſteller, p. 137. n. 1. *der Grünſpecht.*

Naturf. IX. p. 55. n. 55. *der Grünſpecht.*

Anweiſung Vögel zu fangen u. ſ. w. p. 113. *Grünſpecht.*

Jablonſky, allgem. Lex. p. 1098. *Grünſpecht.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 655. *der Grünſpecht.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Th. p. 3. n. 15. *der Grünſpecht.*

Loniceri, Kräuterbuch, p. 678. *Grünſpecht.*

Kraft, Ausrott. grauſ. Thiere, I. p. 444. *Grün-Specht.*

Wirſing, Vögel, Tab. 57.

Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 53. Picus viridis.

Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 20. n. 2. Picus viridis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 7. Picus (Viridis) viridis, vertice coccineo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 98. Picus (Viridis) viridis, vertice coccineo.

Kramer,

Kramer, Auſtr. p. 335. n. 2. Picus pedum digitis duobus anticis; poſticis duobus; viridis, vertice coccineo; *Grünſpecht.*

Brünich, ornitholog. bor. p. 11. n. 39. Picus viridis.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 338. Picus viridis; *ein Grün-Specht, Groſe Specht.*

Moehring, av. gen. p. 35. n. 14. Picus.

Schäffer, elem. ornith. Tab. 56.

Gerin. ornith. II. p. 45. Tab. 165.

Philoſ. Transact. XXIX. n. 350. Tab. 1.

Jonſton, av. p. 111. Picus viridis.

Hoffmann: Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. app. p. 452. Picus viridis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 344. n. 6. *der Grünſpecht.*

β. *Klein*, av. p. 127. n. 3. Iaculator mitella rubra?

Klein, Vorbereit. p. 236. n. 3. *rothgekappter Harpunirer?*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 134. n. 3. *rothgekappter Harpunierer?*

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 511. *der mexicaniſche Grünſpecht.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 46. n. 3. Picus viridis Mexicanus. *Pic verd du Mexique.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 479. n. 25. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 234. n. 27. β. Picus viridis, capite ſuperius et maculis infra aures ſaturate rubris, uropygio dilute flavo.

Seba, muſ. I. p. 100. Tab. 64. fig. 3. Ardea mexicana altera?

Fermin, Beſchreib. von Surinam, II. p. 148. *der Grünſpecht.*

Moehring, av. gen. p. 79. n. 100. Cornix?

13. Bengalensis. *Der bengalische Specht.*

Müller, Natursystem, II. p. 225 n. 13. *der bengalische Specht.*

Halle, Vögel, p. 144. n. 84. *der farbige bengalische Baumhakker mit scharlachrothem liegendem Federbusche.*

Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 328. n. 13. *bunter bengal. Specht.* p. 329. n. 13. *bengal. Specht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 494. *der bengalische Baumhacker.*

Klein, av. p. 28. n. 13 Picus varius benghalensis.

Klein, Vorbereit. p. 53. n. 13. *gelbgrüner und schwarzbunter Specht.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 13. *bunter Bengalenser.*

Brisson, ornitholog. II. p. 45. n. 2. Pic verd de Bengale.

Latham, Vögel, I. 2. p. 480. n. 26. *der bengalische Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 235 n. 29. Picus (Bengalensis) viridis, crista rubra, nucha nigra, fronte et iugulo albo nigroque vario, corpore subtus albo.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 8. Picus (Benghalensis) viridis, occipite rubro, nucha nigra, subtus anticeque albus, nigro maculatus.

Gerin. ornithol. II. p. 50. Tab. 179.

β. *Der Kerella.*

Latham, Syn. II. p. 581. n. 26. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 480 n. 26. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 235. n. 29. β. Picus viridis, capite maculis albis numerosis, dorso nigro medio coccineo.

Naturf. XVII. p. 16. *ein zeylanischer Specht.*

γ. *Der*

γ. *Der philippinische Specht.* (5)

Latham, Syn. II. p. 581.

Latham, Vögel, I. 2. p. 481. n. 26. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 30. Picus (Philippinarum) fusco-viridis cristatus, subtus albo nigroque maculatus, uropygio rubro, rectricibus maculis albis.

42. Goensis. *Der grüne Specht von Goa.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 481. n. 27. *der Specht von Goa.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 235. n. 28. Picus (Goensis) viridis subcristatus, pileo coccineo, corpore subtus albido nigro undulato, temporibus vitta alba, lateribus colli striga nigra.

43. Manillensis. *Der grüne Specht von Luçon.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 482. n. 28. *der manillische Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 31. Picus (Manillensis) sordide viridis, vertice griseo-maculato, tectricibus caudae superioribus rubris, remigibus rectricibusque nigricantibus.

44. Goertan. *Der Goertan.*

Müller, Natursyst. Supplem. p. 91. n. 23. *der Goertan.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 482. n. 29. *der Goertan.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 32. Picus (Goertan) supra griseo-fuscus, subtus griseo-flavicans, vertice uropygioque coccineis.

45. Canus.

(5) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

45. CANUS. *Der norwegische Specht.*

Halle, Vögel, p. 147. n. 88. *der grüne norwegische Baumhakker mit schwarzem Halsbändchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 262. C. *der Graukopf.*

Neuer Schaupl. d. Natur, VIII. p. 329. n. 15. *grauköpfigter Grünspecht.*

Klein, av. p. 28. n. 17. Picus viridis, supra uropygium lutescens, ad radicem rostri et ab inferiori mandibula ad latera capitis nigra linea curva, remigibus alarum nigro fuscis, albis punctis transversalibus, tectricibus flavicantibus.

Klein, Vorber. p. 54. n. 17. *Grünspecht mit einem gelben Steiß.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 30. n. 15. *grauköpfiger Grünspecht.*

Brisson, ornitholog. II. p. 46. n. 4. Pic verd de Norwege.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 25. *grauköpfiger Grünspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 482. n. 30. *der grauköpfige Grünspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 33. Picus (Norwegicus) caeruleo-viridis, capite, collo corporeque subtus cinereis, uropygio luteo, loris mystacibusque nigris.

Gerin. ornithol. II. p. 50. Tab. 177.

46. PERSICUS. *Der persische Specht.*

Müller, Natursyst. II. p. 228. b. *der gelbe persianische Specht mit blauen Füßen.*

Brisson, ornitholog. II. p. 47. n. 5. Pic jaune de Perse.

Latham, Vögel, I. 2. p. 483. n. 31. *der persische Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 236. n. 34. Picus (Perſicus) luteus, corpore ſupra ſubferrugineo, rectricibus luteo-ferrugineis, pedibus cyaneis.

Jonſton, av. p. 111. Picus luteus cyanopus.

14. Semirostris. *Der halbſchnäblichte Specht.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 225. n. 14. *der Halbſchnabel.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 14. *Halbſchnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 485. n. 35. *der halbſchnäblige Specht.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 238. n. 38. Picus (Semiroſtris) fuſco-cinereus, ſubtus albus, capite fuſco flaveſcente maculato, maxilla ſuperiore breviore.

Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 15. *der halbſchnäblichte Specht.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 190. Picus ſemiroſtris.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 114. n. 9. Picus (Semiroſtris) maxilla ſuperiore breviore.

15. Pubescens. *Der Daunenſpecht.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 226. n. 15. *der virginiſche Specht.*

Halle, Vögel, p. 142. n. 80. *der haarige Baumhakker mit weißem haarigen Rükkenſtreife.*

Pennant, arct. Zool. p. 259. n. 81. *der Daunenſpecht.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 329 n. 15. *rauher Specht.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 507. *der kleinſte Specht aus Virginien.*

Klein,

(6) *Pallas* hält ihn für einen verunſtalteten Vogel einer ausländiſchen Art.

Klein, av. p. 27. n. 8. Picus varius minimus.

Klein, Vorbereit. p. 52. n. 8. *der kleinste Specht.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 29. n. 7. *kleinſter Specht.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 55. n. 18. petit Pic varié de Virginie.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 42. *der kleine ſcheckige Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 474. n. 19. *der Daunenſpecht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 106. Little Woodpecker.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 332. n. 20. Picus (Pubeſcens) albo nigroque varius, ſubtus griſeo-albus, rectrice extima alba, maculis quatuor nigris.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 244. n. 7. *der Daunenſpecht.*

16. Villosus. *Der haarige Specht.* (7)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 226. n. 16. *der zottige Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 259. n. 80. *der haarige Specht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 9. *rauher Specht.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 509. *der haarige Baumhacker.*

Klein, av. p. 27. n. 9. Picus villoſus medius.

Klein, Vorbereit. p. 52. n. 9. *rauche Specht.*

Klein, verb. Vögelh. p. 29. n. 9. *raucher Specht.*

Briſſon, ornithol. II. p. 54. n. 17. Pic varié de Virginie.

Selig-

(7) Gewicht 2 Unzen.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 38. *der harige Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 473. n. 18. *der haarige Specht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 108. Hairy Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 232. n. 19. Picus (Villosus) albo nigroque varius, subtus albus, dorso longitudinaliter subvilloso, rectricibus extimis toto albis.

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 209. *der virginianische Specht.*

Schöpf, Reise durch Nordamerika, II. p. 12. Picus villosus.

Philos. Transact. lxii. p. 388.

17. MAIOR. *Der große Buntspecht.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 227. n. 17. *der bunte Specht.*

Leske, Naturgesch. p. 248. n. 3. *der Buntspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 137. n. 6. *der Buntspecht.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 167. n. 3. Picus (Maior) albo nigroque varius, vertice rubro; *der große Bunt- oder Rothspecht.*

Bechstein,

(8) Flügelweite 1 Fuss 6 1/2 Z. Gewicht 2 3/4 Unzen. Kommt dem Grünspecht in Sitten und Betragen sehr gleich, hält sich aber mehr auf der Erde auf als dieser. Bewohnt die Wälder, besonders Laubhölzer. Liebt aber mehr Feldhölzer und Gärten, als tiefe Gebirge und Waldungen. Zieht in Deutschland nicht weg, und hält sich im Winter vorzüglich gern zu den Gärten. Frisst allerhand Insekten, auch Fichten- und Kiefersaamen, Buchecken, Eicheln, und Haselnüsse. Nistet in hohle Bäume, und legt auf eine unordentliche Unterlage von allerhand Geniste oder dem zermalmten faulen Holze 5 bis 6 schmutzig weisse, mit einigen hellrothen Flecken bezeichnete Eyer. Das Fleisch ist wohlschmeckend, besonders in der Haselnusszeit.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 349. n. 3. *der große Buntspecht.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 511. n. 3. *der große Buntspecht.* p. 515. *Buntspecht, gesprenkelter Specht, Elsterspecht, Baumhäckel, größerer Specht.*

Funke, Naturgesch. I. p. 301. *der Buntspecht.*

Ebert, Naturl. I. p. 46. *der bunte Specht.*

Halle, Vögel, p. 139. n. 77. *der größte schwarz- und weißbunte Baumhakker.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 63. n. 74. *der große Buntspecht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 258. n. 78. *der große Buntspecht.*

Neuer Schauplatz d. Nat. VIII. p. 328. n. 5. *grosser Buntspecht.* p. 329. n. 17. *großer Specht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 498. *der große Buntspecht.*

Handbuch der deutsch. Thiergesch. p. 101. *der Buntspecht, Rothspecht.*

Klein, av. p. 27. n. 6. Picus discolor.

Klein, Vorbereit. p. 51. n. 6. *großer Buntspecht.*

Klein, verbess. Vögelhistorie, p. 29. n. 5. *großer Buntspecht.*

Klein, stemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 3. a. c. d. e.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 3.

Brisson, ornithol. II. p. 51. n. 13. grand Pic varié.

Batsch, Thiere, I. p. 307. *der große Buntspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 465. n. 12. *der große Buntspecht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 107. Greater spotted Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 228. n. 13. Picus (Maior) albo nigroque varius, crisso occipiteque rubro.

Beseke, Vögel Kurl. p. 38. n. 59. 60. *der Bunt-specht.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 311. n. 57. *bunter Specht.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 81. *der schwarz und weiß gefleckte Specht.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 76. n. 68. *großer Buntspecht.*

Fabricius, Reis. n. Norweg. p. 183. *der Schwarz-specht.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 167. n. 3. *Buntspecht.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 47. n. 53. *der große Buntspecht.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 271. *der größere schwarz- und weißbunte Specht, Baumhäckel.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 60. *der größere Roth- oder Buntspecht.*

Naumann, Vogelsteller, p. 137. n. 3. *der große Buntspecht.*

Naturforsch. IX. p. 55. n. 56. *bunter Specht.*

Jablonsky, allgemein. Lex. p. 1098. *der Bunt-Specht.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 112. n. 16. *der große Buntspecht.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 454. n. 21. *bunter Specht.*

Eberhard, Thiergesch. p. 104. *der Elster-Specht.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 119. n. 4. *der bunte Specht.*

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 444. n. 12. *Aegt-ster-Specht.*

Günth. Nest. u. Eyer, Tab. 61. *große Rothspecht.*

Wirsing, Vögel, Tab. 58.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Picus varius.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 3. Picus varius maior.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 114. n. 10. Picus (Maior) albo nigroque varius, ano occipiteque rubro.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 99. Picus (Maior) albo nigroque varius, crisso occipiteque rubris.

Kramer, Austr. p. 335. n. 3. Picus pedum digitis duobus anticis: posticis duobus; albo nigroque varius, vertice nigro; *großes Baumhackl.*

Brünich, ornith. bor. p. 11. n. 40. Picus maior.

Gerin. ornith. II. p. 47. Tab. 167. 168.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 245. n. 8. *der Buntspecht.*

18. Medius. *Der mittlere Buntspecht.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 227. n. 18. *der Weißspecht.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 350. n. 4. *der mittlere Buntspecht.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 516. n. 4. *der mittlere Buntspecht.* p. 518. *Elsterspecht, Weißspecht, kleinerer Specht.*

Ebert, Naturl. II. p. 46. *der Weißspecht, Aelsterspecht.*

Halle, Vögel, p. 140. n. 78. *der kleine schwarz- und weißbunte Baumhacker.*

Pennant, arct. Zoolog. p. 263. D. *der mittlere Buntspecht.*

 Neuer

(9) Die Ornithologen sind noch nicht einig, ob diese Gattung von der vorhergehenden wirklich verschieden sey. *Lapeirouse*, und mit ihm *Beseke*, *Bechstein* u. a. m. halten den *mittlern Buntspecht* für eine Varietät vom *großen* Buntspecht; und *Latham* ist geneigt, ihn für einen jungen Vogel dieser Gattung anzusehen.

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 6. *kleiner Buntſpecht.* p. 329. n. 18. *Mittelſpecht.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 501. *der mittlere Buntſpecht, Elſterſpecht.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 102. *kleiner Buntſpecht.*

Geſner, Vögelb. p. 485. *Aegerſtſpecht.*

Briſſon, ornithol. II. p. 52. n. 14. Pic varié.

Latham, Vögel, I. 2. p. 467. n. 13. *der mittlere Buntſpecht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 107. Middle ſpotted Woodpecker.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 229. n. 14. Picus (Medius) albo nigroque varius, criſſo pileoque rubris.

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 38. n. 61. *der Weiſsſpecht.*

Bock, Naturg. v. Preuſſen, IV. p. 312. *Weiſsſpecht.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 76. n. 67. *Weiſsſpecht.*

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 167. n. 4. *Flagſpette, haarigte Baumhacker.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 49. n. 54. *der mittlere Buntſpecht.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der Elſterſpecht.*

Zorn, Petinotheol. p. 273. *eine merklich kleinere Gattung von dem ſchwarz- und weiſsbunten Specht.*

Naturf. IX. p. 55. n. 57. *Weiſsſpecht.*

Lapeirouſe: neue ſchwed. Abhandl. III. p. 104. Picus medius.

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 112. n. 16. *der mittlere Buntſpecht.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 104. *der bunte kleine Specht.*

Wirſing,

Wirsing, Vögel, Tab. 37. *der mittlere Bunt-specht.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 4. Picus varius minor.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 114. n. 11. Picus (Medius) albo nigroque varius, ano verticeque rubris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 100. Picus (Medius) albo nigroque varius, crisso pileoque rubris.

Kramer, Austr. p. 336. n. 4. Picus pedum digitis duobus anticis: posticis duobus; albo nigroque varius, vertice coccineo, pube rubra; *kleines Baumhackl.*

Brünich, ornith. bor. p. 11. n. 41. Picus medius.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 339. Picus varius maior; *ein bundter Specht, gesprengleter Specht, Elster-Specht, Weis-Specht.*

Jonston, av. p. 111. Picus maior.

19. Minor. *Der kleine Buntspecht.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 227. n. 19. *Grasspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 138. n. 7. *der kleine Buntspecht.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 167. n. 4. Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro; *der kleine Bunt- oder Rothspecht.*

Bechstein, Naturgesch. p. 350. n. 5. *der kleine Buntspecht.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 518. *der kleine Buntspecht.*

(10) Flügelweite 11 1/2 Zoll. Gewicht noch keine Unze. Nistet in Gärten und Wäldern in hohlen Bäumen. Legt vier grünlich weisse Eyer auf ein Nest von Moos und Grashalmen gebaut. Männchen und Weibchen brüten gemeinschaftlich vierzehn Tage.

Ebert, Naturl. II. p. 46. *der Grasſpecht.*

Halle, Vögel, p. 141. n. 79. *der kleinſte ſchwarz- und weiſsgeſcheckte Baumhacker.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 63. n. 75. *der kleine Buntſpecht*, *Grasſpecht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 263. E. *der kleine Buntſpecht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 7. p. 329. n. 19. *kleinſter Specht.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 502. *der kleine Buntſpecht*, *Grasſpecht.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 102. *kleinſter Specht*, *Harlekinſpecht.*

Klein, av. p. 27. n. 7 Picus diſcolor minor.

Klein, Vorber. p. 51. n. 7. *kleiner Buntſpecht.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 29. n. 6. *kleiner Buntſpecht.*

Klein, ſtemm. av. p. 5. Tab. 4. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 4.

Briſſon, ornithol. II. p. 53. n. 15. petit Pic varié.

Batſch, Thiere, I. p. 307. *der kleine Buntſpecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 468. n. 14. *der kleine Buntſpecht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 107. *Leſſer ſpotted Woodpecker.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 229. n. 15. Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro, criſſo teſtaceo.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 38. n. 62. 63. *der Grasſpecht.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 312. n. 59. *Grasſpecht*, *kleinſter Specht*, *Harlekinſpecht.*

Fiſcher, Livl. p. 77. n. 69. *Grasſpecht*, *kleiner Baumſpecht.*

Pontop-

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 167. n. 5. *Harlekinſpecht.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 49. n. 55. *der kleine Buntſpecht.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 273. *die kleinſte Art von dem ſchwarz- und weiſsbunten Specht.*

Naumann, Vogelſteller, p. 137. n. 4. *der kleine Buntſpecht.*

Naturf. IX. p. 55. n. 58. *Grasſpecht.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 113. n. 18. *der kleine Buntſpecht.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 105. *der Grasſpecht.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 114. n. 12. Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro, ano albido.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 101. Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro, criſſo teſtaceo.

Kramer, Auſtr. p. 336. n. 5. Picus pedum digitis duobus anticis, poſticis duobus; albo nigroque varius, vertice coccineo, pube teſtacea; *Baumhackerl.*

Brünich, ornitholog. bor. p. 11. Picus minor.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 340. Picus varius minor; *ein kleiner bunter Specht.*

Jonſton, av. p. 111. Picus varius minor.

Gerin. ornith. II. p. 48. Tab. 170. fig. 1.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 245. n. 9. *der kleine Bunt- oder Rothſpecht.*

β. Picus albo nigroque varius, vertice, nucha cerviceque nigro-griſeis, corpore ſubtus flaveſcente nigro maculato. *

Latham, Vögel, I. 2. p. 470. n. 14. Var. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 230. n. 15. *β.*

Sonnerat, voy. p. 118. Tab. 77. Petit pic d'Antigue.

Habitat in Infula *Panay*. An *foeminae* varietas?

γ. Picus albo nigroque varius, occipite fubcriftato, macula verticis coccinea, fronte, genis corporeque fubtus albis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 108. n. 14. A.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 230. n. 15. β.

Habitat in *Zeylona;* magnitudine *minori* cedens.

47. Tricolor. *Der dreyfarbige Specht.*

Müller, Naturfyftem. II. p. 228. e. *der mexicanifche bunte Specht?*

Klein, av. p. 62. n. 6. Pica mexicana alia?

Klein, Vorber. p. 117 n. 6. *mexicanifche Aelfter?*

Klein, av. p. 127. n. 2. Iaculator cinereus?

Klein, Vorber. p. 236. n. 2. *dunkelgrauer Harpunirer?*

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 134. n. 2. *dunkelgrauer Harpunirer?*

Briffon, ornitholog. II. p. 57. n. 21. grand Pic varié du Mexique.

Briffon, ornitholog. II. p. 58. n. 22. petit Pic varié du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 470. n. 15. *der mexicanifche Buntfpecht.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 230. n. 16. Picus (Tricolor) niger, ftriis transverfis albis, pectore abdomineque rubris.

Seba, thef. I. p. 101. Tab. 64. fig. 6. P. mexicana.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 100. Cornix?

Gerin, ornith. II. p. 50. Tab. 178.

48. Ca-

48. CANADENSIS. *Der canadische Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 258. n. 79. *der canadische Buntspecht.*

Brisson, ornithol. II. p. 54. n. 16. Pic varié de Canada.

Latham, Vögel, I. 2. p. 471. n. 17. *der canadische Buntspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 230. n. 17. Picus (Canadensis) albo nigroque varius, corpore subtus dorsoque medio albo, nucha fulva, rectricibus 2. intermediis nigris immaculatis, duabus extimis albis, basi nigris.

80. VARIUS. *Der gelbbäuchige Specht.*

Müller, Naturs. II. p. 227. n. 20. *scheckigter Specht.*

Halle, Vögel, p. 142. n. 81. *der kleine gelbbäuchige Baumhacker.*

Neuer Schaupl. der Natur. VIII. p. 328. n. 10. *gelbbrüstiger kleiner Buntspecht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 509. *der kleine gelbbäuchige Buntspecht.*

Klein, av. p. 27. n. 10. Picus varius minor, ventre luteo.

Klein, Vorber. p. 52. n. 10. *gelbbrüstiger kleiner Buntspecht.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 29. n. 10. *gelbbrüstiger kleiner Buntspecht.*

Brisson, ornitholog. II. p. 59. n. 24. Pic varié de la Caroline.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 42. *der Specht mit dem gelben Leib.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 475. n. 20. *der schäckige Specht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 109. Yellow bellied Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 232. n. 21. Picus (Varius) albo nigroque varius, vertice rubro, crisso albo, fusco fasciato.

49. Flavipes. *Der gelbfüßige Specht.* (1)
Pennant, arct. Zool. II. p. 260. n. 83. *der Specht mit gelben Füßen.*

50. Bicolor. *Der zweyfarbige Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 476. n. 21. *der zweyfarbige Specht.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 233. n. 22. Picus (Variegatus) capite subcristato, lateribus rubro notato, corpore supra transversim, subtus longitudinaliter fusco alboque vario, genis albis.

51. Cardinalis. *Der Cardinalspecht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 476. n. 22. *der Cardinalspecht.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 233. n. 23. Picus (Cardinalis) albo nigroque varius, subtus albus, maculis oblongis nigris, lateribus colli vitta utrinque alba, vertice nuchaque rubris.

52. Nubicus. *Der Specht aus Nubien.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 477. n. 23. *der nubische Specht.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 233. n. 24. Picus (Nubicus) fusco albo rufoque undato-maculatus, vertice nigro albo punctato, occipite cristato rubro, collo pectoreque albidis nigroguttatis.

53. Moluccensis. *Der molukkische Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 477. n. 24. *der Braunspecht.*

Latham,

(1) Ist, nach *Latham*, mit *P. Hirundinaceus* p. 426. n. 5. einerley.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 223. n. 25. Picus (Moluccensis) fusco nigricans albo undatus, subtus albidus fusco sagittatus, crisso albo, remigibus rectricibusque albo maculatis.

β. Picus fusco nigricans albo maculatus, subtus albus, capite albo, vertice maculaque infra oculos fuscis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 224. n. 25. β.
Latham, Syn. Suppl. p. 103. Little brown Woodpecker.

Habitat in India; 5 pollices longus.

21. TRIDACTYLUS. *Der dreyzehige Specht.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 229. n. 21. *Dreyfingerige.*
Leske, Naturgesch. p. 249. n. 4. *der dreyzehige Specht.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 138. n. 8. *der dreizehige Specht.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 351. n. 6. *der dreyzehige Specht.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 521. n. 6. *der dreyzehige Specht.*
Halle, Vögel, p. 148. * *der dreizeehige Baumhakker.*

Gatte-

(2) Flügelweite 15 3/4 Zoll. Gewicht 2 Unzen. — Es wird aber die Gröfse dieser Gattung von den Ornithologen ganz verschieden angegeben. In unserm System wird sie auf 11 Zoll bestimmt. *Pennant* setzt sie auf 8 Zoll. *Beseke* beschreibt diesen Specht um ein Drittheil kleiner als den *Picus medius*. *Tengmalm* sagt: seine Gröfse falle zwischen die Gröfse des *Medius* und *Minor* u. s. w. In Rufsland gehört er unter die seltenen Vögel. Das Weibchen hat eine glänzend weifse, silberhafte, das Männchen aber eine goldgelbe Platte.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 63. n. 76. *der dreyzehige Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 261. n. 84. *der Specht mit drey Zehen.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 329. n. 17. *drey-zähichter Specht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 507. *der dreyzeigte Specht.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 17. *Specht mit außerordentlichen Füßen; Dreyzee.*

Batsch, Thiere, I. p. 308. *der dreyzehige Specht.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 9. *der Specht mit drey Zehen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 495. *der dreyzehige Specht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 112. Three-toed Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 243. n. 56. Picus (Tridactylus) albo nigroque varius, pedibus tridactylis.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 39. n. 64. *der dreyfingerige Specht.*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 87. *der dreyzehige Specht.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Thiere, VI. p. 13.** *der dreyzehige Specht.*

Schwed. Abh. I. p. 263. Picus pedibus tridactylis.

Tengmalm: neue schwed. Abh. IV. p. 46. Picus tridactylus.

Georgi, Reise d. Russl. I. p. 165.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 50. n. 56. *der dreyzähigte Specht.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 454. n. 22. *der dreyfingerige Specht.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 114. n. 19. *der dreyzehige Specht.*

Linné.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 20. n. 5. Picus pedibus tridactylis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 114. n. 13. Picus (Tridactylus) albo nigroque varius, pedibus tridactylis.

Gerin. ornith. II. p. 50. Tab. 180.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 190. Picus tridactylus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 245. n. 10. *der dreyzehige Specht.*

β. *Brisson*, ornith. II. p. 56. n. 20. Pic varié de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 496. n. 54. Var. A. *der (südliche) dreyzehige Specht.*

Latham, Syn. II. p. 601. n. 51. A. Southern 3-toed Woodpecker.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 243. n. 56. β. Picus albo nigroque varius, subtus albus.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 98. *der gujanische Specht.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 32 Gattungen vermehrt. Bey der 5ten Gattung sind *drey*, bey der 10ten *drey*, bey der 12ten *zwey*, bey der 13ten *drey*, und bey der 21sten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Specht von Malacca.*

Latham, Syn. Suppl. p. 111. Malacca Woodpecker.

Latham, Vögel, I. 2. p. 494. n. 51. *der Specht aus Malakka.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 241. n. 51. Picus (Malaccensis) cristatus, pileo humerisque coccineis, gula iuguloque rufo-flavis, corpore subtus albo nigroque fasciato, cauda nigra.

60. GESCHLECHT. SITTA. *Die Spechtmeise.* *(Blauspecht, Grauspecht.)*

Müller, Natursyst. II. p. 261. Gen. LX.
Leske, Naturgesch. p. 249. Gen. XXIX.
Borowsky, Thierreich, II. p. 139. Gen. XVIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 167. Gen. X.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 351. Gen. XI.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 522. Gen. X.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 265.
Onomat. hist. nat. VII. p. 188.
Brisson, ornith. I. p. 474. Gen. XLII.
Batsch, Thiere, I. p. 315. Gen. LXIV.
Latham, allgem. Uebers. der Vögel, I. 2. p. 530. Gen. XXIV.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 261. Gen. XXV.
Büffon, Vögel, XVII. p. 192 ff.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 188. 204.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 245. Gen. XXI.

1. EUROPAEA. *Die gemeine Spechtmeise.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 232. n. 1. *europäische Blauspecht.* Tab. 7. fig. 10.

Leske,

(3) Gewicht des Männchens eine Unze; des Weibchens etwa sechs Quentchen. Letzteres ist auch am Ober- und Unterleibe etwas blässer, hat auch keine blaue Stirne wie das Männchen. — Bemerkenswerth ist es, dass dieser Vogel, wenn er aufsitzt

Leske, Naturgesch. p. 249. n. 1. *der gemeine Grauspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 139. n. 1. *der Grauspecht, die blaue Spechtmaise, Kleiber.* Tabula XVII.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 167. n. 1. *der Blauspecht.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 352. *die gemeine Spechtmeise.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 523. n. 1. *die gemeine Spechtmeise.* p. 526. *Blauspecht, Grauspecht, Mayspecht, Holzhacker, Nußhacker, Baumpicker, Kleiber, blaue Spechtmeise, größte Meise, europäischer Sittvogel, Kleiner, Klaber, Tottler, Kottler, spechtartige Meise, Kleberblauspecht, Barleß.*

Funke, Naturgesch. I. p. 301. *der Blauspecht.*

Halle, Vögel, p. 364. n. 357. *die blaue Spechtmeise, Nußhakker.*

Meyer, Thiere, II. Tab. 37. (mit dem Gerippe.)

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 64. n. 78. *der Blauspecht* u. s. w.

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 834. *Blauspecht.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 189. *der europäische Blauspecht oder Grauspecht.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 174. *die spechtartige Meise.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 102. *der Blauspecht.*

Klein, av. p. 87. n. 15. Parus facie pici.

Klein,

ansitzt oder sonst ruhet, den Kopf gröstentheils abwärts gesenkt, oder wenigstens in gleicher Linie mit dem Körper, und nicht erhoben wie andere Vögel trägt. Man findet ihn oft in Gesellschaft der Kohl- und Blaumeise.

Klein, Vorbereit. p. 162. n. 15. *ſpechtartige Meiſe, Blauſpecht.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 89. n. 15. *ſpechtartige Meiſe.*

Klein, ſtemmat. av. p. 16. Tab. 17. fig. 6. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 28. Tab. 4. fig. 6.

Gesner, Vögelb. p. 482. *Chlän.*

Briſſon, ornith. I. p. 474. n. 1. Torchepot.

Büffon, Vögel, XVII. p. 192. *der Blauſpecht oder die Spechtmeiſe*; mit 1 Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 319. *der gemeine europäiſche Grauſpecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 530. *die gemeine Spechtmeiſe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 117. Nuthatch.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 261. n. 1. Sitta (Europaea) cinerea, ſubtus rufeſcens, rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 39. n. 65. *der europäiſche Blauſpecht.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen. IV. p. 313. n. 61. *Blauſpecht, ſpechtfarbige Meiſe.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 77. n. 70. *Blauſpecht.*

Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſ. II. p. 5. *Blauſpechte.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 167. n. 1. *Spettmeyſe.*

Pontoppidan, Naturhiſt. v. Norwegen, II. p. 136. *Egde?*

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 168. *Natvake?*

Fabric. Reiſ. n. Norweg. p. 335. Sitta europaea.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 60. *der Blauſpecht.*

Naumann, Vogelſteller, p. 137. *der Blauſpecht.*

Scopoli, Bemerk a. d. Naturgeſch. I. p. 51. n. 57. *der Kleber-Blauſpecht.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 43. 273. *Blauſpecht, Kleiber.*

Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Freunde, VII. p. 455. n. 23. *der europäiſche Blauſpecht.*

Naturf. IX. p. 56. n. 60. *europäiſcher Blauſpecht.*

Naturforſch. XXV. p. 18. *Blauſpecht.*

Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 290. n. 67. *der Blau-Specht.*

Anweiſung Vögel zu fangen u. ſ. w. p. 114. *Blauſpecht.*

Angenehme Landluſt, p. 104. *Blauſpecht.*

Börner, ſchleſ. ökon. Nachr. 1781. p. 82. n. 28. *Blauſpecht.*

Günther, Neſter u. Eyer, Tab. 64. *Blau-Specht.*

Wirſing, Vögel, Tab. 7. *Klauber.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 114. n. 20. *die gemeine Spechtmeiſe.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 119. *der gemeine Grauſpecht.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 86. *Nußhacker, Spechtmaiſe.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 53. Picus cinereus.

Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. Sitta, Picus cinereus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 115. Sitta (Europaea) rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 102. Sitta (Europaea) rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.

Kramer, Auſtr. p. 362. n. 1. Sitta rectricibus fuſcis: quatuor margine apiceque albis, quinta apice cana; *Kleiner.*

Brünich, ornitholog. bor. p. 11. n. 42. Sitta Europaea.

Schwenkfeld, aviar. Silef. p. 340. Picus fubcaeruleus; *ein Blaufpecht, Meyfpecht, Baumhecker, große Baumkletter.*

Moehring, av. gen. p. 35. n. 15. Sitta.

Rzaczynsk. auct. hift. nat. Polon. p. 413.

Barrere, fpec. nov. Cl. III. Gen. 13. fp. 4. Picus Pyrenaicus, cinereus pufillus.

Belon, oif. p. 304. Torche-pot, Gimpereau.

Jonfton, av. p. 111. Picus cinereus feu Sitta.

Philof. Transact. XXVIII. p. 170.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 62.

Gerin. ornith. II. p. 54. Tab. 193.

Ariftotel. hiftor. animal. Lib. IX. c. 22. n. 173. Σιττη.

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 246. n. 1. *der gemeine Graufpecht.*

β. SITTA MINOR. *Die kleine Spechtmeife.*

Briffon, ornitholog. I. p. 475. A. petit Torchepot.

Büffon, Vögel, XVII. p. 211. *die kleine Spechtmeife.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 532. *die kleine gemeine Spechtmeife.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 262. n. 1. β. Sitta minor.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Sitta parva.

γ. SITTA

(4) Ift, nach *Bechftein,* nichts anders als die obige Spechtmeife nur aus einem kleinen Ey entfprungen, oder durch einen andern Zufall im Wuchs gehindert. *Briffon* fagt: er kenne den Vogel gar nicht.

γ. Sitta carolinensis. *Die schwarzköpfige karolinische Spechtmeise* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 232. ad n. 1. *der kleine Schwarzkopf.*

Halle, Vögel, p. 365. n. 358. *die Spechtmaise aus Karolina mit schwarzem Kopfe.*

Brisson, ornitholog. I. p. 476. n. 4. Torchepot de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 220. *die schwarzköpfige Spechtmeise;* mit 1 Fig.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 266. n. 87. *der Schwarzkopf.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 44. *der Baumhäcker mit dem schwarzen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 532. n. 2. *die schwarzköpfige Spechtmeise.*

Latham, Syn. Suppl. p. 117. Black-headed Nuthatch.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 262. n. 3. Sitta (Carolinensis) cinerea, subtus candicans, abdomine imo rufescente, capite et collo superiore nigris, rectricibus lateralibus albo nigroque variis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 1. β. Sitta capite nigro.

δ. Sitta carolinensis minor. *Die kleine braunköpfige carolinische Spechtmeise.* (6)

Müller, Naturs. II. p. 232. ad n. 1. *der Braunkopf.*

(5) Nach *Brisson*, *Pennant* und *Latham* eine eigene Gattung. *Catesby* giebt das Gewicht dieses Vogels auf 13 Pfenniggewichte und 5 Grane, seine Länge aber auf 5 1/4 Zoll an. Männchen und Weibchen sehen sich sehr gleich. Findet sich auch in Jamaica.

(6) Nach *Brisson*, *Pennant* und *Latham* eine eigne Gattung. Die Länge wird von letzterm in der *Synops.* auf 4 1/3 Zoll; im

Halle, Vögel, p. 365. n. 359. *die Spechtmaiſe mit braunem Kopfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 266. n. 88. *der kleine Grauſpecht.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 477. n. 5. petit Torchepot de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 223. *die kleine braunköpfige Specht-Meiſe;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 44. *der Baumhäcker mit dem braunen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 533. n. 3. *die kleine Spechtmeiſe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 118. Leaſt Nuthatch.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 263. n. 5. Sitta (Puſilla) cinerea, ſubtus ſordide alba, capite fuſco, macula occipitis ſordide alba, rectricibus lateralibus nigris.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 1. β Sitta capite fuſco.

ε. *Sitta ſubtus alba, capite colloque fuliginoſo, dorſo nigro.* (7)

Beſeke, Vögel Kurl. p. 272. n. 156.

Büffon, Vögel, XVII. p. 235.

2. Canadensis. *Die canadiſche Spechtmeiſe.* (8)

Müller, Naturſ. II. p. 233. n. 2. *canad. Blauſpecht.*

Pennant,

im *Suppl.* auf 3 1/2 Zoll; und im *Syſt. ornith.* auf 4 1/2 Zoll angegeben. S. die 9. Note.

(7) Dieſe Spielart iſt im Syſtem ganz wegzuſtreichen. Sie iſt durch einen Irrthum und Verwechſelung mit dem Waſſerſtaar (Sturnus Cinclus) entſtanden, welchen *Beſeke* für eine Sitta zu halten verleitet worden. Er hat ſeine vorige Behauptung in der angeführten Schrift widerrufen.

(8) Länge nach *Büffon* und *Latham* 4 Zoll 10 Linien. *Bechſtein* vermuthet, in der Note zur Ueberſetzung des Latham-ſchen

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 265. n. 86. *der canadische Grauspecht.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 188. *der Blauspecht aus Canada.*

Brisson, ornitholog. I. p. 475. n. 2. Torchepot de Canada.

Büffon, Vögel, XVII. p. 213. *die canadische Spechtmeise*

Latham, Vögel, I. 2. p. 534. n. 4. *die canadische Spechtmeise.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 262. n. 2. Sitta (Canadensis) cinerea, subtus dilute rufa, fascia superciliari candida, pone oculos nigricante, rectricibus lateralibus quatuor extimis, apice intus albis.

Gerin. ornithol. II. p. 54. Tab. 193.

3. Jamaicensis. *Die Spechtmeise von Jamaica.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 233. n. 3. *jamaicaische Blauspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 140. n. 2. *der jamaicaische Grauspecht.*

schen Werks p. 534. dass diese *canadische Spechtmeise*, wohl von *Latham* und *Pennant* mit der *schwarzköpfigen carolinischen Spechtmeise* (p. 540. n. 1. γ des Systems) verwechselt seyn möge, und dass einer die canadische Spechtmeise unter dem Namen *schwarzköpfige*, der andere aber die schwarzköpfige unter dem Namen der *canadischen* beschreiben möge. Im *Syst. ornithol.* l. c. zweifelt *Latham*, ob die canadische wohl wirklich eine besondere Gattung sey.

(9) Die Bemerkung, dass der Vogel sich in Gebüschen und Heiden aufhalte, und den Namen *Loggerhead* (Dummkopf) daher erhalten habe, weil er sich so nahe kommen lasse, dass man ihn mit dem Stocke todtschlagen könne, macht Latham bey *dieser*, und der *kleinen braunköpfigen carolinischen Spechtmeise.*

Onomat. hiſt. nat. VII p. 190. *der Blauſpecht aus Jamaika.*

Briſſon, ornithol. I. p. 476. n. 3. Torchepot de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVII. p. 216. *die Spechtmeiſe mit ſchwarzer Haube;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 535. n. 5. *die Spechtmeiſe aus Jamaika.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 262. n. 4. Sitta (Jamaicenſis) cinerea, ſubtus alba, vertice nigro, rectricibus lateralibus nigricantibus, apice lineis transverſis albis notatis.

Barrere, ſp. nov. Cl. III. Gen. 21. p. 47. C. Merops americanus, cinereus, capite nigro.

Barrere, Fr. equinox. p. 136. Merops maior, capite nigro.

Donndorf, Handb. der Thiergeſch. p. 246. n. 2. *der jamaikaiſche Grauſpecht.*

β. *Die kleinere Spechtmeiſe von Jamaica.* (10)

Briſſon, ornitholog. I. p. 476. n. 3. A. petit Torchepot de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVII. p. 219. *die kleine Spechtmeiſe mit ſchwarzer Haube.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 335. n. 5. Var. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 263. n. 4. A.

4. MAIOR. *Die große Spechtmeiſe.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 225. *die große krummſchnabligte Spechtmeiſe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 535. n. 6. *die große Spechtmeiſe.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 263. n. 6. Sitta (Maior) griſea, ſubtus albeſcens, gula alba, remigibus rectricibusque fuſcis, margine fulvis.

Hermann,

(10) Nach *Büffon* ein junger Vogel.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Sitta curviroſtris.

5. Naevia. *Die gefleckte Spechtmeiſe.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 227. *die geſprenkelte Spechtmeiſe;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 36.

Latham, Vögel, I. 2. p. 536. n. 7. *die gefleckte Spechtmeiſe.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 263. n. 7. Sitta (Naevia) plumbea, albo-maculata, ſubtus caeruleo-cinerea, lineis longitudinalibus albis, gula alba.

6. Surinamensis. *Die ſurinamiſche Spechtmeiſe.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 227. *die ſurinamiſche Spechtmeiſe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 536. n. 8. *die ſurinamiſche Spechtmeiſe.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 263. n. 8. Sitta (Surinamenſis) caſtaneo-rufa, ſubtus rufeſcente-alba, alis nigris, tectricibus albo-maculatis, cauda nigra, apice alba.

7. Caffra. *Die capſche Spechtmeiſe.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 231. *die Spechtmeiſe vom Vorgebirge der guten Hoffnung.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 537. n. 10. *die capſche Spechtmeiſe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 118. Cape Nuthatch.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 264. n. 9. Sitta (Caffra) ſupra flavo nigroque varia, ſubtus flava, pedibus nigris.

8. Sinensis. *Die chinesische Spechtmeise.* (¹)
Büffon, Vögel, XVII. p. 230. *die chinesische Spechtmeise.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 536. n. 9. *die chinesische Spechtmeise.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 74. n. 22. β. *Lanius* capite cristato nigro, corpore fusco-ferrugineo, subtus albo, prope oculos macula rubra, gula nigra, uropygio flavo, rectricibus apice albis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 5 Gattungen vermehrt; die 4te bis 8te sind neu; bey der 1sten ist die Var. β. hinzugekommen, und bey der 3ten sind gleichfalls 2 Spielarten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Die langschnäblige Spechtmeise in Batavia.*
Latham, Syn. Supplem. p. 118. Long-billed Nuthatch.
Latham, Vögel, I. 2. p. 537. n. 11. *die langschnäblige Spechtmeise.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 264. n. 10. Sitta (Longirostris) caerulescens, subtus pallide rufescens, remigibus primoribus apice fuscis, loris nigris.

2. *Die Grünlings-Spechtmeise vom Cap.*
Büffon, Vögel, XVII. p. 233. *der Grünlings-Blauspecht.*

Sparr-

(1) Im Syst. ornith. hat *Latham* diesen Vogel als eine Spielart von *Lanius iocosus* aufgeführt.

Sparrmann, muſ. Carlſ. faſc. II. Tab. 33. Sitta Chloris.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 264. n. 11. Sitta (Chloris) corpore ſupra viridi, ſubtus candido, cauda atra, ultimo apice flavicante.

61. GESCHLECHT. TODUS. *Der Plattſchnabel. (Baſtardeisvogel.)*

Müller, Naturſyſt. II. p. 234. Gen. LXI.
Leske, Naturgeſch. p. 249. Gen. XXX.
Borowsky, Thierreich, II. p. 140. Gen. XIX.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 168. Gen. XI.
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 539.
Briſſon, ornith. II. p. 192. Gen. LIX.
Batſch, Thiere, I. p. 308. n. 4.
Latham, allgem. Ueberſ. der Vögel, I. 2. p. 538. Gen. XXV.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 265. Gen. XXVI.
Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 18.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 193.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 247. Gen. XXII.

1. VIRIDIS. *Der grüne Plattſchnabel.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 234. n. 1. *der Grüne.* Tab. 8. fig. 1.
Borowſky, Thierreich, II. p. 141. n. 1. *der grüne Baſtard-Eisvogel, der Grünſperling.* Tab. 14.
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 168. n. 1. Todus (Viridis) pectore rubro.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 172. *der grüne Baſtardeisvogel.*
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 541. *der grüne Baſtardeisvogel.*

Handb.

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 297. *der Todier.*

Klein, av. p. 79. n. 6. Sylvia gula phoenicea,

Klein, Vorbereit. p. 148. n. 16. *Scharlatkehlein.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 80. n. 20. *Scharlatkehlein.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 109. n. 7. *grüner Honigſauger.*

Briſſon, ornithol. II. p. 192. n. 1. Todier.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 16. *der grüne Sperling, oder das grüne Colibritchen.*

Pallas, Naturgeſch. merkw. Thiere, VI. p. 19. *der grünliche Plattſchnabel.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 92. *der Todus.*

Latham, Syn. II. p. 657. n. 1. Green Tody.

Latham, Vögel, I. 2 p. 538. n. 1. *der grüne Plattſchnabel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 264 n. 1. Todus (Viridis) viridis, ſubtus roſeo-flaveſcens, pectore rubro.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 116. n. 4. Alcedo (Todus) brachyura viridis, gula ſanguinea, abdomine albo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193. Todus viridis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 247. n. 1. *der grüne Baſtardeisvogel.*

2. Cinereus. *Der Tic-tic.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 235. n. 2. *der Aſchgraue.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 141. n. 2. *der aſchgraue Baſtard-Eisvogel.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 540. *der graue Baſtardeisvogel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 193. n. 3. Todier cendré.

Pallas,

Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 19. *der oben graue und unten hellgelbe Plattſchnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 539. n. 3. *der aſchgraue Plattſchnabel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 265. n. 2. Todus (Cinereus) cinereus, ſubtus luteus, rectricibus binis intermediis nigricantibus, lateralibus fuſcis, apice albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193. Todus cinereus.

3. Fuscus. *Der braune Plattſchnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 539. n. 3. *der braune Plattſchnabel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 266. n. 3. Todus (Fuſcus) ferrugineo-fuſcus, ſubtus olivaceus albo-maculatus, alis faſcia nigricante, cauda ferruginea.

4. Caeruleus. *Der blaue Plattſchnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 540. n. 4. *der blaue Plattſchnabel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 266. n. 4. Todus (Caeruleus) cyaneus, ſubtus fulvus, gula alba, ſub oculis macula purpurea.

5. Varius. *Der bunte Plattſchnabel.*

Briſſon, ornithol. II. p. 193. n. 2. Todier varié.

Latham, Vögel, I. 2. p. 540. n. 5. *der bunte Plattſchnabel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 266. n. 5. Todus (Varius) caeruleo nigro viridique varius, capite colloque caeruleo-nigris, tectricibus alarum viridibus.

Jonſton, av. p. 157. Aliud *Iſpidae* genus, quod ex India adſertur.

6. Leu-

6. Leucocephalus. *Der weißköpfige Plattschnabel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 145. n. 3. *der weißköpfige Plattschnabel.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 18. *der weißköpfige Plattschnabel.* Tab. 3. fig. 2.

Latham, Vögel, I. 2. p. 540. n. 6. *der weißköpfige Plattschnabel.* Tab. 31. fig. 2.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 266. n. 6. Todus (Leucocephalus) nigricans, capite, gula colloque superiore albis.

7. Brachyurus. *Der kurzschwänzige Plattschnabel.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Thiere, VI. p. 22. *die siebente Art.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 541. n. 7. *der kurzgeschwänzte Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 266. n. 7. Todus (Brachyurus) niger, sincipite, genis corporeque subtus albis, cauda abbreviata.

8. Plumbeus. *Der bleyfarbene Plattschnabel.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 19. *eine dritte Art.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 541. n. 8. *der bleyfarbene Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 267. n. 8. Todus (Plumbeus) plumbeo-nigricans, subtus niveus, vertice, remigibus rectricibusque nigricantibus.

9. Obscurus. *Der dunkelbraune Plattschnabel.* (2)

Pennant, arct. Zool. II. p. 266. n. 89. *der dunkelbraune Bastardeisvogel.*

Latham,

(2) Grösse, nach *Pallas*, einer Nachtigall; nach *Pennant* eines Feldsperlings; nach *Latham*, einer *Winternachtigall.* (Motacilla modularis.)

Latham, Vögel, I. 2. p. 541. n. 9. *der dunkelfarbige Plattſchnabel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 267. n. 9. Todus (Obſcurus) olivaceo-fuſcus, ſubtus albo flaveſcens, gula pallida.

Pallas, ſpicil. zool. VI. p. 17. Species quarta.

Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 20. *eine vierte gröſsere Gattung.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 247. n. 2. *der dunkelbraune Baſtardeisvogel.*

10. Regius. *Der Königsplattſchnabel.* (3)

Latham, Vögel, I. 2. p. 542. n. 10. *der ſchöne Plattſchnabel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 267. n. 10. Todus (Regius) fuſco-nigricans criſtatus, pectore albido nigricante transverſim ſtriato, gula ſuperciliisque albis, abdomine, uropygio caudaque rufis.

11. Paradiseus. *Der paradiesartige Plattſchnabel.* (4)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 595. n. 1. *der Katondieb.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 175. n. 1. *der Katondieb.* Tab. 70.

Halle,

(3) *Latham* rechnet hieher auch als Spielart den *Todus Criſtatus* p. 446. n. 16.

(4) Bey dieſer Gattung, und den dazu gerechneten Varietäten, iſt bey den Syſtematikern ein gewaltiger Miſchmaſch. Man kann darüber *Pallas* Naturgeſch. merkwürd. Thiere a. a. O. p. 20. not. **; und *Büffon* am angef. O. p 101. nachleſen. Sonſt bemerke ich noch, daſs in unſerm Syſtem dieſe Gattung, mit allen ihren Varietäten, aus Verſehen nochmals p. 929. unter dem Geſchlecht *Muſcicapa* n. 1. aufgeführet worden.

Halle, Vögel, p. 266. n. 215. *der weiſs - und ſchwarzbunte Paradiesheher.*

Onomat. hiſtor. natur. V. p. 79. *der weiſs - und ſchwarzbunte Paradiesheher.*

Klein, av. p. 62. n. 9. Pica ex albo et nigro varia, duabus caudae pennis ſimplicibus praelongis.

Klein, Vorber. p. 121. *der orientaliſche des Sebä.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 167. n. 6. Pic de l'Isle Papoe.

Briſſon, ornithol. I. p. 181. n. 7. Troupiale hupé de Madras.

Briſſon, ornithol. I. p. 272. n. 29. Gobe-mouche blanc hupé du Cap de bonne Eſperance.

Büffon, Vögel, VII. p. 212. *der Weygehoe;* mit 1 Figur.

Büffon, Vögel, XIV. p. 96. *der ſtahlköpfigte kappigte Fliegerfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 97. *der weiſse capſche Fliegenfänger.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 8. *der elſterähnliche Paradiesvogel.*

Pallas, Naturgeſch. merkw. Thiere, VI. p 20 21. *die ſechſte Gattung von Plattſchnäbeln.*

Samml. zur Phyſik u. Naturgeſch. III. p. 114. *der gehäubte Fliegenſchnäpper mit ſtahlfärbigem Kopfe.*

Latham, Syn. Supplem. p. 172. Paradiſe Flycatcher.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 480. n. 54. Muſcicapa (Paradiſi) capite criſtato nigro, corpore albo, cauda cuneata, rectricibus intermediis longiſſimis.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 107. n. 11. Corvus (Paradiſi) albo nigroque varius, cauda cuneiformi, remigibus *(wohl ein Schreibfehler für*

für rectricibus) intermediis longiſſimis, capite nigro criſtato.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193. Muſcicapa Paradiſi.

Moehring, av. gen. p. 32. n. 8. Pyrrhocorax.

Gerin. ornith. II. p. 42. Tab. 159.

β. *Briſſon*, ornithol. I. p. 273. n. 31. Gobe-mouche hupé du Cap de bonne Eſperance.

Büffon, Vögel, XIV. p. 97. *der gekappte capſche Fliegenfänger.*

Latham, Syn. III. p. 346. n. 44. A.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 480. n. 54. β. Muſcicapa caſtanea, ſubtus alba, collo inferiore pectoreque griſeis, capite nigro-vireſcente.

γ. *Latham*, Syn. III. p. 347. n. 44 B.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 480. n. 54. γ. Muſcicapa caſtanea, ſubtus alba, corpore ſubtus albo, pectore caeruleſcente.

Büffon, pl. enl. 234. fig. 1. Gobe-mouche hupé du Cap de B. E.?

δ. *Briſſon*, ornithol. I. p. 273. n. 30. Gobe-mouche hupé du Bréſil.

Büffon, Vögel, XIV. p. 97. *der gekappte braſilianiſche Fliegenfänger.* p. 99. *Acamacu.*

Klein, av. p. 70. n. 31. Turdus criſtatus.

Klein, Vorbereit. p. 132. n. 31. *Blümenſchwänzel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 69. n. 31. *Blümenſchwanz.*

Halle, Vögel, p. 300. n. 263. *die Seidenſchwanzdroſſel mit vergoldeten Flügeln und dem Federbuſche.*

Moehring, av. gen. p. 33. n. 11. Monedula.

Latham, Syn. III. p. 347. n. 44. C.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 481. n. 44. δ. Muscicapa brasiliensis cristata.

12. FERRUGINEUS. *Der rostbraune Plattschnabel*

Latham, Vögel, I. 2. p. 542. n. 12. *der rostrothe Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 267. n. 11. Todus (Ferrugineus) ferrugineo-nigricans, subtus ferrugineus, genis albo nigroque maculatis, remigibus semifascia ferruginea.

13. PLATYRHYNCHOS. *Der breitschnäblige Plattschnabel.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 22. *die achte Gattung.* Tab. 3. C (der Schnabel.)

Latham, Vögel, I. 2. p. 543. n. 13. *der breitschnäblige Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 268. n. 13. Todus (Rostratus) rostro latissimo, corpore luteo-fusco, subtus luteo, gula maculaque verticis albis.

14. NOVUS. *Der Plattschnabel mit weißem Kinn.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 543. n. 12. *der Plattschnabel mit weißem Kinn.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 268. n. 12. Todus (Gularis) fuscus, subtus albidus, pectore fusco variegato, gula alba.

15. MACRORHYNCHOS. *Der großschnäblige Plattschnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 544. n. 14. *der großschnäblige Plattschnabel.* Tab. 32. fig. 1.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 268. n. 14. Todus (Nasutus) rostro latissimo, corpore nigro, gula, uropygio, abdomine crissoque coccineis.

16. CRI-

16. CRISTATUS. *Der gehaubte Plattschnabel.* (5)
Naturforsch. a. a. O. *der Todvogel mit dem Federbusche.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 544. n. 15. *der gehäubte Plattschnabel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 267. n. 10. β. Todus crista coccinea, corpore fusco, albo maculato.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 14 Gattungen vermehrt, unter welchen die 11te aus dem 113ten Geschlecht hier aufgenommen worden.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der gelbbäuchige Plattschnabel aus Neuholland.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 268. n. 15. Todus (Flavigaster) fusco-cinereus, subtus luteus, rostro pallido, pedibus obscuris.

62. GESCHLECHT. ALCEDO. *Der Eisvogel.*
Müller, Natursystem, II. p. 236. Gen. LXII.
Leske, Naturgesch. p. 249. Gen. XXXI.
Borowsky, Thierreich, II. p. 142. Gen. XX.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 168. Gen. XII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 352. Gen. XII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 533. Gen. XII.
Halle, Vögel, p. 163. Gen. V.
Pennant, arct. Zool. II. p. 264.
Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 544.

(5) Nach *Latham* eine Spielart von *Todus Regius.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 125.
Klein, av. p. 31. Gen. IV.
Brisson, ornitholog. II. p. 176. Gen. LVIII. *Ispida.*
Batsch, Thiere, I. p. 306. Gen. LVIII.
Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. 2. p. 500. Gen. XXIII.
Latham, Syst. ornith. I. p. 244. Gen. XXIII. *Galbula.* p. 245. Gen. XXIV. *Alcedo.*
Hermann, tab. affin. anim. p. 190. 191.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 247. Gen. XXIII.

1. Cristata. *Der Vintsi.*

Müller, Natursyst. II. p. 237. *der ostindische Eisvogel.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 145. n. 4. *der philippinische Eisvogel.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 353. n. 2. *der Eisvogel mit dem Federbusch.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 539. n. 2. *der Eisvogel mit dem Federbusch.*
Halle, Vögel, p. 168. n. 105. *der gelbschnäblige amboinische Eisvogel mit dem Federbusche.*
Neuer Schaupl. der Natur. II. p. 547. n. 2. *gehaubter Eisvogel.*
Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 548. n. 5. *Gelbschnabel.*
Onomat. histor. nat. IV. p. 131. *der Gelbschnabel.*
Klein, av. p. 35. n. 5. Ispida rostro luteo.
Klein, Vorber. p. 67. n. 5. *Gelbschnabel.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 37. n. 5. *Gelbschnabel.*
Brisson, ornith. I. p. 180. n. 6. Martin-pêcheur hupé des Philippines.

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 518. n. 22. *der Eisvogel mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 255. n. 26. Alcedo (Cristata) brach. subcristata, caerulea, subtus rufa nigro-undulata, tectricibus alarum violaceis, caeruleo-maculatis.

Naturf. XIII. p. 182. Alcedo cristata.

Naturf. XIV. p. 157.

β. *Halle*, Vögel, p. 168. n. 103. *der schöne orientalische Eisvogel mit blauem Federbusche.* (6)

Klein, av. p. 34. n. 3. Ispida cristata.

Klein, Vorber. p. 66. n. 3. *der Königfischer mit dem Kamm.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 36. n. 3. *gehaubter Eisvogel*

Brisson, ornithol. I. p. 186. n. 17. Martin-pêcheur hupé des Indes.

Latham, Vögel, I. 2. p. 519. n. 22. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 255. n. 26. β.

Philos. Transact. XXIII. p 1394. 14. Avis auguralis *(Salaezac)?*

16. ORIENTALIS. *Der orientalische Eisvogel.*

Brisson, ornithol. I. p. 178. n. 4. Martin-pêcheur des Indes.

Latham, Vögel, I. 2. p. 520. n. 23. *der orientalische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 255. n. 27. Alcedo (Orientalis) viridis, subtus rufa, superciliis albis, vertice, gula, fascia per oculos remigibusque caeruleis, sub oculis macula rufa.

(6) Nach *Brisson* u. a. eine eigne Gattung. Länge, nach *Latham*, 5 1/2 Zoll.

2. Inda. *Der guianische Eisvogel.*
Müller, Natursyst. II. p. 237. n. 2. *der westindische Eisvogel.*
Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 548. n. 4. *indianischer kleiner Eisvogel.*
Onomat. histor. nat. IV. p. 135. *der indianische Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 526. n. 32. *der guianische Eisvogel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 259. n. 37. Alcedo (Inda) brach. virens, subtus fulva, fascia pectorali nebulosa.

17. Surinamensis. *Der surinamische Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 526. n. 33. *der surinamsche Eisvogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 559. n. 38. Alcedo (Surinamensis) brach. caerulea, subtus rufo-alba, pectore rufo caeruleo undato, vertice caeruleo-nigro, maculis transversis viridibus.
Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 161. *der Eisvogel.*

3. Ispida. *Der gemeine Eisvogel.* (7)
Müller, Natursystem, II. p. 237. n. 3. *der europäische Eisvogel.*

Leske,

(7) Ein einsamer ungeselliger Vogel, der schlechterdings keinen seines Gleichen in der Nähe seines Aufenthalts leidet. Sitzt immer auf niedrigen Zweigen, und hat die bewegliche Vorderzehe bald vorn, bald zurückgeschlagen. Nährt sich, wenn Flüsse und Teiche offen sind, besonders von Fischen, und liebt vorzüglich Schmerlen, denen er auf einem Pfahl oder Stock u. dgl. auflauert, eine zeitlang flatternd über dem Wasser im Gleichgewicht schwebt, sich dann plötzlich auf sie herabstürzt, und sich mit seiner erhaschten Beute wieder auf seinen alten Platz setzt. Im Winter muss er oft mit

Leske, Naturgesch. p. 250. n. 1. *der gemeine Eisvogel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 143. *der gemeine Eisvogel.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 168. n. 1. Alcedo (Ispida) supra cyanea, fascia temporali flava, cauda brevi; *der Eisvogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 353. n. 1. *der gemeine Eisvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 535. n. 1. *der gemeine Eisvogel.* p. 539. *der europäische Eisvogel, Königsfischer*

Funke, Naturgesch. I. p. 247. *der Eisvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 50. *der gemeine Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 163. n. 101. *der gemeine Eisvogel. (Fischer Martin.)*

Meyer, Thiere, I. Tab. 6. (mit dem Gerippe.)

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 64 *der Eisvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 264. A. *der europäische Eisvogel.*

mit blofsen Puppen von Wafferinfekten vorlieb nehmen, die er unter dem Eife hervorholt, wenn fich die Fifche im Schlamm verborgen haben. Niftet an hervorfpringenden Winkeln der Ufer, in Löchern, unter den Wurzeln der Bäume und Sträucher, auch in Felfenritzen. Das Weibchen legt 6 bis 7 weifse Eyer, brütet 14 Tage, und wird unterdeffen von dem Männchen mit Fifchen verforgt. Man hat Beyfpiele, dafs Eisvögel in den Zimmern fich aufser den Fifchen mit der Zeit auch an andere Koft, als Brodt, Semmeln und Milch, Regenwürmer u. dergl. gewöhnt haben. Wenn man im Winter welche findet, die umgekommen find, fo ift diefes nicht vor Kälte, fondern vor Hunger gefchehen, wenn Schneegeftöber und ftarker Froft auch die Oeffnungen an unbeeiften Stellen der Gewäffer, wodurch fie bis dahin noch zum Theil ihre Nahrung fanden, verftopft haben. Das Fleifch ift efsbar.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 546. n. 1. *europäiſcher Eisvogel.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 135. *der gemeine Eis-Vogel.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 294 *der Eisvogel.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 103. *der Eisvogel.*

Klein, av. p. 33. n. 1. Iſpida noſtras.

Klein, Vorber. p. 64. n. 1. *Königsfiſcher, gemeiniglich Eisvogel genannt.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 35. n. 1. *europäiſcher Eisvogel.*

Klein, ſtemm. av. p. 6. Tab. 5. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. C.

Gesner, Vögelb. p. 57. *Eisvogel, Eyſengart;* mit 1 guten Figur.

Briſſon, ornith. II. p. 176. n. 1. Martin-pêcheur.

Batſch, Thiere, I. p. 300. *der gemeine Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 513. n. 16. *der gemeine Eisvogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 115. Common Kingfisher.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 252. n. 20. Alcedo (Iſpida) brach. ſubcriſtata caerulea, ſubtus rufa, loris fulvis, vertice nigro undulato, macula aurium gulaque albis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 40. n. 66. *der europäiſche Eisvogel.*

Götz, Naturgeſch. einiger Vögel, p. 58. *der Eisvogel.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 313. n. 62. *Eisvogel.*

Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 98. *der Eisvogel.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 77. n. 71. *europäiſcher Eisvogel.*

Lepechin,

Lepechin, Tagebuch d. russisch. Reis. I. p. 262. *Eisvögel.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 58. n. 64. *der Königsfischer.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der Eisvogel.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 15. *der Eisvogel.*

Naturf. IX. p. 56. n. 61. *europäischer Eisvogel.*

Neue schwed. Abh. III. p. 104. Alcedo hispida.

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 455. n. 25. *der europäische Eisvogel.*

Günth. Nest. u. Eyer, Tab. 56. *Eisvogel.*

Wirsing, Vögel, Tab. 3.

Frisch, Vögel, Tab. 223.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 74. *Eis-Vogel.*

Naumann, Vogelsteller, p. 192. *Eisvogel.*

Geoffroy, mat. med. VI. p. 295. *der gemeine Eisvogel, Fischer Martin.*

Goeze, nützl. Allerley, II. p. 162. n. 13. *der Eisvogel.*

Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 167. *der Eisvogel.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 115. n. 21. *der gemeine Eisvogel.*

Loniceri, Kräuterb. p. 685. *Eisvogel;* mit einer zieml. Fig.

Zorn, Petinotheol. II. p. 439. *der Eiß-Vogel.*

Merklein, Thierreich, p. 252. *Eiß-Vogel.*

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 210. *Eiß-Vogel.*

Ziegra, diss. de Halcyone. Witt. 1677. 4. pl. 3.

Wanochius, dissert. de Halcyone. Aboae 1682. 4. cum fig. rariss.

Chevalier, lettres sur les maladies de St. Domingue, sur le Remora, et les Halcyons. Paris 1752. 12.

Scaliger, de Halcyone; de ſubtilitat. ex. 133. p. 457.

Friſch, obſervationes, quae deſcriptioni Iſpidae ſ. Halcyonis, in diverſorum auctorum libris, addi poſſunt. Miſcell. Berolinenſ. Cont. II. p. 40.

Brückmann, de Halcyone. Epiſt. itiner. Cent. II. Epiſt. 4.

Wittenb. Wochenbl. XIII. p. 174. *Eisvogel.*

Geyer, de nido halcyonis. Ephem. Nat. Cur. Dec. II. an. 8 obſ. 136. p. 296. c. fig.

André und *Bechſtein*, Spatzierg. I. p. 149. *der gemeine Eisvogel.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 91. *der Eisvogel.*

Jablonsky, allgemein. Lex. p. 293. *Eisvogel.*

Allgem. Haushaltungslex. I. p. 409. *Eisvogel.*

Krünitz, ök. Encykl. Art. *Eisvogel.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 120. *der gemeine Eisvogel.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 1. Alcedo (Iſpida) brachyura, ſupra caerulea, ſubtus fulva.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 105. Alcedo (Iſpida) brachyura, ſupra cyanea, ſubtus fulva, loris rufis.

Schwenkfeld, aviar. Sileſ. p. 193. Alcedo fluviatilis; *Eyßvogel, Eyſengarti, Waſſer-Hünlein, Seeſchwalme.*

Schäffer, elem. ornith. Tab. 141.

Salerne, ornithol. p. 123.

Jonſton, av. p. 157. Iſpida.

Ariſtot. hiſtor. animal. L. IX. c. 20. n. 172. Ἀλκυών.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 248. *der europäiſche Eisvogel.*

β. Ispida

β. Ispida senegalensis. *Der Baboucard* (8)

Brisson, ornith. II. p. 180. n. 7. Martin-pêcheur du Senegal.

Latham, Syn. II. p. 618. n. 16. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 515. n. 16. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 253. n. 20. β. Alcedo caeruleo-viridis, fusco varia, subtus maculaque pone et ante oculos fulva, gula flavescente.

Adanson, Reis. n. Senegall, p. 212. *Eisvögel.*

4. Erithaca. *Der rothköpfige Eisvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 239. n. 4. *der bengalische Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 170. n. 109. *der kleine bengalische Eisvogel mit der Lievrey.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 549. n. 8. *Purpurkopf.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 133. *der kleine bengalische Eisvogel.*

Brisson, ornitholog. II. p. 185. n. 15. Martin-pêcheur à collier de Bengale.

Latham, Vögel, I. 2. p. 516. *der rothköpfige Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 253. n. 21. Alcedo (Erithaca) brachyura, dorso caeruleo, abdomine luteo, capite uropygioque purpureis, gula nuchaque albis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 2. Alcedo (Erithaca) brachyura, dorso caeruleo, abdomine luteo, capite uropygioque purpureo, gula nuchaque albis.

β. *Latham*,

(8) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

β. *Latham*, Syn. II. p. 629. n. 17. Var. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 516. n. 17. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 253. n. 21. β. Alcedo caerulea, subtus flavescens, gula alba, capite cerviceque rubris, pone oculos linea purpurea, albo terminata.

18. Purpurea. *Der purpurfarbene Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 517. n. 18. *der purpurfarbene Eisvogel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 253. n. 22. Alcedo (Purpurea) purpureo-caerulea, subtus rufo-alba, capite, uropygio caudaque rufo-aureis, pone oculos striga purpurascente.

5. Madagascariensis. *Der madagascarische Eisvogel.*
Müller, Natursyst. II. p. 299. n. 5. *der madagascarische Eisvogel.*
Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 548. n. 9. *Eisvogel von Madagascar.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 141. *der Eis-Vogel von Madagaskar.*
Brisson, ornitholog. II. p. 187. n. 18. Martin-pêcheur de Madagascar.
Latham, Vögel, I. 2. p. 517. n. 19. *der madagaskarische Eisvogel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 23. Alcedo (Madagascariensis) subbrachyura, rufa, gula alba, remigibus nigricantibus.

19. Caeruleocephala. *Der blauköpfige Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 517. n. 20. *der blauköpfige Eisvogel.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 24. Alcedo (Caeruleocephala) caerulea, subtus rufa, vertice caeruleo-viridi undato, gula alba, remigibus nigricantibus.

β. A. caerulea, subtus rufa, vertice viridi-caeruleo, fasciis nigris, gula lateribusque pectoris, macula albis. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 24. β.

γ. A. caerulea, capite colloque rufo-flavis, vertice caeruleo nigroque fasciato, abdomine albo. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 24. β.
Latham, Syn. Supplem. p. 115. 20. Blue-headed Kingsfisher.

20. Bengalensis. *Der indische Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 167. n. 102. *der kleinste bengalische Eisvogel.*
Klein, av. p. 34. n. 2. Ispida Bengalensis.
Klein, Vorbereit. p. 65. n. 2. *der kleinste Königsfischer.*
Klein, verb. Vögelh. p. 36. n. 2. *indianische kleine Eisvögel.*
Seligmann, Vögel, I. Tab. 21. *indianischer kleiner Eisvogel;* obere Figur.
Brisson, ornitholog. II. p. 177. n. 2. Martin-pêcheur de Bengale.
Latham, Vögel, I. 2. p. 518. n. 21. *der indische Eisvogel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 25. Alcedo (Bengalensis) caeruleo-viridis, subtus rufa, capite caeruleo-striato, gula alba, per oculos vitta rufa.

β. Der

β. *Der kleinere indische Eisvogel.*(9)

Seligmann, Vögel, I. Tab. 21. untere Figur.

Klein, an den angeführten Orten.

Brisson, ornithol. II. p. 178. n. 3. Petit Martin-pêcheur de Bengale.

Latham, Vögel, I. 2. p. 518. n. 21. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 255. n. 25. β.

6. Superciliosa. *Der amerikan. Eisvogel.*(10)

Müller, Natursystem, II. p. 239. n. 6. *der grüne americanische Eisvogel.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 549. n. 3. *kleiner grüner oranienfarbener Eisvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 144. *der grüne amerikanische Eis-Vogel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 164. *kleiner grün- und oranienfarbener Eisvogel.*

Brisson, ornith. II. p. 181. n. 9. Martin-pêcheur verd d' Amerique.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 35. *der kleine grüne und orangefarbe Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 527. n. 34. *der amerikanische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 259. n. 39. Alcedo (Superciliosa) submacr. viridis, subtus alba, fascia viridi, superciliis fulvis.

β. A. submacr. viridis, subtus fulva, fascia pectorali viridi, superciliis fulvis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 259. n. 39. β.

Büffon, ois. VII. p. 218. Martin-pêcheur verd et orange.

Büffon, pl. enl. 756. Martin-pêcheur petit verd. Fig. 2. *das Männchen.* Fig. 3. *das Weibchen.*

21. Leu-

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(10) Länge, nach *Latham*, 5 Zoll; das Vaterland Cayenne.

21. LEUCORHYNCHA. *Der weißschnäblige Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 168. n. 103. *der weißschnäblige amerikanische Eisvogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 548. n. 3. *Weißschnabel.*

Klein, av. p. 35. n. 4. Ispida rostro albo.

Klein, Vorber. p. 66. n. 14 *Weißschnabel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 36. n. 4. *Weißschnabel.*

Brisson, ornithol. II. p. 186. n. 16. Martin-pêcheur bleu d'Amerique.

Latham, Vögel. I. 2. p. 528. n. 35. *der weißschnäblige Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 260. n. 40. Alcedo (Leucorhyncha) caeruleo-viridis subtus flavescens, capite et cervice castaneo-purpureis, rostro albo.

22. BRASILIENSIS. *Der Gip-gip.*

Brisson, ornithol. II. p. 187. n. 19. Martin-pêcheur du Brésil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 526. n. 31. *der brasilianische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 259. n. 36. Alcedo (Brasiliensis) rufescens, castaneo, fusco alboque varia, subtus alba, fascia oculari fulva.

23. AMERICANA. *Der weiß und grüne Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 525. n. 30. *der geschäckte Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 258. n. 35. Alcedo (Americana) obscure viridis, subtus alba viridi maculata, striga sub oculis alba, fascia pectorali rufa.

24. Bi-

24. BICOLOR. *Der zweyfarbige Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 525. n. 29. *der zweyfarbige Eisvogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 258. n. 34. Alcedo (Bicolor) viridis, fascia pectorali albo nigroque variegata, corpore subtus torque colli strigaque nares inter et oculum rufis.

25. MACULATA. *Der gefleckte Eisvogel.*
Brisson, ornitholog. II. p. 191. n. 25. Martin-pêcheur tacheté du Brésil.
Latham, Vögel, I. 2. p. 525. n. 28. *der gefleckte Eisvogel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 258. n. 33. Alcedo (Maculata) fusca, flavescenti-maculata, subtus alba, fusco-punctata, gula flava.
Jonston, av. p. 211. Matuitui.

7. ALCYON. *Der gehaubte Eisvogel.* (1)
Müller, Natursystem, II. p. 240. n. 7. *Haubeneisvogel.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 142. n. 1. *der Hauben-Eisvogel.*
Halle, Vögel, p. 169. n. 106. *der krausköpfige Eisvogel.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 65. n. 81. *der Haubeneisvogel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 264. n. 85. *der Eisvogel mit dem Halsbande.*
Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 548. n. 6. *Rauchkopf.*
Onomat. histor. nat. IV. p. 131. *der Rauchkopf.*
Klein, av. p. 35. n. 6. Ispida capite amplo plumoso.

Klein,

(1) Länge, nach *Latham*, 10 1/2 Zoll; nach *Pennant* 13 Zoll. Gewicht 3 1/2 Unze.

Klein, Vorbereit. p. 67. n. 6. *Rauchkopf.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 37. n. 6 *Rauchkopf.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 188. n. 21. Martin-pêcheur hupé de la Caroline.
Seligmann, Vögel, III. Tab 38. *der Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 522. n. 27. *der gehaubte Eisvogel.*
Latham, Syn. Suppl. p. 116. Belted Kingsfisher.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 257. n. 32. Alcedo (Alcyon) macr. criſtata, caeruleſcens, abdomine albo, pectore faſcia ferruginea, macula alba ante et pone oculos.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 3. Alcedo (Alcyon) brachyura nigra, abdomine albo, pectore ferrugineo.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 248. n. 2. *der Hauben-Eisvogel.*

β. *Der louiſianiſche Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 523 n. 27. Var. A.
Latham, Syn. II. p. 637. n. 27. A.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 257. n. 32. β.

γ. *Der gehaubte Eisvogel von St. Domingo.* (2)

Borowſky, Thierreich, l. c. Tab. 20.
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 37. ad n. 6.
Briſſon, ornithol. II. p. 188. n. 22. Martin-pêcheur hupé de St. Domingue.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 10. *der americaniſche Eisvogel.*
Latham, Syn. II. p. 639. n. 27. B.
Latham, Vögel, I. 2. p. 524. n. 27. Var. B.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 257. n. 32. γ.

δ. Der

(2) Nach *Briſſon* eine eigne Gattung.

δ. *Der gehaubte brasilianische Eisvogel.* (3)

Brisson, ornitholog. II. p. 187. n. 20. Martin-pêcheur hupé du Brésil.

Latham, Syn. II. p. 639. n. 27. C.

Latham, Vögel, I. 2. p. 524. n. 27. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 258. n. 32. γ.

Jonston, av. p. 190. Jaguacati Guacu.

Moehring, av. gen. p. 85. n. 113. Jaguacati Guacu.

Diesem könnte noch beygefügt werden:

ε. Alcedo cristata caerulescens, vertice, genis, temporibus sordide caerulescentibus, abdomine albo ferrugineo-tincto, lateribus cinereis albo undulatis, remigibus primoribus nigris, dorso, humeris, uropygio et tectricibus alarum sordide caeruleis, primoribus apice albo-punctatis, pedibus incarnatis, rostro corneo subtus sordide-albo, macula ante et sub oculis alba, iridibus castaneis. (4)

8. Torquata. *Der aschgraue Eisvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 241. n. 8. *der Krageneisvogel.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 549. n. 18. *Eisvogel mit der Krause.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 146. *der mexikanische Eisvogel.*

Brisson, ornithol. II. p. 189. n. 23. Martin-pêcheur hupé du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 521. n. 26. *der aschgraue Eisvogel.*

Latham,

(3) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

(4) Ich habe diese Kennzeichen nach der Beschreibung entworfen, die *Bechstein* in der Uebersetzung des Lathamschen Werks p. 523. not. **, von einem aus Amerika erhaltenen Exemplar dieses Vogels gemacht hat.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 256. n. 30. Alcedo (Torquata) macr. ſubcriſtata, cano-caerulescens, torque albo, alis caudaque albo-maculatis.

Eberhard, Thiergeſch. p. 92. *der Eisvogel mit dem Halsbande.*

Jonſton, av. p. 184. Achalalactli.

26. CAYENNENSIS. *Der cayenniſche Eisvogel.*

Briſſon, ornith. II. p. 182. n. 10. Martin-pêcheur de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 521. n. 25. *der cayenniſche Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 256. n. 29. Alcedo (Cayanenſis) caerulea ſubtus alba, faſcia infra occiput nigra, uropygio viridi-caeruleo.

27. ATRICAPILLA. *Der ſchwarzköpfige chineſiſche Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 512. n. 15. *der chineſiſche Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 251. n. 18. Alcedo (Atricapilla) violaceo-caerulea, capite, cervice, humeris remigibusque apice nigris, collo inferiore et torque albo, abdomine rufo.

β. *Der ſchwarzköpfige Eisvogel, von der Inſel Luçon.*

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguin. p. 26. *die erſte Art.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 512. n. 15. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 625. n. 15. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 251. n. 18. β. Alcedo capite, cervice, tectricibus alarum dorſoque ſupremo fuſcis, ſubtus loris et torque albis, ſcapis pennarum fuſcis, dorſo imo, remigibus caudaque caeruleis.

γ. A. ſubcriſtata nigra ferrugineo varia, collo ſubtus et pectore albis, abdomine ferrugineo, remigibus rectricibusque caeruleo-viridibus. *
Latham, Syn. II. p. 626. n. 15. Var. B.
Latham, Vögel, I. 2. p. 513. n. 15. Var. B.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 252. n. 18. γ.

δ. A. ſaturate caerulea, ſubtus alba, tectricibus alarum remigibusque nigricantibus, collari albo. *
Latham, Syn. Supplem. p. 115. Var. C.
Latham, Vögel, I. 2. p. 513. n. 15. Var. C.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 252. n. 18. δ.

28. TUTA. *Der ſichere Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 511. n. 14. *der ſichere Eisvogel.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 251. n. 17. Alcedo (Tuta) macr. viridi-violacea, ſubtus alba, collari viridi-nigro, ſuperciliis albis.

29. VENERATA. *Der verehrte Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 511. n. 13. *der verehrte Eisvogel.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 251. n. 16. Alcedo (Venerata) fuſca viridi varia, ſubtus pallida, faſcia ſuperciliari viridi-albida.

30. SACRA. *Der heilige Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 509. n. 12. *der heilige Eisvogel.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 250. n. 15. Alcedo (Sacra) caeruleo-viridis ſubtus alba, ſuperciliis ſtrigaque ſub oculis ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.

β. *Latham*, Syn. II. p. 621. n. 12. Var. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 509. n. 12. Var. A.

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 250. n. 15. β. Alc. caeruleo-viridis, ſuperciliis albis, nucha nigra, pennis colli et pectoris margine cinereis, genibus extus nigris.

γ. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 509. n. 12. Var. B. Tab. 30.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 250. n. 15. γ. Alc. caeruleo-viridis, uropygio caeruleo, corpore ſubtus et torque colli pallide ferrugineis, ſuperciliis ſtrigaque ſub oculis ferrugineis, gula alba.

δ. *Latham*, Syn. II. p. 622. n. 12. Var. C.
Latham, Vögel, I. 2 p. 509. n. 12. Var. C.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 251. n. 15. δ. Alcedo caeruleo-viridis, capite nigro, vertice caeruleo, ſuperciliis, cervice abdomineque teſtaceis, gula et torque albis.

ε. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 510. n. 12. Var. D.
Latham, Syn. II. p. 623. n. 12. Var. D.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 250. n. 14. Alcedo (Collaris) viridi-caerulea, corpore ſubtus collarique albis. *(eigne Gattung.)*
Sonnerat, Reiſ. nach Neuguinea, p. 26. *die dritte Art;* mit 1 Fig.

ζ. A. Caeruleo-viridis, vertice dorſoque nigricantibus, remigibus rectricibusque nigris caeruleo marginatis. *
Latham, Syn. Suppl. p. 114.
Latham, Vögel, I. 2. p. 510. n. 12. Var. E. *(Poopoo, Whouroo roa* in Neuſeeland, *Koato-o-oo* auf Otaheite, und den freundſchaftl. Inſeln.)
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 551. n. 15. ε.

31. CHLOROCEPHALA. *Der grünköpfige Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 508. n. 11. *der grünköpfige Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 250. n. 13. Alcedo (Chlorocephala) caeruleo-viridis, ſubtus colloque albo, capite viridi, torque nigro.

32. CAERULEA. *Der Eisvogel mit weißem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 508. n. 10. *der Eisvogel mit dem Halsbande.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 249. n. 12. Alcedo (Caerulea) caerulea, ſubtus maculaque ſub oculis rufa, tectricibus alarum uropygioque viridibus, ſuperciliis et torque collari albis.

Briſſon, ornith. II. p. 179. n. 5. Martin-pêcheur à collier des Indes.

33. FUSCA. *Der braune Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 501. n. 1. *der braune Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 245. n. 1. Alcedo (Gigantea) macroura ſubcriſtata, corpore olivaceo-fuſco, ſubtus albido nigricante faſciato, cauda ferrugineo nigroque faſciata, apice alba.

9. CAPENSIS. *Der capſche Eisvogel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 241. n. 9. *der capſche Eisvogel.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 550. n. 19. *Eisvogel vom Cap.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 131. *der Königsfiſcher vom Vorgeb. der guten Hoffnung.*

Briſſon,

Briſſon, ornitholog. II. p. 181. n. 8. Martin-pêcheur du Cap de b. E.

Latham, Vögel, I. 2. p. 502. n. 2. *der capſche Eisvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 114. Cape Kingsfisher.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 246. n. 2. Alcedo (Capenſis) macroura cinereo-caerulea, ſubtus fulva, pectore teſtaceo, roſtro rubro.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 192. Alcedo capenſis.

34. Maxima. *Der groſſe afrikaniſche Eisvogel.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 144. n. 3. *der gröſste Königsfiſcher.*

Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 17. *der allergröſste Königsfiſcher.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 502. n. 3. *der groſſe afrikaniſche Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 246. n. 3. Alcedo (Maxima) macr. criſtata alba maculoſa, corpore ſupra plumbeo, ſubtus ferrugineo, iugulo nigro, ſtriga collari gulaque albis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 612. n. 3. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 503. n. 3. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 246. n. 3. β. Alcedo griſeo-nigricans, alba transverſim undulata, corpore ſubtus albo, pectore criſſoque rufis.

10. Senegalensis. *Der ſenegaliſche Eisvogel.* (5)

Müller, Naturſ. II. p. 242. n. 10. *der ſenegaliſche.*

 Neuer

(5) *Latham* rechnet hieher auch *Forsk. Alcedo Semicaerulea* (Fn. orient. p. 6. n. 5. der in unſerm Syſtem gleichfalls mit bemerkt, aber p. 457. n. 41. nochmals als eine eigne Gattung aufgeführt iſt.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 550. n. 20. *senegalischer.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 143. *der Eisvogel aus Senegal.*

Brisson, ornithol. II. p. 182. n. 11. grand Martin-pêcheur du Senegal.

Latham, Vögel, I. 2. p. 507. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 249. n. 10. Alcedo (Senegalensis) macr. cyanea, subtus alba, capite cano, tectricibus alarum nigris.

β. *Latham,* Vögel, I. 2. p. 506. n. 9. *der Krabben-Eisvogel.* (6)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 249. n. 11. Alcedo (Cancrophaga) macroura caeruleo-viridis, subtus flavescenti-fulva, fascia per oculos, tectricibus alarum remigibusque apice nigris.

γ. *Latham,* Vögel, I. 2. p. 507. n. 9. Var. B.

Latham, Syn. II. p. 619. n. 9. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 249. n. 10. β. Alcedo submacroura, capite colloque albis, corpore subtus ferrugineo, alis nigris, fascia caerulea, cauda caerulea.

δ. *Latham,* Vögel, I. 2. p. 508. n. 9. Var. C.

Latham, Syn. II. p. 619. n. 9. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 249. n. 10. γ. Alcedo capite colloque caerulescenti-albis, corpore supra caeruleo, subtus rufo, alis nigris medio caeruleis.

35. Leucocephala. *Der weißköpfige Eisvogel.*

Müller, Naturs. Suppl. p. 94. n. 19. *der Weißkopf.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 506. n. 8. *der weißköpfige Eisvogel.*

Latham,

(6) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 248. n. 8. Alcedo (Leucocephala) viridi-caerulea, capite, collo corporeque ſubtus albo-flaveſcentibus, gula alba, vertice nigro ſtriato.

36. Flavicans. *Der gelbliche Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 528. *** *der gelbliche Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 248. n. 9. Alcedo (Flavicans) ſubtus flavicans, capite dorſoque viridibus, roſtro rubro, cauda caerulea.

Allgem. Reiſ. XI. p. 480. *Ten-ru-julon.*

11. Smyrnensis. *Der Eisvogel von Smyrna.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 242. n. 11. *Smyrnaiſche.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 145. n. 5. *der Fiſcher Martin von Smyrne.*

Halle, Vögel, p. 169. n. 108. *der Fiſcher Martin von Smirne.* Fig. 7.

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 143. *der Fiſcher Martin von Smirne.*

Briſſon, ornithol. II. p. 184. n. 13. Martin-pêcheur de Smyrne.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 58. n. 65. *der Eisvogel aus Smyrne.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 505. n. 7. *der Eisvogel von Smyrna.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 247. n. 7. Alcedo (Smyrnenſis) macr. ferruginea, alis, cauda dorſoque viridibus, gula faſciaque pectorali alba.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 116. n. 5. Alcedo (Smyrnenſis) macroura ferruginea, alis, cauda dorſoque viridibus.

β. *Der große Eisvogel von Gambia.*(7)

Halle, Vögel, p. 169. n. 107. *der große afrikanische Eisvogel.*

Klein, av. p. 35. n. 7. Iſpida, cauda longa.

Klein, Vorbereit. p. 68. n. 7. *der große Königsfiſcher.*

Klein, verb. Vögelh. p. 37. n. 7. *langgeſchwänzter Eisvogel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 183. n. 12. Martin-pêcheur bleu de Madagaſcar.

Latham, Syn. II. p. 616. n. 7. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 505. n. 7. Var. A. *der große Eisvogel von Gambia.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 248. n. 7. β. Alcedo macr. caſtanea, gula flaveſcente-albida, alis caudaque caeruleo nigroque variegatis.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 15. *der große Eisvogel vom Fluß Gambia.*

γ. *Der große bengaliſche Eisvogel.*(8)

Halle, Vögel, p. 170. n. 110. *der große bengaliſche Eisvogel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 184. n. 14. grand Martin-pêcheur de Bengale.

Latham, Syn. II. p. 616. n. 7. Var. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 506. n. 7. Var. B. *der große bengaliſche Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 248. n. 7. γ. Alc. macr. ſupra caeruleo-viridis, ſubtus alba, capite, cervice abdomineque infimo caſtaneis.

37. Novae guineae. *Der Eisvogel von Neuguinea.*

Sonnerat, Reiſ. nach Neuguin. p. 61. *der zweyte Eisvogel.*

Latham,

(7) Nach *Briſſon* eine eigne Gattung.

(8) Nach *Briſſon* eine eigne Gattung.

Latham, Vögel, I. 2. p. 504. n. 6. *der neuguineische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 247. n. 6. Alcedo (Novae Guineae) nigra, supra maculis rotundatis, subtus longitudinalibus albis lateribus duobus maioribus, superiori pyriformi.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 192. Alcedo novae Guineae.

38. Aegyptia. *Der ägyptische Eisvogel.*

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 300. n. 23. Alcedo Aegyptia.

Latham, Vögel, I. 2. p. 504. n. 5. *der ägyptische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 247. n. 5. Alcedo (Aegyptia) macr. fusca, maculis ferrugineis, gula subferruginea, abdomine femoribusque albidis, maculis cinereis, cauda cinerascente.

41. Semicaerulea. *Der hellblaue Eisvogel.* (9)

Latham, Vögel, I. 2. p. 507. not. * *der hellblaue Eisvogel.*

12. Rudis. *Der bunte Eisvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 243. n. 12. *bunter Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 171. n. 111. *der persische schwarz und weißbunte Eisvogel.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 549. n. 12. *Schwarzschnabel, Persianer.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 143. *der persianische Königs-Fischer.*

Klein, av. p. 36. n. 8. Ispida ex albo et nigro varia.

Klein

(9) S. vorher die fünfte Anmerkung bey Alcedo Senegalensis n. 10. Nach *Forskåls* Beschreibung sollte man freylich wohl den Vogel für eine eigne Gattung halten.

Klein, Vorber. p. 68. n. 8. *Persianer mit einem langen Schwanze.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 37. n. 8. *Schwarzſchnabel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 190. n. 24 Martin-pêcheur blanc et noir.

Latham, Vögel, I. 2. p. 503. *der bunte Eisvogel.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 247. n. 4. Alcedo (Rudis) macroura nigra albido varia, ſubtus alba.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 17. *der ſchwarze Eisvogel.*

Pallas, Naturgeſch. merkw. Thiere, VI. p. 14. *der orientaliſche weißbunte Königsfiſcher.*

Haſſelquiſt, Paläſtina, p. 299. n. 22. Alcedo rudis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 116. n. 6. Alcedo (Rudis) macroura fuſca albido varia.

13. Dea. *Der Eisvogel von Ternate.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 243. n. 13. *die Göttin,*

Borowsky, Thierreich, II. p. 146. n. 6. *der ternatiſche Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 266. n. 214. *der Paradiesheher*, Fig. 14.

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 549. n. 14. *Schwalbenſchwanz.* (Mit dem folgenden verwechſelt.)

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 133. *der Ternatan-Heher, der Paradis-Heher, die Ternatan-Göttin.*

Briſſon, ornithol. I. p. 191. n. 26. Martin-pêcheur de Ternate.

Klein, av. p. 62. n. 8 Pica Ternatana.

Klein, Vorber. p. 118. n. 8 *Ternatanheher.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 61. n. 8. *Ternatanheher.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 520. n. 24. *der Eisvogel von Ternate.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 256. n. 28. Alcedo (Dea) rectricibus duabus longissimis medio attenuatis, corpore nigro-caeruleſcente, alis viresſcentibus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 116. n. 7. Alcedo (Dea) rectricibus duabus longissimis, corpore nigro-caeruleſcente, alis vireſcentibus.

Moehring, av. gen. p. 32. n. 8. Pyrrhocorax.

14. Paradisea. *Der Paradies-Eisvogel.*

Müller, Naturſyst. II. p. 244. n. 14. *der Paradieß-Eißvogel.* Tab. 27. fig. 5.

Halle, Vögel, p. 171. n. 112. *der ſchwalbenſchwänzige Eisvogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 549. n. 15. *ſchöner Eisvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 142. *der Schwalbenſchwanz.*

Klein, av. p. 36. n. 9. Iſpida Surinamenſis, cauda longiſſima, duabus pennis excurrentibus furcata.

Klein, Vorber. p. 68. n. 9. *Schwalbenſchwanz.*

Klein, verbeſſerte Vögelhist. p. 37. *Schwalbenſchwanz.*

Briſſon, ornithol. II. p. 66. n. 2. Jacamar à longue queue.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 19. *der Eisvogel mit dem Schwalbenſchwanz.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 499. n. 3. *der Paradies-Jakamar.*

Latham, Syn. Suppl. p. 113. Paradiſe Jacamar.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 245. n. 3. Galbula (Paradiſea) rectricibus duabus intermediis longiſ-

longiſſimis, corpore viridi-aureo, iugulo alisque ſubtus albis.

Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 13. not.* *die dritte Art von Goldvögeln.*

Bankroft, Naturgeſch. v. Guiana, p. 98. *der ſurinamiſche Eisvogel.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 191. 192. Alcedo Paradiſea.

Gerin. ornith. II. p. 52. Tab. 185.

39. Grandis. *Der kupferigt-goldglänzende Eisvogel.* (10)

Latham, Vögel, I. 2. p. 498. n. 2. *der große Jakamar.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 245. n. 3. Galbula (Grandis) cupreo-aurea, ſubtus tota ferruginea, capite artubusque viridi-aureis, cauda cuneiformi, corpore longiore.

Pallas, Naturgeſch. merkw. Thiere, VI. p. 12. not. * *Eine noch nicht beſchriebene Art von Goldvögeln.*

15. Galbula. *Der Keilſchwanz.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 244. n. 15. *Keilſchwanz.*

Halle, Vögel, p. 146. n. 86. *der braſiliſche Baumhacker.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 549. n. 16. *eine Art mit keilförmigem Schwanze.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 134. *der braſiliſche Baumhacker.*

Klein, av. p. 28. n. 15. Picus Braſilienſis.

Klein,

(10) *Pallas* iſt der einzige, der dieſes Vogels a. a. O. beyläufig gedenkt, und von dem die Syſtematiker die Beſchreibungen entlehnt haben; von ſeinem Vaterlande und Naturgeſchichte überhaupt ſagt *Pallas* gar nichts.

Klein, Vorbereit. p. 54. n. 15. *der brasilianische Specht*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 30. n. 16. *brasilianischer Specht.*
Brisson, ornithol. II. p. 65. n. 1. Jacamar.
Latham, Vögel, I. 2. p. 497. n. 1. *der grüne Jakamar.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 244. n. 1. Galbula (Viridis) cauda cuneiformi, corpore viridi-aureo, subtus rufo, gula alba.
Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 13. not. * *die zweyte Gattung von Goldvögeln.*
Hermann, tab. affinit. animal. p. 191. Alcedo Galbula.
Jonston, av. p. 197. Jacamaciri.
Moehring, av. gen. p. 82. n. 107. Galbula.
Gerin. ornith. II. p. 52. Tab. 184.
Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 249. n. 3. *der Keilschwanz.*

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 498. n. 1. Var. A. *der langgeschwänzte grüne Jakamar.* Tab. 29.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 244. n. 1. β. Galbula cauda longiore.

40. Tridactyla. *Der dreyzehige Eisvogel.*
Müller, Natursyst. Supplem. p. 93. n. 16. *der Dreyfingerige.*
Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 12. *der dreyzehige Königsfischer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 529. n. 37. *der dreyzehige Eisvogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 260. n. 41. Alcedo (Tridactyla) brachyura, supra caudaque rufa, subtus flava, pedibus tridactylis.

β. Al-

β. Alcedo brach. pallide violaceo-rubescens, subtus alba, alis caeruleo-atris, remigibus margine caeruleis. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 260. n. 41. β.
Sonnerat, Reise n. Neuguinea, p. 26. *die zweyte Art.*

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 26 Gattungen vermehrt, die 16te bis 41te sind neu. Bey der 1sten ist noch *eine*, bey der 3ten *eine*, bey der 4ten *eine*, bey der 7ten *eine* (δ), bey der 10ten noch *drey*, bey der 11ten *eine* (γ), und bey der 15ten noch *eine* Varietät hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der sinesische Eisvogel.*
Naturf. VII. p. 39. oben.

2. *Ein Eisvogel auf Spitzbergen von der Größe einer Taube.*
Allgem. Reis. XVII. p. 281.

3. *Alcedo collaris. Der heilige Eisvogel.*
White Reis. nach Neu-Süd-Wallis; in dem Magazin merkw. Reisebeschreib. V. p. 127.
Vielleicht eine Spielart von *Alcedo Sacra*, n. 30. — cf. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 510. und 511.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der weißschnäblige Eisvogel aus Südamerika.*
Latham, Syn. Supplem. p. 113. White-billed Jacamar.

Latham,

Latham, Vögel I. 2. p. 500. n. 4. *der weißschnäblige Jacamar.*

Latham. Syst. ornitholog. I. p. 245. n. 4. Galbula (Albirostris) cauda integra, corpore viridi-aureo subtus ferrugineo, gula macula trigona alba, antice testacea, rostro albo.

2. *Der Eisvogel von der Küste Coromandel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 252 n. 19. Alcedo (Coromanda) pallide violaceo-rosea, subtus rufescens, uropygio taenia longitudinali caeruleo alba, gula alba.

Sonner. voy. Ind. II. p. 212. Tab. 118. Martin-pêcheur violet de la côte de Coromandel.

3. *Der Amazoneneisvogel, in Cayenne.*

Latham, Syn. Suppl. p. 116. Amazonian Kingsfisher.

Latham, Vögel, I. 2. p. 528. n. 36. *der Amazonen-Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 257. n. 31. Alcedo (Amazona) viridi-nitens, subtus lunulaque colli alba, lateribus viridi variegatis, remigibus rectricibusque albo-maculatis.

63. GESCHLECHT. Merops. *Der Bienenfresser.*

Müller, Natursystem, II. p. 442. Gen. LXIII.

Leske, Naturgesch. p. 250. Gen. XXXII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 146. Gen. XXI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 168. Gen. XIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 370. Gen. XIX.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 541. Gen. XIII.

Halle, Vögel, p. 512. Gen. III. (verlarvte Eisvögel, Eremitvögel.)

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 245.

Onomat. hist. nat. V. p. 174.

Klein, av. p. 110. Trib. II. B.

Brisson, ornitholog. II. p. 194. Gen. LX. Apiaster.

Batsch, Thiere, I. p. 310. Gen. LIX.

Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. 2. p. 545. Gen. XXVI.

Latham, Syst. ornith. I. p. 269. Gen. XXVII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 193.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 249. Gen. XXIV.

1. Apiaster. *Der gemeine Bienenfresser.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 244. n. 1. *der Immenwolf.*

Leske,

(1) Ist zwar eigentlich im südlichen Europa und Asien zu Hause, kommt aber doch zuweilen nach Deutschland. *Bechstein* hat den 9. Jun. 1791. zwey Alte mit zwey Jungen in seiner Gegend gesehen. Vielleicht streifen diese Vögel, wenn sie ihre Brut in südlichern Ländern gemacht haben, mit ihren Jungen umher, und verfliegen sich in andere Länder. *Latham* sagt: sie wären nirgends häufiger als in den südlichen Breiten Rufslands, besonders am Don, der Wolga, und dem Jaik; und *Lepechin* versichert: sie wären in den Gegenden um die Wolga so häufig, dass man ihrer in einem Tage zu Hunderten fangen könne. In der Gegend von Woronesch, sagt *Latham*, kommen sie etwa den 24 April in grofsen Flügen an, und bauen ihr Nest in die lehmigen Ufer, die sie schief, bis zur Tiefe eines halben *Zolles* (sollte dies nicht ein Druckfehler seyn?) durchbohren, und die Hügel sind an manchen Stellen so voll von Nestern, dass sie wie Honigwaben aussehen. Um den September ziehen sie in andere Gegenden, und man sieht sie alsdenn zu Tausenden nach Süden fliegen.

Leſke, Naturgeſch. p. 250. n. 1. *der gemeine Bienenfreſſer.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 147. n. 2. *der gemeine Bienenfreſſer.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 168. n. 1. Merops (Apiaſter) dorſo ferrugineo, abdomine caudaque viridi-caeruleſcente, gula lutea, faſcia temporali nigra; *der Immenwolf, Bienenfreſſer.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 370. *der gemeine Bienenfreſſer.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 541. n. 1. *der gemeine Bienenfreſſer.* p. 544. *Immenwolf, Bienenfänger, Schwanzeisvogel, Bienenfraſs, Heuvogel, Heumäher, einſamer Bracher, Immenfraſs, Bienenwolf, gemeiner Bienenvogel.* Tab. 19.

Funke, Naturgeſch. I. p. 302. *der Bienenfreſſer.*

Ebert, Naturl. II. p. 61. *der Bienenfreſſer.*

Halle, Vögel, p. 512. n. 591. *der Schwanzeisvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 65. n. 82. *der Immenwolf.*

Onomat. hiſtor. nat. V. p. 174. *der Bienenfänger, Schwanzeisvogel.*

fliegen. — *Willugby* erzählt aus *Belon*, daſs die Knaben auf Candia dieſen Vogel dergeſtalt fangen, daſs ſie eine Nadel in Form einer Angel biegen, ſolche mit dem Knopfe an das Ende eines Fadens binden, an der Spitze eine Cicade befeſtigen, und das andere Ende des Fadens in der Hand halten. Die ſo befeſtigte Cicade fliegt demohnerachtet in der Luft, und wenn ſie der Vogel gewahr wird, fliegt er mit aller Gewalt auf ſie herab, fängt ſie, und verſchlingt ſie ſammt der Nadel, wodurch er gefangen wird — In Aſtrachan macht, nach *Pallas*, der Bienenfreſſer gemeiniglich mit Ausgang des Aprils den Beſchluſs von allen Zugvögeln. — Das Fleiſch ſoll ſehr ſchmackhaft ſeyn.

Handb. der Naturgeſch. II. p. 297. *der Immenwolf.*

Klein, av. p. 110. n. 10. Merops ſimpliciter.

Klein, Vorber. p. 203. n. 10. *Imbenwolf.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 113. n. 1. *Immenwolf, Heuvogel, Heumäher, einſamer Bracher.*

Klein, ſtemmat. av. p. 24. Tab. 25. fig. 1. a. b.

Briſſon, ornith. II. p. 194. n. 1. Guépier.

Batſch, Thiere, I. p. 311. *der gemeine Bienenfreſſer.*

Gesner, Vögelb. p. 341. *Imbenwolff oder Imbenfraß.* Fig. p. 342.

Latham, Vögel, I. 2. p. 546. n. 1. *der gemeine Bienenfreſſer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 119. Common Bee-eater.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 269. n. 1. Merops (Apiaſter) dorſo ferrugineo, abdomine caudaque viridi-caeruleſcente, rectricibus duabus longioribus, gula lutea.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 56. n. 63. *der Bienenfraß.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 316. n. 63. *der Immenwolf.*

Cetti, Naturg. von Sardin. II. p. 92. *der Bienenfreſſer.* Tab. 11.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *der Bienenvogel.*

Fermin, Beſchreib. von Surinam, II. p. 164. *der Bienenſpecht?*

Haſſelquiſt, Reiſe n. Paläſt. p. 302. Merops galilaeus.

Naturforſch. IX. p. 57. n. 62. *der Immenwolf.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 92. *der Bienenfänger.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 120. *der gemeine Bienenfreſſer.*

Wirſing, Vögel, Tab. 27. *Bienenfraas.*

Lemmery,

Lemmery, Materiallex. p. 727.
Dec. Ruſſ. I. p. 107. IV. p. 340.
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 21. n. 1. Iſpida Merops.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 1. Merops (Apiaſter) dorſo ferrugineo, abdomine caudaque viridi-caeruleſcente, rectricibus duabus longioribus.
Kramer, Auſtr. p. 337. n. 1. *Meerſchwalbe.*
Hermann, tab. affinit. animal. p. 193.
Jonſton, av. p. 113. Merops.
Moehring, av. gen. p. 38. n. 21. Merops.
Ariſtot. hiſtor. animal. L. VI. c. 11. Μεροψ.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 249. n. 1. *der Immenwolf.*

β. *Latham*, Syſt. ornithol. I. p. 269. n. 1. β. Merops Schaeghagha.
„Cum priore exacte quadrat, at roſtrum carinatum non eſt, ſed convexum, nec digiti „infimo articulo coadunati." *Forsk.*

2. Viridis. *Der grüne Bienenfreſſer.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 246. n. 2. *grüner Bienenfreſſer.* Tab. 8. fig. 4.
Borowſky, Thierreich, II. p. 146. n. 1. *der grüne Bienenfreſſer.* Tab. 21.
Onomat. hiſt. nat. V. p. 177. *der Bienenfraß aus Bengalen.*
Halle, Vögel, p. 514. n. 595. *die Bienenſchwalbe.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 113. n. 5. *Bienenfraß mit feinem Schwalbenſchwanz.*
Briſſon, ornithol. II. p. 198. n. 8. Guépier à collier de Madagaſcar.
Batſch, Thiere, I. p. 311. *der grüne Bienenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 548. n. 2. *der grün Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 269. n. 2. Merops (Viridis) virens, fascia pectorali nigra, gula caudaque caeruleis, rectricibus duabus intermediis elongatis.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 78. *der indianische Bienenfraß.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 2. Merops (Viridis) dorso ferrugineo, abdomine alisque viridibus, gula caudaque caeruleis.

β. *Der bengalische Bienenfresser.* (2)

Brisson, ornitholog. II. p. 199. n. 9. *Guêpier à collier de Bengale.*

Latham, Syn. II. p. 671 n. 2. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 549. n. 2. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 270. n. 2. β.

γ. *Der ägyptische Bienenfresser.*

Latham, Syn. II. p. 671. n. 2. Var. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 549. n. 2. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 270. n. 2. γ. Merops totus viridis, gula flava, linea ad latera capitis nigra, remigibus apice fuscis. (3)

δ. *Der kleinere philippinische Bienenfresser.* (4)

Brisson, ornithol. II. p. 200. n. 10. petit Guépier des Philippines.

Latham, Syn. II. p. 672. n. 2. Var. C.

Latham, Vögel, I. 2. p. 549. n. 2. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 270. n. 2. β.

ε. Der

(2) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(3) Eben so beschreibt *Forskål* a. a. O. den Vogel. — Die Jungen werden im Junius in Aegypten verkauft.

(4) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

ε. *Der indianische Bienenfresser.* *
Latham, Syn. Suppl. p. 120. Indian Bee-eater.
Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 2. Var. D.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 271. n. 3. β.

3. CONGENER. *Der gelbköpfige Bienenfresser.*
Müller, Natursystem, II. p. 247. n. 3. *Gelbkopf.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 148. n. 3. *der gelbköpfige Immenwolf.*
Halle, Vögel, p. 513. n. 593. *die Seeschwalbe.*
Onomat. histor. natur. IV. p. 176. *die Seeschwalbe.*
Klein, av. p. 110. n. 12. Merops alter.
Klein, Vorbereit. p. 204. n. 12. *Seeschwalm.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 113. n. 3. *Seeschwalm.*
Gesner, Vögelbuch, p. 343. *Seeschwalb;* mit 1 Figur.
Brisson, ornithol. II. p. 195. n. 2. Guépier à tête jaune.
Batsch, Thiere, I. p. 311. *der gelbköpfige Immenwolf.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 550. n. 3. *der gelbköpfige Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 270. n. 3. Merops (Congener) flavescens, uropygio virescente, remigibus apice rubris, rectricibus basi luteis.
Jonston, av. p. 134. Merops alius.

4. SUPERCILIOSUS. *Der madagascarische Bienenfresser.*
Müller, Natursyst. II. p. 247. n. 4. *Madagascarische.*

Onomat. hiſtor. nat. V. p. 176. *der Bienenfraß aus Madagaſcar.*

Briſſon, ornith. II. p. 197. n. 7. Guépier de Madagaſcar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 550. n. 4. *der madagaſcariſche Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 271. n. 4. Merops (Superciliofus) viridis, linea frontis ſupra infraque oculos alba, gula flavicante, rectricibus duabus elongatis.

β. *Büffon*, oiſ. VI. p. 496. Autre guepier de Madagaſcar. *

Latham, Vögel, II. p. 551. *eine andere Art.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 271. β. M. roſtro graciliore, cauda apice aequali, vittis capitis, uropygio caudaque caeruleo-viridibus.

γ. *Pallas*, Reiſ. Ausz. II. p. 8. *eine ſchöne Art von ganz grünen Immenvögeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 551.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 271. n. 4. γ.

5. PHILIPPINUS. *Der philippiniſche Bienenfreſſer.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 247. n. 5. *Philippiniſche.*

Onomat. hiſtor. nat. V. p. 176. *der philippiniſche Bienenfänger.*

Briſſon, ornithol. II. p. 201. n. 12. grand Guepier des Philippines.

Latham, Vögel, I. 2. p. 551. n. 5. *der philippiniſche Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 271. n. 5. Merops (Philippinus) viridis, ſubtus flaveſcens, uropygio caeruleo, cauda aequali.

6. Ci-

6. Cinereus. *Der aschgraue Bienenfresser.*

Müller, Natursyst. II. p. 248. n. 6. *Aschgraue.*

Halle, Vögel, p. 513. n. 592. *der graue geschwänzte Eisvogel mit zwey längern rothen Schwanzfedern.*

Onomat. histor. natur. V. p. 175. *der graue Bienenfraß.*

Klein, av. p. 110. n. 11. Merops cinereus, Avicula de *Quauhcilui* dicta.

Klein, Vorbereit. p. 204. n. 11. *grauer Bienenfraß.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 113. n. 2. *grauer Bienenfraß.*

Brisson, ornitholog. II. p. 196. n. 5. Guepier du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 551. n. 6. *der aschgraue Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 272. n. 6. Merops (Cinereus) rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens, capite grisescente, rectricibus duabus longissimis rubris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 3. Merops (Cinereus) rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis rubris.

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. Curruca.

7. Cafer. *Der äthiopische Bienenfresser.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 248. n. 7. *Mohrischer.* Tab. 8. fig. 5.

(5) *Latham* hat die Synonymen von *Merops Cafer* und *Upupa Promerops* zusammen gezogen, und läſst den erstern eingehen. Nach *Pallas* gehört auch dahin die *Certhia Cafra*, wie ich unten weiter bemerken werde.

Onomat. hiſtor. nat. V. p. 175. *der äthiopiſche Bienenfänger.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 117. n. 4. Merops (Cafer) griſeus, ani regione flava, cauda longiſſima.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 151. 194. Merops Cafer.

8. Flavicans. *Der gelbe Bienenfreſſer.*

Klein, av. p. 63. n. 2. Manucodiata II. Aldrov.

Klein, Vorber. p. 120. n. 2. *weißköpfiger Paradiesheher mit goldgelben Flecken und grüngelbem Schnabel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 63. n. 2.

Briſſon, ornithol. II. p. 196. n. 3. Guepier jaune.

Latham, Vögel, I. 2. p. 552. n. 7. *der gelbe Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 272. n. 7. Merops (Flavicans) flavus, ſubtus albidus, capite albo flavo aureoque vario, pectore rubro, alis, uropygio caudaque rufis.

Jonſton, av. p. 170. Manucodiata altera ſpecies.

9. Brasiliensis. *Der braſilianiſche Bienenfreſſer.*

Halle, Vögel, p. 513. n. 594. *der kurzſchwänzige Bienenfänger.*

Klein, av. p. 110. n. 13. Merops Braſilienſis.

Klein, Vorber. p. 204. n. 13. *Rubinenglanz aus Braſilien.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 113. n. 4. *braſilianiſcher Immenwolf.*

Briſſon, ornithol. II. p. 196. n. 4. Guepier du Bréſil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 552. n. 8. *der braſilianiſche Bienenfreſſer.*

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 272. n. 9. Merops (Braſilienſis) fuſco nigroque varius, capite, gula, tectricibus alarum minoribus corporeque ſubtus rubris, remigibus caudaque caeruleis.

Moehring, av. gen. p. 81. n. 105. Ardeae adfinis.

10. Badius. *Der kaſtanienbraune Bienenfreſſer.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 197. n. 6. Guepier de l'Isle de France.

Latham, Vögel, I. 2. p. 553. n. 9. *der kaſtanienbraune Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 273. n. 10. Merops (Caſtaneus) viridi-caeruleſcens, vertice, cervice pennisque ſcapularibus caſtaneis, taenia ſuboculari ad nucham fuſca.

β. *Latham*, Syn. II. p. 678. n. 2. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 553. n. 9. Var. A.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 273. n. 10. β.

11. Chrysocephalus. *Der goldköpfige Bienenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 553. n. 10. *der goldköpfige Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 273. n. 11. Merops (Chryſocephalus) viridi-aureus, gula lutea, ſincipite, ſuperciliis corporeque ſubtus viridi-caeruleis, vertice cerviceque aureo-rubris.

12. Angolensis. *Der angoliſche Bienenfreſſer.*

Briſſon, ornithol. II. p. 200. n. 11. Guepier d'Angola.

Latham, Vögel, I. 2. p. 554. n. 11. *der angoliſche Bienenfreſſer.*

Latham,

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 273. n. 12. Merops (Angolenſis) viridi-nitens, ſubtus viridi caeruleus, gula lutea, iugulo caſtaneo, per oculos faſcia cinerea nigro maculata.

13. Erythrocephalus. *Der rothköpfige Bienenfreſſer.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 201. n. 13. Guepier à tête rouge des Indes.

Latham, Vögel, I. 2. p. 554. n. 12. *der rothköpfige Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 274. n. 13. Merops (Erythrocephalus) viridis, ſubtus rubeo-luteſcens, capite rubro, gula lutea, per oculos vitta nigra.

14. Nubicus. *Der blauköpfige Bienenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 555. n. 13. *der blauköpfige Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 274. n. 14. Merops (Caeruleocephalus) ruber, capite, gula uropygioque caeruleo-viridibus, cauda ſubforcipata.

15. Erythropterus. *Der rothflügelige Bienenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 555. n. 14. *der rothſchwingige Bienenfreſſer.* Tab. 32. fig. 2.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 274. n. 15. Merops (Erythropterus) fuſco-viridis, ſubtus albidus, remigibus rectricibusque rubris, apice nigris, gula lutea.

16. Cayennensis. *Der cayenniſche Bienenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 556. n. 15. *der cayenniſche Bienenfreſſer.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 274. n. 16. Merops (Cayanensis) viridis, alis caudaque rufis, remigibus basi albis.

17. Surinamensis. *Der surinamische Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 556. n. 16. *der surinamische Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 17. Merops (Surinamensis) varius, nucha rubescente, collo viridi-luteo, remigibus virescentibus, nigro caeruleoque variegatis.

Fermin, Beschr. v. Surinam, II. p. 164. *der Bienenspecht.*

18. Novae seelandiae. *Der neuseeländische Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 556. n. 17. *der Neu-Seeländische Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 18. Merops (Cincinnatus) viridi-atro-nitens, lateribus iuguli utrinque cincinno fasciaque alarum albis.

19. Niger. *Der schwarze Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 557. n. 18. *der schwarze Bienenfresser.*

Latham, Syn. Supplem. p. 120. Yellow-tufted Bee-eater.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 19. Merops (Fasciculatus) nigro-nitens, crisso fasciculoque axillari flavis, cauda maxime cuneiformi, rectrice extima tota, proxima latere exteriore, alba.

β. M. nigro-nitens, crisso fasciculoque axillari flavis, cauda cuneiformi, rectricibus apice albis.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 19. β.

γ. M.

γ. M. nigro-nitens, crisso flavo, cauda cuneiformi, hypochondriis rufis. *
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 19. γ.

20. Rufus. *Der gelbrothe Bienenfresser.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 558. n. 19. *der gelbrothe Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 276. n. 22. Merops (Rufus) rufus, subtus rufo-flavicans, remigibus fuscis extus rufis.

21. Moluccensis. *Der moluckische Bienenfresser.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 558. n. 20. *der moluckische Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 276. n. 23. Merops (Moluccensis) griseus, genis nigris, orbitis nudis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 14 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten sind *zwey*, bey der 2ten *vier*, und bey der 4ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Bienenfresser von Coromandel.*
Sonnerat, voy. Ind. II. p. 213. Guepier jaune de la Côte de Coromandel. Tab. 119.
Latham, Syn. Suppl. p. 120. Coromandel Bee-eater.
Latham, Vögel, I. 2. p. 558. n. 21. *der coromandelsche Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 272. n. 8. Merops (Coromandus) flavescens, lateribus colli, remigibus rectricibusque flavis, tectricibus alarum, dorso

dorſo uropygioque caeruleſcenti-undulatis, per oculos ſtriga nigra.

2. *Der belappte Bienenfreſſer.*

White, voyage to new South-Wal. p. 144. 240. Wattled Bee-eater.

White, Reiſe n. Neu-Süd-Wales; in dem Magazin merkw. Reiſebeſchr. p. 129. *der belappte Bienenfreſſer.*

Phillips, Botany-Bay, p. 164. New-Holland Bee-eater.

Latham, Vögel, I. 2. p. 559. n. 22. *der belappte Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 276. n. 20. Merops (Caruncülatus) fuſcus, abdomine flavo, palearibus carunculatis, cauda cuneiformi, apice alba.

3. *Der gehörnte Bienenfreſſer.*

White, voy. p. 190. Knob-fronted Bee-eater; mit 1 Fig.

White, Reiſe, a. a. O. p. 129. *der beulenſtirnige Bienenfreſſer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 560. n. 23. *der gehörnte Bienenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 276. n. 21. Merops (Corniculatus) fuſcus, capite nudiuſculo, corpore ſubtus rectricibusque apice albidis, corniculo frontali obtuſo.

64. GESCHLECHT. UPUPA. *Der Wiedehopf.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 249. Gen. LXIV.

Leske, Naturgeſch. p. 250. Gen. XXXIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 151. Gen. XXV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 169. Gen. XIV.

Bech-

Bechstein, Naturgesch. I. p. 370. Gen. XX.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 544. Gen. XIV.
Halle, Vögel, p. 514. Gen. IV.
Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 766.
Onomat. hist. nat. VII. p. 645.
Klein, av. p. 110. C.
Brisson, ornith. I. p. 284. Gen. XXVII. p. 286. Gen. XXVIII. Promerops.
Batsch, Thiere, I. p. 310. Gen. LX.
Latham, allgem. Uebers. der Vögel, I. 2. p. 560. Gen. XXVII.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 277. Gen. XXVIII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 193.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 250. Gen. XXV.

1. Epops. *Der gemeine Wiedehopf.* (6)

Müller, Natursystem, II. p. 249. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.* Tab. 8. fig. 6.

Leske,

(6) Flügelweite 19 Zoll. Gewicht 3 Unzen. Ein munterer aber scheuer Vogel, der sehr hurtig läuft, und sanft, ohne alles Geräusch fliegt. Kömmt spät im April, oder zu Anfang des Mayes, mit oder kurz vor dem Kuckuck an. Lebt des Sommers in Wäldern, die an Viehtriften und Wiesen grenzen, auch in waldigen Gegenden um die Dörfer herum, in den Weidenbäumen. Im August, wenn die Wiesen gemähet sind, zieht er einzeln, oder in Gesellschaft von 4 bis 8, auf die Ebenen, und verläfst uns alsdenn unvermerkt. Unter den Insekten und Gewürmen liebt er vorzüglich Regenwürmer und Maulwurfsgryllen. Das Weibchen brütet *allein*, 14 Tage. Gezähmt läfst er sich wohl 3 Jahre erhalten, und frifst in der Gefangenschaft auch rohes Fleisch, so gar Käse. Die Jungen werden mehrentheils mit Regenwürmern ernährt. Der Wiedehopf stinkt von Natur; der grofse Gestank aber, den das Nest von sich giebt, kömmt vorzüglich

Leſke, Naturgeſch. p. 251. n. 1. *der europäiſche Wiedehopf.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 152. n. 1. *der Wiedehopf.* Tab. 21.

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 169. n. 1. Upupa (Epops) criſta variegata; *der Wiedehopf, Kothhahn, Dreckkrämer.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 370. *der gemeine Wiedehopf.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 544. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.* p. 549. *Wiedehoppe, Kuckuksköſter, Kothhahn, Dreckhahn, Stinkhahn, Baumſchnepfe, Heervogel, Gänſehirt.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 331. *der Wiedehopf.*

Ebert, Naturl. II. p. 62. *der Wiedehopf.*

Halle, Vögel, p. 514. n. 596. *der gemeine Wiedehopf.* Fig. 42.

Meyer, Thiere, II. Tab. 9.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 66. n. 83. *der Wiedehopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 267. A. *der gemeine Wiedehopf.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 42. n. 8. *der Wiedehopf.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 767. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 646. *der gemeine Wiedehopf.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 214. *der Widhopf.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 103. *der Wiedehopf.*

Klein,

vorzüglich von den Excrementen der Jungen her, die ſie, da ſie in einer Höhle ſitzen, nicht aus dem Neſte werfen können, und die alſo neben ihnen liegen bleiben. Das Fleiſch ſoll in Italien gegeſſen werden.

Klein, av. p. 110. n. 14. Upupa, ſimpliciter.

Klein, Vorber. p. 204. n. 14. *Wiedhoff oder Wiedehopf.*

Klein, verb. Vögelh. p. 113. n. 1. *gemeiner Widhopf.*

Klein, ſtemm. av. p. 24. Tab. 25. fig. 2. a. b. fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 31. Tab. 11.

Gesner, Vögelb. p. 548. *Widhopff.* Fig. p. 549. gut.

Briſſon, ornitholog. I. p. 284. n. 1. Hupe ou Puput.

Batſch, Thiere, I. p. 312. *der gemeine Wiedehopf.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 561. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.*

Latham, Syn. II. p. 687. n. 1. Hoopoe.

Latham, Syn. Supplem. p. 122. Hoopoe.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 277. n. 1. Upupa (Epops) nigricante et rufo-albo variegata, ſubtus rufeſcens, criſta rufeſcente apice nigra, cauda nigra, faſcia alba.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 40. n. 67. *der gemeine Wiedehopf.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 78. n. 72. *gemeiner Wiedehopf.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 316. n. 64. *der Wiedehopf.*

Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 100. *der Wiedehopf.*

Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 99. *die gemeinen Wiedehopfen.*

White, Naturgeſch. von England, p. 14. *der Wiedehopf.*

Lepechin, Tagebuch d. ruſſiſch. Reiſ. I. p. 245. *Wiedehöpfe.*

Pallas

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 24. *Wiedehopf.*
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 167. n. 1. *Herfugl.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 65. n. 52. *Wiedehopf.*
Linné, auserles. Abh. II. p. 290. n. 68. *der Wiedehopf.*
Naturf. IX. p. 58. n. 64. *der gemeine Wiedehopf.*
Naturforsch. XXV. p. 17. *Wiedehopf.*
Naumann, Vogelsteller, p. 136. *der Wiedehoppe.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 395. *Wiedehopf.*
Eberhard, Thiergesch. p. 77. *der Wiedehopf.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 147. 367. 492. *der Wiedehopf.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 61. *der Wiedehopf.*
Meidinger, Vorles. I. p. 121. *der europäische Wiedehopf.*
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 1388. *Wiedehopf.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 758. *der Wiedehopf.*
Merklein, Thierreich, p. 412. *Widehopff.*
Loniceri, Kräuterbuch, p. 680. *Widhopf.*
Zückert, Speis. a. d. Thierr. p. 98. *Wiedehopf.*
Goeze, nützl. Allerley, II. p. 163. n. 14. *der Wiedehopf.*
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vors. VI. p. 345. *Wiedehopf.*
Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 572. *Wiedehopf.*
Wirsing, Vögel, Tab. 15. *Wiedehopf.*
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 53. Upupa.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 1. Upupa Epops.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 1. Upupa (Epops) cristata variegata.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 103. Upupa (Epops) crifiata variegata.

Brünich, ornith. bor. p. 11. n. 43. Upupa Epops.

Schäffer, elem. ornith. Tab. 70.

Schwenkfeld, aviar. Silef. p. 168. Upupa; *ein Wiede-Hopffe*, *Kot-Hahn*.

Jonfton, av. p. 118. Upupa.

Moehring, av. gen. p. 39. n. 22. Upupa.

Ariftotel. hiftor. animal. Lib. IX. c. 10. n. 46. c. 22. n. 174. Ἔποψ.

Plin. hift. nat. L. X. c. 29. L. XXX. c. 6. Upupa.

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 250. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.*

4. Capensis. *Der madagafcarifche Wiedehopf.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 564. n. 2. *der madagaskarifche Wiedehopf.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 277. n. 2. Upupa (Capenfis) fufco-nebulofa, crifta, corpore fubtus maculaque alarum albis.

2. Promerops. *Der capfche Wiedehopf.*(7)

Müller, Naturfyftem, II. p. 251. n. 2. *Capfcher.* Tab. 8. fig. 7.

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 768. *der caapfche Wiedehopf.*

Onomat. hiftor. nat. VII. p. 649. *der Paradieswiedehopf vom Vorgeb. der guten Hoffnung.*

Handb. d. Naturgefch. II. p. 216. n. 1. *der Promerops vom Vorgeb. d. g. H.*

Briffon, ornith. I. p. 286. n. 1. Promerops.

Latham, Vögel, I. 2. p. 566. n. 5. *der capfche Wiedehopf.*

Latham,

(7) Nach *Latham* gehört der *Merops Cafer* Linn. und die im Syftem p. 462. n. 7. dazu gerechneten Synonymen mit hieher.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 278. n. 5. Upupa (Promerops) fuſca, ſubtus alba, pectore rufeſcente, uropygio viridi-olivaceo, criſſo luteo, tectricibus ſex intermediis longiſſimis.

Eberhard, Thiergeſch. p. 77. *der Promerops.*

5. Mexicana. *Der mexikaniſche Wiedehopf.*

Klein, av. p. 107. n. 4. Avis Ani, Mexicana, cauda longiſſima.

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 4. *Ani, mit einem ſehr langen Schwanze aus Mexico.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 6. *langgeſchwänzte Klette.*

Briſſon, ornithol. I. p. 286. n. 2. Promerops du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 565. n. 4. *der mexicaniſche Wiedehopf.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 278. n. 4. Upupa (Mexicana) griſea, viridi-caeruleo purpureoque variegata, abdomine flaveſcente, rectricibus quatuor intermediis longiſſimis.

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. Curruca.

3. Paradisea. *Der Paradieswiedehopf.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 251. n. 3. *Paradieſiſcher.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 152. n. 2. *der paradieſiſche Wiedehopf.*

Halle, Vögel, p. 516. n. 597. *der braune Schwanzwiedehopf.*

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 767. n. 2. *Schwarzkamm.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 648. *der Paradieſswiedehopf.*

Klein, av. p. 110. n. 15. Upupa Manucodiata.

Klein, Vorbereit. p. 204. n. 15. *Schwarzkamm.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 114. n. 2. *Schwarzkamm.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 287. n. 3. Promerops hupé des Indes.

Latham, Vögel, I. 2. p. 565. n. 3. *der Paradies-Wiedehopf.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 278. n. 3. Upupa (Paradiſea) criſtata ſpadicea, ſubtus cineraſcens, capite colloque nigris, rectricibus duabus intermediis longiſſimis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 2. Upupa (Paradiſea) rectricibus duabus longiſſimis.

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. Curruca.

6. Fusca. *Der braune Wiedehopf.*

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguin. p. 59. *der braune Promerops;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 567. n. 6. *der braune Wiedehopf.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 279. n. 6. Upupa (Papuenſis) fuſca, ſubtus albo nigroque faſciata, capite colloque atris, rectricibus duabus intermediis longiſſimis.

7. Magna. *Der groſse Wiedehopf.*

Sonnerat, Reiſ. nach Neuguin. p. 59. *der groſse Promerops;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 568. n. 7. *der ſtruppige Wiedehopf.* Tab. 33.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 279. n. 7. Upupa (Superba) atro-violacea, vertice, cervice abdomineque ſuperiore viridi-nitentibus, pennis ſcapularibus lateralibusque caudae falciformibus, cauda longiſſima.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 194. Promerops faſtuoſus.

8. Au-

8. AURANTIA. *Der orangefarbene Wiedehopf.*
Briſſon, ornithol. I. p. 287. n. 4. Promerops de Barbades.
Latham, Vögel, I. 2. p. 569. n. 6. *der orangefarbene Wiedehopf.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 279. n. 8. Upupa (Aurantia) flavo-aurantia, capite colloque aureis, remigibus primoribus aurantio-rubro contaminatis.
Moehring, av. gen. p. 37. n. 3. Rhyndace.

β. *Der gelbe Wiedehopf.*
Briſſon, ornith. I. p. 288. n. 5. Promerops jaune du Mexique.
Latham, Syn. II. p. 697. n. 8. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 569. n. 8. Var. A. *der gelbe Wiedehopf.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 279. n. 8. A. Upupa lutea, capite, collo alisque cinereo nigroque variegatis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 5 Gattungen vermehrt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der rothſchnäblige Wiedehopf.*
Latham, Syn. Supplem. p. 124. Tab. 20. Red-billed Promerops.
Latham, Vögel, I. 2. p. 570. n. 9. *der rothſchnäblige Wiedehopf.* Tab. 34.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 280. n. 9. Upupa (Erythrorhynchos) viridi-atra, abdomine atro, cauda cuneiformi, remigibus 6. primoribus rectricibusque lateralibus albo-maculatis.

2. *Der blaue Wiedehopf.*

Latham, Syn. Supplem. p. 124. Blue Promerops.

Latham, Vögel, I. 2. p. 570. n. 10. *der blaue Wiedehopf.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 280. n. 10. Upupa (Indica) indico-caerulea, cauda cuneiformi, rostro nigro, pedibus plumbeis.

65. GESCHLECHT. CERTHIA. *Der Baumläufer.*

Müller, Natursyst. II. p. 253. Gen. LXIV.

Leske, Naturgesch. p. 251. Gen. XXXIV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 153. Gen. XXIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 169. Gen. XV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 272. Gen. XXI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 550. Gen. XV.

Neuer Schauplatz der Natur, I. p. 619.

Pennant, arct. Zool. II. p. 268.

Brisson, ornith. II. p. 2. Gen. XLIII.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 5 ff.

Batsch, Thiere, I. p. 310. Gen. LXI.

Latham, allgem. Uebers. der Vögel, I. 2. p. 571. Gen. XXVIII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 280. Gen. XXIX.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 205.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 250. Gen. XXVI.

1. FAMILIARIS. *Der gemeine Baumläufer.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 254. n. 1. *Baumklette.*

Leske,

(8) Nistet, nach Art der Spechte, in hohlen Bäumen, Baumritzen, Klüften an den Wurzeln, und in Tannenwäldern gern

Leſke, Naturgeſch. p. 251. n. 1. *der gemeine Baumläufer.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 154. n. 2. *die Baumklette, krummſchnablichte Baumkleber.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 169. n. 1. Certhia (Familiaris) griſea, ſubtus alba, remigibus fuſcis, rectricibus decem; *Baumklette, Grüper, Grauſpecht.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 372. n. 1. *der gemeine Baumläufer.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 550. n. 1. *der gemeine Baumläufer.* p. 554. *Baumläufer, europäiſcher Baumläufer, Baumläuferlein, Baumreiter, gemeiner Klettervogel, krummſchnäbliger Baumkleber, Grüper, Grünſpecht, Rindenkleber, Kleinſpecht, Schindelkriecher, (Baumhäckel,) kleiner Baumhacker, Baumklette, Brunnenläufer, Hierengryl, der gemeine graue Baumſteiger;* in Thüringen: *Baumrutſcher.*

Ebert, Naturl. II. p. 63. *die gemeine europäiſche Baumklette.*

Halle, Vögel, p. 500. n. 555. *der gemeine graue Baumſteiger.*

gern zwiſchen den Ritzen, wo zwey Bäume zuſammen gewachſen ſind, und macht nur eine ſchlechte Unterlage von Moos, kleinen Reiſern, Federn und Haaren. Die Eyer ſind aſchgrau, mit dunkeln Strichen und Punkten bezeichnet. Brütet 14 Tage, des Jahrs gewöhnlich zweymal, und zum erſten Mal ſchon im März. Wandert nicht, verläſst aber im October und November die Waldungen, begiebt ſich in die ebenen Gegenden, und zieht bis in den März in den Gärten, und beſonders an den Waſſern herum, an welchen Weidenbäume ſtehen, deren Rinde und Mooſe eine Menge Nahrungsmittel für ihn enthalten. Das Fleiſch iſt wohlſchmeckend.

Meyer Thiere, II. Tab. 38. *Graufpecht.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 67. n. 87. *der Grüper* u. f. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 268. n. 90. *der europäifche Baumläufer.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 619. *Baumklette.*

Onomat. hiftor. nat. II. p. 786. *der Brunnläufer.*

Handb. d. deutfch. Thierg. p. 103. *Baumläufer.*

Klein, av. p. 106. n. 1. Falcinellus arboreus noftras.

Klein, Vorber. p. 197. n. 1. *Hierengryll, Baumklette, Baumheekel, Baumhecker, Baumkletterlein.*

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 109. n. 1. *europäifche Baumklette.*

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 445. *Rinnenkleber od. Baumkletterlein;* mit 1 Fig.

Briffon, ornith. II. p. 2. n. 1. Grimpereau.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 11. *der gemeine Baumläufer;* m. 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 418. *Baumläufer;* mit 1 Figur.

Batfch, Thiere, I. p. 313. *die Baumklette.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 752. n. 1. *der gemeine Baumläufer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 126. Creeper.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 280. n. 1. Certhia (Familiaris) grifea, fubtus alba, remigibus fufcis decem, macula alba.

Befeke, Vögel Kurl. p. 40. n. 68. *die Baumklette.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgefch. I. p. 53. n. 59. *das Baumläuferlein.*

Bock, Naturgefch. von Preuffen, IV. p. 317. n. 65. *Baumklette.*

Fifcher,

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 78. n. 73. *gemeiner Baumlaufer.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 167. n 1. *Träepikker.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 30. 43. 147. 275. *das Baum-Läuferlein, oder Schindel-Kriecher.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 61. *Baumreuter.*

Naturf. IX. p. 59. n. 65. *Baumklette.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 455. n 26. *Baumklette.*

Linné, auserlef. Abh. II. p. 283. n. 35. *der gesellige Baumläufer.*

Anweisung Vögel zu fangen u. s. w. p. 115. *Baumläuferlein.*

Forstlex. III. p. 424. *Grauspecht.*

Krünitz, ökon. Encyklop. Art. *Baumklette.*

Meidinger, Vorlef. I. p. 121. n. 1. *der gemeine Baumläufer.*

Eberhard, Thiergesch. p. 87. *der Baumsteiger, oder Brunnläufer.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Reptatrix.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 2. Certhia.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 1. Certhia (Familiaris) supra grisea, subtus alba, remigibus fuscis decem macula alba.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 104. Certhia (Familiaris) grisea, subtus alba, remigibus fuscis decem, macula alba, rectricibus decem.

Kramer, Austr. p. 337. n. 2. Ispida cauda rigida.

Brünich, ornitholog. bor. p. 12. Certhia.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 347. Scandalaca arborum; *ein Baumkletterlin, Baum-Heckel, Rindenkleber.*

Rzaczynsk. auct. hist. nat. Polon. p. 419.

Schaeffer, elem. ornith. Tab. 25.

Jonston,

Jonston, av. p. 112. Certhia.
Moehring, av. gen. p. 36. n. 17. Certhia.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 205. Certhia familiaris.
Philos. Transact. XXVI. p. 124.
Gerin. ornith. II. p. 55. Tab. 195. fig. 1.
Aristot. histor. animal. L. IX. c. 19. n. 184. Κεϱθιος.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 251. n. 1. *die Baumklette.*

β. *Der große Baumläufer.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 554. *der große Baumläufer.*
Brisson, ornith. II. p. 3. A. grand Grimpereau.
Büffon, Vögel, XVIII. Tab. 21. *der große Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 753. n. 1. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 281. n. 1. β.
Gerin. ornithol. II. p. 56. Tab. 196. Cerzia vulgare maggiore.

26. Viridis. *Der grüne Baumläufer.* (9)
Büffon, Vögel, XVIII. p. 149. *der grüne Baumläufer.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 54. n. 60. *die grüne Baumklette.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 754. n. 2. *der grüne Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 281. n. 2. Certhia (Viridis) virescens, subtus flavo-varia, lateribus colli vitta caerulea, gula macula rufa.

27. Paci-

(9) Nach *Scopoli* vielleicht nur dem Geschlecht nach von *Certhia Caerulea* p. 474. n. 8. verschieden.

27. PACIFICA. *Der Baumläufer von den Freundschaftsinseln.*
Büffon, Vögel, XVIII. *der Baumläufer von den Freundschaftsinseln.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 754. n. 3. *der große krummschnäblige Baumläufer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 126. Great hook-billed Creeper.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 281. n. 3. Certhia (Pacifica) rostro longissimo incurvato, corpore atro, humeris, uropygio, crisso femoribusque flavis.
Cook, last voy. III. p. 119. *Hoohoo.*

28. OBSCURA. *Der olivenfarbene Baumläufer von den Sandwich-Inseln.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 151. *der dunkelfarbige Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 575. n. 4. *der grüne krummschnäblige Baumläufer.* Tab. 35. fig. 1.
Latham, Syn. Suppl. p. 126. Hook-billed green Creeper.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 281. n. 4. Certhia (Obscura) fusco-virens, rostro longissimo incurvato, mandibula inferiore breviore, loris fuscis.

29. COCCINEA. *Der karmoisinrothe Baumläufer.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 170. n. 3. Certhia (Coccinea) rectricibus remigibusque nigris, reliquo corpore coccineo.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 133. *der karmoisinrothe Baumläufer von der Insel O-Waihi;* mit 1 Fig.
Martini, Naturlex. VI. p. 459. *rother Baumläufer von der Insel O-Waihi.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 575. n. 5. *der rothe krummſchnäblige Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 127. Hook-billed red Creeper.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 282. n. 5. Certhia (Veſtiaria) roſtro longiore incurvo, corpore coccineo, alis caudaque nigris, tectricibus alarum macula alba.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 251. n. 2. *der karmoiſinrothe Baumläufer.*

30. FALCATA. *Der ſichelſchnäblige Baumläufer.* (10)

Büffon, Vögel, XVIII. p. 152. *der ſichelſchnäblige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 576. n. 6. *der ſichelſchnäblige Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 282. n. 6. Certhia (Falcata) roſtro longiſſimo incurvato, corpore viridi, ſubtus caudaque violaceis, tectricibus alarum maioribus, remigibus abdomineque pallide fuſcis.

31. SOVIMANGA. *Der violette Baumläufer.*

Briſſon, ornithol. II. p. 11. n. 18. Grimpereau violet de Madagaſcar.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 39. *der Souimanga;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 467. *Soui-Manga.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 577. n. 7. *der violette Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 282. n. 7. Certhia (Madagaſcarienſis) olivaceo-viridis nitens, pectore fuſco caeruleo caſtaneoque faſciato, abdomine flaveſcente, humeris macula fulva.

32. MA-

(10) Steht im brittiſchen Muſeum; woher er kommt, iſt unbekannt.

32. Manillensis. *Der manillische Baumläufer.* (1)

Büffon, Vögel, XVIII. p. 153. *der manillische Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 577. n. 7. Var. A. *der manillische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 283. n. 7. β.

33. Burbonica. *Der burbonsche Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 76. *der bourbonsche Souimanga;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 436. *der bourbonsche Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 601. n. 41. *der bourbonsche Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 52. Certhia (Borbonica) viridi-fusca, subtus grisea, lateribus rufis, uropygio flavo.

34. Sannio. *Der neuseeländische Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 154. *der spottende Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 600. n. 39. *der neuseeländische Baumläufer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 129. Mocking Creeper.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 48. Certhia (Sannio) viridi-olivacea, subtus flavescens, genis macula alba, cauda subforcipata.

35. Aurantia. *Der orangenkehlige Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 155. *der Baumläufer mit der pomeranzenfarbigen Kehle.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 599. n. 38. *der orangenkehlige Baumläufer.*

Latham,

(1) Nach *Latham* eine Varietät von *Certhia Sovimanga*, n. 31.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 295. n. 47. Certhia (Aurantia) viridis, collo inferiore fulvo, pectore abdomineque pallide flavis, remigibus rectricibusque nigricantibus.

36. Flavipes. *Der gelbfüßige Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 156. *der gelbbeinige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 599. n. 37. *der blaubrüstige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 295. n. 46. Certhia (Cyanogastra) viridis, subtus caerulea, lateribus colli vitta longitudinali flavescente, remigibus rectricibusque nigris.

37. Ochrochlora. *Der gelbgrüne Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 157. *der gelbgrüne Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 599. n. 36. *der gelbgrüne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 295. n. 45. Certhia (Surinamensis) viridis, genis, gula abdomineque flavis, pectore lateribusque viridi-flavescentibus, caeruleo notatis.

38. Cardinalis. *Der Cardinalsbaumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 158. *der Cardinalsbaumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 598. n. 35. *der Cardinalbaumläufer.* Tab. 35. fig. 2.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 290 n. 29. Certhia (Cardinalis) nigra, capite, collo, pectore vittaque dorsi longitudinali rubris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 251. n. 3. *der Cardinalsbaumläufer.*

39. Carun-

39. CARUNCULATA. *Der belappte Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 159. *der Baumläufer mit Lappen an der Kehle.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 598. n. 34. *der belappte Baumläufer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 129. Wattled Creeper.
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 295. n. 44. Certhia (Carunculata) olivaceo fuſca, ſubtus flaveſcente cinerea, gula fulva, ad baſin maxillae inferioris caruncula carnoſa flava.
Forſter: Götting. Magazin 1780. VI St. p. 349. *ein Baumläufer aus Tongatabu, mit fleiſchichten Bärten oder Lappen.*
Naturforſch. XVII. p. 15. Certhia caruncalata.

β. Certhia olivacea-fuſca, ſubtus flaveſcens, remigibus rectricibusque margine flavis. *
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 294. n. 44. β.

40. FUSCA. *Der braune Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 160. *der braune Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 597. n. 33. *der braune Baumläufer.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 294. n. 41. Certhia (Fuſca) collo lateribus albido vario, iugulo pectoreque albo faſciatis.

2. MURARIA. *Der Mauerſpecht* (2)
Müller, Naturſyſt. II. p. 254. n. 2. *Mauerſpecht.*
Leſke, Naturgeſch. p. 251. n. 2. *der kleine Baumläufer, Mauerſpecht.*

Borowſky,

(2) *Suavem vocem edit*, ſagt *Schwenkfeld;* und *Scopoli* behauptet, er habe gar keine Stimme. *Büffon*, *Latham* u. a. übergehen dieſen Umſtand ganz.

Borowſky, Thierreich, II. p. 153. n. 1. *die Mauerklette, Mauerſpecht, Todtenvogel.* Tab. 23.

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 170. n. 2. Certhia (Muraria) cinerea, macula alarum fulva; *der Mauerſpecht.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 273. n. 2. *der Mauerſpecht.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 555. n. 2. *der Mauerſpecht.* p. 557. *Mauerläufer, Todtenvogel, kleiner Baumläufer, Mauerklette, Mauerklettervogel, Kletterſpecht, Murſpecht.* Tab. 20.

Funke, Naturgeſchichte, I. p. 301. *der Mauerſpecht.*

Ebert, Naturl. II. p. 64. *der Mauerſpecht.*

Meyer, Thiere, II. Tab. 38. fig. 1.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 68. n. 85. *der Mauerſpecht.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſchichte, p. 104. *Mauerſpecht.*

Martini, Naturlex. VI. p. 421. *Mauerlaufer.*

Gesner, Vögelbuch, p. 483. *Murſpecht;* m. 1 F.

Briſſon, ornithol. II. p. 3. n. 2. *Grimpereau de Muraille.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 23. *der Mauerläufer oder Mauerſpecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 596. n. 32. *der Mauerſpecht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 129. Wall Creeper.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 294. n. 40. Certhia (Muraria) cinera, tectricibus alarum remigibusque exterius roſeis.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 3. *der Mauerſpecht.* (ſehr unähnlich.)

Batſch, Thiere, I. p. 313. *die Mauerklette.*

Götz,

Götz, Naturg. einiger Vögel, p. 80. *der Mauerspecht.* Tab. 5.

Scopoli, Bemerk a. d. Naturgesch. I. p. 52. n. 58. *der Mauerspecht.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 318. n. 66. *Mauerspecht?*

Naturf. IX. p. 60. n. 66. *Mauerspecht?*

Gmelin, Reis n. Russland, III. p. 100. *langschwänzige Bachstelze, oder persischer Langschnabel.* Tab. 19. fig. 2?

Meidinger, Vorles. I. p. 121. n. 2. *der kleine Baumläufer.*

Eberhard, Thiergesch. p. 87. *der Mauerspecht.*

Schles. ökon. Nachr. 1781. p. 83. n. 93.

Storr, Alpenreise, I. p. 73. *Mauerspecht.*

Kramer, Austr. p. 336. n. 6. Picus pedum digitis tribus anticis: postico uno, albo rubro nigroque varius; *Mauerspecht, Todten Vogl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 540. Picus muralis; *ein Mauer - Specht, Mur - Specht, Kletten-Specht.*

Charleton, av. 93. Picus murarius.

Rzaczynsk. auct. histor. nat. Polon. p. 414. Picus murarius.

Jonston, av. p. 111. Picus murarius.

Barrere, sp. nov. Class. III. Gen. 22. sp. 3. p. 47. Merops pyrenaicus cinereus, alarum costis coccineis, reptatrix.

Gerin. ornithol. II. p. 56. Tab. 197.

Salerne, ois. p. 113. Pic d'Auvergne.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 251. n. 4. *der Mauerspecht.*

3. PUSILLA. *Der kleine Baumläufer.* (3)

Müller, Naturs. II. p. 255. n. 3. *kleiner Indianischer.*

 Klein,

(3) Nach *Büffon* u. *Latham* eine Varietät von *C. Sperata* n. 13.

Klein, av. p. 108. n. 14. Falcinellus fuſcus, ventre albicante.

Klein, Vorber. p. 200. n. 14. *braune Baumklette, mit weißem Unterleibe.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 111. n. 17. *braune Klette.*

Briſſon, ornithol. II. p. 7. n. 9. Grimpereau des Indes.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 45. *der kleine braun und weiße Baumläufer des Edwards.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 51. *das kleine braun und weiße Baumläuferlein.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 578. n. 8. Var. A. *der kleine Baumläufer.*

Latham, Syn. II. p. 707. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 283. n. 8. β. Certhia griſea, ſubtus alba, ſuperciliis candidis, rectricibus fuſcis, extimis apice albis.

Martini, Naturlex. VI. p. 448. *kleiner indianiſcher Baumläufer.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 2. Certhia (Puſilla) ſupra griſea ſubtus alba, rectricibus fuſcis, extimis apice albis.

4. Capensis. *Der capſche Baumläufer.* (4)

Müller, Naturſ. II. p. 255. n. 4. *capſcher grauer.*

Briſſon, ornithol. II. p. 6. n. 7. Grimpereau du Cap de bonne éſperance.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 55. *Briſſons kapſcher Baumläufer;* m. 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 446. *der capſche graue Baumläufer.*

Latham,

(4) Nach *Büffon* das Weibchen von *Certhia Chalybea*, n. 10. *Briſſon* vermuthet ſelbſt, daſs dieſer Vogel wohl das Weibchen von irgend einer andern Gattung ſeyn möge.

Latham, Syn. II. p. 711. n. 11. Cape Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 581. n. 11. *der capſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 284. n. 12. Certhia (Capenſis) griſea, rectricibus nigricantibus, extima exterius albo fimbricata.

β. Melanura. *Der ſchwarzſchwänzige Baumläufer.* (5)

Büffon, Vögel, XVIII. *der ſchwarzſchwänzige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 62. *der ſchwarzſchwänzige Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 134. Black-tailed Creeper.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 300. n. 67. Certhia (Melanura) capite dorſoque violaceis, pectore abdomineque vireſcentibus, alis fuſcis, cauda nigra ſubbifida, tibiis digitisque atris.

5. Olivacea. *Der madagaſcariſche Baumläufer.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 255. n. 5. *Madagaſcariſche.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 8. n. 11. Grimpereau olive de Madagaſcar.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 60. *der madagaskariſche Baumläufer des Briſſon.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 583. n. 14. *der madagaskariſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 285. n. 14. Certhia (Olivacea) olivacea, ſubtus griſea, orbitis albicantibus, rectricibus extimis apice albis.

(5) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

(6) Nach *Büffon* eine Abart von *Certhia Zeylonica*, p. 482. n. 23.

6. CURRUCARIA. *Der graue Baumläufer.* (7)
Müller, Naturſyſt. II. p. 256. n. 6. *Ceyloniſcher.*
Borowſky, Thierreich, II. p. 154. n. 3. *die zeyloniſche Baumklette.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 5. n. 5. Grimpereau gris des Philippines.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 61. *der graue philippiniſche Baumläufer des Briſſon;* mit 1 Fig.
Martini, Naturlex. VI. p. 472. *zeiloniſcher Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 583. n. 15. *der graue Baumläufer.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 285. n. 15. Certhia (Currucaria) olivacea ſubtus griſeſcens, rectricibus aequalibus, iugulo vitta longitudinali violaceo.

7. JUGULARIS. *Der kleine graue Baumläufer.* (8)
Müller, Naturſyſt. II. p. 256. n. 7. *Blaukehlchen.*
Briſſon, ornithol. II. p. 5. n. 6. petit Grimpereau des Philippines.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 62. *der kleine philippiniſche Baumläufer des Briſſon;* mit 1 Fig.
Martini, Naturlex. VI. p. 432. *Blaukehlchen.*
Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 78. n. 74. *Blaukehlchen?*
Latham, Syn. II. p. 714. n. 15. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 584. n. 15. Var. A. *der kleine graue Baumläufer.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 286. n. 15. β. Certhia ſubgriſea, ſubtus lutea, gula violacea, rectricibus duabus extimis apice flavis.
Gerin. ornithol. II. p. 58. n. 199. fig. 1.

8. CAE-

(7) Nach *Büffon* eine Abart von ebendemſelben.

(8) Nach *Büffon* eine Abart von obiger Abart. Nach *Latham* eine Varietät von *Certhia Currucaria.*

8. CAERULEA. *Der blaue Baumläufer.* (9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 256. n. 8. *blauer Surinamiſcher.* Tab. 8. fig. 8.

Borowſky, Thierreich, II. p. 155. n. 4. *die blaue Baumklette.*

Halle, Vögel, p. 503. n. 563. *der Papilionvogel.*

Klein, av. p. 107. n. 6. Falcinellus papilio, avis Hoitzillin vocata.

Klein, Vorbereit. p. 199. n. 6. *Schmetterling.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 9. *Schmetterling.*

Klein, av. p. 108. n. 13. Falcinellus gula alisque nigris.

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 13. *Schwarzkehlchen.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 111. n. 16. *Schwarzkehlchen.*

Briſſon, ornithol. II. p. 8. n. 12. Grimpereau bleu de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 104. *Abart des ſchwarz und blauen Guitguit;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 427. *Schwarzkehlchen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 591. n. 27. *der blaue Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 128. Blue Creeper.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 292. n. 35. Certhia (Caerulea) caerulea, faſcia oculari, gula, remigibus rectricibusque nigris.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 41. *das blaue Baumläuferlein.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 55. n. 61. *die himmelblaue Baumklette.*

Bankroft, Naturgeſchichte von Guiana, p. 99. *der guianiſche Baumläufer.*

(9) Nach *Büffon* eine Varietät von *Certhia Cyanea* p. 483. n. 24. *Scopoli* rechnet auch die *Certhia viridis* p. 469. n. 26. hieher.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 3. Certhia (Caerulea) caerulea, remigibus rectricibusque nigris.

Sparrmann, muſ. Carlſon. faſc. 4. Tab. 82.

Gerin. ornith. II. p. 56. Tab. 196. fig. 2.

41. Brasiliana. *Der ſchwarz und violette Baumläufer.*

Briſſon, ornith. I. p. 18. n. 30. Grimpereau violet du Bréſil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 124. *der ſchwarz und violette Guitguit;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 435. *braſilianiſcher violetter Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p 595. n. 31. *der ſchwarz und violette Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 293. n. 39. Certhia (Braſiliana) nigra, vertice viridi - aureo, iugulo, tectricibus alarum minoribus uropygioque violaceis, pectore caſtaneo.

42. Variegata. *Der bunte Baumläufer.*

Klein, av. p. 79. n. 17. Sylvia verſicolor.

Klein, Vorbereit. p. 149. n. 17. *Buntwenzel.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 80. n. 21. *Buntwenzel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 19. n. 32. Grimpereau varié d'Amerique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 122. *der bunte Guitguit;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 424. *amerikaniſcher bunter Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 595. n. 30. *der bunte Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 293. n. 38. Certhia (Variegata) caeruleo - nigro, flavo - alboque varia,

varia, ſubtus fulvo-flaveſcens, vertice rubronitente, nucha caerulea.

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 32.

9. CAYANA. *Der cayenniſche Baumläufer.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 257. n. 9. *Cajenniſcher.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 11. n. 17. *Grimpereau verd de Cayenne.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 119. *der grüne gefleckte Guitguit.*

Martini, Naturlex. VI. p. 437. *cayenniſcher Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 594. n. 29. *der cayenniſche Baumläufer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 128. Cayenne Creeper.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 293. n. 37. Certhia (Cayana) viridis, nitida, ſubtus albo ſtriata, rectricibus viridibus, lateralibus interius nigricantibus.

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 27.

10. CHALYBEA. *Der Baumläufer mit dem Halsbande.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 257. n. 10. *ſtahlfärbig bandirter.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 13. n. 20. Grimpereau à collier du Cap de B. E.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 50. *der purpurfarbige indianiſche Souimanga;* mit 1 Fig.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 52. *der Souimanga mit dem Halskragen;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 457. *purpurfarbiger indianiſcher Baumläufer.*

Martini, Naturlex. VI. p. 468. *ſtahlfärbiger bandirter Baumläufer.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 55. *der purpurfarbene indianische Baumhäcker.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 580. n. 10. *der Baumläufer mit dem Halsbande.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 284. n. 11. Certhia (Chalybea) viridi-nitens, pectore rubro, fascia antica chalybea.

11. Afra. *Der afrikanische Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 257. n. 1. *bunter.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 72. *der grüne Souimanga mit rother Kehle;* mit 1 Fig.
Martini, Naturlex. VI. p. 435. *der bunte Baumläufer.*
Seligmann, Vögel, IX. Tab. 37. fig. 1.
Latham, Vögel, I. 2. p. 586. n. 18. *der afrikanische Baumläufer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 127. African Creeper.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 286. n. 18. Certhia (Afra) viridis, abdomine albo, pectore rubro, uropygio caeruleo.

β. *Büffon*, Vögel, XVIII. p. 73. β.
Latham, Syn. II. p. 717. n. 18. Var. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 586. n. 18. Var. A. p. 580. not. ****.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 287. n. 18. β.
Sparrmann, mus. Carlson. fasc. III. Tab. 38. Certhia Scarlatina?
Born, Physic. p. 76. Tab. 3.

γ. *Büffon*, Vögel, XVIII. p. 73. γ.
Latham, Syn. II. p. 718. n. 18. Var. B.
Latham, Vögel, I. 2. p. 586. n. 18. Var. B.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 287. n. 18. γ.

12. SPIZA. *Der schwarzköpfige Baumläufer.*

Müller, Natursyst. II. p. 257. n. 12. *Blaukopf.*

Klein, av. p. 79. n. 18. Sylvia, avicula americana altera.

Klein, Vorber. p. 149. n. 18. *Weißschnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 80. n. 22. *Weißschnabel.*

Brisson, ornithol. II. p. 10. n. 16. Grimpereau verd à tête noire d'Amerique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 108. *der grün und blaue Guitguit mit schwarzem Kopfe;* mit 1 Figur.

Martini, Naturlex. VI. p. 441. *Weißschnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 592. n. 20. *der schwarzköpfige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 292. n. 36. Certhia (Spiza) viridis, subtus caerulea, capite gulaque nigris.

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 26.

Moehring, av. gen. p. 36. n. 16. Colius.

β. *Der Baumläufer mit schwarzer Mütze.* (10)

Klein, av. p. 80. n. 22. Sylvia viridis, capite nigro.

Klein, Vorber. p. 150. n. 22. *grüner Wenzel mit schwarzem Kopfe.*

Klein, verb. Vögelh. p. 81. n. 26. *grüner Wenzel mit schwarzem Kopfe.*

Brisson, ornithol. II. p. 10. n. 15. Grimpereau verd à tête noire du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 110. *der grüne Guitguit mit schwarzem Kopfe;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 49. *der grüne Fliegenschnäpper mit dem schwarzen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 593. n. 28. Var. A. *der Baumläufer mit schwarzer Mütze.*

Latham,

(10) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. p. 727. n. 28. A. Black-capped Creeper.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 292. n. 36. β. Certhia viridis, capite supra nuchaque nigris.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 110. *der grüne schwarzkuppichte Fliegenschnäpper des Edwards.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 188. n. 27. Motacilla (Spiza) viridis, remigibus primoribus nigricantibus.

Gerin. ornithol. II. p. 60. n. 25.

γ. *Der blauköpfige Baumläufer.* (1)

Klein, av. p. 80. n. 23. Sylvia viridis, capite cyaneo.

Klein, Vorber. p. 150. n. 23. *grüner Wenzel mit blauem Kopfe.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 81. n. 25. *grüner Wenzel mit blauem Kopfe.*

Brisson, ornitholog. II. p. 9. n. 14. Grimpereau verd du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 115. *der grün und blaue Guitguit mit weißer Kehle;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 49. *der blauköpfige grüne Fliegenschnäpper.*

Latham, Syn. II. p. 727. n. 28. B. Blue-headed Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 593. n. 28. Var. B. *der blauköpfige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 292. n. 36. γ. Certhia viridis, gula alba, vertice tectricibusque alarum caeruleis.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 188. n. 27. β. Motacilla viridis, capite caeruleo.

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 24.

δ. *Der*

(1) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

δ. *Der ganz grüne Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 117. *der ganz grüne Guitguit;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 439. *ganz grüner Baumläufer.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 38. fig. 2. *der ganz grüne Baumläufer.*

Latham, Syn. II. p. 728. n. 28. C. All-green Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 495. n. 28. Var. C. *der ganz grüne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 293. n. 36. γ. Certhia corpore toto viridi, subtus dilutiore.

13. SPERATA. *Der purpurfarbige Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 257. n. 13. *Purpurfärbige.*

Brisson, ornitholog. II. p. 16. n. 27. Grimpereau pourpré des Philippines.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 42. *der purpurbraune Souimanga mit rother Brust;* m. 1 Fig.

Halle, Vögel, p. 501. n. 557. *der rothe Gesangkolibri?*

Klein, av. p. 107. n. 2. Falcinellus, colore passeris Hispanici?

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 2. *Purpurköpfchen?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 2. *Purpurköpfchen, Nochtototl?*

Martini, Naturlex. VI. p. 455. *purpurfarbiger Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 578. n. 8. *der purpurfarbige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 283. n. 8. Certhia (Purpurea) subtus coccinea, capite, gula uropygioque violaceis.

Gerin,

Gerin. ornithol. II. p. 58. Tab. 200. fig. 2. das Männchen. fig. 1. das Weibchen.

Seba, thes. I. p. 69. Tab. 42. Avis Nochtototl?

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. Troglodytae adfinis?

β. *Der Baumläufer mit violetter Kehle.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 47. *der Baumläufer mit violetter Kehle und rother Brust.*

Martini, Naturlex. VI. p. 450.

Latham, Syn. II. p. 708. n. 8. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 579. n. 8. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 283. n. 8. γ. Certhia castaneo-rubra, capite virescente, gula violacea, pectore rubro, uropygio caudaque chalybeis.

Sonnerat, Reise n. Neuguinea, p. 25. *die dritte Art Baumläufer;* mit 1 Fig.

14. SENEGALENSIS. *Der senegalische Baumläufer.*

Müller, Natursyst. II. p. 258. n. 14. *senegalischer.*

Brisson, ornith. II. p. 18. n. 29. Grimpereau violet du Sénegal.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 48. *der violette Souimanga mit rother Brust;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 466. *senegalischer Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 579. n. 9. *der senegalische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 284. n. 10. Certhia (Senegalensis) nigro-violacea, vertice gulaque viridi-aureis, pectore coccineo, alis caudaque fuscis.

Gerin. ornith. II. p. 58. Tab. 199. fig. 2.

43. PUR-

43. PURPUREA. *Der virginische Baumläufer.*

Halle, Vögel, p. 508. n. 582. *der purpurfarbene Gesangkolibri.*

Klein, av. p. 108. n. 9. Falcinellus phoeniceus.

Klein, Vorbereit. p. 199. n. 9. *Purpurklette, Purpurvogel aus Virginien.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 12. *virginische Klette.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 16. n. 26. Grimpereau pourpré de Virginie.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 95. *der Purpurvogel mit dem Baumläuferſchnabel.*

Martini, Naturl. VI. p. 457. *Purpurklette, Atototl.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 590. n. 25. *der virginiſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 291. n. 33. Certhia (Purpurea) corpore toto purpureo.

Gerin, ornith. II. p. 59. Tab. 202. fig. 1.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. Troglodytae adfinis.

15. GUTTURALIS. *Der braſilianiſche Baumläufer.*

Müller, Naturſ. II. p. 258. *Grünkehlchen.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 17. n. 28. Grimpereau noirâtre du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 93. *der braune Vogel mit dem Baumläuferſchnabel.*

Martini, Naturlexicon, VI. p. 442. *grünkehlichter Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 590. n. 20. *der braſilianiſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 291. n. 32. Certhia (Gutturalis) nigricans, ſincipite et gutture viridi-nitente, pectore purpureo.

Gerin, ornith. II. p. 59. Tab. 202. fig. 1.

16. PINUS.

16. Pinus. *Der Tannenbaumläufer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 258. n. 16. *Blauflügel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 385. n. 235. *der Fichtenſänger.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 471. n. 15. Méſange d' Amerique.

Büffon, Vögel, XVI. p. 114. *der Tannenkriecher*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 428. *Blauflügel, Tannenbaumhäcker.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 67. *der Tannenbaumhäcker.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 537. n. 111. Sylvia (Pinus) olivacea, ſubtus flava, loris nigris, alis caeruleis, faſciis duabus albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 205. Certhia Pinus.

17. Cruentata. *Der bengaliſche Baumläufer.* (2)

Müller, Naturſyſt. II. p. 259. n. 17. *Rothkopf.*

Klein, av. p. 108. n. 19. Falcinellus Bengalenſis.

Klein, Vorbereit. p. 201. n. 19. *die bengaliſche Klette.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 111. n. 22. *ſchwarz, weiß und rothe Klette.*

Briſſon, ornithol. II. p. 18. n. 31. Grimpereau de Bengale.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 74. *der roth, ſchwarz und weiße Souimanga*; m. 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 463. *rothköpfichter Baumläufer.*

Selig-

(2) *Pennant* rechnet dieſen Vogel zu den Motacillen; *Briſſon* zu den Meiſen; *Latham* unter ſeine Sylvien. Ueberhaupt herrſcht in der Beſchreibung deſſelben ſehr viel Verwirrung, worüber man *Martini* Naturlexicon a. a. O. umſtändlicher nachleſen kann.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 57. *die kleine schwarze, weiß und rothe indianische Baumklette.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 600. n. 40. *der bengalische Baumläufer.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 51. Certhia (Cruentata) nigro-caerulescens, subtus alba, vertice, cervice, dorso uropygioque rubris.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 4. Certhia (Cruentata) nigro caerulescens, subtus alba, vertice, cervice, dorso uropygioque rubris.
Gerin, ornith. II. p. 57. Tab. 198. fig. 1.

18. FLAVEOLA. *Der Zuckervogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 259. n. 18. *Zuckervogel.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 268. n. 91. *der westindische Baumläufer.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 111. n. 23. *schwarz und gelbbunte Baumklette.*
Brisson, ornithol. II. p. 19. n. 33. Grimpereau ou Sucrier de la Jamaique.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 126. *der Zuckerfresser;* mit 1 Fig.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 17. *das schwarz und gelbe Baumläuferlein.*
Martini, Naturlex. VI. p. 474. *Zuckervogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 601. n. 42. *der Zuckervogel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 297. n. 53. Certhia (Flaveola) nigra, subtus uropygioque lutea, superciliis exalbidis, rectricibus lateralibus apice albis.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 5. Certhia (Flaveola) nigra, uropygio pectoreque luteo, superciliis, macula alarum rectricumque apicibus albis.

Gerin. ornithol. II. p. 57. Tab. 234. (*)

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 252. n. 5. *der westindische Baumläufer.*

β. *Der martinikische Baumläufer.* (3)

Klein, av. p. 74. n. 10. Luscinia seu Philomela e fusco et luteo varia.

Klein, Vorber. p. 140. n. 10. *schwarz und gelbbunte Nachtigall.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 75. n. 10. *schwarzbunte Nachtigal.*

Brisson, ornitholog. II. p. 4. n. 3. Grimpereau de la Martinique, ou le Sucrier.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 126. 129. *der martinikische Zuckerfresser;* m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 52. *Baumkletterer mit gelbem Bauche.*

Latham, Syn. II. p. 737. n. 42. A. Yellow-bellied Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 602. n. 42. Var. A. *der martinikische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 297. n. 53. β. Certhia fusco-cinerea, subtus uropygioque lutea, crisso superciliisque albis, rectricibus apice albis.

Gerin. ornith. II. p. 61. n. 37.

γ. *Der bahamische Baumläufer.* (4)

Borowsky, Thierreich, II. p. 155. n. 5. *der Zuckervogel.*

Klein, av. p. 74. n. 9. Luscinia pectore flavo; Parus bahamensis.

Klein, Vorbereit. p. 140. n. 9. *Gelbbrüstel von Bahama.*

Klein,

(3) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

(4) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 75. n. 9. *Gelbbrüftel.*

Briffon, ornithol. II. p. 6. n. 8. Grimpereau de Bahama.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 130. *der bahamifche Baumläufer*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 477. *bahamifcher Baumläufer.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 18. *die bahamifche Meife.*

Latham, Syn. II. p. 737. n. 42. B. Bahama-Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 603. n. 42. Var. B. *der bahamifche Baumläufer.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 297. n. 53. γ. Certhia fufca, fubtus lutea, gula pallida, abdomine infimo criffoque fufcefcentibus, superciliis albis.

Gerin. ornith. II. p. 59. n. 20.

δ. *Der Baumläufer von der Infel S. Bartholomaei.* *

Latham, Vögel, I. 2. p. 611. n. 72. *der fchwefelgelbe Baumläufer.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 297. n. 53. γ. Certhia fupra plumbeo-fufca, fubtus flava, superciliis flavefcenti-viridibus, uropygio fubvirefcenti, criffo albido, roftro, pedibus, alis, caudaque fufcis.

Muf. Carlf. Fafc. III. Tab. 57. Certhia bartholemica.

44. Sanguinea. *Der blutrothe Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 161. *der blutrothe Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 603. n. 43. *der karmoifinrothe Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 290. n. 30. Certhia (Sanguinea) ſaturate coccinea, abdomine obſcuro, criſſo albo, remigibus ſecundariis caſtaneo-marginatis, primoribus rectricibusque nigris.

45. Virens. *Der grünliche Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 162. *der grünliche Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 603. n. 44. *der olivengrüne Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 290. n. 31. Certhia (Virens) olivaceo-viridis, loris nigricantibus, remigibus caudaque flavo marginatis.

46. Rubra. *Der ſcharlachrothe Baumläufer.* (5)

Büffon, Vögel, XVIII. p. 165. *der rothe Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 604. n. 45. *der ſcharlachrothe Baumläufer.*

47. Cinnamomea. *Der zimmtfarbene Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 164. *der zimmtfarbige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 604. n. 46. *der zimmtfarbige Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 298. n. 56. Certhia (Cinnamomea) cinnamomea, ſubtus alba.

48. Macassariensis. *Der macaſſariſche Baumläufer.*

Klein, av. p. 107. n. 7. Falcinellus rex florum, Kakopit Tſioei.

Klein, Vorbereit. p. 199. n. 7. *Blumenkönig.*

Klein,

(5) *Latham* rechnet ihn mit zu *Certhia Cardinalis.* Syſt. ornith. p. 290. n. 29.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 10. *Blumenkönig.*

Halle, Vögel, p. 503. n. 564. *der Blumenprinz.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 23. n. 6. Colibri des Indes.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 165. *der macaſſariſche Baumläufer;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 604. n. 47. *der macaſſariſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 300. n. 72. Certhia (Macaſſarienſis) viridi-aurata, ſubtus nigricante-fuſca.

49. Indica. *Der indiſche Baumläufer.*

Klein, av. p. 108. n. 12. Falcinellus Cyaneus.

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 12. *Weißkehlchen.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 111. n. 15. *Weißkehlchen.*

Halle, Vögel, p. 504. n. 568. *der hellblaue Kolibriſpecht, mit weißer Kehle.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 25. n. 10. Colibri bleu des Indes.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 166. *der indiſche Baumläufer;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 605. n. 40. *der indiſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 301. n. 73. Certhia (Indica) caeruleo-nitens, collo inferiore albeſcente.

50. Amboinensis. *Der amboiniſche Baumläufer.* (6)

Briſſon, ornithol. II. p. 26. n. 12. Colibri d'Amboine.

(6) *Klein* rechnet ihn zu ſeinem Blumenkönig *Certhia Macaſſarienſ.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 167. *der amboinische Baumläufer*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 605. n. 49. *der amboinische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 301. n. 74. Certhia (Amboinensis) cinereo-grisea, subtus viridis, capite colloque flavis, viridi-marginatis, pectore rubro, alis nigris.

51. MEXICANA. *Der rothe mexikanische Baumläufer.*

Klein, av. p. 107. n. 1. Avicula Hoitzillin.

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 1. *das Vöglein Hoitzillin.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 3. *mexikanische Baumklette.*

Halle, Vögel, p. 502. n. 558. *der rothe Gesangkolibri mit grüner Kehle.*

Brisson, ornitholog. II. p. 15. n. 24. Grimpereau rouge du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 88. *der rothe Vogel mit dem Baumläuferschnabel*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 589. n. 23. *der rothe Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 289. n. 27. Certhia (Coccinea) rubra; pileo dilutiore, gula iuguloque viridibus, remigibus apice caerulescentibus.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. Troglodytae adfinis.

β. *Der rothe, schwarz gehäubte mexikanische Baumläufer.*

Klein, av. p. 80. n. 20. Sylvia rubra, rostro longiori.

Klein, Vorbereit. p. 149. n. 20. *rother Wenzel mit schwarzer Haube.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 80. n. 23. *rother Wenzel mit ſchwarzer Haube.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 16. n. 25. Grimpereau rouge à tête noire du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p... *der rothe Vogel mit ſchwarzem Kopfe.*

Martini, Naturlex. VI. p. 462. *rother Baumläufer mit ſchwarzer Haube.*

Latham, Syn. II. p. 722. n. 23. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 589. n. 23. Var. A. *der rothe ſchwarzgehäubte Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 289. n. 27. β. Certhia pallide rubra, remigibus rectricibusque ſaturatioribus, capite nigro, tectricibus alarum flavo-aureis.

52. Cinerea. *Der aſchgraue Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 168. *der aſchgraue Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 589. n. 22. *der aſchgraue Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 289. n. 25. Certhia (Cinerea) viridi-nitens, capite, collo, dorſo ſupremo pectoreque fuſco cinereis, ſtriga lateribus gulae abdomineque flaveſcentibus.

19. Pulchella. *Der ſchöne Baumläufer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 259. n. 19. *Langſchwanz.*

Klein, av. p. 80. n. 19. Sylvia verſicolor.

Klein, Vorber. p. 149. n. 19. *Kurzſchwanz.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 79. n. 15. *amboiniſcher Steinpatſcher.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 14. n. 21. Grimpereau à longue queue du Sénegal.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 83. *der langſchwänzige goldgrüne ſchillernde Souimanga;* m. 1 F.

Martini, Naturlex. VI. p. 450. *Langschwanz.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 587. n. 20. *der schöne Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 288. n. 23. Certhia (Pulchella) rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore viridi nitente, pectore rubro.
Gerin. ornith. II. p. 59. Tab. 201 fig. 2.

20. FAMOSA. *Der langschwänzige Baumläufer.*
Müller, Natursystem, II. p. 259. n. 20. *capscher Colibri.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 155. n. 6. *der capsche Colibri, Zuckervogel.*
Brisson, ornitholog. II. p. 14. n. 22. Grimpereau à longue queue du Cap de b. E.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 85. *der große grüne Souimanga mit langem Schwanze*; mit 1 Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 312. *der Zuckervogel.*
Martini, Naturlexicon, VI. p. 447. *capscher langgeschwänzter Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 588. n. 21. *der langgeschwänzte Baumläufer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 128. Famous Creeper.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 288. n. 24. Certhia (Famosa) rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore viridi nitente, axillis luteis, loris nigris.
Gerin. ornith. II. p. 58. Tab. 201. fig. 1.

21. PHILIPPINA. *Der philippinische Baumläufer.* (7)
Müller, Natursf. II. p. 260. n. 21. *philippinischer.*
Brisson,

(7) Nach *Büffon* das Weibchen, oder eine Spielart von *Certhia chalybea.* Nach *Latham* vielleicht das Weibchen von *Certhia Sperata*; und *Sonnerat* ist geneigt ihn für das Weibchen von *Certhia Zeylonica* zu halten.

Briſſon, ornithol. II. p. 4. n. 4. Grimpereau des Philippines.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 55. *der philippiniſche Baumläufer.*

Martini, Naturlexicon, VI. p. 455. *philippiniſcher Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 581. n. 12. *der philippiniſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 283. n. 9. Certhia (Philippina) rectricibus 2. intermediis longiſſimis, corpore ſubgriſeo vireſcente, ſubtus albo-flaveſcente.

Sonnerat, Reiſ. nach Neuguin. p. 25. *die zweyte Art Baumläufer;* m. 1 Fig.

22. Violacea. *Der violetfarbige Baumläufer.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 260. n. 22. *violetfärbiger.*

Müller, Naturſyſtem, Suppl. p. 97. n. 27. *der violette Baumläufer.*

Briſſon, ornithol. II. p. 15. n. 23. petit Grimpereau à longue queue du Cap de b. E.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 79. *der langſchwänzige Souimanga mit violetter Kehle;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 471. *violetter Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 587. n. 19. *der violetköpfige Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 288. n. 21. Certhia (Violacea) rectricibus duabus intermediis longiſſimis, corpore violaceo-nitente, pectore abdomineque luteis.

23. Zeylonica. *Der zeilaniſche Baumläufer.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 260. n. 23. *Roſtfärbiger.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 99. n. 31. *der Dreyfarbige.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 7. n. 10. Grimpereau olive des Philippines.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 58. *der olivenfarbige Souimanga mit purpurfarbiger Kehle;* mit 1 Figur.

Martini, Naturlex. VI. p. 458. *roſtfarbiger Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 582. n. 13. *der zeylaniſche Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 285. n. 15. Certhia (Zeylonica) pileo viridi, dorſo ferrugineo, abdomine flavo, gula uropygioque azureis.

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguin. p. 25. *die erſte Art Baumläufer;* mit 1 Fig.

β. *Latham*, Syn. II. p. 713. n. 13. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 583. n. 13. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 285. n. 13. β. Certhia fuſca, pileo tectricibusque alarum viridibus, uropygio purpureo, pectore infimo abdomineque albis.

24. Cyanea. *Der ſchwarz und blaue Baumläufer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 260. n. 24. *ſchwarzblauer.*

Klein, av. p. 108. n. 11. Falcinellus de Guitguit, ex inſula Cuba.

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 11. *Kurzſchwanz, Langhals von der Inſel Cuba.*

Klein, verb. Vögelh. p. 110. n. 14. *Langhals und Kurzſchwanz.*

Halle, Vögel, p. 504. n. 567. *der ſchwarzblaue Kolibriſpecht mit verſilberter Stirn.*

Briſſon, ornith. II. p. 9. n. 13. Grimpereau bleu du Bréſil.

Büffon,

Büffon, Vögel, XVIII. p. 98. *der ſchwarz und blaue Guitguit;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 464. *ſchwarzblauer Baumläufer.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 54. *der ſchwarze und blaue Baumhäcker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 591. n. 26. *der ſchwarz und blaue Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 128. black and blue Creeper.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 291. n. 34. Certhia (Cyanea) caerulea, faſcia oculari, humeris, alis caudaque nigris, pedibus rubris.

Jonſton, av. p. 206. Guiracoereba.

Moehring, av. gen. p. 36. n. 16. Colius.

β. C. obſcure viridis, lateribus remigum interioribus tectricibusque alarum inferioribus ſulphureis. *

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 29. n. 34. β.

25. LOTTENIA. *Der Lootensvogel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 261. n. 25. *von Lootens Vogel.*

Müller, Naturſyſtem, Suppl. p. 99. n. 32. *der Violetfleck.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 12. n. 19. Grimpereau verd de Madagaſcar.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 65. *der Souimanga: Angala-Dian.*

Martini, Naturl. VI. p. 451. *Lotensvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 584. n. 16. *der Lotens-Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 286. n. 16. Certhia (Lotenia) caerulea, faſcia pectorali rubro-aurea, loris atris.

Gerin,

Gerin. ornithol. II. p. 160. n. 29.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 252. n. 6. *der Lootensvogel.*

53. Omnicolor. *Der goldgrüne Baumläufer.*(8)
Klein, Vorbereit. p. 199. n. 8. *ceylaniſche Baumklette.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 11. *ceylaniſche Baumklette.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 70. *der Souimanga mit allen Farben;* mit 1 Fig.
Martini, Naturlexicon, VI. p. 473. *zeiloniſcher Baumläufer von allen Farben.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 585. n. 17. *der goldgrüne Baumläufer.*
Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 286. n. 17. Certhia (Omnicolor) viridi - aurata, variis coloribus nitens.

54. Caffra. *Der cafferſche Baumläufer.*(9)
Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 97. n. 26. *der capſche braune Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 139. 169. *der kapſche braune Baumläufer.*
Martini, Naturlex. VI. p. 445. *kapſcher brauner Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 610. n. 67. *der braune capſche Baumläufer.*
Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. VI. p. 21. *der kaffriſche Baumhäckel.*
Hermann, tab. affin. anim. p. 195. Certhia Cafra.

A. *Ver-*

(8) *Briſſon* hat die hieher gehörigen ..onymen aus *Klein* und *Seba* zu der vorhergehenden Gattung -ezogen.

(9) Iſt nach *Pallas* mit *Merops Caffer* u. *Upupa Promerops Linn.* völlig einerley, und ſind alle bey dieſen beyden Gattungen aufgeführte Synonymen *hieher* zu rechnen.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 29 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *zwey*, bey der 4ten *zwey*, bey der 11ten *drey*, bey der 12ten *vier*, bey der 13ten *zwey*, bey der 23ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt, und bey der 18ten ist die Varietät *β* hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der polirte Baumläufer.*
 Mus. Carls. fasc. III. Tab. 59. Certhia polita.
 Latham, Vögel, I. 2. p. 612. n. 73. *der polirte Baumläufer.*
 Latham, Syst. ornitholog. I. p. 287. n. 19. Certhia (Polita) nigricans, pectore, capite corporeque supra virescenti parumque purpureo-metallino, macula subaxillari flava.

2. *Der asiatische Baumläufer.*
 Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 63. *der asiatische Baumläufer.*
 Latham, Syst. ornithol. I. p. 288. n. 22. Certhia (Asiatica) saturate caerulea, alis fuscis, rostro pedibusque atris.

3. *Der schnupftabacksfarbige Baumläufer.*
 Latham, Syn. Supplem. p. 129. Snuff-coloured Creeper.
 Latham, Vögel, I. 2. p. 605. n. 50. *der schnupftabacksfarbige Baumläufer.*
 Latham, Syst. ornitholog. I. p. 289. n. 26. Certhia (Tabacina) rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore supra, capite colloque tabacino, subtus viridi, rectricibus viridi nigricantibus.

4. *Der*

4. *Der rothrückige Baumläufer.*
Latham, Syn. Supplem. p. 132. *Red-backed Creeper.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 55. *der rothrückige Baumläufer.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 290. n. 28. Certhia (Erythronotos) coccinea, ſubtus rufo-alba, lateribus colli faſcia nigra, tectricibus alarum atro-viridibus, remigibus caudaque nigris.
Sonnerat, voy. Ind. p. 209. Tab. 117. fig. 1. Grimpereau à dos rouge de la Chine.

5. *Der rußbraune Baumläufer.*
Muſ. Carlſ. Faſc. III. Tab. 56. Certhia ignobilis.
Latham, Vögel, I. 2. p. 611. n. 71. *der rußbraune Baumläufer.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 294. n. 42. Certhia (Ignobilis) ſupra fuliginoſo-nigra, ſubtus cinerea, lineolis ellipticis albidis.

6. *Der gewellte Baumläufer.*
Muſ. Carlſ. Faſc. II. Tab. 34. Certhia undulata.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 143. *der gewellte Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 610. n. 68. *der gewellte Baumläufer.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 295. n. 43. Certhia (Undulata) ſupra cinereo-fuliginoſa, ſubtus alba, nigro transverſim undulata.

7. *Der neuholländiſche Baumläufer.*
White, voy. p. 186. 297. New Holland Creeper. (Männchen und Weibchen abgebildet.)
White, Reiſ. n. Neu-Süd-Wallis; in dem Magazin merkw. Reiſebeſchr. V. p. 129. *die neuholländiſche Baumklette.* (Certhia varia.)

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 64. *der neuholländische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 49. Certhia (Novae Hollandiae) nigra, subtus albo striata, superciliis maculaque aurium albis, remigibus rectricibusque flavo marginatis.

8. *Der grauliche Baumläufer aus Neukaledonien.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 65. *der grauliche Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 296. n. 50. Certhia (Incana) subfusca, collo remigibusque canescentibus.

9. *Der fremde Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 66. *der fremde Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 297. n. 54. Certhia (Peregrina) olivacea, subtus flava, fascia alarum bifida pallida, cauda subforficata, rectricibus 2 exterioribus apice intus albis.

10. *Der Baumläufer mit Kniebändern aus Surinam.*

Mus. Carls. Fasc. II. Tab. 36. Certhia armillata.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 146. *der Baumläufer mit Kniebändern.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 611. n. 70. *der Baumläufer mit Kniebändern.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 298. n. 55. Certhia (Armillata) viridis, alis complicatis, supra nigris subtus luteis, humeris, femorum armillis maculisque aliquot uropygii sapphirinis.

11. *Der graubäuchige Baumläufer aus Afrika.*

Latham, Syn. Supplem. p. 298. Ash-bellied Creeper.

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. n. 51. *der graubäuchige Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 298. n. 57. Certhia (Verticalis) viridi-olivacea, ſubtus cinerafcens, vertice viridi, remigibus caudaque fuſcis.

12. *Der indigblaue Baumläufer, aus Indien.*

Latham, Syn. Suppl. p. 130. Indigo Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. n. 52. *der indigblaue Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 298. n. 58. Certhia (Parietum) cyanea ſubtus rufa, ſuperciliis gulaque albis, ſub oculis ad nucham linea nigra.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 208. Roſſignol de murailles des Indes.

13. *Der Baumläufer mit blauem Steiß, vom Vorgebirg der guten Hoffnung.*

Latham, Syn. Supplem. p. 131. Blue-rumped Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. *der Baumläufer mit blauem Steiß.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 298. n. 59. Certhia (Viridis) viridis, uropygio caeruleo, gula rubra, remigibus caudaque rufo-aureis.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 208. Tab. 116. fig. 2. Grimpereau verd du Cap de b. E.

14. *Der gelbbäuchige Baumläufer, aus Indien.*

Muſ. Carlſ. Faſc. II. Tab. 35. Certhia lepida.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 144. *der nette Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 610. n. 69. *der nette Baumläufer.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. n. 54. *der gelbbäuchige Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 131. Yellow-bellied Creeper.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 298. n. 60. Certhia (Lepida) violaceo-nitens subtus flava, sincipite viridi, lateribus colli striga longitudinali virescente alteraque violacea, gula rubrofusca.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 209. Tab. 116. fig. 1. Grimpereau de Malacca.

β. C. violaceo-purpurea, subtus flava, genis fuscovirescentibus, gula iuguloque rubentibus.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 60. β.

15. *Der gelbrückige Baumläufer aus China.*

Latham, Syn. Supplem. p. 132. n. 56. Orange-backed Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 56. *der gelbrückige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 61. Certhia (Cantillans) caerulescente-grisea, dorso supremo macula corporeque subtus flavo.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 210. Tab. 117. fig. 2. Grimpereau siffleur de la Chine.

16. *Der gebüschelte Baumläufer aus Bengalen.*

Latham, Syn. Supplem. p. 132. n. 57. Tufted Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 57. *der gebüschelte Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 299. n. 62. Certhia (Cirrhata) olivacea, abdomine caudaque nigris, lateribus pectoris cirrho flavo.

17. *Der rothschnäblige Baumläufer aus Indien.*
Latham, Syn. Supplem. p. 133. n. 58. Red-billed Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 58. *der rothschnäblige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 63. Certhia (Erythrorynchos) olivacea, corpore subtus albo, alis caudaque nigricantibus, rostro rubro.

18. *Der gelbflügelige Baumläufer aus Bengalen.*
Latham, Syn. Suppl. p. 133. n. 59. Yellow-winged Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 59. *der gelbflügelige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 64. Certhia (Chrysoptera) nigricante aureoque varia, tectricibus alarum flavis, remigibus caudaque nigris.

19. *Der langschnäblige Baumläufer in Bengalen.*
Latham, Syn. Suppl. p. 133. n. 60. Long-billed Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 60. *der langschnäblige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 65. Certhia (Longirostris) olivaceo-nigricans, vertice nuchaque pallide viridibus, iugulo pectoreque albis, abdomine flavescente.

20. *Der streifschwänzige chinesische Baumläufer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 133. n. 61. Barred-tail Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 61. *der streifschwänzige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 300. n. 66. Certhia (Grisea) cinereo-grisea, subtus rufescens, cauda

cauda cuneiformi, rectricibus duabus intermediis fuscis, lateralibus griseis, omnibus ad apicem fascia nigra.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 210. Tab. 117. fig. 3. Grimpereau gris de la Chine.

21. *Der eherne Baumläufer in Westindien.*

Mus. Carls. Fasc. IV. Tab. 78. Certhia aenea.

Latham, Vögel, I. 2. p. 612. n. 74. *der eherne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 300. n. 68. Certhia (Aenea) ex viridi orichalcea, alis fuliginosis, cauda atro-nitente, rostro pedibusque nigris.

22. *Der blaukehlige Baumläufer auf Martinique.*

Mus. Carls. Fasc. IV. Tab. 79. Certhia Gularis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 612. n. 75. *der blaukehlige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 300. n. 69 Certhia (Gularis) corpore cinereo-olivacea, subtus lutea, gula, iugulo pectorisque parte superiore sericeo-caeruleis.

23. *Der Bastardbaumläufer in Amerika.*

Mus. Carls. Fasc. IV. Tab. 80. Certhia trochilea.

Latham, Vögel, I. 2. p. 613. n. 77. *der Bastardbaumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 300. n. 70. Certhia (Trochilea) supra fusco-olivacea, subtus ex flavescenti sordide alba, cauda nigra, alis fuliginosis.

24. *Der grünflügelige surinamische Baumläufer.*

Mus. Carls. Fasc. IV. Tab. 81. Certhia prasinoptera.

Latham, Vögel, I. 2. p. 613. n. 76. *der grünflügelige Baumläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 300. n. 71. Certhia (Praſinoptera) nigra, collo anterius purpureo, alis et cauda chryſo-praſinis.

66. GESCHLECHT. Trochilus. *Der Kolibri. (Honigſauger, Blumenſpecht, Ananasvogel.)*

Müller, Naturſyſt. II. p. 262. Gen. LXVI.

Leske, Naturgeſch. p. 252. Gen. XXXV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 156. Gen. XXIV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 170. Gen. XVI.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 375. Gen. XXIII.

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. II. p. 170. Gen. XXIII.

Funke, Naturgeſch. I. p. 336.

Ebert, Naturl. II. p. 64.

Halle, Vögel, p. 496. Gen. IV.

Pennant, arct. Zool. II. p. 269.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 189.

Onomat. hiſt. nat. II. p. 54. III. p. 133. VII. p. 581.

Klein, av. p. 104. Gen. XIV. Melliſuga.

Briſſon, ornith. II. p. 20. Gen. XLIV. Polytmus. p. 29. Gen. XLV. Melliſuga.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 170 ff.

Batſch, Thiere, I. p. 310. Gen. LXII.

Latham, allgem. Ueberſ. der Vögel, I. 2. p. 614. Gen. XXIX.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 301. Gen. XXX.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 206.

Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 252. Gen. XXVII.

* *Mit krummen Schnäbeln.*

1. PARADISEUS. *Der Paradieskolibri.*

Müller, Naturſ. II. p. 263. n. 1. *Paradies-Colibri.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 158. n. 2. *der Paradies-Kolibri.*

Klein, av. p. 107. n. 5. Falcinellus criſtatus.

Klein, Vorb. p. 198. n. 5. *gehaubte Baumklette.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 8. *gehaubte Baumklette.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 28. n. 16. Colibri rouge hupé à longue queue du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 257. *der gehaubte Kolibri;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 615. n. 1. *der Paradies-Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 301. n. 1. Trochilus (Paradiſeus) curviroſtris ruber, alis caeruleis, capite criſtato, rectricibus intermediis longiſſimis.

Batſch, Thiere, I. p. 315. *der Paradieskolibri.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 1. Trochilus (Paradiſeus) curviroſtris ruber, alis caeruleis, capite criſtato, rectricibus duabus longiſſimis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 253. n. 1. *der Paradieskolibri.*

23. GALERITUS. *Der goldfleckige Haubenkolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 283. *der gehaubte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. n. 30. *der goldfleckige Haubenkolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 304. n. 10. Trochilus (Galeritus) curvir. viridi-aureus, remigibus rectricibusque fuſcis, criſta purpurea.

24. EXILIS. *Der kleine Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 284. *der schwarze Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2, p. 627. n. 29. *der kleine Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 310. n. 32. Trochilus (Exilis) curvir. viridi-fuscus rubro nitens, capite crista viridi-nitente apice aurato, remigibus caudaque nigris.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 100. *der schwarze Kolibri.*

2. PELLA. *Der Topaskolibri.*

Müller, Natursyst. II. p. 264. n. 2. *Surinamischer.*

Onomat. hist. nat. II. p. 57. *das langgeschwänzte rothe Colibritchen.*

Klein. av. p. 108. n. 15. Falcinellus gutture viridi.,

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 15. *grünkehlige Klette.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 111. n 18. *grünkehlige Klette.*

Brisson, ornithol. II. p. 27. n. 15. Colibri rouge à longue queue de Surinam.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 242. *der Topaskolibri;* mit 1 Figur.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 63. *das langgeschwänzte rothe Colibritchen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 615. n. 2. *der Topaskolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 302. n. 2. Trochilus (Pella) curvirostris ruber, rectricibus intermediis longissimis, corpore rubro, capite fusco, gula aurata uropygioque viridi.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 178. *der große Kolibri.*

Linné,

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 3. Trochilus (Pella) curviroſtris, rectricibus intermediis longiſſimis, corpore rubro, gula aurata uropygioque viridi.

3. Superciliosus. *Der cayenniſche Kolibri.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 364. n. 3. *Cajenniſcher.*

Briſſon, ornithol. II. p. 26. n. 13. Colibri à longue queue de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 247. *der weiſsfädigte Kolibri;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 616. n. 3. *der cayenniſche Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 302. n. 3. Trochilus (Superciliosus) curviroſtris, fuſcus, nitens, rectricibus intermediis longis, abdomine ſubincarnato ſuperciliis albis.

25. Cyanurus. *Der blauſchwänzige Kolibri.*

Halle, Vögel, p. 502. n. 561. *der grüne Kolibriſpecht mit zwey langen Federn im Schwanze.* Fig. 39.

Klein, av. p. 107. n. 4. Falcinellus novae Hiſpaniae, cauda bipenni longa.

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 4. *blaulichte Baumklette mit zwo langen Schwanzfedern aus Neuſpanien.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 7. *blauliche Baumklette.*

Briſſon, ornithol. II. p. 27. n. 14. Colibri à longue queue du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 251. *der Blauſchwanz;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 617. *der blauſchwänzige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 303. n. 5. Trochilus (Cyanurus) curvir. viridis, ſubtus cinereo-griſeus, capite anteriore, collo inferiore rectricibusque duabus intermediis longiſſimis caeruleis.

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. Curruca.

4. POLYTMUS. *Der ſchwarzköpfige Kolibri.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 205. n. 4. *Langſchwanz.*

Klein, av. p. 108. n. 17. Falcinellus cauda 7. unciarum.

Klein, Vorbereit. p. 201. n. 17. *ſchwarzplattige grüne Klette.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 111. n. 20. *ſchwarzplattige grüne Klette.*

Halle, Vögel, p. 506. n. 573. *der grüne Kolibriſpecht mit ſchwarzer Platte, und langer Schwanzſchleppe.*

Onomat hiſtor. nat. II. p. 54. *das langgeſchwänzte Colibritchen, mit ſchwarzer Platte.*

Briſſon, ornithol. II. p. 40. n. 19. Oiſeau-mouche à tête noire et queue fourchue de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 234. *der Fliegenvogel mit langem ſchwarzen Schwanze;* m. 1 F.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 67. *das langgeſchwänzte Colibritchen mit ſchwarzer Platte.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 616. n. 4. *der ſchwarzköpfige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 302. n. 4. Trochilus (Polytmus) curvir. vireſcens, rectricibus lateralibus longiſſimis, pileo rectricibusque fuſcis.

Bankroft, Naturgeſchichte von Guiana, p. 101. *der langſchwänzige ſchwarzkuppige Colibri.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 4. Trochilus (Polytmus) curvirostris, rectricibus lateralibus longissimis, corpore virescente, pileo rectricibusque fuscis.

Gentl. Magazin, XX. Tab. p. 121.

β. Tr. virescens, subtus albus, vertice fusco, rectricibus aequalibus, apice late albis. (Femina?) *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 303. n. 4. β.

5. Forficatus. *Der große gabelschwänzige Kolibri.*

Müller, Naturfystem, II. p. 265. n. 5. *Gabelschwanz.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 157. n. 1. *der gabelschwänzige Kolibri.* Tab. 24.

Klein, av. p. 108. n. 16. Falcinellus vertice caudaque cyaneis.

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 16. *blaukappige grüne Klette.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 111. n. 19. *blaukappige grüne Klette.*

Onomat. histor. nat. II. p. 63. *das grüne Colibritchen mit langem Schwanz.*

Brisson, ornithol. II. p. 39. n. 18. Oiseau-mouche à queue fourchue de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 232. *der langschwänzige Fliegenvogel, oder das grün und blaue Gold;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 65. *das grüne Colibritchen mit langem Shhwanz.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 617. n. 6. *der große gabelschwänzige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 303. n. 7. Trochilus (Forficatus) curvirostris viridis, rectricibus

cibus lateralibus longiſſimis, pileo rectricibusque caeruleis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 5. Trochilus (Forficatus) curviroſtris, rectricibus lateralibus longiſſimis, corpore viridi, pileo rectricibusque caeruleis.

26. FURCATUS. *Der kleine gabelſchwänzige Kolibri.*

Briſſon, ornithol. II. p. 40. n. 20. Oiſeau-mouche violet à queue fourchue de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 230. *der violette Fliegenvogel mit dem Gabelſchwanze.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 618. n. 7. *der kleine gabelſchwänzige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 304. n. 8. Trochilus (Furcatus) curvir. caeruleo-violaceus, vertice, collo uropygioque viridi-aureis, remigibus rectricibusque nigris, cauda bifurca.

27. MACROURUS. *Der cayenniſche gabelſchwänzige Kolibri.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 39. n. 17. Oiſeau-mouche à queue fourchue de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 227. *der Fliegenvogel mit dem langen Schwanze, von der Farbe eines angelaufenen Stahls.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 618. n. 8. *der cayenniſche gabelſchwänzige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 304. n. 9. Trochilus (Forcipatus) curvir. viridi-aureus, capite colloque violaceis, abdomine macula alba, cauda chalybea bifurca.

28. PURPURATUS. *Der purpurköpfige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 286. *der purpurköpfige Kolibri.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 627. n. 27. *der purpurköpfige Kolibri.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 309. n. 29. Trochilus (Torquatus) curvirostris viridis, vertice purpureo, collo inferiore annulo caeruleo, cauda bifurca purpurea.

29. Auratus. *Der granatkehlige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 619. n. 9. *der granatkehlige Kolibri.* Tab. 36. fig. 1.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 305. n. 11. Trochilus (Granatinus) curvir. viridis, subtus nigricans, gula iuguloque granatinis.

β. *Büffon*, Vögel, XVIII. p. 246. *der Granat.*
Latham, Syn. II. p. 753. n. 9. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 619. n. 9. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 305. n. 11. β.

6. Leucurus. *Der weißschwänzige Kolibri.*

Müller, Natursyst. II. p. 266. n. 6. *Weißschwanz.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 168. *weißschwänzige Baumklette.*
Brisson, ornithol. II. p. 22. n. 5. Colibri de Surinam.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 269. *die rothe Halsbinde.*
Seligmann, Vögel, VII. Tab. 46. *das Colibritchen mit weißem Schwanze.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 622. n. 17. *der weißschwänzige Kolibri.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 307. n. 19. Trochilus (Leucurus) curvir. viridi-aureus, rectricibus aequalibus albis, collari rubro.

30. Gra-

30. GRAMINEUS. *Der schwarzbrüstige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 267. *der grüne Halskragen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 622. n. 16. *der schwarzbrüstige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 306. n. 18. Trochilus (Pectoralis) curvir. viridis nitens, collo inferiore viridi, pectore nigro, abdomine albo, cauda chalybeo-purpurascente.

31. VIOLACEUS. *Der violette Kolibri.*

Brisson, ornithol. II. p. 25. n. 11. Colibri violet de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 265. *der violette Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 622. n. 15. *der violette Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 306. n. 17. Trochilus (Violaceus) curvir. atro-violaceus, gutture pectoreque violaceo-nitentibus, alis caudaque viridi-aureis, rectricibus atro contaminatis.

32. MACULATUS. *Der grünkehlige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 261. *der Kolibri mit dem grünen Halskragen;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 621. n. 14. *der grünkehlige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 306. n. 16. Trochilus (Gularis) curvir. viridi-aureus, collo subtus smaragdino, lateribus rufo, abdomine albo, pectoris macula nigra.

33. PUNCTULATUS. *Der gefleckte Kolibri.*

Brisson, ornitholog. II. p. 21. n. 2. Colibri piqueté.

Büffon,

Büffon, Vögel, XVIII. p. 249. *der Zitzil, oder getupfte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 621. n. 13. *der gefleckte Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 306. n. 15. Trochilus (Punctulatus) curvir. viridi-aureus, tectricibus alarum colloque inferiore albo-maculatis, rectricibus fusco-virescentibus, apice albis.

34. ALBUS. *Der violetschwänzige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 259. *der Kolibri mit dem violetten Schwanze;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 620. n. 11. *der violetschwänzige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 305. n. 13. Trochilus (Nitidus) curvir. viridi-auratus, subtus albus, gula media fusco-viridi, cauda violacea, rectricibus tribus exterioribus apice albis.

7. JUGULARIS. *Der rothbrüstige Kolibri.*

Müller, Natursystem, II. p. 266. n. 7. *Rothhals.* Tab. 8. fig. 10.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 263. *der Kolibri mit der karminfarbenen Kehle;* m. 1 F.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 56. fig. 1. *der Colibri mit rother Brust;*

Latham, Vögel, I. 2. p. 620. n. 10. *der rothbrüstige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 305. n. 12. Trochilus (Iugularis) curvir. caerulescens, rectricibus aequalibus, genis colloque subtus sanguineis.

35. AURANTIUS. *Der orangenköpfige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 287. *der pomeranzenfarbige Honigsauger.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 627. n. 28. *der orangenköpfige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 310. n. 30. Trochilus (Aurantius) curvir. fuscus, capite aurantio, gutture pectoreque flavis, alis purpureis, cauda ferruginea.

36. FLAVIFRONS. *Der gelbstirnige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 288. *der gelbstirnige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 627. n. 26. *der gelbstirnige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 309. n. 28. Trochilus (Flavifrons) curvir. viridis, sincipite flavo, remigibus rectricibusque nigris.

8. THAUMANTIAS. *Der Wunderkolibri.*

Müller, Natursyst. II. p. 266. n. 8. *Joli.*

Halle, Vögel, p. 508. n. 580. *der goldgrüne Kolibrispecht, Spitze des Schwanzes weiß.*

Klein, av. p. 106. n. 3. Mellisuga Ronkje dicta.

Klein, Vorbereit. p. 196. n. 3. *der Honigsauger Ronkje.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 108. n. 3. *Ronkje.*

Brisson, ornitholog. II. p. 20. n. 1. Colibri.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 280. *der kleine Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 626. n. 25. *der Wunder-Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 309. n. 27. Trochilus (Thaumantias) curvir. viridis nitens, rectricibus aequalibus albo fimbricatis, extima exterius alba.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 2. Trochilus viridescens.

Jonston, av. p. 193. Guainumbi sexta species.

Moehring, av. gen. p. 39. Troglodytes.

9. Do-

9. DOMINICUS. *Der Kolibri von St. Domingo.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 267. n. 9. *Domingiſcher.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 276. *der perlfarbene und grüne Kolibri;* mit 1 Fig.

Briſſon, ornitholog. II. p. 22. n. 4. Colibri de S. Domingue.

Latham, Vögel, I. 2. p. 626. n. 24. *der Kolibri von St. Domingo.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 309. n. 26. Trochilus (Dominicus) curvir. viridis nitens, ſubtus ſubcinereus, rectricibus medio ferrugineis, apice albis.

37. VENUSTISSIMUS. *Der blaue Kolibri.*

Halle, Vögel, p. 502. n. 599. *der blaue Kolibriſpecht.*

Klein, av. p. 107. n. 2. avicula cyaneo colore venuſtiſſima.

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 2. *blaue Baumklette.*

Klein, verbeſſ. Vögelh. p. 110. n. 4. *blaue Baumklette.*

Briſſon, ornith. II. p. 24. n. 9. Colibri bleu du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 274. *der blaue Kolibri;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 626. n. 33. *der blaue Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 309. n. 25. Trochilus (Cyaneus) curvir. coccineo - ſericeus, dorſo caeruleo, alis nigris.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. Troglodytae adfinis.

38. MARGARITACEUS. *Der grauhälſige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 273. *das weiße Bruſtſtück.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 625. n. 22. *der grauhälſige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 308. n. 24. Trochilus (Margaritaceus) curvir. viridis nitens, ſubtus margaritaceo-canus, cauda baſi chalybea, medio purpureo-fuſca, ad apicem faſcia fuſca apice alba.

39. Hirsutus. *Der rothbäuchige Kolibri.*

Halle, Vögel, p. 508. n. 597. *der ſchwarze Kolibriſpecht.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 21. n. 3. Colibri du Bréſil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 278. *der Kolibri mit gelbröthlichem Bauch.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 625. n. 21. *der rothbäuchige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 308. n. 23. Trochilus (Braſilienſis) curvir. viridi-aureus, ſubtus albo-rufeſcens, cauda nigricante-viridi apice albo, tibiis pennatis.

Jonſton, av. p. 193. Guainumbi quarta ſpecies.

β. *Latham*, Syn. II. p. 761. n. 21. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 625. n. 21. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 308. n. 23. β. Tr. viridi-aureus, ſubtus rufus, ſub oculis vitta flaveſcente-alba, poſtice dilatata, rectricibus nigricantibus apice albis, lateralibus dimidiato-rufis.

40. Multicolor. *Der vielfarbige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 289. *der vielfarbige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 624. n. 20. *der vielfarbige Kolibri.*

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 308. n. 22. Trochilus (Multicolor) curvir. fuſcus, abdomine rubro, vertice, gula, pectore dorſoque medio viridibus, vitta per oculos ad nucham caerulea, poſtice nigro marginata.

41. Cinereus. *Der grauſchnäblige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 290. *der aſchgraue Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 624. n. 19. *der grauſchnäblige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 308. n. 21. Trochilus (Cinereus) curvir. viridis, nitens, ſubtus cinereus, rectricibus lateralibus nigris, tribus extimis chalybeis, apice albo.

10. Mango. *Der mexikaniſche Kolibri.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 267. n. 10. *der Rieſe.* Tab. 8. fig. 13.

Halle, Vögel, p. 507. n. 576. *der grüne Kolibriſpecht mit ſchwarzem Bauche und gelben Schultern.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 24. n. 8. Colibri de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 271. *das ſchwarze Bruſtſtück;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 623. n. 18. *der mexikaniſche Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 307. n. 20. Trochilus (Mango) curvir. viridis nitens, ſubtus ater, rectricibus ſubaequalibus ferrugineis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 16. Trochilus (Mango) rectricibus ſubaequalibus ferrugineis, corpore teſtaceo, abdomine atro.

Jonſton, av. p. 193. Guainumbi quinta ſpecies.

β. *Latham*, Syn. II. p. 759. n. 18. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 623. n. 18. Var. A.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 307. n. 20. β. Tr. curviroſtris, viridis nitens, collo inferiore purpureo-nitente, medio atro, abdomine nigricante, criſſo lateribus atro, rectricibus lateralibus purpureis, apice nigro marginatis.

γ. Tr. curviroſtris fuſco-viridis, collo inferiore viridi, pectore abdomineque violaceis, criſſo albo, rectricibus lateralibus purpureis, apice nigro marginatis. *
Latham, Syn. Suppl. p. 135. n. 18. B.
Latham, Vögel, I. 2. p. 624. n. 18. Var. B.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 307. n. 20. γ.

*11. Holosericeus. *Der ſchwarzbäuchige Kolibri.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 267. n. 11. *Sammetvogel.* Tab. 8. fig. 11.
Borowſky, Thierreich, II. p. 158. n. 3. *der Sammetvogel.*
Halle, Vögel, p. 502. n. 560. *der Regenbogenſpecht.*
Onomat. hiſtor. nat. II. p. 62. *das grüne Colibritchen mit ſchwarzem Bauch.*
Klein, av. p. 107. n. 3. avis Auricoma, nec vel Apellea manu imitabilis.
Klein, Vorber. p. 198. n. 3. *unbeſchreibliche Baumklette.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 5. *unbeſchreibliche Baumklette.*
Klein, av. p. 108. n. 18. Falcinellus ventre nigricante, cauda brevi aequabili.
Klein, Vorbereit. p. 201. n. 18. *Klette mit ſchwarzem Unterleibe;* u. ſ. w.

Klein,

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 111. n. 21. *Schwarzbrüſtlein.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 23. n. 7. Colibri du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 254. *der grün und ſchwarze Kolibri.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 71. *das grüne Colibritchen mit ſchwarzem Bauch.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 620. n. 12. *der ſchwarzbäuchige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 305. n. 14. Trochilus (Holoſericeus) curvir. viridis, rectricibus aequalibus ſupra nigris, faſcia pectorali caerulea, abdomine nigro.

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 102. *der ſchwarzbäuchichte amerikan. Colibri.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 9. Trochilus (Holoſericeus) curviroſtris, rectricibus aequalibus ſupra nigris, corpore ſupra viridi, pectore caeruleo, abdomine nigro.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. Troglodytae adfinis.

42. GULARIS. *Der blaukehlige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 291. *der blaukehligte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. n. 31. *der blaukehlige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 310. n. 31. Trochilus (Gularis) curvir. flaveſcens, gula uropygioque caeruleis, abdomine albo, alis caudaque nigris.

43. FULVUS. *Der brandgelbe Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 292. *der brandgelbe Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. *der brandgelbe Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 287. n. 20. Certhia (Fulva) fulva, remigibus rectricibusque atris, ſubſus fuſceſcentibus.

44. VARIUS. *Der bunte Kolibri.* (10)

Büffon, Vögel, XVIII. p. 293. *der bunte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. n. 33. *der bunte Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 287. n. 18. δ. Certhia viridi-aurea, ſubtus fuſco-albicans, faſcia pectorali duplici ex viridi cyanea et ſanguinea.

** *Mit geraden Schnäbeln.*

66. CAPENSIS. *Der capſche Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 294. *der Kolibri vom Vorgeb. der guten Hoffnung.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 629. n. 34. *der capſche Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 303. n. 6. Trochilus (Capenſis) curviroſtris (?) viridis, rectricibus intermediis longis, tectricibus alarum caeruleis.

12. COLUBRIS. *Der gemeine Kolibri.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 268. n. 12. *Goldkehle.*

Leſke, Naturgeſch. p. 253. *der gemeine Kolibri.* Tab. 6. fig. 4.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 376. n. 1. *der gemeine Kolibri.*

Ebert, Naturl. II. p. 65. Tab. 25.

Halle, Vögel, p. 500. n. 554. *der grüne Kolibri mit ſcharlachrother Kehle.* Fig. 38.

Pennant,

(10) Nach *Latham* eine Varietät von *Certhia Afra*, p. 476. n. 11.

Pennant, arct. Zool. II. p. 269. n. 92. *die Rothkehle.*

Onomat. hist. nat. II. p. 59. *das rothbrüstige Colibritchen.*

Klein, av. p. 106. n. 5. Mellisuga pectore rubro.

Klein, Vorbereit. p. 196. n. 5. *rothbrüstiger Honigsauger.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 108. n. 5. *Rothbrüstlein.*

Klein, av. p. 105. n. 1. Mellisuga, Colibris.

Klein, Vorbereit. p. 195. n. 1. *Kolibritchen aus Carolina.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 107. n. 1. *carolinisches Colibritchen.*

Brisson, ornithol. II. p. 36. n. 13. Oiseau-mouche à gorge rouge de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVIII p. 185. *der Rubin*; m. 1 F.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 75. *das rothbrüstige Kolibritchen.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 30. *das Colibritchen, Summvöglein.*

Gesner, Vögelb. p. 477. *Spatz, so Muscatus genannt wird.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 632. n. 40. *der gemeine Colibri.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 312. n. 38. Trochilus (Colubris) rectirostris, viridi-aureus, rectricibus nigris, lateralibus tribus ferrugineis, apice albis, gula flammea. (Mas.)

Linné, auserles. Abh. II. p. 279. n. 4. *Colibri.*

Berlin. Samml. IV. p. 274. *der Kolibri.*

Valentin. mus. museor. II. p. 154. *Colibri.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 120. n. 6. Trochilus (Colubris) rectricibus nigris, lateralibus tribus apice albis, gula rubra.

Charlevoix, hiſt. de la nouv. France, III. p. 158.
Le Clercq, nouv. relat. de la Gaſpeſie, p. 486. Nirido.
Philoſ. Transact. XVII. p. 760. 815.
Gentl. Magaz. XX. Tab. p. 175.
Hiſt. de St. Domingue. Par. 1730. I. p. 31.

β. Tomineo. *Müller*, Naturſyſt. II. p. 268. ad n. 12.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 312. n. 38. β. Tr. rectricibus ſubaequalibus, baſi ferrugineis, apice albis, corpore ſupra fuſco, ſubtus albido. (Femina.)
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 11. Trochilus (Tomineo) rectricibus ſubaequalibus baſi ferrugineis, apice albis, corpore ſupra fuſco, ſubtus albo.

45. Fimbriatus. *Der bunthälſige Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 219. n. 16. *der Fliegenvogel mit der gefleckten Kehle.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 33. n. 7. Oiſeau-mouche à gorge tachetée de Cayenne.
Latham, Vögel, I. 2. p. 634. n. 41. *der bunthälſige Kolibri.*
Latham, Syſt. ornith. I. p. 312. n. 39. Trochilus (Fimbriatus) rectir. viridi-aureus, pennis gulae iugulique albo fimbriatis, ventre cinereo, rectricibus nigro-chalybeis, lateralibus apice griſeis.

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 634. n. 41. Var. A.
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 313. n. 41. β. Tr. rectiroſtris viridi-aureus, ſubtus albus, pennis pectoris griſeo-marginatis, rectricibus totis vireſcente nigris.

46. Ru-

46. Rubineus. *Der Rubin-Kolibri.*

Brisson, ornithol. II. p. 37. n. 14. Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 220. *der Smaragdrubin.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 631. n. 39. *der Rubin-Kolibri.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 312. n. 37. Trochilus (Rubineus) rectir. viridi-aureus gutture rubino nitente, rectricibus rufis, exterius apiceque fusco-viridi-aureo fimbriatis.

47. Auritus. *Der Ohrenkolibri.*

Brisson, ornithol. II. p. 38. n. 15. grand Oiseau-mouche de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 221. *der Fliegenvogel mit Ohren;* m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 631. n. 38. *der Ohrenkolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 311. n. 36. Trochilus (Auritus) rectir. viridi-auratus, subtus albus, taenia infra oculos nigra, macula aurium fasciculari violacea, rectricibus quatuor intermediis nigro-caeruleis, lateralibus albis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 768. n. 33. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 631. n. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 311. n. 36. β. Tr. rectirostris viridis, subtus albus, infra oculos fascia purpurea, postice dilatata, alteraque ad latera colli viridi-caerulea.

13. Ourissia. *Der blaubrüstige Kolibri.*

Müller, Natursyst. II. p. 268. n. 13. *Blaubauch.*

Onomat. histor. nat. II. p. 62. *das grünblaue Colibritchen.*

Klein, av. p. 106. n. 6. Mellisuga alis fuscis.
Klein, Vorbereit. p. 196. n. 6. *Honigsauger mit braunen Flügeln.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 109. n. 6. *Braunflügel.*
Brisson, ornithol. II. p. 34. n. 10. Oiseau-mouche à poitrine bleue de Surinam.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 213. *der Amethist-smaragd;* m. 1 F.
Seligmann, Vögel, II. Tab. 69. *das grüne und blaue Colibritchen.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 630. n. 37. *der blaubrüstige Kolibri.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 311. n. 35. Trochilus (Ourissia) rectir. viridi auratus, rectricibus subaequalibus fusco-aureis, remigibus nigris, abdomine caeruleo.

β. *Latham*, Syn. II. p. 767. n. 32. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 630. n. 37. Var. A.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 311. n. 35. β. Tr. rectirostris viridis, subtus caeruleus, gula aurantia, remigibus rectricibusque fuscis.

14. Moschitus. *Der Juwelenkolibri.*
Müller, Natursystem, II. p. 269. n. 14. *Rothschwanz.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 171. n. 2. Trochilus (Mosquitus) viridescens, vertice purpureo-aurato, gutture auroreo-rutilo; *der Juwelen-Colibrit.*
Halle, Vögel, p. 500. n. 553. *der schwarze kleinste Kolibri.*
Halle, Vögel, p. 499. n. 551. *der Regenbogenvogel.*
[*Klein*, av. p. 105. n. 2. Mellisuga, Thaumantias americana.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 195. n. 2. *Kurassauer aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 108. n. 2. *Curassauer.*] Mit mehrern andern verwechselt.

Brisson, ornithol. II. p. 30. n. 3. Oiseau-mouche, à gorge topaze du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 195. *der Topasrubin.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 638. n. 51. *der rubinköpfige Kolibri.* Tab. 25. fig. 2.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 316. n. 49. Trochilus (Moschitus) rectir. viridi-aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis, extimis apice fuscis, remigibus nigris.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 102. *der Colibri mit eisenfarbigem Schwanz.*

Fermin, Beschr. v. Surinam, II. p. 179. *die dritte Art Kolibri.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 8. Trochilus (Mosquitus) rectricibus aequalibus ferrugineis, extimis apice fuscis, corpore nigro-aureo, remigibus nigris.

Jonston, av. p. 193. Guainumbi octava species.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 253. n. 2. *der Juwelenkolibri.*

15. Mellisugus. *Der goldgrüne cayennische Kolibri.*

Müller, Natursyst. II. p. 269. n. 15. *Honigsauger.* Tab. 28. fig. 7.

Halle, Vögel, p. 499. n. 552. *der ganz grüne Kolibri mit braunen Flügeln.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 68. n. 87. *der Honigsauger.*

Brisson, ornitholog. II. p. 32. n. 6. Oiseau-mouche de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 216. *das vergoldete Grün;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 634. n. 42. *der goldgrüne cayennische Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 313. n. 40. Trochilus (Mellisugus) rectir. viridi-aureus, rectricibus aequalibus chalybeo-caeruleis, remigibus atro-caerulescentibus, tibiis pennatis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X., I. p. 121. n. 10. Trochilus (Mellisugus) rectricibus aequalibus caeruleis, corpore viridi-aureo, remigibus atro-caerulescentibus.

Jonston, av. p. 193. Guainumbi nona species.

16. Pegasus. *Der rauchfüßige Kolibri.*

Müller, Natursyst. II. p. 269. n. 16. *der Federfuß.*

Brisson, ornithol. II. p. 34. n. 9. Oiseau-mouche à ventre gris de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 209. *(Als das Weibchen von Trochilus Leucogaster.)*

Latham, Vögel, I. 2. p. 638. n. 49. *der rauchfüßige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 315. n. 47. Trochilus (Pegasus) rectir. rectricibus basi virescentibus, corpore virescente aureo, subtus subgriseo, tibiis pennatis.

49. Leucogaster. *Der goldkehlige Kolibri.*

Halle, Vögel, p. 498. n. 548. *der grüne Kolibri.*

Brisson, ornithol. II. p. 33. n. 8. Oiseau-mouche à ventre blanc de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 208. *die vergoldete Halskrause.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 637. n. 48. *der goldkehlige Kolibri.*

Latham,

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 315. n. 46. Trochilus (Leucogaſter) rectir. viridi auratus, ſubtus albus, gula inaurata.
Jonſton, av. p. 191. Guainumbi prima ſpecies.
Muſ. Wormian. p. 298. avicula minima; mit *Marcgr.* Fig.
Sloane, Jam. p. 308. n. 39. *larger Humming-bird?* Tab. 264. fig. 2. ſchl.

49. Striatus. *Der geſtreifte Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 295. *der geſtreifte Kolibri.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 47. *der geſtreifte Kolibri.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 314. n. 45. Trochilus (Hypophaeus) rectir. fuſco-aureus, ſubtus albidus, vertice fuſco, medio gulae ſtriga longitudinali viridi-aurea.

β. Tr. rectir. fuſco-aureus, pileo fuſco, medio gulae ſtriga longitudinali fuſca, rectricibus lateralibus apice albo marginatis. *
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 214. n. 45. β.

γ. Tr. rectir. fuſco-aureus, pileo fuſco-vireſcente, ſuperciliis rufis, ſtriga gulari obſcura, uropygio criſſoque rufeſcentibus. *
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 314. n. 45. β.

50. Obscurus. *Der dunkelköpfige Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 296. *der dunkelfarbige Kolibri.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 46. *der dunkelköpfige Kolibri.*
Latham, Syſt. ornithol. I. p. 314. n. 44. Trochilus (Obſcurus) rectir. cyaneus, pileo nigricante, gula, iugulo dorſoque medio viridibus.

51. Bicolor. *Der Saphir- und Smaragd-Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 211. *der Smaragdsaphir.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 45. *der Saphir- und Smaragd-Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 314. n. 43. Trochilus (Bicolor) rectir. saturate viridi-auratus, capite colloque inferiore sapphirinis.

52. Saphirinus. *Der Saphir-Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 210. *der Saphir.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 635. n. 44. *der Saphir-Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 313 n. 42. Trochilus (Sapphirinus) rectir. viridi-auratus, subtus albus, collo inferiore violaceo-sapphirino, gula caudaque rufis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 775. n. 39. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 45. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 314. n. 42. β. Trochilus rectir. pectore sapphirino, abdomine albo, cauda caeruleo-atro nitente.

17. Niger. *Der schwarze Kolibri.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 269 n. 17. *der Schwarze.*

Brisson, ornitholog. II. p. 32. n. 5. Oiseau-mouche de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 217.

Latham, Vögel, I. 2. p. 635. n. 43. *der schwarze Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 313. n. 41. Trochilus (Niger) rectir. rectricibus subaequalibus, corpore

(1) Nach *Büffon* das Weibchen von *Trochilus Mellisugus*. p. 294. n. 15.

corpore nigro ſubtus aurato, criſſo albo, tibiis pennatis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 13. Trochilus (Niger) rectricibus ſubaequalibus, corpore nigro ſubtus aurato, ano albo.

53. Cyanocephalus. *Der blauköpfige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 297. *der blauköpfige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 646. n. 67. *der blauköpfige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 319. n. 63. Trochilus (Cyanocephalus) rectir. viridi aureus, capite, remigibus rectricibusque caeruleis, abdomine rubro.

54. Amethystinus. *Der Amethyſt-Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 189. *der Amethiſt.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 645. n. 64. *der Amethyſt Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 319. n. 62. Trochilus (Amethyſtinus) rectir. viridi aureus, ſubtus griſeo fuſcoque varius, gula colloque inferiore amethyſtinis, cauda forcipata.

55. Viridissimus. *Der goldgrüne Kolibri.*(2)

Büffon, Vögel, XVIII. p. 191. *der goldgrüne Fliegenvogel.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 50. fig. 3. *der ganz grüne Colibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 644. n. 63. *der goldgrüne Kolibri.*

Latham,

(2) In der XIIten Edition hat *Linné Edwards*, *All-green Humming-bird* mit zu ſeinem *Trochilus Melliſugus* gerechnet. *Latham* nimmt ihn als eine Spielart von *Troch. viridiſſimus* an. Syſt. ornithol. loc. cit. *Trochilus rectir. viridi-aureus, ſubtus caeruleſcens.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 619. n. 61. Trochilus (Viridissimus) rectir. viridis vividissimus inauratus, abdomine albo, cauda chalybea.

56. GLAUCOPIS. *Der blaustirnige Kolibri.* (3)

Halle, Vögel, p. 498. n. 549. *der ganz grüne Kolibri mit kürzerm Schnabel.*

Brisson, ornithol. II. p. 38. n. 16. Oiseau-mouche à queue fourchue du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 132. n. 3.

Latham, Vögel, I. 2. p. 644. n. 62. *der blaustirnige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 318. n. 60. Trochilus (Frontalis) rectir. viridi-auratus, fronte violaceo-caerulea, femoribus fuscis, crisso albo, rectricibus chalybeis.

Jonston, av. p. 191. Guainumbi secunda species.

57. RUFUS. *Der Kragenkolibri.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 272. n. 93. *der Kragenkolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 298. *der Kragenkolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 643. n. 61. *der Kragen-Kolibri.* Tab. 37.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 318. n. 59. Trochilus (Collaris) rectir. rufo-testaceus, subtus rufescente-albus, vertice viridi-aureo, gula flammeo-rubra, lateribus pennis elongatis.

58. ORNATUS. *Der geputzte Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 193. *das Halsbüschchen*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 643. n. 60. *der geputzte Kolibri.*

Latham,

(3) Nach *Büffon* eine Spielart von *Trochilus viridissimus*, n. 55.

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 318. n. 58. Trochilus (Ornatus) rectr. viridi-aureus, ſubtus fuſco-aureus, criſta rufa, abdomine infimo vittaque transverſa uropygii albis, infra aures utrinque pennis 6. ſ. 7. elongatis rufis, apice macula viridi.

59. Puniceus. *Der braune Haubenkolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 300. *der braune Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 642. n. 49. *der braune Haubenkolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 318. n. 57. Trochilus (Pileatus) rectir. pallide-fuſcus, remigibus rectricibusque ſaturatioribus, criſta caerulea ſplendidiſſima.

18. Cristatus. *Der cayenniſche Haubenkolibri.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 270. n. 18. *Haubenkolibri.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 158. n. 4. *der Haubenkolibri.*

Onomat. hiſtor. nat. II. p. 58. *das Haubencolibritchen, der blauhaubichte Honigſauger.*

Klein, av. p. 106. n. 4. Melliſuga criſtata.

Klein, Vorbereit. p. 196. n. 4. *blauhaubiger Honigſauger.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 108. n. 4. *blauhaubiger Honigſauger.*

Briſſon, ornithol. II. p. 35. n. 12. Oiſeau-mouche hupé

Büffon, Vögel, XVIII. p. 202. *der gehaubte Fliegenvogel.*

Seligmann, Vögel, II. Tab, 73. *das Hauben-Colibritchen.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 642. n. 58. *der cajennische Haubenkolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 317. n. 56. Trochilus (Criſtatus) rectir. viridis, abdomine fuſco-cinereo, criſta caeruleſcente, tibiis pennatis.

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 102. *der grüne gradſchnablichte Kolibri?*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 17. Trochilus (Criſtatus) rectiroſtris viridis, alis fuſcis, abdomine cinereo, criſta caeruleſcente.

Du Tertre, hiſt. des Antill. II. p. 262. petit Colibri.

Feuillé, journ. d'obſ. p. 413. Colibri.

60. Longicaudus. *Der Raketten-Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 204. *der Raketten-Fliegenvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 642. n. 57. *der Raketten-Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 317. n. 55. Trochilus (Platurus) rectir. viridi-aureus, gula ſmaragdina, rectricibus rachi expanſa rufo-alba, intermediis duabus ſetaceis elongatis apice expanſis.

61. Carbunculus. *Der Carfunkel-Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 215. *der Carfunkel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 641. n. 56. *der Carfunkel-Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 317. n. 54. Trochilus (Carbunculus) rectiroſtris ſericeo-niger, vertice colloque ſuperius obſcure rubris, collo inferiore pectoreque flammeo-rubris, rectricibus rufo-aureis.

62. Cyano-

62. CYANOMELAS. *Der ſchwarz- und blaue Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 301. *der ſchwarz- und blaue Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 641. n. 55. *der ſchwarz- und blaue Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 317. n. 53. Trochilus (Bankrofti) rectir. nigro et caeruleo-varius, gutture pectoreque rubro-aureis.

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 100. *der ſchwarz und blaue Kolibri.*

63. GUJANENSIS. *Der guianiſche Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 302. *der kleine grün- und karmoſinfarbene Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 641. n. 54. *der gujaniſche Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 317. n. 52. Trochilus (Guianenſis) rectir. pallide viridis criſtatus, pileo pectoreque rubro-aureis, alis caudaque viridi rubro purpureoque variegatis.

Bankroft, Naturgeſchichte von Guiana, p. 101. *der kleine grüne und karmoſinfarbene Kolibri.*

64. TOBACI. *Der Kolibri von Tabago.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 303. *der Kolibri von Tabago.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 640. *der Kolibri von Tabago.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 316. n. 51. Trochilus (Tobagenſis) rectir. viridi-auratus, abdominis inferioris faſcia femoribusque albis, remigibus rectricibusque caeruleo-atris.

19. ELATUS. *Der guianiſche Haubenkolibri.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 270. n. 19. *Rothkappe.*

Brisson, ornithol. II. p. 30. n. 2. Oiseau-mouche à gorge topaze d' Amerique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 200. *der amerikanische Honigsauger mit der Topaskehle.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 640. n. 52. *der guianische Haubenkolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 316. n. 50. Trochilus (Elatus) rectir. virescente-aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis, apice nigris, pileo rubro cristato.

Seba, thes. I. p. 108. Tab. 78. fig. 7. 8. Florisuga aut Mellifera.

20. MELLIVORUS. *Der weißbäuchige Kolibri.*

Müller, Natursyst. II. p. 270. n. 2. *der Kragenkolibri.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 159. n. 5. *der Kragenkolibri.*

Halle, Vögel, p. 506. n. 574. *die Kolibridiane, grün, ein weißer Halbmond am Nacken.*

Onomat. histor. nat. II. p. 61. *das weißbauchichte Kolibritchen.*

Brisson, ornitholog. II. p. 35. n. 11. Oiseau-mouche à collier de Surinam.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 223. *der Fliegenvogel mit dem Halsbande, oder die Jacobinerin;* mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 69. fig. 1. *das Colibritchen mit weißem Bauch.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 629. n. 36. *der weißbäuchige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 310. n. 34. Trochilus (Mellivorus) rectir. rectricibus 2. intermediis nigris, lateralibus albis, capite caeruleo, dorso viridi, abdomine albo.

Linné,

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 14. Trochilus (Mellivorus) rectiroſtris, rectricibus nigris, lateralibus albis, capite caeruleo, dorſo viridi, abdomine albo.

65. CAMPYLOPTERUS. *Der breitſchäftige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 225. *der Fliegenvogel mit breiten Schäften;* mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 629. *der breitſchäftige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 310. n. 33. Trochilus (Latipennis) rectir. viridis, ſubtus griſeus, remigibus tribus ſeu quatuor primoribus ſcapo maxime dilatato incurvo, rectricibus lateralibus fuſco-nitentibus, apice albis.

21. RUBER. *Der kleine braune Kolibri.*

Müller, Naturſ. II. p. 271. n. 21. *rother Kolibri.*

Onomat. hiſtor. nat. II. p. 60. *das kleine braune Kolibritchen.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 31. Oiſeau-mouche de Surinam.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 206. *der purpurfarbene Fliegenvogel.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 63. *das kleine braune Colibritchen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 638. n. 50. *der kleine braune Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 315. n. 48. Trochilus (Ruber) rectir. rectricibus lateralibus violaceis, corpore teſtaceo fuſco maculato.

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 101. *der kleine braune Colibri.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 15. Trochilus (Ruber) rectir. lateribus violaceis, corpore teſtaceo fuſco ſubmaculato.

22. MINIMUS. *Der kleinſte Kolibri.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 271. n. 22. *Fliegenkolibri.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 159. n. 6. *der Fliegenkolibri.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 171. n. 1. Trochilus (Minimus) rectr. corpore viridi-nitente, ſubtus albido, rectricibus lateralibus margine exteriore albis.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 377. n. 2. *der kleinſte Kolibri.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 171. *der kleinſte Kolibri.*

Halle, Vögel, p. 508. n. 581. *der rothgraue Kolibriſpecht.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 69. n. 88. *der Fliegenkolibri.*

Klein, av. p. 105. ad n. 2. ⎫ mit *Tr. Mo-*
Klein, Vorbereit. p. 195. ad n. 2. ⎬ *ſchitus* ver-
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 108. ad n. 2. ⎭ wechſelt.

Klein, ſtemmat. av. p. 23. Tab. 24. fig. 1. 2.

Briſſon, ornitholog. II. p. 29. n. 1. Oiſeau-mouche.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 182. *der kleinſte Fliegenvogel.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 103. *der kleinſte Colibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 645. n. 65. *der kleinſte Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 320. n. 65. Trochilus (Minimus) rectr. corpore viridi ſubtus albido, rectricibus lateralibus margine exteriore albis.

Molina, Naturgeſch. von Chili, p. 218. *der kleinſte Kolibri.*

Schlözer,

Schlözer, Erdbeſchreib. von Amerika, p. 239. *der Brummvogel.*

Hamburg. Magazin, IV. p. 406.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 121. n. 18. Trochilus (Minimus) rectricibus lateralibus margine exteriore albis, corpore fuſco-nitente, ſubtus albido.

Jonſton, av. p. 194. Guainumbi ſeptima ſpecies.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 254. n. 3. *der Fliegenkolibri.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 33 Gattungen vermehrt. Bey der 10ten und 13ten ſind *zwey* Varietäten aus einander geſetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Kolibri mit dem Halsfleck.*

Latham, Syn. Supplem. p. 136. Patch-necked Humming-bird.

Latham, Vögel, I. 2. p. 646. n. 66. *der Leverſche Kolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 320. n. 64. Trochilus (Maculatus) rectir. fuſcus, ſubtus albus, lateribus colli maculis obſcuris, utrinque medio macula coccinea.

DRITTE ORDNUNG.

ANSERES. *(Wasservögel. Schwimmvögel.)*

67. GESCHLECHT. Anas. *Die Ente.*

Müller, Natursyst. II. p. 275. Gen. LXVII.
Leske, Naturgesch. p. 286. Gen. LXXII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 4. Gen. XXX.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 225. Gen. LXXVI.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 379. Gen. XXIV.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 558. Gen. XVI.
Ebert, Naturl. II. p. 67.
Halle, Vögel, p. 541. Gen. I.
Pennant, arct. Zool. II. p. 502.
Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 598. III. p. 268.
Onomat. hist. nat. I. p. 403.
Klein, av. p. 128. Gen. I. Anser. p. 131. Gen. II. Anas.
Brisson, ornitholog. II. p. 430. Gen. CVI. Anser. p. 413. Gen. CVII. Anas.
Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. LXXXXIX.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 833. Gen. XCVII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 156 ff.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 254. Gen. XXVIII.

* *Mit einem an der Wurzel höckerigen Schnabel.*

1. Cygnus. *Der Singschwan.* (4)
Müller, Natursystem, II. p. 275. n. 1. *der Schwan.* p. 276. 2. *der wilde Schwan.*

Leske,

(4) Flügelweite 7 Fuss. Gewicht 13 bis 16 Pfund. Nährt sich von Insekten, Wasserpflanzen, Fröschen u. s. w. Legt 4 bis 6 oliven-

Leske, Naturgeschichte, p. 286. n. 1. *der Schwan.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 14. n. 10. *der Schwan.*

olivengrünweisse Eyer in ein grosses Schilf- und Reisignest, woran das Weibchen 14 Tage bauet, und Dunen darein rupft. *Pallas* bemerkt, dass der Schwan sowohl die Farbe seines Schnabels als seines Leibes verändere, nachdem er jung oder alt ist, denn anstatt dass ersterer bey den alten pomeranzengelb und letzterer schneeweiss ist, so ist jener bey den jungen bläulich schwarz, und dieser aschfarben. *Beseke* sagt, er sey nur im ersten Jahre auf dem Rücken und an den Flügeln grau, wenn er aber ein Jahr alt, sey er durchaus blendend weiss. Er nistet in Kurland in so grosser Menge, dass viele Hunderte auf einmal einen grossen See oder Sumpf einnehmen, besonders in der Gegend von Liebau auf dem Papensee, und um Durben, wo sie nach Johannis jung und alt wegen der Federn erschlagen werden. Sie werden auch gegessen, aber das Fleisch ist hart, und muss erst, nach abgezogener Haut, in Essig einige Wochen lang liegen. Die allermehresten Naturhistoriker vermischen in ihren Beschreibungen diese und die folgende Gattung mit einander, und sehen beyde nur als Spielarten an. Der wesentliche Unterschied aber zwischen beyden beruht in folgendem; 1) In der Grösse; denn *Cignus* ist weit kleiner als *Olor*. 2) In der Wachshaut, die bey *Cygnus* gelb, bey *Olor* schwarz ist. 3) In dem Tragen des Halses; *Cygnus* trägt den Hals ganz aufrecht, *Olor* schwimmt mit gebogenem Halse. 4) In der Anzahl der Rippen; *Cygnus* hat zwölf Rippen an jeder Seite, *Olor* hingegen nur eilf. 5) Im Bau der Luftröhre, welche bey *Cygnus* gerade herab in die Brusthöhlung fällt, wieder zurück geht wie eine Trompete, durch einen Knorpel verengert wird, und dann eine zweyte Beugung macht, um in die Lunge zu kommen; wodurch dieser Singschwan im Stande ist, einen lauten durchdringenden Ton von sich zu geben, welches der andere nicht kann, weil bey diesem die Luftröhre nur gerade in die Lungen, und nicht durch den Brustknochen geht. — Viele der vorher angeführten Stellen gehen auf beyde Gattungen.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 225. n. 1. Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo; *der Schwan, Elbsch.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 381. *der Singschwan oder wilde Schwan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 581. n. 1. *der Singschwan.*

Funke, Naturgesch. I. p. 212. *der Schwan.*

Ebert, Naturl. II. p. 68. *der Schwan.* ibid. *der wilde Schwan.*

Halle, Vögel, p. 542. *der wilde Schwan.*

Meyer, Thiere, I. p. 31. Tab. 45.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 72. n. 90. *der Schwan.*

Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 817. *Schwan.* II. p. 269. *der wilde Schwan.*

Onomat. hist. nat. I. p. 420. *der Schwan.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 84. *der Schwan.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 104. *der wilde Schwan.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 502. n. 387. *der Singschwan, wilde Schwan.*

Beckmann, Naturhist. p. 43. a. *der Schwan.*

Klein. av. p. 128. n. 1. Anser Cygnus.

Klein, Vorbereit. p. 237. n. 1. *Schwangans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 135. n. 1. *Schwangans.*

Klein, stemm. av. p. 31. fig. 33.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 44. *der wilde Schwan.*

Brisson, ornithol. II. p. 439. n. 12. Cygne sauvage.

Latham, Syn. Suppl. p. 272. Whistling Swan.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 833. n. 1. Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo.

Gesner,

Gesner, Vögelb. p. 462. *Schwan. Elb, Oelb, Elbs.*
Batſch, Thiere, I. p. 378. *der Schwan.*
Beſeke, Vögel Kurl. p. 41. n. 69. *der Schwan.*
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 320. n. 67. *der Schwan.*
Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 328. *der Schwan.*
Fiſcher, Naturgeſch. v. Livland, p. 79. *Schwan.*
Olaſſen, Reiſe durch Island, I. p. 34. 118. 292. *Schwäne.*
Lepechin, Tagebuch d. ruſſiſch. Reiſ. II. p. 5. *Schwanen.*
Rytſchkow, orenb. Topogr. p. 244. *Schwäne.*
White, Naturgeſch. von England, p. 61. n. 9. *wilder Schwan.*
Taube, Slavon. und Syrmien, I. p. 23. *wilde Schwäne.*
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 138. *** *Schwäne.*
Schlötzer, Erdbeſchr. von Amerika, p. 151. 282. *Schwäne.*
Uno v. Troil, Reiſe n. Island, p. 115. *Schwane.*
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 167. n. 1. *Schwan, Schnabelſchwan.*
Pontoppidan, Naturhiſt. v. Norwegen, II. p. 188. *Svane.*
Horrebow, Nachr. von Isl. §. 44. *die Schwäne.*
Steller, Kamtſchatka, p. 190. *Schwanen.*
Kraſcheninnikow, Kamtſchatka, p. 195. *Schwanen.*
Pallas, Reiſe, Ausz. II. p 7. *Schwane.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 8. *der Schwan.* III. p. 10. *der wilde Schwan.*
Pallas, Naturgeſch. merkwürd. Th. VI. p. 34. *Schwäne.*

S. G. Gmelin, Reis. d. Rufsl. III. p. 249.
Linné, Reis. d. Schweden, I. p. 304. 305.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 60. n. 66. *der Schwan.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 69. *der Schwan.*
Naturf. XII. p. 131. n. 67. *der Schwan.*
Linné, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 70. *der Schwan.*
Naumann, Vogelsteller, p. 185. *der Schwan.*
Schwed. Abh. XLI. p. 23. *der Schwan.*
Schneider, zool. Abhandl. p. 141. *der Schwan.*
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. s. w. II. 3. p. 196. *wilde Schwäne.*
Stralsund Magaz. I. p. 158. *Schwan.*
Neueste Mannichfalt. I. p. 171. *Schwan.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 439. *der Schwan.*
Berlin. Samml. VIII. p. 583.
Beckmann, Landwirthschaft, p. 476.
Zorn, Petinotheol. I. p. 232. II. p. 12. 403. *der wilde Schwan.*
Merklein, Thierreich, p. 357. *Schwan.*
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 1034. *Schwan.*
Oekonom. Zool. p. 69. n. 9. *der Schwan.*
Ludovici, Kaufmannslex. IV. p. 1688.
Meidinger, Vorles. I. p. 123. n. 1. *der Schwan.*
Eberhard, Thiergesch. p. 119. *der Schwan.*
André und *Bechstein*, Spatzierg. I. p. 363. IV. p. 269.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 188. n. 17. *der Schwan.* p. 190. *vom Schwanengesang.*
Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, I. p. 372. (vom Schwanengesang.)
Beckmann, physikal. ökon. Bibl. I p. 319. 419. VI. p. 181. 260. XV. p. 510.
Loniceri, Kräuterbuch, p. 664. *der Schwan.*

Wedel,

Wedel, miscell. acad. nat. curios. Dec. I. An. II. obs. 12. p. 30.

Valentin, amph. zootom. II. p. 50.

Scaliger, de subtil. ex. 232. p. 728. Cygnus.

Glatthorn, diss. de Cygno. Witt. 1670. 4. pl. 2.

Tourner, dissert. de avibus Apollinis: *Cygno* et *Corvo*. Ups. 1725. 8. pl. 1½.

Nessel, diss. de av. Apoll. *Cygno* et *Corvo*. Ups. 1728. 8.

Bartholinus, de Cygno nigro; in ei. orat. var. argum. Hafn. 1668. 8. orat. 52. p. 371.

Bartholin. diss. de Cygni anatom. eiusque cantu. Hafn. 1650. 4.

Bartholin. Cygni anatome. Hist. anat. Cent. II. hist. 79. p. 311.

Jo. Dan. Maior, progr. de Cygni anatome. Kil. 1666. 4.

Wedel, Cygni sterni anatome. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 12. p. 30. c. fig.

Lachmund, de Cygni lingua ossea, ibid. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 179. p. 225. c. f.

Lospichler, de notabili Cygni in ovo conservatione. ibid. Cent. I. et II. obs. 59. p. 132.

Titius: Wittenberg. Wochenbl. VI. p. 361. (vom Nutzen der Schwäne.)

Camerarius, an Cygnus cantet, inprimis tum, cum morti est vicinus? Syll. Memorab. Cent. VII. part. 62. p. 470.

Lelandi Cygnea cantatio, cum Commentario. Lond. 1658. 8.

Feller, diss. de Cygnorum cantu. Lips. 1660. et 1672. 4. pl. 2.

Winter, de cantu Cygneo. 1698. 4.

Edzardi diss. de Cygno ante mortem non canente. Witt. 1722. 4. pl. 2.

Neu

Neu Hamburg. Magaz. St. 106. p. 371. *vom Schwanengesang.*

Detharding, progr. in obitum Crausii, praemisso discursu de fabuloso Olorum Cantu. Rost. 1723. 4.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Cygnus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 2. Cygnus.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 1. Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 106. Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo.

Müller, zool. dan. prodr addend. p. 277. Svane-Sang.

Kramer, Austr. p. 338. n. 2. Anas rostro semicylindrico, cera flava, corpore albo.

Brünich, ornitholog. bor. p. 12. n. 44. Anas Cygnus.

Charleton, onomast. zoic. p. 97. n. 10. Cygnus.

Mus. Worm. p. 299. Cygnus, Olor.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 310. Olor; *ein Schwan, Oelb, Oelbs.*

Philos. Transact. lvi. Tab. 10. p. 215. fig. 1. 2.

Hermann, tab. affin. anim. p. 156. Cygnus.

Plin. hist. nat. L. 30. c. 8. Cygnus.

Senec. Hippol. I. 3. 302. Cygnus.

Martial. epigr. XIII. 77. Cygnus.

Ciceron. Tuscul. qu. I. 30. Cygni.

Virgil. Ecclog. IX. 36. Olores.

Aristotel. histor. animal. Lib. IX. c. 10. n. 162. Κυκνοι.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 254. n. 1. *der Schwan.*

47. Olor.

47. Olor. *Der stumme Schwan.* (5)
Müller, Naturs. II. p. 276. b. *der zahme Schwan.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 16. *der zahme Schwan.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 379. n. 1. *der stumme Schwan.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 595. n. 1. *der stumme Schwan.*
Funke, Naturg. I. p. 213. *die stummen Schwäne.*
Ebert, Naturl. II. p. 68. *der zahme Schwan.*
Halle, Vögel, p. 541. n. 644. *der Schwan.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 505. n. 388. *der stumme Schwan.*
Gesner, Vögelb. p. 462. Fig. p. 463.

Schwed.

(5) Länge über 5 Fuss. Flügelweite über 8 Fuss. Gewicht 25 bis 30 Pfund. Soll 30 bis 100 Jahr alt werden. Liebt vorzüglich klares und helles Wasser. Die ungezähmten ziehen gewöhnlich im October weg und finden sich zu Ende des Märzes auf eben demselben Teiche oder Flusse wieder ein, wo sie sich das vorige Jahr aufhielten. Nährt sich von Wasserlinsen, allerhand Sämereyen der Wasserkräuter, besonders von grossen Wasserkäfern. Fische aber rührt er nicht an. Das Weibchen baut im April aus Holz, Binsen, Rohr, Stengeln, Schilf, u. dgl. m. ein schlechtes Nest, füttert es mit Brustfedern aus, und legt 6 bis 8 graugrünlich weisse grosse Eyer. Die ausgekrochenen Jungen sehen anfänglich grünlich dunkelgrau aus, bis ins zweyte Jahr sehen sie mehr aschgraubraun aus; haben im ersten Jahre schwarze, im zweyten bleyfarbene, im dritten gelbe, und in der Folge erst zinnoberrothe Schnäbel und Füsse. Die Federn sind weit kostbarer als Gänsefedern. Aus Lithauen, Polen und Preussen kommen jährlich viele Centner zur Messe nach Frankfurt an der Oder. Auf der Spree und Havel um Berlin, Spandau und Potsdam werden die gezähmten Schwäne im Sommer, vorzüglich im May zusammengetrieben und gerupft. Auch die Haut bereitet man mit den Pflaumfedern zu einem Pelzwerke, und braucht sie unter andern zu feinen Puderquasten.

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. *der so genannte Cygnus Mansuetus.*

Brisson, ornitholog. I. p. 438. n. 11. Cygne.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 10. *der so genannte zahme Schwan.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. XLV. (der Kopf.)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 834. n. 2. Anas (Olor) rostro rubro, basi tuberculo carnoso nigro, corpore albo.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 1. β. Cygnus mansuetus.

Linné, Syst. Natur. Edit. XII. 1. p. 194. n. 1. β. Cygnus mansuetus.

Kramer, Austr. p. 338. n. 2. β. C. mansuetus.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 310. *Olor.*

Jonston, av. p. 136. Cygnus.

Cheseld. Osteog. cap. 5. ad fin. (Scelet.)

Aelian. hist. anim. L. 10. c. 36. L. 17. c. 24. L. 15. c. 61.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 255. n. 2. *der stumme Schwan.*

48. Nigricollis. *Der schwarzhälsige Schwan.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 834. n. 3. Anas (Nigricollis) rostro rubro, corpore albo, capite colloque nigris.

49. Melanocephala. *Der chilesische Schwan.*

Molin. l. c. Anas Melancorypha.

Ist nach *Latham* a. a. O. mit dem vorhergehenden einerley.

50. Hybrida. *Der Cage.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 835. n. 6. Anas (Hybrida) rostro semicylindrico, cera rubra, cauda acutiuscula.

2. Cy-

2. Cygnoides. *Die Schwanengans.*

Müller, Natursystem, II. p. 278. n. 2. *Schwanengans.*

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 225. n. 2. Anas (Cygnoides) rostro semicylindrico: cera gibbosa, palpebris tumidis; *die spanische oder schinesische Gans.*

Halle, Vögel, p. 546. n. 646. *die Schwanengans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 76. n. 91. *Schwanengans, türkische Gans.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 531. B. *die Schwanengans.*

Klein, av. p. 129. n. 4. Anser hispanicus.

Klein, Vorbereit. p. 238. n. 4. *spanische oder vielmehr guineische Gans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 136. n. 4. *spanische Gans.*

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 269. n. 4. *spanische Gans.*

Onomat. histor. nat. I. p. 420. *die türkische, sibirische Gans.*

Brisson, ornith. I. p. 435. n. 7. Oie de Guinée.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 686. *die Schwanengans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 837. n. 16. Anas (Cygnoides) rostro semicylindrico, cera gibbosa, palpebris tumidis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 61. n. 67. *die spanische Gans, türkische Gans.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 321. n. 68. *Schwanengans.*

Naturf. XII. p. 131. n. 68. *Schwanengans.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas Cygnoides.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 3. Anser cygneus.

Linné,

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 2. Anas (Cygnoides) rostro semicylindrico, basi gibbo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 158. Anas cygnoides.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 255. n. 3. *die Schwanengans.*

β. Orientalis. *Die orientalische Schwanengans.*

Müller, Natursystem, II. p. 279. b. *die ostindische Schwanengans.*

Klein, av. p. 129. n. 5. Anser rufficus.

Klein, Vorbereit. p. 239. n. 5. *russische Gans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 136. n. 5. *russische Gans.*

Brisson, ornithol. II. p. 435. n. 6. Oie de Moscovie.

Latham, Syn. III. p. 447. n. 12. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 838. n. 16. γ. A. rostro luteo, cera magna nigra, occipite atro, sacco gulari.

Pallas, Reise, I. p. 169. *die Schwanengans.*

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 11. n. 32. Anser Cygnoides, Spontaneus; Mongolis *Chongorgalu.*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 89. *die Schwanengans.*

Naturf. XIII. p. 194. Anas cygnoides.

Naturf. XV. p. 160. *Schwanengänse.*

Beckmann, Bibl. III. p. 179. *die Schwanengans.*

Philos. Transact. lvii. p. 347. n. 17.

Decouv. Russ. I. p. 466.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 122. n. 2. β. Anser rostro semicylindrico atro, basi gibbo, minor.

Linné, it. Westgoth. p. 145. Anser Chinensis.

3. Gam-

3. GAMBENSIS. *Der gambiſche Schwan.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 279. n. 3. *gambiſcher Schwan.*

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 269. n. 7. *gambiſche Gans, gewaffnete Gans.*

Klein, av. p. 129. n. 7. Anſer Chilenſis.

Klein, Vorber. p. 239. n. 7. *die Gans von Chili.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 136. n. 7. *gambenſer Gans.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 436. n. 8. Oie de Gambie.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 839. n. 19. Anas (Gambenſis) roſtro baſi gibbo, corpore nigro ſubtus albo, dorſo purpuraſcente, roſtro pedibusque rubris.

Halle, Vögel, p. 547. n. 649. *die Sporengans.*

Berlin. Samml. IV. p. 287. *der Cahüitahü oder Sporengans.*

51. COSCOROBA. *Die Coſcoroba.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 835. n. 7. Anas (Coſcoroba) roſtro extremo dilatato rotundato, corpore albo.

52. MELANOTOS. *Die Gans mit ſchwarzem Rücken.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 839. n. 18. Anas (Melanotos) roſtro baſi gibbo compreſſo, corpore albo, capite colloque nigro maculatis, dorſo, alis caudaque nigris.

Latham, Syn. III. 2. p. 449. n. 13. Black-backed Gooſe.

Latham, Syn. Supplem. p. 272.

Naturforſch. I. p. 275. n. 11. *die Gans mit ſchwarzem Rücken.*

Berlin. Samml. IX. p. 194. *der Schwarzrücken.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 190. n. 11. *der Schwarzrücken.*

53. GRANDIS. *Die Riesengans.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 530. A. *die Riesengans.*

Latham, Syn. III. 2. p. 446. n. 11. great Goose.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 837. n. 15. Anas (Grandis) corpore nigricante, subtus albo, rostro nigro, pedibus coccineis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 256. n. 4. *die Riesengans.*

54. HYPERBOREA. *Die Schneegans.* (6)

Müller, Natursystem, Suppl. p. 101. n. 39. b. *die nordische Gans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 14. n. 9. *die Schneegans.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 510. n. 395. *die Schneegans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 578. n. 7. *die Schneegans.* p. 581. *Hagelgans.*

Halle, Vögel, p. 550. n. 653. *die Schneegans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 130. n. 115. *die Schneegans*, *Schleckergans.*

Klein, av. p. 130. n. 11. Anser grandinis, nivis, hybernus.

Klein, Vorbereit. p. 241. n. 11. *Schneegans*, *Hagelgans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 137. n. 12. *Schneegans.*

Brisson, ornithol. II. p. 438. n. 10. Oie de neige.

Batsch,

(6) Flügelweite 3 1/2 Fuss Gewicht zwischen 5 und 6 Pfunden. Die Jungen sind blau und erhalten ihre eigne Farbe erst nach einem Jahre In der Hudsonsbay werden jährlich Tausende von den Indianern für die Colonien geschossen.

Batsch, Thiere, I. p. 376. *Schneegans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 837. n. 14. Anas (Hyperborea) corpore niveo, fronte flavescente, remigibus decem primoribus nigris, rostro pedibusque rubris.

Pallas, Naturgesch. merkw. Thiere, VI. p. 30. *die Schneegans.*

Schwed. Abh. XLI. p. 24. Anas Hyperborea.

Krünitz, Encyklop. XVI. p. 103 *die Schneegans.*

Sander, über die Grösse u. Schönheit in der Nat. I. p. 263.

Hermann, tab. aff. anim. p. 159. Anas hyperborea.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 256. n. 5. *die Schneegans.*

55. Picta. *Die gemahlte Gans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 836. n. 12. Anas (Picta) cinereo-nigricans, nigro transversim lineata, capite, collo, abdomine medio, tectricibus fasciaque alarum albis.

56. Magellanica. *Die magellanische Gans.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 836. n. 11. Anas (Magellanica) ferrugineo-fusca, corpore anteriore subtusque transversim variegato, tectricibus fasciaque alarum albis.

57. Antarctica. *Die Gans von den Falklandsinseln.*

Latham, Syst. ornitholog II. p. 835. n. 8. Anas (Antarctica) corpore toto albo, rostro nigro, pedibus flavis. *(Mas.)*

β. A. *(magellanica)* corpore variegato, abdomine, crisso, uropygio femoribusque albis, speculo alarum viridi. *(femina.)* *

Mus. Carlson. fasc. II. Tab. 37.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 835. n. 8. *β.*

58. Variegata. *Die bunte neuseeländische Gans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 836. n. 10. Anas (Variegata) corpore variegato, capite, collo, rectricibusque alarum albis, speculo alarum viridi, rostro pedibusque nigris.

59. Leucoptera. *Die gestreifte Gans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 835. n. 9. Anas (Leucoptera) corpore albo, supra nigro transversim lineato, speculo alarum viridi, rostro pedibusque nigris.

60. Cinerea. *Die kurzflügelige Gans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 660. n. 15. *die aschgraue Ente?*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 834 n. 5. Anas (Brachyptera) rostro fulvo, corpore cinereo, alis abbreviatis, crisso fasciaque alarum albis.

4. Tadorna. *Die Brandgans.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 279. n. 4. *Brandgans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 16. n. 11. *die Lochgans, Brandgans, Fuchsgans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 570. n. 3. *die Brandente.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 694. *die Krachtente.*

Halle, Vögel, p. 548. n. 651. *die Fuchsgans.*

Gatte-

(9) *Brandgans* — weil sich der Vogel da aufhält, wo das Wasser an die Klippen und hohen Ufer stösst, und schäumt, welches die Schiffer *Brandungen* nennen; *Fuchsgans* — wegen der Höhlen, die sie bewohnt; daher auch *Wühlgans*. Flügelweite 3 1/2 Fuss. Gewicht des Männchens 2 Pfund 10 Unzen. Bleibt in England das ganze Jahr. In Russland wird sie bisweilen gezähmt auf dem Hofe gehalten. An Gestalt und Farbe nähert sie sich mehr einer Ente als einer Gans.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 77. n. 92. *die Brandgans.*
Neuer Schaupl. d. Natur, III. p. 220. *Fuchsgans.* p. 270. n. 8. *Brandgans.*
Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 407. *die Fuchsgans, Brandgans.*
Handb. der Naturgeſch. II. p. 371. *die Fuchsgans.*
Klein, av. p. 130. n 9. Vulpanſer.
Klein, Vorbereit. p. 240. n. 9. *Fuchsgans.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 137. n. 9. *Fuchsgans.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 532. D. *die Wühlgans, Brandgans.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 453. n. 9. Tadorne.
Batſch, Thiere, II. p. 379. *die Lochgans.*
Gesner, Vögelb. p. 133. *Vulpanſer.*
Latham, Syn. Supplem. p. 275. *Shieldrake.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 854. n. 56. Anas (Tadorna) roſtro ſimo, fronte compreſſa, capite nigro-vireſcente, corpore albo variegato.
Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 321. n. 69. *Brandgans, Fuchs-Erdgans.*
Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſ. I. p. 189. *die geſprenkelten Enten.*
Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 41. *Brandgänſe.*
Linné, Reiſ. d. Oel. und Gothl. p. 321. *Brandgans.*
Georgi, Reiſ. d. Ruſsl. II. p. 482. *die Bergente.*
Pallas, Reiſ. Ausz. II. p. 271. *Bergenten.* III. p. 373. *Bergente.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 12. *die Bergente.* IV. p. 22. Anas Tadorna.
Pallas, Naturgeſch. merkw. Thiere, VI. p 42. *die Bergente.* it. p. 27. *Bergente.*
Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännem. p. 167. n. 2. *Fagergaas.*

Pontoppidan, Naturhiſtorie von Norwegen., II. p. 141. *Fager-Giäs, Ring-Giäs, Ur-Giäs.*
Krünitz, Encykl. XVI. p. 96. *die Fuchsgans.*
Naturf. XII. p. 132. n. 69. *Brandgans, Ringelgans.*
Schwed. Abhandl. XL. p. 23. Anas Tadorna.
Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 1. p 107. *die Bergente.*
Sander, Gröſse u. Schönheit in der Nat. I. p. 249. *die Brandgans, Erdgans.*
Allerneueſte Mannichfalt. II. p. 175. *die Bergente.*
Wallbaum, Beſchreib. der *Bergente* weiblichen Geſchlechts.
Beckmann, Bibl. I. p. 339. *die Bergente.*
Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 7. Tadorna.
Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 3. Anas (Tadorna) roſtro ſimo, fronte compreſſa, corpore albo variegato.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 107. Anas (Tadorna) roſtro ſimo, fronte compreſſa, capite nigro vireſcente, corpore albo-variegato.
Brünich, ornitholog. bor: p. 12. n. 45. 46. 47. Anas Tadorna.
Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 208. Anas longiroſtra quarta?
Charleton, onomaſt. zoic. p. 98. n. 2. Vulpanſer, Chenalopex.
Jonſton, av. p. 141. Vulpanſer ſeu Chenalopex.
Jonſton, av. p. 146. la Tadorne.
Hermann, tab. affin. anim. p. 158. 160. Anas Tadorna.
Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 22. Chenalopeces.
Ariſtotel. hiſtor. animal. Lib. VI. cap. 2. n. 28. Χεναλωπηξ.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 256. n. 6. *die Brandgans.*

5. Spectabilis. *Die graukopfige Ente.*

Müller, Natursystem, II. p. 280. n. 5. *bunte Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 515. n. 399. *die Königsgans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 143. n. 35. *graukopfige Ente aus der Hudsonsbay.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 604. n. 32. *graukopfige Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 458. n. 15. Canard de la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 845. n. 36. Anas (Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, carina pennacea nigra, capite canescente.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 34. *der Buntkopf.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 49. *die Ente mit dem grauen Kopfe.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 144. **.

Schwed. Abh. XLI. p. 24. Anas Spectabilis.

Stralsund. Magazin, I. p. 149. *die grünköpfigte Gans.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 4. Anas (Spectabilis) rostro basi gibbo compresso; carina pennacea nigra, capite canescente.

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 195. n. 4. Anas (Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, carina pennacea nigra, capite canescente.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 108. Anas (Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, carina pennacea nigra, capite canescente.

Fabric. fn. groenl. p. 63. n. 39. Anas (Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, carina pennacea nigra, capite canescente.

Mus. Carls. fascic. II. Tab. 39. das Männchen. Tab. 40. das Weibchen.

6. FUSCA. *Die Sammetente.*

Müller, Natursyst. II. p. 281. n. 6. *wilde braune Ente.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 17. n. 12. *die nordische braune oder schwarze Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 568. n. 2. *die Sammetente.* p. 570. *wilde braune Ente, Moderente, braune Seeente, Turpane.*

Halle, Vögel, p. 557. n. 667. *die Moderente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 77. n. 93. *die braune Ente.*

Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 601. n. 5. *braune Ente.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 602. n. 11. *schwarze Ente.*

Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 601. n. 9. *Moorente, Fliegenente.*

Onomat. hist. nat. I. p. 412. *die schwarze Ente.*

Klein, av. p. 133. n. 12. Anas nigra.

Klein, Vorbereit. p. 246 n. 12. *schwarze Ente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 140. n. 12. *schwarze Ente, mit schwarzem, rothem und gelbem Schnabel.*

Brisson, ornithol. II. p. 472. n. 29. grande Macreuse.

Latham, Syn. Suppl. p. 274. Velvet Duck.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 848. n. 44. Anas (Fusca) nigricans, palpebra inferiore speculoque alarum albis.

Pennant,

Pennant, arct. Zool. II. p. 516. n. 400. *die Sammetente.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 322. n. 71. *wilde braune Ente.*

Lepechin, Tagebuch d. russisch. Reis. III. p. 14. *kohlschwarze große Makreuser-Enten.*

Fischer, Zus. zur Naturgesch. v. Livland, p. 45. n. 493. *schwärzliche Ente, Mohrente.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 292. n. 77. *die braune Ente.*

Naturf. XII. p. 132. n. 71. *wilde braune Ente.*

Naturf. XXV. p. 10. n. 14. Anas fusca.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 62. n. 68. *wilde braune Ente.*

Stralsund. Magazin, I. p. 165. *Turpane, oder braune See-Ente.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Carbo.

Neue schwed. Abhandl. VI. p. 189. *die braune Ente.*

Krünitz, Encykl. XI. p. 60. *die braune Seeänte.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 143. *Hav-Aaare.*

Schriften der drontheim. Gesellschaft, I. p. 222. *See-Orre, schwarzbraune wilde Ente.*

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 14. Anas nigra.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 5. Anas (Fusca) nigricans, macula pone oculos lineaque alarum albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 109. Anas (Fusca) nigricans, palpebra inferiore speculoque alarum albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 158. Anas Fusca.

7. Nigra. *Die ſchwarze Ente.* (8)

Müller, Naturf. II. p. 281. n. 7. *ſchwarze Ente.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 573. n. 4. *die Trauerente.*

Halle, Vögel, p. 559. n. 670. *die ſchwarze Seeente mit dem ſchwarzen Schnabelgeſchwülſte.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 602. n. 11. *ſchwarze Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 517. n. 402. *die Trauerente.*

Briſſon, ornithol. II. p. 471. n. 28. Macreuſe.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 848. n. 43. Anas (Nigra) roſtro baſi gibbo, corpore toto nigro.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 41. n. 70. *die ſchwarze Ente.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 81. n. 89. *ſchwarze Ente, Mohrente.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 323. n. 72. *ſchwarze Ente;* (mit *Anas fuſca* verwechſelt.)

Linné, Reiſ. d. Oel. und Gothl. p. 232. 290.

Naturf. XII. p. 133. n. 72. *ſchwarze Ente;* (mit *Anas fuſca* verwechſelt.)

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas nigra.

Stralſund. Magaz. I. p. 149. *die ſchwarze See Ente.*

Beckmann, Bibl. I. p. 5. Anas nigra.

Voyage en Sibirie p. l'Abbé *Chappé de Auteroche.* I. Tab. 10. Macreuſe.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 123. n. 6. Anas (Nigra) tota nigra, baſi roſtri gibba.

Philoſ. Transact. XV. n. 175. p. 1160. 4. Whilk.

61. Re-

(8) Länge, nach *Pennant* 22 Zoll; Flügelweite 34 Zoll; Gewicht 2 Pfund und 2 Unzen. — Nach *Beſeke* hingegen beträgt die Länge 2 Fuſs 6 1/2 Zoll, die Flügelweite 3 Fuſs 7 Zoll, und das Gewicht 1 3/4 Pfund. Welche Verſchiedenheit! Sollte hier wohl einerley Gattung gemeynt ſeyn?

61. REGIA. *Die Königsente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 847. n. 39. Anas (Regia) caruncula compressa frontali, corpore caeruleo, subtus fusco, collari albo.

62. NILOTICA. *Die Nil-Ente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 846. n. 38. Anas (Nilotica) albida, maculis canis, pectoris lateribus et abdomine cano lineatis, callo rostri marginali et caruncula purpureo-sanguineis.
Hasselquist, Reise nach Paläst. p. 919. n. 36. Anas nilotica.

63. BERINGII. *Die Beringsgans.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 509. n. 393. *die Beringsgans.*
Steller, Beschr. von Kamtschatka, p. 188. *eine Art wunderseltsamer Gänse.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 843. n. 29. Anas (Beringii) rostro gibbo, corpore albo, alis nigris, regione aurium virescenti-alba.

64. ALBIFRONS. *Die Bläſſengans.* (9)
Pennant, arct. Zool. II. p. 509. n. 394. *die Bläſſengans.*

Bechstein.

(9) Flügelweite, nach *Pennant*, 4 F. 6 Z.; Gewicht 5 1/2 Pfund. In der XII. Edit. p. 197. rechnete *Linné* *Brissons Anser Septentrionalis Sylvestris* zu seinem *Anas Erythropus* n. 11. Man muss sich überhaupt sorgfältig hüten, die zu *A. Albifrons*, *Erythropus*, *Casarca* und *Bernicla* gehörigen Synonymen nicht zu verwechseln. Vorzüglich schwer ist es die zu *A. Albifrons* und *Erythropus* gehörigen Synonymen richtig zu ordnen. Folgende Schwierigkeiten, und (mir wenigstens scheinbare) Verwechselungen bin ich nicht im Stande zu heben. 1) Linné hat in der XII. Edition offenbar *A. Albifrons* und *Erythropus* unsers Systems für einerley angenommen; denn er citirt bey seinem *Erythropus* Brissons *Anser Septentrionalis Sylve-*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 576. n. 6. *die Blässengans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 10. b. *die canadische Gans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 138. n. 16. *Lachgans.*

Halle, Vögel, p. 550. n. 655. *die Lachgans.*

Brisson, ornith. II. p. 433. n. 3. Oie sauvage du Nord.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 842. n. 27. Anas (Albifrons) cinerea, fronte alba.

Brünich, ornithol. bor. p. 13. n. 53. Anas (Anser *ferus*) margine frontis albo, abdomine cinereo immaculato.

Philos.

Sylvestris, und führt auch *Fn. Suec.* n. 116. an. Eben diese *Fn. Suec* finde ich nun im Syst. *zweymal*, nämlich bey *A. Albifrons*, n. 64, und bey *A. Erythropus*, n. 11. p. 512. angeführt 2) *Linné* charakterisirt seine *Anas Erythropus: cinerea, fronte alba;* dies finde ich auch in der XIII. Ed. *Latham* hingegen nimmt eben diesen Charakter bey *Anas Albifrons* an, übrigens citirt er eben die Synonymen, die in der XIII. Edition unsers Syst. bey *Anas Albifrons* angeführt sind 3) Linnés *Anas Erythropus*, fn. Suec. II. p. 41. n. 116. ist offenbar einerley mit *fn. suec.* I. n. 92. Letztere citirt *Kramer* (Austr. p. 339. n. 6.), welche Stelle in unserm System zu *Anas Albifrons* gezogen worden. Ist aber Linnés *Anas Erythropus* (Edit. XII. p. 197. n. 11.) einerley mit *Anas Erythropus* Ed. X. I. p. 123. n. 8. und Fn. Suec. II. n. 116. einerley mit Fn. Suec I. n. 92. welches der Natur der Sache nach gar nicht anders seyn kann, und gehört *Clus. Anser Helsingicus*, exot. 368. mit dahin, so müssen auch die Synonymen: a) *Kramer* l. c. *Anas cinerea, fronte alba*; b) *Müller*, zool. dan. prodr. p. 14. n. 113. *Anas (Erythropus) cinerea, fronte alba*, verglichen mit den dänischen Synonymen in *Brünich.* ornithol. bor. p. 14. n. 56. nicht zu *Anas Albifrons* unsers Systems p. 509. n. 64. sondern zu *Anas Erythropus* p. 512. n. 11. daselbst gezogen werden, obgleich *Gmelin* und *Latham* sie zu der ersten rechnen. Ich überlasse diess den Ornithologen zur Prüfung. Cf. *Blumenbach* Handbuch der Naturgesch. p. 226. not. *.

Phil. Transact. lxii. p. 414. n. 3. Laughing Goose.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 48. *die lachende Gans.*

β. A. fronte tota alba, abdomine nigro maculato. *
Brünich, ornith. bor. p. 13. n. 54.

** * Mit glattem Schnabel, an der Wurzel ohne Höcker.*

8. MARILA. *Die Bergente.* (10)
Müller, Natursyst. II. p. 281. n. 8. *Bergente.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 640. n. 8. *die Bergente.* p. 642. *Moderente*, *Schaufelente*, *unterirrdische Ente*, *Morente*, *Schimmel*, *Aschenente*; (*Warten*, die Männchen bey den Jägern.) Tab. 23.
Pennant, arct. Zool. II. p. 526. n. 416. *die Schaufelente.*
Brisson, ornithol. II. p. 470. n. 26. A. petit Morillon rayé.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 853. n. 54. Anas (Marila) nigra, humeris cinereo undulatis, abdomine speculoque alari albis. (*Mas.*)
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 72. n. 83. *die unterirrdische Ente.*
Steinberg, Zirchn. p. 138. Tab. 22.
Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas Marila.
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 167 n. 3. Anas Marila. Tab. 13.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14 n. 111. Anas (Marila) nigra, humeris cinereo-undulatis, abdomine speculoque alari albis.

A. fusco

(10) Flügelweite 20 Zoll. Gewicht des Männchen 1 1/2 Pfund, des Weibchen 2 Unzen mehr. *Pennant*. — Nach *Brisson* eine Varietät von *Anas Fuligula*.

A. fusco - ferruginea, speculo alarum, abdomine capitisque annulo ad rostri basin albis. *(Femina.)* *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 853.

Mus. Carls. fasc. II. Tab. 38. Anas fraenata.

Ray's Letters p. 61. Duck with a circle of white feathers about the bill.

β. A. capite colloque purpureo - viridibus, dorso humerisque cinereo - undulatis, abdomine speculoque alarum albis. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 854. n. 54. *β.*

Büffon, pl. enl. n. 1002. Millouinan.

9. Anser. *Die gemeine Gans.* (1)

α. Ferus. Die wilde Gans.

Müller, Natursf. II. p. 282. n. 9. *β. die wilde Gans mit graubraunen Federn*,

Leske,

(1) Flügelweite 5 Fuss. Gewicht bisweilen 10 Pfund. *Pennant.* Ziehen als Zugvögel im Frühjahr in Europa nach den lappländischen Morästen, den östlichen und südlichen Theilen von Island, und bleiben den Sommer über daselbst. Auch in Asien und Amerika halten sie sich zu dieser Jahreszeit in den nördlichsten Gegenden auf. So bald in der nördlichen Erde der erste anhaltende Schnee einfällt ziehen sie sich nach einer gelindern Zone. Sie überwintern in Deutschland, Frankreich, Ungarn, Griechenland, Klein - Asien, dem östlichen Russland, Javan, sogar im nördlichen Afrika, und ziehen sich im März, nachdem der Schnee früh oder spät schmilzt, und warme Witterung einfällt, in ihr eigentliches Vaterland zurück. Sie wandern heerdenweise, formiren dabey zwey Reihen, die sich vorn in der Spitze eines Dreyecks anfangen, und so als Schenkel desselben ausspreitzen Diejenige Gans, welche die Spitze formirt, ist allezeit grösser als die übrigen, hat eine gröbere Stimme, und ist vielleicht jedesmal eine *alte* Gans. Die wilde Gans legt im Frühjahr in Sümpfen und grossen Brüchen 9 bis 12 weisse Eyer, die an beyden Seiten fast gleich

Leske, Naturgeschichte, p. 287. n. 2. *die Gans.* *
Borowsky, Thierreich, III. p. 9. a. *die wilde Gans.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 226 n. 3. Anas (Anser) rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, subtus pallidiore, collo striato. *
Bechstein, Naturgesch. I. p. 382. *die wilde Gans.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 586. a. *die wilde Gans.*
Funke, Naturgesch. I. p. 206. *die Gans.* *
Ebert, Naturl. II. p. 68. *die eigentlichen Gänse.* *
Halle, Vögel, p. 543. *die wilde Gans.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 79. n. 94. *die wilde Gans.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 507. n. 391. *die wilde Gans.*
Beckmann, Naturhist. p. 43. b *die Gans.* *
Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 268. *Gans.* *
Onomat. hist. nat. I. p. 421. *die Gans.* *
Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 105. *die Gans.* *
Klein. av. p. 129. n. 3. Anser ferus.
Klein, Vorbereit. p. 238. n. 3. *wilde Gans.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 136. n. 3. *wilde Gans.*
Klein, stemm. av. p. 31. Tab. 34. fig. 1. a-c.
Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 19. fig. 2.
Brisson, ornitholog. II. p. 432. n. 2. Oye sauvage.

Batsch,

gleich stumpf sind Begattet sich mit der zahmen, ob gleich nicht so leicht als man gemeiniglich vorgiebt. Wird leicht zahm, und in einigen Gegenden Russlands auf den Höfen gehalten. *Fischer* und *Beseke* gedenken einer *großen* und einer *kleinen* wilden Gans, worüber sich aber nichts bestimmen läßt. Die mit einem * bezeichneten Synonymen gehen auf die wilde und zahme Gans.

Batsch, Thiere, I. p. 367. *die gemeine Gans.* *

Gesner, Vögelb. p. 117. *heimische Gans;* * mit 1 guten Fig.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 841. n. 26. Anas (Anser) rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, subtus pallidiore, collo striato.

Beseke, Vögel Kurl. p. 43. n. 71. *die gemeine wilde Gans.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 329. n. 74. *die wilde Gans mit graubraunen Federn.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 76. *wilde Gans.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 333. *die wilden Gänse.*

Taube, Slavon. und Syrmien, I. p. 22. *wilde Gänse.*

Olafsen, Reise durch Island, I. p. 119. *wilde Gänse.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 5. *Gänse.*

S. G. Gmelin, Reis. durch Russl. I. p. 68. *wilde Gänse.*

Pallas, Reise, II. p. 325. 326. III. p. 91. 92. 93. 616. *wilde Gänse.*

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 7. *Gänse.* III. p. 475. *wilde Gänse.*

Steller, Kamtschatka, p. 190. *Gänse.* p. 187. *große graue Gänse.*

Leem, Nachricht von den Lappl. p. 138. 139. *die wilden Gänse.*

Krascheninnikow, Kamtschatka, p. 195. *große graue Gänse.*

Carver, Reis. durch Nordamer. p. 383. *Gänse.*

White, Naturgesch. von England, p. 62. n. 10. *wilde Gänse.*

Georgi, Russl. p. 482. *wilde Gänse.*

Rytschkow,

Rytſchkow, orenb. Topogr. p. 243. *wilde Gänſe.*
Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 167. n. 4. a. *wilde Gans.*
Ponttoppidan, Norwegen, II. p. 139. *Gaas.* *
Naturf. XII. p. 134. n. 74. *die wilde Gans.*
Schwed. Abh. XXXVIII. p. 294. *wilde Gans.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 69. *wilde Gans.*
Naumann, Vogelſteller, p. 185. *die wilde Gans.*
Linné, auserl. Abh. II. p. 291. n. 71. *die Gans.*
Oekonom. Zool. p. 70 n. 10. *die Gans.* *
Zorn, Petinotheol. I. p. 404. *die wilde Gans.*
Sander, Gröſse und Schönheit in der Natur, I. p. 250. *wilde Gänſe.*
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 665. *Gans.*
Anweiſung Vögel zu fangen, u. ſ. w. p. 220. *die wilde Gans.*
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 118. n. 1. *die wilde Gans.*
André und *Bechſtein*, Spatzierg. II. p. 268. *die wilde Gans.*
Merklein, Thierreich, p. 260. *Ganß.* *
Krünitz, Encykl. XVI. p. 84. *die wilde Gans.*
Stralſund. Magazin, I. p. 148. *die grauen Gänſe.*
Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 54. Anſer. *
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 4. Anſer vulgaris. *
Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 123. n. 7. Anas (Anſer) roſtro ſemicylindrico, corpore ſupra cinereo, ſubtus pallidiore, collo ſtriato. *
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 112. Anas (Anſer) roſtro ſemicylindrico, corpore ſupra cinereo, ſubtus pallidiore, collo ſtriato. *
Kramer, Auſtr. p. 338. n. 4. Anas roſtro ſemicylindrico, corpore ſupra cinereo, ſubtus albido, rectricibus margine albis. *

Heerkens, av. Fris. p. 87. Anser. *
Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 212. Anser ferus; *eine wilde Gans, grawe Gans.*
Charleton, onomast. zoic. p. 98. n. 11. Anser ferus.
Jonston, av. p. 140. Anser ferus.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 159. Anas Anser. *
Schäffer, elem. ornith. Tab. 20.
Forskål, fn. orient. p. 6. n. 6. Descript. anim. p. 3. n. 6. Anas Anser. Arabisch: *Uäs araki.*
Philos. Transact. xv. n. 175. p. 1660. 5.
Plin. histor. nat. Lib. 10. c. 22. 59. L. 18. c. 35. Anser.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 257. n. 7. *die gemeine Gans.* *

β. Domesticus. *Die zahme Gans* (2)
Müller, Natursystem, II. p. 282. a. *die zahme Hausgans mit weißen Federn.*

Borowsky,

(2) Länge 3 Fuss; Flügelweite 5 2/3 Fuss. Wird 20 bis 24 Jahr alt; man will sogar Gänse von 80 Jahren gesehen haben. Eine Gans, die man nicht zum Brüten lässt, legt in drey Zeiträumen oft ein Schock Eyer. Gewöhnlich aber legt sie ihre gehörige Anzahl nicht eher, als bis sie zwey Jahre alt ist. Vier geschlachtete Gänse geben ein Pfund gemeine und sechszehn ein Pfund Pflaumfedern. Wenn man auf ein Bette 40 bis 50 Pfund rechnet, so gehören 200 Gänse dazu. Eine Stadt also, worin 200000 Menschen wohnen, braucht 40 Millionen Gänse zu ihren Schlafbetten. Das Fleisch von den Gänsen ist mehr nahrhaft und schmackhaft als gesund. Den meisten Ueberfluss an rohen Säften haben die gemästeten Gänse, weil es ihnen an Bewegung gefehlt hat. — *Klein*, *Brisson* u. a. haben die wilde und zahme Gans als zwey besondere Gattungen angenommen. Beyläufig bemerke ich hier noch den Unterschied der Gänse überhaupt von den Enten.

Die

Borowsky, Thierreich, III. p. 10. *gemeine Hausgans.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 382. b. *die zahmen Gänse.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 596. b. *die zahme Gans.* p. 620. *Hausgans, gemeine Hausgans, Bauerngans, Martinsgans, Wullah.*

Halle, Vögel, p. 542. n. 645 *die Hausgans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 87. n. 95. *die zahme Gans.*

Klein, av. p. 129. n. 2. Anser domesticus, rusticus.

Klein, Vorbereit. p. 238. n. 2. *Bauer-, Haus-, zahme Gans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 135. n. 2. *zahme Gans, Martinsgans.*

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 19. fig. 1.

Brisson, ornith. II. p. 431. n. 1. Oye domestique.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 842. n. 26. *β.* Anas Anser (domesticus).

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 323. *die Hausgans.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 330. *die zahme Gans.*

Die Gans unterscheidet sich von der Ente: 1) durch die Grösse des Körpers; 2) den erhabenern Rücken; 3) den längern Hals; 4) stärkern Schnabel; und vornämlich 5) durch die Füsse, welche höher, und nahe an der Mitte des Körpers gestellet sind, und dessen Gleichgewicht erhalten, daher auch die Brust der Gänse freyer und erhabener ist; dahingegen die Füsse der Enten dem Hintern näher sind, und vorn das Uebergewicht zu verursachen scheinen, wie an ihrem wackelnden Gange wahrzunehmen ist. Auch in der Stimme ist ein merklicher Unterschied. *Klein* und *Brisson* haben daher aus Gänsen und Enten zwey besondere Geschlechter gemacht.

Taube, Slavon. und Syrm. I. p. 40. *Gänse.*
Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 150. *Gänse.*
Georgi, Reise d. Rußl. p. 482. *die gemeine Hausgans.*
Knox, Reis. n. Ceylon, p. 57. *Gänse.*
Molina, Naturgesch. von Chili, p. 210. *Gänse.*
Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 138. *die Gans.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 387. *die Gänse.*
Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 167. n. 4. b *zahme Gans.*
Naturf. XII. p. 133. n. 73. *die zahme Hausgans.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 62. n. 69. *die Gans.*
Sander, ökon. Naturgesch. II. p. 19. *die Gans.*
Walther, ökon. Naturgesch. p. 130. *die Gans.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 316. *die Haus- oder zahme Gans.*
Krünitz, Encykl. XVI. p. 21. *zahme Gans, Lichtgans.*
Zückert, Speis. a. d. Thierr. p. 99.
Berlin. Samml. VII. p. 497.
Loniceri, Kräuterbuch, p. 644. *Ganß.*
Ludovici, Kaufmannslex. II. p 1503.
André u. *Bechstein*, Spatzierg. III. p. 350. *die zahme Gans.*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 7. β. Anser domesticus.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 112. β. Anser domesticus.
Linné, fn. Suec. II. p. 40. n. 114. β. Anser domesticus.
Linné, it. Oel. p. 83. Anser domesticus.

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Silef. p. 209. Anfer domefticus, *zahme Gans.*

Rzaczynsk. hiftor. nat. Polon. I. p. 301. Auct. p. 432.

Kramer, Auftr. p. 338. n. 4. β. Anfer domefticus; *einheimifche Ganß.*

Moehring, av. gen. p. 60. n. 61. Anas.

Jonfton, av. p. 138. Anfer domefticus.

Plin. hift. nat. L. 10. c. 22. 59. Anfer.

Varro, de re ruft. L. 3. c. 10. Anfer.

Columella, de re ruft. L. 8. c. 13. Anfer.

Palladius, de re ruft. L. I. c. 30. Anfer.

* * *

Tiling, obf. de periculof. fymptom. ex morfu anferis etc. *in den* Eph. Nat. Cur. Dec. II. An. 2. obf. 75.

Schulze, de vivacitate anferum; *daf.* Dec. I. an. 6. et 7. obf. 169. p. 233.

Gifeler, de penna anferina monftrofa; *daf.* an. 2. obf. 80. p. 155.

Lachmund, de anfere domeftico criftato; *daf.* an. 6. et 7. obf. 182. p. 241. c. f.

Id. de cranio anferis monftrofo; *daf.* dec. I. an. 4. et 5. obf. 181. p. 226.

Paulini anfer cornutus; *daf.* dec. II. an. 6. app. p. 19.

Böhm, von vierfüfsigen Gänfen; Brefsl. Natur- und Kunftgefch. 1726. p. 713.

Polifius, de anferculo quadrupede; Eph. nat. cur. dec. II. an. 4. obf. 41. p. 100.

Menzel, de tribus in uno anfere cordibus; *daf.* dec. I. an. 9. et 10. obf. 108. p. 267. c. fig.

Bartholin, ex anferino fterno de hyeme praefagium; Hift. anat. Cent. 5. hift. 67. p. 137.

Peyer, de ventriculo et renibus anserinis; Eph. nat. cur. dec. II. an. 1. obs. 85. 86. p. 199.

Von Gänsen, in deren Magen Gold gefunden worden; s. Bresl. Nat. u. Kunstgesch. 31 Vers. p. 153.

Hanow, von einem mit Federn bewachsenen Gänsemagen; Merkwürdigk. d. Nat. I. p. 255.

Gedanken über die Haltung der Gänse auf den Gütern; Lpzg. Samml. IX. p. 392.

Hannöv. Samml. 1757. p. 670. et 941. — Hannöv. Beytr. 1762. p. 631. et 1255. — Wittenberg. Wochenbl. I. p. 337. — warum die jungen Gänse im Jun. und Jul. so häufig hinfallen, und von den Mitteln dagegen.

Mus. rust. et commun. III. p. 143. — *Hirsch*, gesammelte Nachr. der ökon. Gesellschaft in Franken, II. p. 319. — Wittenb. Wochenbl. 1768. p. 245. — Gaz. litt. de Berlin, 1770. p. 390. — Berlin. Samml. III. p. 398. — Neueste Mannichfalt. II. p. 40. — Fränkische Samml. II. p. 11. — Gel. Beytr. zu den Braunschw. Anz. 1767. St. 101. — Lpz. Intelligenzbl. 1767. p. 263. 1776. p. 347. — Oekonom. Nachr. IV. p. 305. *vom Mästen der Gänse.*

Hannöv. Magazin, 1767. St. 69. — Lpz. Intelligenzbl. 1772. p. 317. — Leipzig. Samml. III. p. 802. — Götting. gemeinnütz. Abhandl. 1772. p. 145. — Oekon. Nachr. der patriot. Gesellsch. in Schlesien, 1774. p. 179. 1778. p. 314. — *Rammelt*, gemeinnütz. Abh. II. p. 252. — *Paulet*, Beytr. zu einer Gesch. der Viehseuchen, II. p. 266. — *von den Krankheiten der Gänse.*

Allg. Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 845 ff.

65. Mon-

65. MONTANA. *Die Berggans.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. H. Edit. in 4. p. 388. n. 5. *die Gebürg-Gans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 841. n. 25. Anas (Montana) capite, collo alarumque pennis rubro-viridibus.

66. CANA. *Die grauköpfige Gans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 840. n. 22. Anas (Cana) ferrugineo-rufa, capite colloque griseis, speculo alarum viridi, humeris albis.

67. RUFICOLLIS. *Die Rothhalsgans.*(3)

Pennant, arct. Zool. II. p. 532. C. *die Rothhalsgans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 688. *die Rothhalsgans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 129. n. 114. *die Rothhalsgans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 841. n. 23. Anas (Ruficollis) supra nigra, collo rufo, corpore subtus macula ante oculos strigaque longitudinali colli utrinque alba.

Pallas, Naturgesch. merkwürd. Th. VI. p. 24. *die Rothhalsgans.* Tab. 4.

Pallas, Reise, III. p. 476. *Rothhalsgänse.*

Pallas, Reis. III. Anh. p. 12. n. 3. Anser *ruficollis*, Ostiacis *Tschakwoi* (a voce); Samoiedis *Tschagu.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 11. *die bunte Nordgans.* (Anser pulchricollis.)

Catal. mus. Petropol. p. 419. n. 62. Anser ferus minor, niger, collo rufo.

(3) Länge 1 Fuss 10 Zoll. Flügelweite 3 Fuss 10 Zoll. Gewicht 3 Pfund Troy. *Pennant.*

Catal. muſ. Petropol. p. 406. n. 628. Anſer *Chaſſarka* Ruſſorum, *Tſchakwoi Aſſjach* Lapponibus.

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas ruficollis.

Sander, Gröſse und Schönheit in der Natur, I. p. 262. *eine Gans mit rothem Hals.*

Decouv. Ruſſ. II. p. 19.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 159. not. y. et e.

46. CASARCA. *Die rothe Ente.* (4)

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 101. n. 39. a. *die aſtracaniſche Ente.*

Latham, Syn. Supplem. p. 273. Ryddy Gooſe.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 841. n. 24. Anas (Caſarca) rufa, remigibus rectricibusque nigris, ſpeculo alari albo.

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 12. *die ſo genannte rothe Ente.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 9. *die kleine wilde Gans, Kaſarka genannt.*

Georgi, Reiſ. d. Ruſsl. II. p. 482. *rothe Ente.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas rutila.

Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 1. p. 107. *die ſo genannte rothe Ente.*

Dec. Ruſſ. I. p. 417. 464.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 149. Anas Caſarca.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 257. n. 8. *die rothe Ente.*

10. AEGYPTIACA. *Die ägyptiſche Gans.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 284. n. 10. *egyptiſche Gans.*

Briſſon, ornith. II. p. 437. n. 9. Oye d'Egypte.

Latham,

(4) Länge, nach *Lepechin*, 1 Fuſs, 8 Zoll, 2 Linien; Flügelweite 2 Fuſs 5 Zoll.

Latham, Syn. III. 2. p. 453. n. 16. Egyptian Goose.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 840. n. 21. Anas (Aegyptiaca) rostro subcylindrico, corpore undulato, vertice albo, speculo alari candido, fascia nigra.

Schwedische Abhandlung, XLI. p. 24. Anas aegyptiaca.

Hermann, tab. affin. anim. p. 158. o. Anas aegyptiaca.

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 454. n. 16. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 840. n. 21. β.

68. Segetum. *Die Bohnengans.* (5)

Pennant, arct. Zool. II. p. 507. n. 390. *die Bohnengans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 620. n. 3. *die Bohnengans.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 120. n. 2. *die Bohnengans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 843. n. 28. Anas (Segetum) cinereo-fusca, subtus albida, alis griseis, tectricibus maioribus remigibusque secundariis apice albis.

69. Borealis. *Die Gulaundente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 593. E. *die Gulaundente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 843. n. 30. Anas (Borealis) rostro angusto, capite viridi-nitente, pectore abdomineque albis.

(5) Länge 2 Fuss 7 Zoll; Gewicht 6 1/2 Pfund. *Pennant.*

11. Erythropus. *Die Bernakelgans.*(6)

Müller, Natursystem, II. p. 284. n. 11. *Rothfuß-gans.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 226. n. *.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 623. n. 5. *die Bernakelgans.* p. 624 *schottische Gans, Rothfußgans.*

Onomat. hist. nat. I. p. 411. *der wilde Rothfuß.*

Klein, av. p. 130. n. 8. Anser Brenta. (Mit *Anas Bernicla* verwechselt.)

Brisson, ornithol. II. p. 441. n. 14. Bernacle.

Gesner, Vögelb. p. 73. *Branta oder Bernicla.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 843. n. 31. Anas (Erythropus) cinerea, supra nigro alboque undulata, collo nigro, facie abdomineque albis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 43. n. 73. *die Rothfuß-gans.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 513. n. 397. *die Bernaclegans.*

Pallas, Reise, Ausz. II. p. 6. *sogenannte Kasarken.* (Anser erythropus.)

Pallas,

(6) Länge, nach *Pennant*, 2 Fuss 1 Zoll; Flügelweite 4 Fuss 5 Zoll. Gewicht 5 Pfund. Ich muss hier dasjenige wiederholen, was ich bereits in der 9ten Anmerkung bey *Anas albifrons*, n. 64. gesagt habe. Ich habe die Synonymen so gut geordnet, als ich gekonnt habe. Aber die ungeheure Verwechselung der deutschen und ausländischen Synonymen bey der *Blässengans* der *Bernackelgans*, und der *Brentgans*, und die so wenig übereinstimmenden Beschreibungen und Bestimmungen der Naturforscher bey diesen Gattungen, machen es fast unmöglich hier überall etwas mit Gewissheit anzugeben. Die grösten und bewährtesten Ornithologen sind hier nicht einig. Auch die Lathamschen Synonymen weichen oft von den Linneischen und Gmelinschen ab, und wenn man beym Nachschlagen alle vergleicht, findet man wieder neue Schwierigkeiten.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 474. *Nordgänse.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 11. *die gemeine rothfüßige Nordgans oder Kasarka.*
Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 31. *die Bernakelgans.*
Lepechin, Tagebuch d. russisch. Reis. III. p. 13. *Nordgänse oder Kasarken.*
Fabric. Reis. nach Norwegen, p. 348. Anas Erythropus.
Georgi, Russl. II. p. 482. *die weißköpfige kleine Gans.*
Olaffen, Reise durch Island, I. p. 34. 292. *Helsing oder Bernicla.*
Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas Erythropus.
Stralsund. Magazin, I. p. 148. *die gelbfüßigen canadischen Gänse?*
Leem, Nachricht von den Lappl. p. 140. *eine Art kleiner wilder Gänse?*
Naturf. XXV. p. 9. n. 3. Anas Erythropus?
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 5. Anser erythropus.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 8. Anas (Erythropus) cinerea, fronte alba.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 113. Anas (Erythropus) cinerea, fronte alba.
Charleton, onomast. zoic. p. 98. n. 4. Bernicla.
Philos. Transact. II. p. 853. XII. p. 923.

β. A. cinerea, marginibus pennarum albidis, subtus et uropygio alba, capite anteriore et gutture fulvis, vertice et cervice nigricantibus, collo subtus et pectore fuscis. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 844. n. 31. β.
Brisson, ornithol. II. p. 442. n. 15. Bernicla minor. *Petite Bernacle.*

Raj.

Raj. Syn. p. 137. A. 7. Brenthus.
Will. orn. p. 361. Rat Goose or Road Goose.

12. CAERULESCENS. *Die blausittige Gans.*
Müller, Natursyst. II. p. 285. n. 12. *blaue Gans.*
Halle, Vögel, p. 550. n. 655. *die blaue Nordengans.*
Seligmann, Vögel, V. Tab. 47. *die blaugeflügelte Gans.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 508. n. 392. *die blausittige Gans.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 138. n. 15. *blaue Gans.*
Brisson, ornitholog. II. p. 434. n. 5. Oye sauvage de la Baye de Hudson.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 838. n. 13. Anas (Caerulescens) grisea, subtus alba, tectricibus alarum dorsoque postico caerulescentibus.

β. A. alba, collo postice imo interscapulio scapularibusque plumbeis, tectricibus alarum caudaeque caerulescentibus. *
Latham, Syst. ornithol. II. p. 837. n. 13. β.

γ. A. grisea fusco-varia, capite colloque supremo albis, postice nigro variis, tectricibus alarum caudaeque caerulescentibus. *
Latham, Syst. ornithol. II. p. 837. n. 13. γ.

13. BERNICLA. *Die Brentgans.* (7)
Müller, Natursyst. II. p. 285. n. 13. *Ringelgans.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 11. n. 3. *die schottische Gans.*

Blumen-

(7) Wegen der häufigen Verwechselungen, die sich in den *Synonymen* und *Beschreibungen* bey dieser und einiger der vorhergehenden Gattungen finden, beziehe ich mich auf die vorige Note und auf die Anmerkung bey *Anas albifrons*, n. 64. S. auch

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 226. n. 4. Anas (Bernicla) fusca, capite, collo pectoreque nigris, collari albo; *Baumgans, Rothgans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 621. n. 4. *die Brentgans.* p. 623. *Ringelgans, Bernakelgans, schottische Gans, Rotjes, Rotges.*

Halle, Vögel, p. 548. n. 650. *die Baumgans, Nonnengans, Rothgans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II p. 98. n. 96. *die Baumgans.*

Onomat. hist. nat. I. p. 409. *die schottische Gans, Rothgans.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 370. *die Klostergans, Bernakel.*

[*Klein*, av. p. 130. n. 8. Anas Brenta.

Klein, Vorbereit. p. 240. n. 8. *Brentgans, Baumgans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 136. n. 8. *Brentgans.*] Mit *Anas Erythropus* verwechselt.

Brisson, ornitholog. II. p. 442. n. 16. Cravant.

Gesner, Vögelb. p. 74. *Baumganß;* mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, II. p. 376. *die schottische oder Baumgans.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 512. n. 16. 396. *die Brentgans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 844. n. 32. Anas (Bernicla) fusca; capite colloque nigris, collari albo.

Bock,

S. auch *Fabric.* faun. groenl. p. 67. n. 41. Im Handb. der Naturgesch. a. a. O. wird die Benennung *Nonnen-* oder *Klostergans* (Oye nonnette) davon hergeleitet, weil ihr Fleisch an einigen Orten in der Fastenzeit zu essen erlaubt sey. — Richtiger möchte doch wohl *Jonstons* Ableitung seyn: *Monacharum ornatui, quae colorem album atro superimponunt, similis.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 329. n. 75. *Ringelgans, Brentgans.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reis. III. p. 13. *Bernicien.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 167. n. 5. *Radgaas, Bernikel, Reyhengaas.*

Olaffen, Island, I. p. 292. *Hrota?*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 145. *eine besondere Art brauner Vögel in der Größe einer Ente?*

Stralsund. Magaz. I. p. 153. *Neemka?*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas Bernicla.

Naturf. XII. p. 135. n. 75. *Ringelgans.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 73. n. 84. *die Brentganß, Baumganß.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 72. *die Bernikel-Gans.*

Valentin. mus. museor. I. p. 494. Anas Scoticus verus, Bernicla dictus; c. fig.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 6. Bernicla.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. 11. Anas (Bernicla) fusca, capite colloque nigris, collari albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 114. Anas (Bernicla) fusca, capite, collo pectoreque nigris, collari albo. (dän. *Ray-Gaas, Rad-Gaas*, norweg. *Raat-Gaas, Gaul, Gogl*; isländisch: *Helsingen.*)

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 15. Anas (Hrota) grisea, capite colloque nigris; (norweg. *Gaul*: isländisch: *Hrota, Mar-Giaes, Gagl*)?

Schwenkfeld, av. Siles. p. 213. Anser arborum; *ein Baum-Gans, Baum-Endtle.*

Charleton, onomast. zoic. p. 8. n. 3. Branta.

Jonston,

Jonston, av. p. 141. Branta seu Bernicla. Gallis *Cravant* et *Oye Nonnette*, Isidoro *Barliata*, Alberto *Barbates*, Hollandis *Rotgansen* dicitur.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 258. *die Baumgans*.

70. Torquata. *Die Gans mit dem Halsbande.*(8)

Latham, Syst. ornith. II. p. 849. n. 45. β. Anas nigra, temporibus fascia oculari et suboculari et torque albis, lateribus colli castaneis.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 688.

14. Canadensis. *Die canadische Gans.*(9)

Müller, Natursyst. II. p. 286. n. 14. *canadische*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 10. n. c. *die wilde canadische Gans*.

Halle, Vögel, p. 547. n. 648. *die kanadenser Gans*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 98. n. 97. *die canadische Gans*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 505. n. 389. *die canadische Gans*.

Klein, av. p. 129. n. 6. Anser Canadensis.

Klein, Vorbereit. p. 239. n. 6. *kanadenser Gans*.

Klein,

(8) Nach *Latham* eine Varietät von *Anas Histrionica*; nach *Bechstein* eine Varietät von *Anas Ruficollis*.

(9) Unzählige Heerden erscheinen jährlich im Frühjahr, in der Hudsonsbay, ziehen um zu brüten weiter gegen Norden, und kehren im Herbst nach Süden zurück. Eine grosse Anzahl brütet auch in der Hudsonsbay. Die Engländer tödten daselbst in guten Jahren 3 bis 4000, die sie einsalzen und aufbewahren Die man im Herbste fängt, wenn die Alten mit ihren Jungen zurückkommen, werden nicht gerupft, sondern man läst sie mit den Federn gefrieren, um frisches Fleisch im Winter zu haben.

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 136. n. 6. *canadenfer Gans.*

Briffon, ornithol. II. p. 433. n. 4. Oie fauvage de Canada.

Latham, Syft. ornithol. II. p. 838. n. 17. Anas (Canadenfis) cinerea, capite colloque nigris, genis gulaque albis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 84. *die canadenfer Gans.* (Fig. Catesb.)

Seligmann, Vögel, V. Tab. 46. *die canadifche Gans.* (Fig. Edw.)

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 279. n. 5. *die canadifche Ente.*

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 9. Anas (Canadenfis) fufca, capite colloque nigro, gula alba.

Fabric. fn. groenl. p. 66. n. 2. Anas canadenfis.

Donndorf, Handb. der Thiergefch p. 258. n. 10. *die canadifche Gans.*

15. MOLLISSIMA. *Die Eidergans.* (10)

Müller, Naturfyft. II. p. 287. n. 15. *Eyder-Gans*,

Leske, Naturgefch. p. 287. n. 3. *die Eidergans.*

Borowfky,

10) Flügelweite 3 Fufs. Gewicht des Weibchen 3 1/2 Pfund. Schwimmt, taucht und fliegt vortrefflich. Nährt fich von Fifchen, Mufcheln, Schnecken, Infekten, z. E. Krebfen, kleinen Wafferwürmern und Seegräfern; holt auch vom Boden die Eingeweide der Fifche, welche von den Fifchern in die See geworfen werden, herauf. Niftet in Felfenklippen, auch im Grafe, unter Wachholderbüfchen. Legt dreymal Eyer, das erfte mal 5, das andere mal 3, das dritte mal mehrentheils nur *eins*, aber jedes mal in ein anderes Neft. Die erfte Brut gefchiehet zu Ende des Junius und Anfang des Julius. In Island werden dem Vogel die beyden erften male die Eyer mit fammt den Federn, an andern Orten aber nur das erfte mal weggenommen. Die ganze Legezeit dauert 6 bis

Borowsky, Thierreich, III. p. 5. n. 1. *der Eidervogel.* Tab. 97.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 226. n. 5. Anas (Mollissima) rostro cylindrico, cera postice bifida, rugosa; *der Eidervogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 384. n. 5. *die Eidergans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 625. n. 6. *die Eidergans.* p. 636. *Eidervogel, Eider, St. Kuthbertsente.* Tab. 21. 22.

Funke, Naturgesch. I. p. 315. *der Eidervogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 69. *der Eidervogel.*

Halle, Vögel, p. 549. n. 652. *die Eidergans.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 99. n. 98. *der Eidervogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 506. *Eidergans.*

Onomat. histor. nat. I. p. 421. *die Eydergans.*

Klein, av. p. 130. n. 10. Anas, plumis mollissimis.

Klein, Vorber. p. 241. n. 10. *Eidergans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 137. n. 10. *Eidergans.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 514. n. 398. *die Eidergans.*

Beckmann, Naturhist. p. 43. n. c. *der Eider.*

Brisson,

bis 7 Wochen. Das Weibchen brütet 28 Tage. Das Alter dieses Vogels erstreckt sich auf 25 bis 30 Jahr. Die Dunen aus einem Neste wiegen etwa 3/4 Unzen. Sie sind so elastisch, dass man zur Ausstopfung eines ganzen Bettes nur etwa 5 Pfund nöthig hat. Die isländische Compagnie verkauft beynahe jährlich für 4000 Thaler Dunen nach Dänemark und Schlesswig. In Island und Norwegen sind die Eidergänse in manchen Gegenden halb gezähmt, und nisten in Menge nahe an den Wohnungen.

Brisson, ornitholog. II. p. 440. n. 13. Oie à duvet ou Eider.

Batsch, Thiere, I. p. 377. *der Eydervogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 274. Eider or Cuthbert Duck.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 845. n. 35. Anas (Mollissima) rostro cylindrico, cera postice basi rugosa.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 91. *die große weiße und schwarze Ente.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 330. n. 76. *die Eydergans.*

Phipps Reis. n. d. Nordpol, p. 97. *der Eider.*

Uno von Troil, Reis. d. Isl. p. 116 *Eider.*

Olassen, Isl. I. p. 33. 119. 293 *Eidervogel.*

Cranz, Hist. von Grönl. p. 115. *der Eider Vogel.*

Egede, Beschr. v. Grönl. p. 117 *der Eidervogel.*

Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 42. *Eider-Enten, St. Cuthberts-Enten.*

Tremarec, Reis. n. d. Nordsee, p. 76.

Fabricius, Reisen n. Norwegen, p. 294. *Eidervogel.*

Leem, Lappl. p. 140. *Aederfugle.*

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 168. n. 6. *Eddergaas.*

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 132. *Edder, Aedder-Aerfugl;* mit 1 Fig.

Linné, Reis. d. Oel. und Gothl. p. 230.

Debes, Hist. der Ins. Feroë, p. 122

Schwed. Abh. XLI. p. 24. Anas mollissima.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 193. n. 18. *die Eidergans.*

Oekon. Zool. p. 71. n. 11. *die Eydergans.*

Krünitz, ökon. Encyklop. X. p. 331. *Eidergans.*

Meidinger, Vorles. I. p. 123. *die Eidergans.*

Sander,

Sander, über die Gröſse u. Schönheit in der Nat. I. p. 251. *Eydergans.*
Berlin. Samml. I. p. 96. VII. p. 156. *Eydervogel.*
Neueſte Mannichfalt. I. p. 177. II. p. 123.
Beckmann, phyſikal. ökonom. Bibl. III. p. 244. VI. p. 188.
Hübner, Handlungslex. p. 611.
Bohn, Waarenlager, p. 255.
Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1151.
Brünich, natürl Hiſt. des Eider-Vogels; aus dem dän. überſ. m. K. Koppenh. 1763. 8.
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 54. *Eider.*
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 92. n. 8. Anas plumis molliſſimis.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 124. n. 12. Anas (Molliſſima) roſtro cylindrico, cera poſtice bifida rugoſa.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 116. Anas (Molliſſima) roſtro cylindrico, cera poſtice bifida rugoſa.
Bartholin. act. med. Hafn. I. p. 90. — Med. dan. dom. p. 65.
Thorlacii diſſ. chorograph. hiſt. Island. Witt. 1661. fol. 15.
Buchanani oper. Lugd. Bat. 1725. I. p. 44.
Muſ. Besler. p. 36. Avis inter Anſerem et Anatem feram media. Tab. 9. n. 6. *Abbild. des Weibchens ſchlecht.*
Sibbald. Scot. illuſtr. II. 3. p. 21. Tab. 18.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 258. n. 11. *die Eidergans.*

16. MOSCHATA. *Die Biſamente.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 288. n. 16. *Biſam-Ente.*

Leske, Naturgeschichte, p. 287. n. 4. *die Bisamente.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 11. n. 4. *die Bisamente, lybische Ente.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 386. n. 6. *die Bisamente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 636. n. 7. *die Bisamente.* p. 633. *indianische, kairische, lybische Ente.*

Halle, Vögel, p. 553. n. 658. *die türkische Ente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 106. n. 99. *die Bisamente.*

Onomat. histor. nat. I. p. 413. *die Bisamente.*

Klein, av. p. 131. n. 2. Anas Indica.

Klein, Vorbereit. p. 242. n. 2. *türkische Ente. fremde Ente, indianischer Endrach.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 138. n. 2. *türkische Ente.*

Gesner, Vögelb. p. 64. *indianischer Entrach;* mit 1 Figur.

Brisson, ornithol. II. p. 446. n. 3. Canard musqué.

Batsch, Thiere, I. p. 376. 378. *die Bisamente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 846. n. 37. Anas (Moschata) facie nuda papillosa.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 330. n. 77. *Bisamente, moscowitische Ente.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 336. *die Ente aus der Barbarey.*

Georgi, Reise d. Russl. II. p. 482. *die Moschusente.*

Naturf. XII. p. 135. n. 76. *Bisam-Ente.*

Hübner, physikal. Tageb. II. p. 161. *Bisamänte.*

Schwed. Abh. XLI. p. 24. Anas Moschata.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 74. n. 85. *die türkische Ente.*

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 11. Anas moschata.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. 13. Anas (Moschata) facie nuda papillosa.

Charleton, onomast. zoic. p. 9. n. 2. Anas Indica. n. 3. A. Lybica. n. 4. A. Muscovitica. n. 5. A. Cairina.

Jonston, av. p. 143. Anas Cairina, Lybica, Indica.

Phil. Transact. lvii. p. 348.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 259. n. 12. *die Bisamente.*

71. RUFA. *Die braunköpfige Ente.* (1)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 659. n. 3. *der Rothhals.*

Latham, Syn. III. 2. p. 477. n. 32. Rufous-necked Duck.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 863. n. 78. Anas (Rufa) cinerea, capite et collo rufis, rostro, pectore pedibusque nigris.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 72. n. 81. *der Rothhalß.*

72. LEUCOCEPHALA. *Die weißköpfige Ente.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 680. n. 1. *die weißköpfige Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 858. n. 64. Anas (Leucocephala) cinereo lutescens nebulosa, fusco pulverato, corpore antice fusco, luteonigro undulato, capite colloque albis, macula verticis collarique nigris.

(1) Nach *Latham* und *Bechstein* eine Spielart von *Anas Ferina*, p. 530. n. 31.

(2) Nach *Bechstein* eine Spielart von *Anas Glaucion* p. 525. n. 26. Nach *Latham* gehört auch *Anas Marsa* p. 520. n. 84. mit hieher.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 70. n. 79. *die weißköpfichte Ente.*

73. Monacha. *Die Mönchente.* (3)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 680. n. 2. *die Mönchente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 847. n. 40. Anas (Monacha) albo nigroque varia, rostro flavescente, apice nigro, speculo alarum viridi violaceo.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 71. n. 80. *die Mönchente.*

74. Melanura. *Die schwarzschwänzige Ente.* (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 681. n. 3. *die schwarzschwänzige Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 861. n. 72. Anas (Melanura) cinerea, rostro pedibusque testaceis, vertice dorsoque rufis, remigibus rectricibusque nigris.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 72. n. 82. *die schwarzschwänzige Ente.*

75. Torrida. *Die schwarznackige Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 681. n. 4. *die schwarznackige Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 845. n. 33. Anas (Torrida) capite albo, collo supra nigro, subtus castaneo.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 75. n. 86.

76. Al-

(3) Nach *Bechstein* eine Spielart von der *gemeinen Ente.*

(4) Nach *Bechstein*, nebst den beyden folgenden Gattungen, blosse Spielarten der *gemeinen* oder Bastarde von der *gemeinen* und *Bisamente.*

76. Albicans. *Die weißstirnige Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 681. n. 5. *die Weißstirn.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 845. n. 34. Anas (Albicans) supra fusca, fronte subtusque alba, capite colloque fusco-rufis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 75. n. 87. *die Weißstirn.*

77. Georgica. *Die georgische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 847. n. 41. Anas (Georgica) cinereo-nebulosa, rectricibus alarum cinerascentibus, speculo alarum viridi albo maculato, remigibus rectricibusque nigricantibus.

17. Bahamensis. *Die bahamische Ente.*

Müller, Natursystem, II. p. 289. n. 17. *bahamische Ente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 524. n. 413. *die bahamische Ente.*

Halle, Vögel, p. 561. n. 675. *die Bahamerente, mit vergoldetem Dreyecke auf der Nase.*

Klein, av. p. 134. n. 18. Anas Bahamensis.

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 18. *Bahamer.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 141. n. 18. *bahamische Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 456. n. 12. Canard de Bahama.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 855. n. 58. Anas (Bahamensis) grisea, rostro plumbeo, macula laterali fulva, macula alarum viridi luteaque.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 86. *die bahamische Ente mit bleyfarbenem Schnabel.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. 14. Anas (Bahamensis) grisea, rostro plumbeo, macula laterali fulva, alarum viridi luteoque.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 158. Anas Bahamensis.

Jonston, av. p. 208. Mareca, anatis sylvestris species, sed parva.

78. Brasiliensis. *Die brasilianische Ente.*

Halle, Vögel, p. 566. n. 689. *die braune Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 557. n. 13. Canard du Brésil.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 856. n. 59. Anas (Brasiliensis) fusca, subtus griseo-aurea, inter rostrum et oculum albo-flavescens, speculo alarum viridi-caeruleo nigro, subtus marginato.

Jonston, av. p. 208. Mareca, alia species.

79. Erythrorhyncha. *Die rothschnäblige Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 855. n. 57. Anas (Erythrorhyncha) fusca, subtus alba, pectore lateribus maculis fuscis, fascia alarum alba, alteraque subtus lutescente, cauda nigra.

18. Albeola. *Die Gespensterente.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 290. n. 18. *Weißling.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 519. n. 405. *die Gespensterente.*

Klein, av. p. 136. n. 33. Anas parva ex nigro et albo variegata.

Klein, Vorbereit. p. 251. n. 33. *kleine schwarz- und weißbunte Ente.*

Klein,

(5) *Latham* rechnet hieher auch die *Anas Bucephala Linn.* p. 521. n. 21 und nimmt die *Anas Rustica Linn.* p. 524. n. 24. für das Weibchen an.

Klein, verb. Vögelhist. p. 143. n. 33. *schwarz- und weißbunte Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 481. n. 38. Sarcelle de la Louisiane.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 866. n. 86. Anas (Albeola) alba, dorso remigibusque nigris, capite colloque caerulescente, sericeo nitente, occipite albo.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 95. *die kleine schwarz- und weiße Ente.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 124. n. 15. Anas (Albeola) alba, dorso remigibusque nigris, capite caerulescente, occipite albo.

Philos. Transact. lxii. p. 416. n. 18.

80. STELLERI. *Stellers Ente.* (6)

Müller, Natursystem, Suppl. p. 102. n. 39. c. *die Stellersente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 525. n. 415. *Stellers Ente.* Tab. 23. obere Figur.

Hermann, tab. aff. anim. p. 158. 1. Anas Stelleri.

19. CLYPEATA. *Die Löffelente.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 290. n. 19. *Löffelente.*

Leske, Naturgesch. p. 287. n. 5. *die Löffelente.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 12. n. 5. *die Löffelente, Schildente, Spadelente.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 227. n. 7. Anas (Clypeata) rostri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo; *die Löffelente.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 388. n. 14. *die Löffelente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 675. n. 21. *die Löffelente.* p. 677. *Schildente, (Spatelente,)*

(6) *Latham* rechnet sie zu *Anas Dispar* p. 535. n. 107.

(7) Flügelweite 2 Fuss 7 1/2 Zoll. Gewicht 22 Unzen.

te,) Leppelschnute, Breitschnabel, deutscher Pelikan, Seefasan; bey den Jägern *Taschenmaul.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 691. n. 161.

Pennant, arct. Zool. II. p. 517. n. 403. *die Löffelente.*

Ebert, Naturl. II. p. 70 *die Löffelente.*

Halle, Vögel, p. 558. n. 668. *die Löffelente.*

Neuer Schaupl. der Nat. V. p. 182. *Löffelente.*

Onomat. hist. nat. I. p. 418 *die Schildente.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 371. *die Löffelente.*

Klein, av. p. 132. n. 10. Anas latirostra.

Klein, Vorber. p. 245. n. 10. *Löffelente, Breitschnabel, Schallente, Lepelgans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 140. n. 10. *Löffelente.*

Klein, stemm. av. p. 31. Tab. 35. fig. 1. a-c.

Klein, av. p. 134. n. 20. Anas latirostra americana.

Klein, Vorbereit. p. 248. n. 20. *aufgeworfener Breitschnabel aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 141. n. 20. *aufgeworfener Breitschnäbler.*

Gesner, Vögelb. p. 84. *ein großer Breitschnabel, (Räsgenkopff).* p. 85. *eine andere Gattung, (Breitschnabelkopff.)*

Brisson, ornithol. II. p. 450. n. 6. Souchet.

Batsch, Thiere, I. p. 378. *die Löffelente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 856. n. 60. Anas (Clypeata) rostri extremo dilatato, rotundato, ungue incurvo.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 330. n. 78. *Löffelente, Stockente.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 84. *Schildente, Löffelente.*

Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 18. *Löffelenten.*

Linné, Reis. d. Oel. und Gothl. p. 185.

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die breitschnäblichte Ente.*

Naturf. XII. p. 135. n. 77. *Löffel-Ente.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 92 *die americanische Ente mit breitem Schnabel.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reis. I. p. 189. III, p. 14. *Schildenten.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168. n. 7. *Leffel, Kropand eller Stockand, Krofente oder Stockente.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 45. n. 76. *die Löffelente.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 63. n. 70. *die Löffel-Ente.*

Sander, Grösse und Schönheit in der Natur, I. p. 261. *die Löffelente.*

Schneider, zool. Abh. p. 139. Anas Clypeata.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 12. Anas Clypeata.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. 16. Anas (Clypeata) rostri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 117. Anas (Clypeata) rostri extremo dilatato-rotunda o, ungue incurvo.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 204. Anas latirostra; *ein Löffel-Endtle, breitschnäblichte Wild-Endtle.*

Charleton, onomast. zoic. p. 9. n. 7. Anas Platyrynchos Gesneri.

Mus. Worm. p. 301. Anas platyrynchos; c. fig.

Jonston, av. p. 145. Platyrynchi; *Schellenten, Taschenmaul.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 159. t. x. Anas Clangula.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 259. n. 13. *die Löffelente.*

β. *Die Morente.*

Halle, Vögel, p. 557. n. 667. *die Morente*, *Fliegenente.*

Klein, av. p. 132. n. 9. Anas Muscaria.

Klein, Vorbereit. p. 245. n. 9. *Morente*, *Muck-*, *Fliegen-*, *Murentel*, *Muggente.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 139. n 9. *Morente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 451. n. 6. A. Souchet à ventre blanc.

Gesner, Vögelb. p. 81. *Muckent*; mit 1 Fig.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 205. Anas fera 17. seu minor 5. *ein Mück-Endtle*, *Mos-Endtle*, *Mur-Endtle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 857. n. 60. β. A. macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pectore rufescente.

Jonston, av. p. 145. Anas muscaria.

γ. *Die Tempatlahoac.*

Latham, Syn. III. 2. p. 511.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 857. n. 60. γ. Anas fera boschas mexicana *Briss.*

Brisson, ornithol. II. p. 449. n. 5. Canard sauvage du Mexique.

81. Mexicana. *Die mexikanische Löffelente.* (Yacapatlahoac.)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 857. n. 61. Anas (Mexicana) supra nigro fulvo alboque varia, subtus fulva, tectricibus alarum minoribus albis, macula alarum viridi aurea.

Brisson, ornitholog. II. p. 452. n. 7. Souchet du Mexique.

82. Ru-

82. Rubens. *Die rothbrüstige Löffelente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 857. n. 62. Anas (Rubens) fusca, iugulo et pectore rubro-fuscis, speculo alarum purpureo-albo-maculato, cauda brevi alba.

83. Jamaicensis. *Die jamaicaische Löffelente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 857. n. 63. Anas (Jamaicensis) fusco croceo ferrugineoque varia, dorso, alis caudaque fuscis, capite superiore nigro, subtus cum gula albo maculis nigris.

84. Mersa. *Die Ruderente.* (s)
Müller, Natursyst. Suppl. p. 102. n. 47. *die Ruderente.*
Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 15. n. 29. Anas mersa. Tab. H.

85. Scandiaca. *Die lappmärkische Ente.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 536 M. *die lappmärkische Ente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 859. n. 68. Anas (Scandiaca) spadiceo-fusca, rostro ampliato, corpore supra nigro, linea alari, pectore et abdomine albis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 13. Anas (Skorra) supra fusca, punctis confertis; taenia alarum obliqua, maculaque utrinque ad basin rostri albis, hypochondriis ferrugineis.
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 140. *Skoarra.*

20. Strepera. *Die Schnatterente.*
Müller, Natursystem, II. p. 291. n. 20. *Schnatter-Ente.*

Borowsky.

(s) Ist, nach *Latham*, mit *Anas Leucocephala*, p. 516. n. 72. einerley.

Borowsky, Thierreich, III. p. 12. n. 6. *die Schnarrente.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 386. n. 7. *die Schnatterente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 642. n. 9. *die Schnatterente.* p. 644. *Schnarrente, graue und braune Ente.*

Halle, Vögel, p. 555. n. 663. *die Schnarrente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 107. n. 100. *die Schnatterente.*

Onomat. hist. nat. I. p. 415. *die graue oder braune Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 536. L. *die Schnatterente.*

Klein, av. p. 132. n. 6. Anas fera 10. seu strepera.

Klein, Vorbereit. p. 244. n. 6. *Schnarrente, Mittelnte.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 139. n. 6. *Schnarrente.*

Brisson, ornithol. II. p. 452. n. 8. Chipeau.

Batsch, Thiere, I. p. 378. *die Schnatterente.*

Gesner, Vögelb. p. 86. *ein Leiner.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 859. n. 69. Anas (Strepera) speculo alarum rufo nigro albo.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 331. n. 79. *Schnarr-, Schnatterente.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80, n. 77. *Schnatterente.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 338. n. 90. *die Schnatterente, Lärmente.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 168. n. 8. *Knarand.*

Naturforsch. XII. p. 136. n. 78. *Schnatterente.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas strepera.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 20. Strepera.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 125. n. 15. Anas (Strepera) macula alarum rufa, nigra alba.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 118. Anas (Strepera) speculo alarum rufo, nigro albo.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 202. Anas fera 10. seu strepera; *Scherr-Endtlin.*

Jonston, av p. 145. Anas platyrynchos rostro nigro et plano.

Donndorf, Handb. der Thiergesch p. 260. n. 14. *die Schnatterente.*

86. Falcaria. *Die Sichelente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 534. I. *die Sichelente.* Tab. 23. untere Figur.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 860. n. 70. Anas (Falcaria) cristata, corpore cano fuscoque variegato, pectore squamato-undulato, fronte, gula, torque colli fasciaque alarum albis.

Pallas, Reise, Ausz III. Anh. p. 12. n. 34. Anas *falcaria; Mongolis Boro-Nogossum*, et *Chartologoi Nogossum.*

21. Bucephala. *Die dickköpfige Ente.* (9)

Müller, Naturs. II. p. 291. n. 21. *Dickkopf.*

Halle, Vögel, p. 567. n. 694. *die dickköpfige Cardinalente.*

Klein, av. p. 134. n. 19. Anas minor, capite purpureo.

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 19. *Purpurköpfchen mit weißen Backen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 141. n. 19. *Büffelskopf.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 90. *die kleine Ente mit purpurfarbenem Kopf.*

Brisson,

(9) Nach *Latham* mit *Anas Abeola*, p. 517. n. 18. einerley.

Briſſon, ornitholog. II. p. 454. n. 10. Canard d' hyver.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 46. n. 77. *der Dickkopf.*

Schriften der berlin. Geſellſchaft naturf. Freunde, VII. p. 455. n. 27. *der Dickkopf.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 279. n. 6. *die Büffelkopf-Ente.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 125. n. 19. Anas (Bucephala) albida, dorſo remigibusque nigris, capite ſupra infraque tumido ſericeo nitente.

Hermann, tab. affin. animal. p. 152. Anas Bucephala.

22. DOMINICA. *Die Ente von St. Domingo.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 292. n. 22. *domingiſche Ente.*

Briſſon, ornithol. II. p. 484. n. 42. Sarcelle de St. Domingue.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 874. n. 102. Anas (Dominica) rufa, capite anteriore fuliginoſo, ſpeculo alarum candido, rectricum ſcapis aterrimis.

87. SPINOSA. *Der Stachelſchwanz.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 874. n. 103. Anas (Spinoſa) fuſco-nebuloſa, genis gulaque albis, vertice faſcia per oculos alteraque maxillari utrinque nigris, rectricibus mucronatis.

88. AFRICANA. *Die afrikaniſche Ente.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 875. n. 105. Anas (Africana) dorſo, alis caudaque nigris, capite, collo pectore ſupremo abdomineque fuſcorufis, macula pectoris inferioris faſciaque alarum albis.

89. MADAGASCARIENSIS. *Die madagascarische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 875. n. 105. Anas (Madagascariensis) obscure viridis, facie ultra oculos, gula abdomineque albis, iugulo, imo pectore et lateribus ferrugineis fusco-undulatis, infra aures macula ovata viridi.

90. COROMANDELIANA. *Die Ente von Coromandel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 875. n. 106. Anas (Coromandeliana) alba, vertice, dorso, alis caudaque aeneo-fuscis, collo maculis striisque nigricantibus, macula alarum alba.

91. MANILLENSIS. *Die manillische Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 875. n. 107. Anas (Manillensis) fusca, capite anteriore, gula iugulique parte suprema albis, abdomine albo lunulis nigris, remigibus rectricibusque schisti colore.

92. FORMOSA. *Die schöne Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 876. n. 108. Anas (Formosa) fusca, vertice nigro albo marginato, gula rufescente nigro maculata, alarum speculo nigro testaceo-marginato, anterius macula obliqua viridi nitente insignito.

β. A. fusca, vertice nigro, capite lateribus fusco-flavescentibus, pone oculos viridi macula incurvata nigra. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 876. n. 108. β.

93. HINA. *Die chinesische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 876. n. 109. Anas (Hina) regione oculorum viridi.

23. CLANGULA. *Die Quackente.* (10)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 292. n. 23. *Quacker-Ente.*

Leske, Naturgeſch. p. 288. n. 6. *die Quackerente.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 386. n. 8. *die Quackente.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 645. n. 10. *die Quackente.* p. 647. *Kobelente, Quackerente, Klangente, Hohlente, Dickkopf;* das Männchen; *Köllje;* das Weibchen: *Köllje-Quene* (Strauſsente) *Vieräuglein.*

Halle, Vögel, p. 559. n. 671. *die Baumente, goldäugige Ente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 107. n. 101. *die Kobelente, Straußente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 518. n. 507. *die Kobelente.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 602. n. 12. *Schreyer, Goldäuglein.*

Onomat. hiſt. nat. I. p. 417. *die Klangente, Hohlente.*

Klein, av. p. 133. n. 13. Anas Clangula.

Klein, Vorbereit. p. 246. n. 13. *Golden Aeuglein.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 140. n. 13. *Golden Aeuglein.*

Klein, av. p. 135. n. 27. Anas Platyrynchos.

Klein, Vorbereit. p. 250. n. 27. *Vieräuglein.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 142. n. 27. *Vieräuglein.*

Briſſon, ornith. II. p. 470. n. 27. Garrot.

Gesner, Vögelb. p. 82. *Clangula oder Klinger.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 867. n. 87. Anas (Clangula) nigro alboque varia, capite tumido violaceo, ſinu oris macula alba.

Beſeke,

(10) Flügelweite 31 Zoll. Gewicht 2 Pfund. *Penn.*

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 46. n. 78. *die Quackerente.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 83. *Quackente.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 332. n. 80. *Quakerente.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 14. *Klapperenten.*

Linné, Reis. d. Oel. u. Gothl. p. 56.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14 *die Brillenente.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 168. n. 10. *Hvinand, Blankekniv.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 126. *Hvin- oder Quiin-Ander.*

Scopoli, Bemerk a. d. Naturgesch. I. p. 64. n. 71. *das Goldäuglein.*

Naturf. XII. p. 136. n. 79. *Qwackerente.*

Schwed. Abh. XLI. p. 23. Anas Clangula.

Sander, Grösse u. Schönheit in der Nat. I. p. 261. *die Quackerente.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Clangula.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 19. Clangula.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 125. n. 20. Anas (Clangula) nigro alboque varia, capite tumido nigro-viridi, sinu oris macula alba.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 119. Anas (Clangula) nigro alboque varia, capite tumido violaceo, sinu oris macula alba.

Kramer, Austr. p. 341. n. 13. Anas nigro alboque variegata, capite nigro viridi, sinu oris alba macula; *Eiß-Ente.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 200. Anas fera 6. seu cristata; *ein Strauß-Endte, Kobel-Endte.*

Phil. Transact. lxii. p. 417. n. 48.

Herrmann, tab. affinit. animal. p. 158. 159. Anas Clangula.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 260. n. 15. *die Quackente.*

24. RUSTICA. *Die graue Halbente.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 293. n. 24. *graue Halbente.*

Klein, av. p. 134. n. 22. Anas minor ex albo et fusco varia.

Klein, Vorbereit. p. 249. n. 22. *Graukopf mit weissen Backen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 142. n. 22. *Graukopf.*

Brisson, ornitholog. II. p. 284. n. 39. Sarcelle de la Caroline.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 867 n. 86. β. A. fusco-cinerea, macula aurium alarumque alba.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 96. *die kleine weiße und braune Ente.*

Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 80. n. 78. *Graukopf.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 135. n. 21. Anas (Rustica) fusco-cinerea, macula aurium alarumque alba.

25. PERSPICILLATA. *Die Brillenente.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 293. n. 25. *Brillente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 516. n. 402. *die schwarze Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 475. n. 5. *die Brillenente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 143. n. 36. *schwarze Ente mit weißer Platte.*

Brisson,

(1) Nach *Latham* das Weibchen von *Anas Albeola*, p. 517. n. 18.

(2) Flügelweite 35 Zoll. Gewicht 2 Pfund, 2 Unzen. *Penn.*

Brisson, ornithol. II. p. 472. n. 30. grande Macreuse de la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 847. n. 42. Anas (Perspicillata) nigra, vertice nuchaque albis, macula nigra rostri pone nares.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 125. n. 22. Anas (Perspicillata) nigra, vertice nuchaque albis, macula nigra rostri pone nares.

Philos. Transact. lxii. p. 417.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 260. n. 16. *die Brillenente.*

26. GLAUCION. *Die Spatelente.*

Müller, Natursystem, II. p. 293. n. 26. *Breitschnabel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 677. n. 22. *die Spatelente.* p. 679. *Breitschnäbel, breitschnäblige Enten, Löffelenten, Leppelschnuten. (Lepelgänse) Schalienten, Schellenten, Blauaugen.*

Halle, Vögel, p. 565. n. 686. *die Ringente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 106. n. 102. *die Löffelente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 533. F. *die Spatelente.*

Gesner, Vögelb. p. 72. *Glaucion.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 868. n. 88. Anas (Glaucion) corpore nigricante, pectore nebuloso, speculo alarum albo lineari.

Brisson, ornithol. II. p. 468. n. 25. Morillon.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 25. n. 80. *der Breitschnabel.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 168. n. 10. *Krukkop, Dyker.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 65. n. 72. *die eisengraue Ente.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Glaucion.

Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 54. Glaucium.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 21. Glaucion.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 126. n. 23. Anas (Glaucion) iridibus flavis, capite griseo, collari albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 120. Anas (Glaucion) corpore nigricante, pectore nebuloso, speculo alarum albo lineari.

Fabric. fn. groenl. p. 70. n. 44. Anas (Glaucion) corpore nigricante, pectore nebuloso, speculo alarum albo lineari.

Brünich, ornithol. bor. p. 20. n. 89. Glaucion?

Charleton, onomast. zoic. p. 100. n. 4. Glaucius.

Jonston, av. p. 145. Glaucius.

94. Novae hispaniae. *Die surinamische Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 480. Sarcelle du Mexique.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 868. n. 89. Anas (Novae Hispaniae) alba nigro-maculata, capite fulvo-nigricante, et viridi-caeruleo vario, tectricibus alarum et crisso caeruleis, macula inter rostrum et oculum fasciaque alarum alba.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 261. n. 17. *die surinamische Ente.*

95. Malacorhynchos. *Die weichschnäblige Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 862. n. 76. Anas (Malacorhynchos) caeruleo-cinerea, rostri apice flexili membranaceo, vertice viridi-cinereo, alarum macula transversa alba.

96. GLOCITANS. *Die gluckende Ente.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 535. ad K. *gluckende Ente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 862. n. 75. Anas (Glocitans) subcristata fusca, nigro undulata, capite viridi, macula ante poneque oculos ferruginea, pectore maculis nigris, speculo alarum viridi, albo marginato.
Schwed. Abh. XLI. p. 22. *die glucksende Ente.*
Gmelin, Catal. mus. Petropol. I. p. 408. n. 670. Querquedula glocitans torquata.

97. AMERICANA. *Die amerikanische Pfeifente.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 528. n. 420. *die amerikanische Pfeifente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 861. n. 74. Anas (Americana) ferrugineo nigroque undulata, abdomine albido, capite albo nigroque maculato, pone oculos striga utrinque ad nucham nigro-virescente, tectricibus alarum medio albis.

98. CAPENSIS. *Die capsche Pfeifente.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 861. n. 73. Anas (Capensis) cinerascens, dorso ex rubescente fusco, pennis margine flavescentibus, speculo alarum caeruleo-virescente, albo marginato.

27. PENELOPE. *Die* (gemeine) *Pfeifente.* (3)
Müller, Natursystem, II. p. 294. n. 27. *Pfeifente.* Tab. 22. fig. 6.
Borowsky, Thierreich, III. p. 13. n. 7. *die Pfeiffente.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 387. n. 9. *die Pfeifente.*

(3) Flügelweite 2 Fuss 3 Zoll. Gewicht 23 Unzen. *Penn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 648. n. 11. *die Pfeifente.* p. 651. *Speckenten, Penelopeenten, Schmünten.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 692. *die Pfeifente.*

Halle, Vögel, p. 555. n. 664. *die Pfeifente.*

Onomat. histor. nat. V. p. 245. *Penelope.*

Klein, av. p. 132. n. 7. Anas Fistularis.

Klein, Vorbereit. p. 244. n. 7. *Pfeifente.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 139. n. 7. *Pfeifente.*

Klein, Vögeleyer, p. 35. Tab. 21. fig. 3.

Gesner, Vögelb. p. 72. *Penelope.*

Gesner, Vögelb. p. 85. *ein Pfeiffent.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 535. K. *die Pfeifente.*

Brisson, ornithol. II. p. 464. n. 21. Canard siffleur.

Batsch, Thiere, I. p. 378. *die Pfeifente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 860. n. 71. Anas (Penelope) cauda acutiuscula, crisso nigro, capite brunneo, fronte alba, dorso cinereo undulato.

Beseke, Vögel Kurl. p. 47. n. 81. 82. *die Pfeifente.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 80. *Brandente, Rothhals.* (welche Synonymen ihr eigentlich nicht zukommen.)

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 89. III. p. 14. *Penelopen oder Pfeifenten.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 339. *die Penelope.*

White, Naturgesch. von England, p. 62. n. 13. *Pfeifente.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. Anas Fistularis *Briss.* p. 22. A. Penelope.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 72. *Speck - oder Pfeiff-Ente.*

Linné,

Linné, auserl. Abh. II. p. 285. n. 48. *die Pfeifente.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168. n. 11. *Brunnacke.*

Naturf. XII. p. 136. n. 80. *Pfeifente?*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Penelope.

Krünitz, Encykl. XI. p. 41. *Pfeif- oder Speckänten.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 126. n. 24. Penelope.

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 22. Penelope.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 126. n. 24. Anas (Penelope) cauda acutiuſcula ſubtus nigra, capite brunneo, fronte alba.

Müller, zool. dan. prodr. p. 15. n. 121. Anas (Penelope) cauda acutiuſcula, criſſo nigro, capite brunneo, fronte alba, dorſo cinereo-undulato.

Kramer, Auſtr. p. 342. n. 16. Anas capite brunneo, fronte alba, cauda ſubtus nigra; *Eiſsente mit weiſser Platte.*

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 202. Anas fera II. ſeu canora; *ein Pfeiff-Endtlin.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 100. n. 2. Boſchas, aliis Anas Fiſtularis.

Jonſton, av. p. 146. Penelope.

β. Kagolka. *Latham*, Syſt. ornith. II. p. 861. n. 71. β.

28. Acuta. *Der Pfeilſchwanz.* (4)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 295. n. 28. *Pfeilſchwanz.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 651. n. 12. *der Pfeilſchwanz.* p. 653. *Langhals, Nadelſchwanz,*

(4) Flügelweite 3 Fuſs, 2 Zoll. Gewicht 24 Unzen. *Penn.*

schwanz, Spitzschwanz, Spießente, Pfeifente, Pylst ert.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 691. *Fasanenente*, p. 695. *grauer Mittelente.*

Halle, Vögel, p 560. n. 672 *die Spiesente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 108. n. 104. *der Pfeilschwanz.*

Pennant, arct. Zool. II p. 527. n. 418. *der Nadelschwanz.*

Klein, av. p. 133. n. 15. Anas Caudacuta.

Klein, Vorbereit. p. 246 n. 15. *Spiesente, Spitzschwanz.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 141. n. 15 *Spießente.*

Klein, av p. 136. n. 32. Anas fera, ventre candido?

Klein, Vorber. p. 251. n. 22. *wilde Ente mit einem weißen Bauche?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 143. n. 32. *Weißbauch?*

Gesner, Vögelb. p 86. *ein Spitzschwanz.*

Brisson, ornitholog. II. p. 459. n. 16. Canard à longue queue.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 864 n. 21. Anas (Acuta) cauda acuminata elongata, subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 48. n. 82. *der Pfeilschwanz.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reis. I. p. 189 *Pfriemenente.* III. p. 14. *spitzschwänzige Enten.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 65. n. 73. *die Spießente.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Acuta.

Neue schwed. Abhandl. I. p. 299. *die isländische Ente.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 74. *die Spies-Ente.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 10. Anas cauda acuta.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 25. Anas (Acuta) cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 122. Anas (Acuta) cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato.

Brünich, ornithol. bor. app. p. 77. Anas Acuta.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 202. Anas fera 12. seu Caudacuta; *ein Spies-Endte.*

Charleton, onomast. zoic. p. 9. n. 10. Anas Caudacuta.

Jonston, av. p. 146. Anas Caudacuta.

Hermann, tab. affin. anim. p. 159. Anas Acuta.

99. FERRUGINEA. *Die rothbraune Ente.*(5)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 536. N. *die rothe Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 866. n. 84. Anas (Ferruginea) fusco-rufa, abdomine albo, rostro dilatato pedibusque pallide caeruleis.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 16. Anas fluviatilis.

Linné, fn. Suec. I. n. 112. II. n. 134. Anas *rufa*, rostro pedibusque cinereis.

29. HYE-

(5) Gewicht, nach *Pennant*, 10 Unzen. Weder in der X. noch XII. Edition des Syst. Nat. hat *Linné* diese Gattung aufgeführt. In den Faun. Suec. I. und II. Ed. steht nicht Anas *rutila*, sondern *rufa*. Die Charaktere stimmen auch mit *Pennants* Beschreibung gar nicht überein. *Linné* hat das Thier, nach seinem eignen Geständniss, nicht gesehen. Fn. II. l. c. *Latham* ist geneigt es für das Weibchen von *Anas Dispar*, p. 535. n. 107. zu halten.

29. Hyemalis. *Die Winterente.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 295. n. 29. *Winterente.*

Halle, Vögel, p. 560. n. 673. *die Isländerente.*

Halle, Vögel, p. 564. n. 685. *die nordliche Schwanzente.*

Onomat. hiſt. nat. I. p. 409. *der Spitzſchwanz.* p. 410. *die Winterendte.*

Klein, av. p. 133. n. 16. Anas Islandica, cauda protenſa.

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 16. *isländiſche Spieß-ente mit langem Schwanze.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 141. n. 16. *isländiſche Spießente, Gadelbuſch.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 143. n. 37. *Weißback mit langen Schwanzfedern.*

Briſſon,

(6) Unter den Synonymen *dieſer* und der *folgenden* Gattung herrſcht groſse Verwechſelung und die Meynungen der Ornithologen ſind ſehr getheilt, ob beyde als wirklich von einander verſchiedene Gattungen, oder nur als Spielarten zu betrachten ſind. So nimmt z. E. *Latham* die *Anas Glacialis* für das erwachſene Männchen; die *Anas Hyemalis* mit den Synonymen aus *Raj. Will. Edw.* Tab 156 *Briſſ.* n. 17. und Fn. Suec n. 125. für ein junges Männchen; *Pennants long-tailed Duck*, für das Weibchen; und *Briſſons Querquedula Feroenſis* als eine Spielart an. Aus den Synonymen des *Pennant* erhellet, daſs er ebenfalls die *Anas Hyemalis* und *Glacialis* für einerley hält; hält aber *Briſſ. Querquedula Feroenſis* für das Weibchen. Bey *Müller* und *Brünich* finde ich der *Anas Glacialis* gar nicht gedacht *Fabricius* (fn. groenl. p. 71.) nimmt die *Anas Hyemalis Linn.* zur Hauptgattung, ſieht *Brünichs* n. 75. als das Männchen, n. 76. als ein junges Männchen, n. 77. 78. als das Weibchen, und n. 79. als ein junges Weibchen an. *Brünich* ſelbſt aber iſt ungewiſs, wie alle dieſe dem Alter, Geſchlecht (Sexus) oder Gattung nach verſchieden ſeyn mögen Ich habe die Synonymen überhaupt nach Anleitung unſers Syſtems geordnet; bin aber ſehr geneigt, mit *Bechſtein* die *Anas Hyemalis* und *Glacialis* für einerley Gattung anzunehmen.

Brisson, ornithol. II. p. 460. n. 17. Canard à longue queue d'Islande.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 865. n. 82. β. Anas cauda cuneata, rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus, pectore, dorso alisque nigris.

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 145. *die Hav-Aelder.*

Olaffen, Reise durch Island, I. p. 292. c. *Haavella?*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 168. n. 13. *Gadisse, Klashan, Ungie, Dykere, Angeltaske.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 73. *die Schwanz-Ente.*

Schwedische Abhandlung, XLI. p. 24. Anas Hyemalis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 51. *die langgeschwänzte Ente aus der Hudsons-Bay.*

Martini, Naturlex. II. p. 581. *Angeltasche.*

Sander, Gröſse und Schönheit in der Natur, I. p. 262. *Angeltasche.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 9. Anas cauda forcipata.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 26. Anas (Hyemalis) cauda cuneata, rectricibus intermediis longis, corpore griseo, temporibus albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 123. Anas (Hyemalis) cauda cuneata, rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus, pectore, dorso alisque nigris.

Charleton, onomast. zoic. p. 99. n. 8. Anas Islandica, Havellaea ipsis dicta.

Hermann, tab. aff. anim. p. 159. Anas Hyemalis.

Donndorff.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 261. n. 18. *die Winterente.*

β. QUERQUEDULA FERROENSIS BRISS. *Die Feroe Kriechente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 528. ad n. 420. *die Feroe-Kriechente des Brisson.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 865. n. 82. δ. A. fusco-nigricans subtus alba, capite lateribus dilute griseo, orbitis candidis, occipite, gula, collo maculis fuscis, macula alarum fusco-rufescente.

30. GLACIALIS. *Die Eisente.*

Müller, Naturf. II. p. 296. n. 30. *die Eißente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 654. n. 13. *die Winterente. (Eisente.)* p. 656. *Weißbacken mit langen Schwanzfedern. Spitzschwänze, Langschwänze von Neuland, Langschwänze von Island, Hanik, Klashanik.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 527. n. 419. *die Eisente, Kirre.*

Brisson, ornitholog. II. p. 461. n. 18. Canard à longue queue de Terre-neuve.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 864. n. 82. Anas (Glacialis) cauda acuminata elongata, corpore nigro, subtus albo. *(Mas adultus.)*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 865. n. 82. γ. A. cauda cuneata, corpore nigricante, rufo et griseo vario, dorso nigro, collari abdomineque imo albis. *(Femina.) (Pennants Long-tailed Duck.)*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 66. n. 74. *die Winterente.*

100. FUL-

100. FULVA. *Die goldgelbe Ente.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 863. n. 79. Anas (Fulva) fulva, corpore superiore et alis fulvo fuscoque striatis, cauda albo nigroque varia.
Brisson, ornitholog. II. p. 464. n. 20. Millouin du Mexique.

31. FERINA. *Die Tafelente.* (7)
Müller, Natursyst. II. p. 296. n. 31. *Rothhals.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 387. n. 10. *die Tafelente.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 656. n. 14. *die Tafelente.* p. 659. *der (eigentliche) Rothhals, die braune Ente, der Rothkopf, die braunköpfige, die rothe Mittelente, Wildente, Quellje.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 693. *die Tafelente.*
Halle, Vögel, p. 554. n. 660. *die Ente mit rothem Halse.*
Onomat. histor. nat. I. p. 407. *die braune wilde Ente.*
Klein, av. p. 132. n. 5. Anas fera fusca vel media.
Klein, Vorbereit. p. 243. n. 5. *wilde braune Ente.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 139. n. 5. *braune Ente.*
Gesner, Vögelb. p. 79. *wilde graue oder Mittelente.* Fig. p. 80.
Brisson, ornitholog. II. p. 462. n. 19. Millouin.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 862. n. 77. Anas (Ferina) cinereo-undulata, capite brunneo, fascia pectorali, crisso uropygioque nigro.

Pennant,

(7) Flügelweite 2 1/2 Fuss, Gewicht 1 Pfund 12 Unzen. *Penn* — Nach *Beseke* ist dies *Frischens Seeelster* Tab. 164, und nach *Bechstein*: *Frischens afrikanische Ente*, Tab 165. — *Bock* hält sie gar mit *Anas Fusca* p. 507. n. 6. für einerley.

Pennant, arct. Zool. II. p. 521. n. 409. *die Tafelente.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 48. n. 83. 84. *der Rothhals.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 332. n. 81. *Rothhals, Brandente, Rothkopf.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 81. *graue wilde Ente.*

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 168. n. 14. *Brunnakke.*

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 127. *Röd-Nakker.*

Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 18. *Rothhälse.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 410. *die Mittel-Ente.*

Naturforsch. XII. p. 136. n. 81. *Rothhals.*

Schwed. Abh. XLI. p. 23. Anas Ferina.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 15. Anas fera fusca.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 27. Anas (Ferina) alis cinereis immaculatis, uropygio nigro.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 124. Anas (Ferina) cinereo-undulata, capite brunneo, fascia pectorali, crisso uropygioque nigro.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 201. Anas fera 8 seu Erythrocephalos 2. *ein braun Endte, braunköpfige Endte, rote Endte, Mittel-Endte, wilde graw Endte.*

Charleton, onomast. zoic. p. 99. n. 9. Anas *Fusca*, quibusdam *Media*, p. 100. n. 3 Penelope.

Jonston, av. p. 145. Anas fusca. p. 146. Penelope. Canne à la tête rousse.

Forskål, fn. orient. p. VI. n. 13. h. Descript. animal. p. 4. n. 13. Anas ferina? Arabisch *Batt?*

β. Bech-

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 659. n. 2. *die Sumpfente.*

Brisson, ornithol. II. p. 463. n. 19. A. Millouin noir.

Latham, Syn. III. 2. p. 524. n. 68. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 863. n. 77. β. Anas nigricans, capite colloque castaneis, pectore et abdomine fusco cinereoque variis, alis albo griseoque variis.

γ. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 659. n. 4. *die rothköpfige Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 463. n. 19. B. Milouin à tête brune.

101. LURIDA. *Die bleyfarbene Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 876. n. 111. Anas (Gmelini) nigra, capite spadiceo, pectore lineis rubris transversis.

102. KEKUSCHKA. *Die Kekuschka.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 112. Anas (Kekuschka) ochracea, subtus nivea, dorso cinereo, uropygio caudaque nigerrimis.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 8. *die Ente Kekuschka genannt.*

32. QUERQUEDULA. *Die Knäckente.*(8)

Müller, Naturs. II. p. 296. n. 32. *Winter-Halbente.*

Bechstein,

(8) Flügelweite 28 Zoll. — Bleibt das ganze Jahr, und zieht nur vom November bis im März von einem Teiche und Flusse zum andern, um immer offenes Wasser zu haben. Nährt sich von Fischen, Wasserinsekten, Schnecken u. s. w. Legt 12 bis 15 gelblich weisse Eyer an das Ufer ins Gras auf ein schlecht zusammengelegtes Nest von Binsen und Grashalmen. Brütet

Bechstein, Naturgesch. I. p. 387. n. 11. *die Knäckente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 662. n. 16. *die Knäckente.* p. 665. *Bergente, Winterhalbente, Rothhälslein.*

Halle, Vögel, p. 556. n. 665. *die Kriechente.*

Onomat. hist. nat. I. p. 417. *die Kriechente, Krickente.* (Mit n. 33. verwechselt.)

[*Klein*, av. p. 132. n. 8. Anas fera 15. *Schwenkf.* seu minor 2.

Klein, Vorbereit. p. 244. n. 8. *gemeine Krück- Kriech-Kriegente, grau Endelein, Biekilchen, scheckigt Entlein, sprenklicht Entlein, Kernel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 139. *Kriechente, Kernel* u. s. w.]

Mit *Anas Crecca* und *Circia* verwechselt.

Brisson, ornithol. II. p. 573. n. 31. Sarcelle.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 537. O. *die Knäckente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 872. n. 99. Anas (Querquedula) macula alarum viridi, linea alba supra oculos.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 332. n. 82. *Winterhalbente.*

Fischer, Livland, p. 80. n. 82. *Winter-Halbente.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 335. *Cabizoni?*

White, Naturgesch. von Engl. p. 62. n. 14. *Winterhalbente.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, III. p. 14. *Kriekenten.*

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 18. *Kriechenten.*

Olaffen,

Brütet 28 bis 30 Tage. Beyde Eltern führen die Jungen. Das Fleisch hat der Nahrung halber einen thranigen Geschmack.

Olaffen, Isl. I. p. 292. e. *Oert.*
Ponttoppidan, Dännem. p. 168. n. 15. *Krikand.*
Linné, auserlef. Abh. II. p. 292. n. 78. *die Franz-Ente.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgefch. I. p. 67. n. 75. *die Krickente, Kriechente.*
Schwed. Abh. XLI. p. 23. Anas Querquedula.
Schneider, zool. Abhandl. p. 139. Querquedula. p. 153. *Kriekente.*
Naturf. XII. p. 136. n. 82. *Winterhalbente.*
Linné, Syft. Nat. Ed. II. p. 54. Querquedula.
Linné, Syft. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 23. Querquedula.
Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 28. Anas (Querquedula) macula alarum viridi, linea alba fupra oculos.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 125. Anas (Querquedula) macula alarum viridi, linea alba fupra oculos.
Schwenkfeld, av. Silef. p. 204. Anas fera 15. feu minor 3; *ein fcheckicht Endtlin, fprenglicht Endte Kernel.*
Charleton, onomaft. zoic. p. 101. n. 3. *Kernell.*
Jonfton, av. p. 144. Anas Circia, *Kernell* circa Argentoratum dicta.

33. Crecca. *Die Kriekente.* (9)
Müller, Naturfyft. II. p. 297. n. 33. *Kriechente.*
Bechftein, Naturgefch. I. p. 388. n. 12. *die Kriekente.*
Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 666. n. 17. *die Kriekente.* p. 668. *Kriechente, Spiegelente,*

(9) Wird von manchen für eine Varietät von *Anas Querquedula* gehalten. (*Fifcher, Bock* u. a. m.) *Latham* rechnet auch die *Anas Balbal* p. 543. n. 124. fo wie die folgende *A. Circia* als Spielarten hieher.

Krikente, *Krugente*, *Kriechen*, *Krikke*, *Biekelchen*, *Karnellen*, *Karnel*, *Wäbke*, *scheckig Entlein*; das Weibchen: *das Grauentchen.*
Halle, Vögel, p. 557. n. 666. *die kleine Kriechente.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 109. n. 107. *die Kriechente.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 537. P. *die Kriechente.*
Onomat. hist. nat. I. p. 416. *Drossel*, *Krickente.*
Klein, av. p. 133. n. 14. Anas Querquedula Francica.
Klein, Vorber. p. 246. n. 14. *fränkische Kriechente.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 141. n. 14. *Franzente.*
Klein, av. p. 136. n. 31. Anas Querquedula.
Klein, Vorbereit. p. 251. n. 31. *Rothhälslein.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 143. n. 31. *Rothhälslein.*
Klein, stemm. av. p. 31. Tab. 35. fig. 2 a. b.
Gesner, Vögelb. p. 70. *Kruckentlein*, *Kleinent*, *Grawentlein*, *Murentlein*, *Sorentlein*, *Tröfel*, *Socke*, *Kriechentlein*, *Krigentlein.*
Gesner, Vögelb. p. 69. *Phascades.*
Brisson, ornithol. II. p. 476. n. 32. petite Sarcelle.
Batsch, Thiere, I. p. 378. *die Kriechente.*
Latham, Syn. Supplem. p. 276. Common Teal.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 872. n. 100. Anas (Crecca) speculo alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.
Beseke, Vögel Kurl. p. 48. n. 85. *die Kriechente.*
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 332. *Kriechente*, *Sommerhalbente.*
Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 86. *Schapsente.*
Carver, Reis. d. Nordamer. p. 388. *die Kriechente.*

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. I. p. 8. *die Krickente.*
Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 340. *die Kriechente.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 72. *Kriechente.*
Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168. n. 16. *Krikand*, *Attelingand.*
Naturf. XII. p. 137. n. 83. *Kriechente.*
Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 456. *die Kriechente.*
Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Crecca.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 24. Phascas.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 126. n. 29. Anas (Crecca) macula alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 126. Anas (Crecca) speculo alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 203. Anas fera 13. seu minor 1. *Krück-Endtlin, graw Endtlin.*
Charleton, onomast. zoic. p. 100. Boschas minor.
Jonston, av. p. 144. Querquedula minor.
Schäfer, element. ornith. Tab. 19.
Philos. Transact. lxii. p. 419. n. 51.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 261. n. 19. *die Kriechente.*

β. *Die Kriekente, welche einen goldgrünen sichelförmigen Streif von den Augen an bis zum Nacken hat.*

Bechstein, Naturg. Deutschl. II. p. 668. Var. 1.

γ. *Die Kriekente mit einem weißen Streifen unter den Augen und braunen Backen.* *

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 669. Var. 2.

δ. Anas *dorsi* marginibus pennarum rufis, *genis, gula* et *corpore* subtus rufo-albis; *speculo* absque nigredine. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 873. n. 100. γ.

34. CIRCIA. *Die Sommerhalbente.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 297. n. 34. *die Sommer-Halbente.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 388. n. 13. *die Sommerhalbente.*

Bechstein Naturgesch. Deutschl. II. p. 669. n. 18. *die Sommerhalbente.* p. 671. *die kleine Kricke, das Schäckchen, Biekilchen, Birkelchen, Zirzente.*

Klein, av. p. 132. n. 8. Anas Circia. (Mit *A. Querquedula* verwechselt.)

Brisson, ornitholog. II. p. 477. n. 33. Sarcelle d'Eté.

Gesner, Vögelb. p. 71. *ein Birckilgen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 873. n. 100. β. Anas speculo alarum varii coloris, linea alba superciliari, rostro pedibusque cinereis.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 48. n. 87. *die Sommerhalbente.*

Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 81. n. 85. *Kriechente.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. Anas Circia.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 68. n. 76. Anas Circia.

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 457. n. 30 *Sommerhalbente.*

Schneider, zool. Abh. p. 139. 154 Anas Circia.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 25. Circia.

Linné,

(10) Nach *Latham* eine Varietät von *Anas Crecca*, p. 532. n. 33.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 127. n. 32. Anas (Circia) macula alarum varia, linea alba supra oculos, rostro pedibusque cinereis.

Linné, fn. Suec. II. p. 46. n. 130. Anas (Circia) macula alari varia, linea alba supra oculos, rostro pedibusque cinereis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 204. Anas fera 14 seu minor 2; *ein graw Endtlin, Birckilgen.*

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 1. Anas Circia.

103. Carolinensis. *Die amerikanische Kriechente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 570. n. 422. *die amerikanische Kriechente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 874. n. 101. Anas (Carolinensis) nigro alboque undulata, capite colloque supremo castaneis, fascia pone oculos speculoque alari viridibus, humeris lunula alba, infra oculos linea obsoleta alba.

Philos. Transact. lxii. p. 519. n. 51. (Anas Crec. var.)

35. Histrionica. *Die Kragenente.*

Müller, Natursyst. II. p. 297. n. 35. *die Kragenente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 672. n. 9. *die Kragenente.* p. 673. *der Harlekin, die schäckige Ente;* das Männchen: *Plümente.*

Brisson, ornithol. II. p. 457. n. 14. Canard à collier de Terre-neuve.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 849. n. 45. Anas (Histrionica) fusca albo caeruleoque varia, auribus, temporibus linea gemina, collari fasciaque pectorali albis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 93. *die dunkle und gefleckte Ente.*

Egede, Beſchr. von Grönl. p. 122. *Tornoviarſuk.*
Stralſund. Magaz. I. p. 149. *die buntköpfige Ente.*
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 127. n. 30. Anas (Hiſtrionica) fuſca, albo caeruleoque varia, auribus, temporibus linea gemina, collari faſciaque pectorali albis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 127. Anas (Hiſtrionica) fuſca, alba.
Philoſ. Transact. lxii. p. 417.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 262. n. 20. *der Harlekin.*

36. Minuta. *Die Zwergente.* (1)
Müller, Naturſyſt. II. p. 298. n. 36. *Zwergente.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 673. n. 20. *die Zwergente.*
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 143. n. 38. *braune Kriechente mit weißen Hauptflecken.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 483. n. 41. Sarcelle de la Baye de Hudſon.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 849. n. 45. β. Anas griſea, auribus albis, remigibus primoribus nigricantibus.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 52. *die kleine braun und weiße Ente.*
Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 127. n. 31. Anas (Minuta) griſea, auribus albis, remigibus primoribus nigricantibus.

104. Fuscescens. *Die braune Ente.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 526. n. 417. *die braune Ente.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 849. n. 46. Anas (Fuſceſcens) fuſceſcens, capite colloque dilutiore,

(1) Nach *Fabricius* und *Latham* das Weibchen von *Anas Hiſtrionica.*

tiore, alis cinereis, ſpeculo caeruleo, margine albo, cauda obſcura.

105. Poekilorhyncha. *Die buntſchnäblige Ente.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 850. n. 47. Anas (Poecilorhyncha) nigra, genis cum parte iuguli cinereis, alarum ſpeculo viridi, ſupra albo, ſubtus albo nigroque cincto, remigibus ſecundariis candidis.

Berlin. Samml. IX. p. 195. *die buntſchnäblichte zeyloniſche Ente.*

Neueſte Mannichfalt. I. p. 191. *die buntſchnäblichte zeyloniſche Ente.*

106. Damiatica. *Die damiatiſche Ente.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 850. n. 48. Anas (Damiatica) alba, capite, collo ſuperiore, humeris caudaeque apice albis, nuchae lunula ferruginea, remigibus vireſcenti-atris.

Haſſelquiſt, Reiſe n. Paläſt. (Ed. germ.) p. 318. n. 35. Anas Damiatica.

107. Dispar. *Die oſtrogothiſche Ente.* (¹)

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 866. n. 83. Anas (Dispar) alba, ſubtus ferruginea, occipitis macula fronteque vireſcentibus, orbitis, gula, iugulo collari dorſoque nigris.

37. Discors. *Die Bläſſenente.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 298. n. 37. *bunte Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 529. n. 421. *die Bläſſenente.*

Halle, Vögel, p. 562. n. 678. *die bunte amerikaniſche Kriechente.*

(¹) Nach *Latham* mit *Anas Stelleri* p. 518. n. 80. einerley.

Halle, Vögel, p. 567. n. 695. *die Schuppenente.*

Klein, av. p. 134. n. 24. Anas Querquedula americana variegata.

Klein, Vorbereit. p. 249. n. 24. *Blaukopf, weiß gezeichnet, aus Amerika.*

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 142. n. 24. *Blaukopf, weiß gezeichnet.*

Briffon, ornitholog. II. p. 479. n. 35. Sarcelle d'Amerique.

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 854. n. 55. Anas (Difcors) tectricibus alarum caeruleis, remigibus fecundariis extus viridibus, fafcia frontali alba. *(mas.)*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 100. *fcheckiges amerikanifches Kriechentlein.*

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 262. n. 21. *die Bläffenente.*

β. *Klein*, av. p. 134. n. 23. Anas Quacula. (3)

Klein, Vorbereit. p. 249. n. 23. *grau Krieck mit blauen Schultern.*

Klein, verb. Vögelhift. p. 142. n. 23. *graue Kriechente mit blauen Schultern.*

Briffon, ornithol. II. p. 479. n. 36. Sarcelle de Virginie.

Latham, Syft. ornithol. II. p. 854. n. 55. Anas tectricibus alarum caeruleis, corpore grifeofufco, fubtus grifeo, fpeculo alarum viridi, fafcia fuperius alba. *(femina.)*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 98. *blaues amerikanifches Kriechentlein.*

γ. *Latham*, Syn. III. 2. p. 504. n. 50. Var. A.

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 854 n. 55. β. A. pileo caudaque nigris, tectricibus alarum caeruleis,

(3) Nach *Briffon*, *Klein* u. a. eine eigne Gattung.

ruleis, maioribus macula alba, remigibus secundariis extus gula abdomineque albis.

38. Viduata. *Die spanische Ente.*
Müller, Natursyst. II. p. 298. n. 38. *die Wittwe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 858. n. 65. Anas (Viduata) fusca, capite antico albo, postico nigro, pedibus caeruleis.

β. A. rufescente nigricanteque undatim varia, capite colloque antice dimidia parte albis, pectore rufo, cervice collari sub gula alis caudaque nigris. *
Latham, Syst. ornithol. II. p. 858. n. 65. β.
Büffon, IX. p. 255. pl. enl. 808. Canard à face blanche de Maragnon.

108. Jacquini. *Jacquins-Ente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 863. n. 80. Anas (Jacquini) spadicea, dorso nigricante, rostro pedibusque nigris.

109. Dominicana. *Die Dominikaner-Ente.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 859. n. 60. Anas (Dominicana) griseo-cinerea, facie gulaque albis, fascia oculari, occipite, collo pectoreque nigris.

39. Autumnalis. *Die Herbstente.*
Müller, Naturs. II. p. 298. n. 39. *die Herbstente.*
Halle, Vögel, p. 563. n. 679. *das Entenrothkehlchen?*
Klein, av. p. 135. n. 25. Anas fera, griseo colore, mente cinnabrino, undulante pectore?
Klein, Vorbereit. p. 249. n. 25. *Rothbart mit wellenförmiger Brust?*
Klein, verb. Vögelhist. p. 142. n. 25. *Rothbart?*

Klein,

Klein, verb. Vögelhist. p. 138. n. 17. *rothschwänzige Gans.*

Brisson, ornitholog. II. p. 466. n. 23. Canard siffleur d'Amerique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 852. n. 52. Anas (Autumnalis) grisea, remigibus, cauda ventreque nigris, speculo alarum fulvo alboque.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 89. *die pfeifende Ente mit rothem Schnabel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 127. n. 33. Anas (Autumnalis) grisea, remigibus, cauda ventreque nigris, area alarum fulva albaque.

Mars. Dan. p. 108. Tab. 52. Anas fera mente cinnabrino?

110. LABRADORIA. *Die labradorische Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 519. n. 406. *die scheckige Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 859. n. 67. Anas (Labradora) dorso, alis et abdomine fuscis, capite, collo, scapularibus remigibusque secundariis albis, torque fasciaque pectoris nigris.

111. SUPERCILIOSA. *Die Ente mit weißen Augenbraunen.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 852. n. 51. Anas (Superciliosa) cinereo-fusca, fascia supra et infra oculos, gula iuguloque albis, speculo alarum viridi-caerulescente, nigro marginata.

112. CURVIROSTRA. *Die krummschnäblige wilde Ente.* (4)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 852. n. 50. Anas (Curvirostra) atra, rectricibus intermediis (maris)

(4) Sollte nicht diese Gattung mit der *folgenden* einerley, und sollten nicht beyde, Spielarten der *gemeinen* Ente seyn? *Pallas* sagt:

ris) recurvatis, gula macula ovali alba, rostro incurvo.

Pallas, Naturgesch. merkwürd. Th. VI. p. 39. *die Krummschnabel-Ente.*

41. ADUNCA. *Die krummschnäblige zahme Ente.* (Krummschnäblige Hausente.) (5)

Müller, Naturs. II. p. 300. n. 41. *krummschnäblichte Ente.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 19. n. 14. *die krummschnablichte Ente.*

Bechstein,

sagt: es sey ihm diese Gattung nur ein einziges mal wild vorgekommen, und glaubt, dass die unter unsern Enten nicht ungewöhnliche Krummschnabelenten von dieser wilden Gattung entstanden seyn mögen. Aus der besondern Farbe, Zeichnung, und dem ganzen Ansehen des einzigen Exemplars, welches in Holland gefangen war, und sich 1764 in einer Vögelsammlung im Haag befand, schliesst er, dass sie nicht von der gemeinen wilden Ente oder Hausente entstanden seyn könne, sondern eine eigne Art ausmache, die nur wegen ihrer Seltenheit den rechten Ursprung der krummschnäbligen Enten bisher zweifelhaft gelassen habe. Zur Bestätigung dieser Behauptung führt er den Umstand an, dass die Zucht der Krummschnabelenten hauptsächlich im mittlern Europa, sonderlich Niederdeutschland und Holland, wo sich auch die wilde Gattung allein aufzuhalten scheint, ihren Ursprung genommen, und in Russland noch vor wenig (nun etwa vor 30) Jahren, ehe sie aus Holland dahin gebracht worden, so wie in ganz Sibirien weder wild noch zahm anzutreffen gewesen. Auch sollen die dunkelfarbigen unter den zahmen Krummschnabelenten, die man in Holland erzielt, fast immer die Farbe der von ihm beschriebenen wilden haben, und diese Farbe unter den gemeinen Hausenten, so mannichfaltig man sie auch abgeändert siehet, doch noch nie bemerkt worden seyn.

(5) Nach *Latham* u. a. eine Varietät von *Anas Boschas.* S. die vorhergehende Anmerkung.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 391. n. 6. *die krummschnablige Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 719. n. 2. *die krummschnablige Ente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 28. n. 111. *die krummschnablichte Ente.*

Beckmann, Landwirthschaft, p. 475.

Klein, av. p. 133. n. 17. Anas rostro adunco.

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 17. *krummer Breitschnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 141. n. 17. *krummer Breitschnabel.*

Brisson, ornitholog. II. p. 445. n. 2. Canard à bec courbé.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 851. n. 49. ζ. Anas rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro incurvato.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 35. Anas (Adunca) rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro incurvato.

Frisch, Vögel, Tab. 179?

113. DOMESTICA. *Die gemeine Hausente.* (6)

Borowsky, Thierreich, III. p. 17. n. 13. *die gemeine Ente.*

Bechstein,

(6) *Klein*, *Brisson* u. a. m. betrachten zwar die Hausente als eine eigne Gattung; die mehresten Naturhistoriker aber sehen sie doch nur als eine Spielart von der wilden an. Farbe und Zeichnung ist, wie bey allen Hausvögeln, gar sehr verschieden. Die Paarungszeit fängt schon im März an. Auf einen Erpel rechnet man 10 bis 12 Enten. Beyde aber taugen nur etwa 4 bis 6 Jahre zur Fortpflanzung. Bey gutem Futter legt eine Ente, ehe sie brüten will, 20 bis 30 grünlich blauweisse Eyer, glätter und grösser als Hühnereyer. Brütet 28 bis 30 Tage. Ueberhaupt aber legt eine in

Bechstein, Naturgesch. I. p. 389. n. 15. b. *die zahme Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 705. n. 1. b. *die zahme Ente. — Entrich, Aentrich, Antrach, Anter, Enter, Erpel, Entvogel, Drake, Wyt, Warte.* (das Männchen.) p. 719. *Hausenten, Schnatterer, Rätschen, Hatschen.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 125. n. 110. *die Hausente, Ente, Aente.*

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 598. n. 1. *die zahme Ente.*

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 106. *die zahme Ente.*

Klein, Vorbereit. p. 242. n. 1. *Haus-, zahme Ente.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 138. n. 1 *zahme Ente.*

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 20. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 59. *zahme Ente;* mit 1 zieml. guten Figur.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 68. n. 77. *die zahme oder Hausente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 443. n. 1. Canard domestique.

Sander, ökonom. Naturgesch. II. p. 18. n. 2. *die Ente.*

Walther, ökon. Naturgesch. p. 124 *Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 851. n. 49. β. Anas domestica.

Bock, Preussen, IV. p. 332. n. 84. *Hausente.*

Knox,

in einem Jahre 80 und mehrere Eyer. *Bechstein* führt ein Beyspiel von einer Ente an, die 105 Eyer gelegt hat. Die zahmen Enten scheinen die gröſste Neigung zu unnatürlicher Paarung zu haben, so daſs z. E. die Erpel auf Hühner erpicht sind, und wieder umgekehrt, Enten auch den welschen Hähnen nachlaufen, und sie zu reitzen suchen.

Knox, Reis. n. Ceylon, p. 57. *Enten.*
Pallas, Naturg. merkw. Thiere, XI. p. 37. *** (vom Haushahn getreten, und ganz weiss gestaltete zweydeutige Junge aus eignen Eyern selbst ausgebrütet.)
Kämpfer, Beschreib. von Japan, p. 141. *Enten.*
Naturf. XII. p. 137. n. 84. *gemeine Ente.*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 194. n. 19. *die zahme Hausente.*
Krünitz, ökon. Encyklop. XI. p. 33. *Hausänten.*
Phys. ökon. Patriot. IV. p. 189 ff.
Taube, Beytr. zur Naturk. des Herzogth. Zelle, p. 257.
Fränk. Samml. V. p. 354 ff.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 127. n. 34. β. Anas domestica.
Linné, Syst. Natur. Edit. XII. I. p. 206. n. 40. β. Anas domestica.
Brünich, ornitholog. bor. p. 20. n. 88. Anas domestica.
Kramer, Austr. p. 341. n. 11. β. Anas domestica.
Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 195. Anas domestica; *ein Rätsche*, *Hatsche.* Siles.
Charleton, onomast. zoic. p. 9. n. 1. Anas domestica.
Moehring, av. gen. p. 60. n. 61. Anas.
Jonston, av. p. 143. Anas domestica.
Varro, de re rust. L. 3. c. 11. Anates.
Columella, de re rust. L. 8. c. 15. L. 6. c. 7. Anates.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 55. L. 20. c. 5. Anates.
Turner. av. Plin. voc. *Anas.*

* * *

Mylii phys. Belust. V. p. 392. Nachricht von einer monströsen Ente.

Böhm,

Böhm, von vierfüss. Enten und Gänsen. Bresl. Naturgesch. 1726. p. 713.

Schulze, de intestinis in anate monstrosis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 71. p. 56.

Hannaeus, de cornu anatino. ib. Dec. II. an. 9. obs. 169. p. 316.

Bemerk. über Enten, deren Oberkiefer am Schnabel kürzer als der untere ist. Wittenberg. Wochenbl. XIII. p. 380.

Allgem. Haushalt. und Landwissensch. I. p. 852. *von den Enten.*

40. Boschas. *Die gemeine wilde Ente.* (7)

Müller, Natursystem, II. p. 299. n. 40. *gemeine Ente.* *

Leske, Naturgeschichte, p. 288. n. 7. *die gemeine Ente.* *

Borowsky, Thierreich, III. p. 17. n. 13. *die gemeine Ente.* *

Blumen-

(7) Flügelweite 35 Zoll. Gewicht 2 1/2 Pfund. *Pennant.* Wird wahrscheinlich sehr alt, da man in sichern Gegenden ein Paar viele Jahre hinter einander antrift. Im Sommer leben sie paarweise. Im October aber schlagen sich mehrere Familien zusammen, und im November bilden sie grosse Schaaren, die besonders des Nachts von einem Teich, Fluss, oder See zum andern fliegen, denn es sind blosse *Strichvögel*. Die Begattungszeit fällt in den März, früher oder später, nachdem die Witterung günstig ist. Ohngefähr in der Mitte des Aprils legt das Weibchen 10 bis 16 blassgrüne längliche Eyer, brütet drey Wochen, und bedeckt die Eyer, wenn es der Nahrung halber vom Neste aufsteigt. Das Männchen lösst es beym Brüten einige Stunden im Mittage ab, und führt die Jungen mit. Das Fleisch ist zarter, aber nicht so rein vom Geschmack als das von der zahmen Ente. — Die mit einem * bezeichneten Synonymen gehen auf die wilde und zahme Ente zugleich.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 227. n. 6. Anas (Boschas) rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto; *die Ente.* *

Bechstein, Naturgesch. I. p. 389. n. 15. a. *die wilde Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 682. n. 1. a. *die wilde Ente.* p. 705. *gemeine wilde Ente, Märzente, Blumente, Spiegelente, grobe wilde Maschente.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 690. *die wilde Ente.*

Meyer, Thiere, I. Tab. 12.

Funke, Naturgesch. I. p. 210. *die Ente.* *

Halle, Vögel, p. 551. n. 657. *die Hausente.* *

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 110. n. 109 *die wilde Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 524. n. 412. *die wilde Ente.*

Beckmann, Naturhist. p. 44. d. *die Ente.* *

Klein, av. p. 131. n. 3. Anas sylvestris vera.

Klein, Vorbereit. p. 343. n. 3. *gemeine wilde Ente, Blauente, Groß-, Blaß-Ente.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 138. n. 3. *gemeine wilde Ente.*

Gesner, Vögelb. p. 77. *kleinere wilde blaue Ente, Blaßent, Spiegelent, Großent, Merzent, Hagent;* mit 1 Fig.

Brisson, ornitholog. II. p. 447. n. 4. Canard sauvage.

Batsch, Thiere, I. p. 379. *die gemeine Ente.* *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 850. n. 49. Anas (Boschas) cinerea, rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto, torque albo.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 49. n. 88. *die gemeine Ente.*

Bock,

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 322. *die Märzente.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 87. *gemeine wilde Ente, Blauente.*

Cetti, Sardin. II. p. 334. *die wilde Ente.*

Rytschkow, orenb. Topogr. p. 245. *wilde Enten.*

Strahlenberg, Europa u. Asien, p. 352. *Enten.*

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 136. *wilde Enten.*

Olaffen, Reise durch Island, I. p. 292. *Blaakolls-Oend.*

White, Naturgesch. von England, p. 62. n. 11. *die wilde Ente.*

Pallas, Reis. III. p. 91-93. Ausz. II. p. 7. *Enten.*

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 10. IV. p. 8. *die Märzente.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 14. *gemeine Enten.*

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 18. *gemeine wilde Enten.*

Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 150. *Enten.*

Steller, Beschr. von Kamtschatka, p. 190. *Enten.*

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 168. n. 18. *Vildand.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 70. *wilde Enten.*

Loniceri, Kräuterb. p. 645 *Endte, Antvogel.* *

Linné, auserles. Abh. II. p. 285. n. 48. p. 292. n. 75. *die gemeine Ente.*

Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueste u. s. w. II. 1. p. 103. *die Märzente.*

Schwed. Abh. XLI. p. 23. Anas Boschas.

Geoffroy, mat. med. VII. p. 300. *die gemeine wilde Ente.*

Stralſund. Magazin, I. p. 147. Anas Boſchas.
Naturf. XII. p. 132. n. 70. *gemeine wilde Ente.*
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 132. n. 3. *die wilde Ente.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 409. *die gemeine wilde Ente.*
Anweiſung Vögel zu fangen, u. ſ. w. p. 184. *die Ente.*
Oekonom. Zool. p. 72. n. 12. *die gemeine Ente.* *
Krünitz, Encyklop. XI. p. 42. *die gemeine wilde Ente.*
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 298. *Ente.* *
Merklein, Thierreich, p. 255. *Ente.* *
Kraft, Ausrott. grauſ. Thiere, p. 235. 236. 584. *wilde Enten.*
Helwing: Breſsl. Samml. Mart. 1721. Cl. 5. Art. 1. (wilde Enten zahm zu machen.) Cf. Schwed. Abhandl. XIII. p. 326.
Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 89. Col. 1423 f.
Schönfeld, Landwirthſchaft, p. 705.
Zückert, Speiſ. a. d. Thierr. p. 100.
Schreber, Sammlung verſchiedener Schriften, II. p. 281.
Allgem. Haushaltungslex. I. p. 419. *Ente.*
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 54. *Boſchas.* *
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 17. *Boſchas.* *
Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 127. n. 34. Anas (Boſchas) rectricibus intermediis (maris) recurvatis, roſtro recto. *
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 12. Anas (Boſchas) rectricibus intermediis (maris) recurvatis, roſtro recto. *
Charleton, onomaſt. zoic. p. 99. n. 6. Anas fera.
Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 197. Anas fera 1. ſeu torquata minor; *ein wilde blaw Endte, Mertz-Endte.*

Endte, Gros-Endte, Rätsch-Endte, Blas-Endte, Spiegel-Endte.

Jonston, av. p. 144 Boscades maiores.

Hermann, tab. aff. anim. p. 159. Anas Boschas.

Phil. Transact. lxii. p. 419.

Forskål, fn. orient. p. 6. n. 9. d. Descript. animal. p. 3. n. 9. Anas Boschas.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 262. n. 22. *die gemeine Ente.* *

β. CIRRHATA. *Die gehäubte wilde Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 444. n. 1. A. Anas domestica cirrata; *Canard domestique hupé.*

Frisch, Vögel, Tab. 178. *die hollige Hausente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 699.

γ. PERSICA. *Die persische Ente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 445. n. 1. B. Anas persica; *Canard de Perse.*

Frisch, Vögel, Tab. 167. *die persische Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 694.

δ. MAIOR. *Die Störente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 448. n. 4. A. Boschas maior; *grand Canard sauvage.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 704. n. 1. *die Störente, Storente, Sterzente.*

Klein, av. p. 131. n. 3. Anas fera 2. seu torquata maior. *Schwenkf.*

Klein, Vorbereit. p. 243. n. 3. *Stor- oder Sterzente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 139. n. 3. *die zweyte wilde Ente.*

Gesner, Vögelb. p. 78. *größere wilde blawe Ente, Stortzent genannt.* Fig. p. 79.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 851. n. 49. γ. Boschas maior.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 198. Anas fera 2. feu torquata maior; *ein Stor-Endte, Stertz-Ente, große Wild-Endte.*

Döbel, Jägerpraktik, p. 71. *die sonst allgemeine große Ente.*

ε. Grisea. *Die Schmalente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 448. n. 4. B. Bofchas maior grifea; *Grand canard sauvage gris.*

Bechstein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 704. n. 2. *die Schmalente.*

Bechstein, Naturgefch. Deutfchl. III. p. 696. *die Schmielente.*

Frisch, Vögel, 173. Anas iuncea.

Gesner, Vögelb. p. 78. Anas iuncea vel graminea; *ein Schmilent.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 851. n. 49. δ. Bofchas maior grifea.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 199. Anas fera 4. feu iuncea; *ein Schmäl-Endte, Schmil-Endte, Schmelichen.*

ζ. Naevia. *Die Roßente.*

Müller, Naturfyft. II. p. 300. *Spiegelenten.*

Brisson, ornitholog. II. p. 449. n. 4. C. Bofchas maior naevia; *grand Canard sauvage tacheté.*

Bechstein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 705. n. 3. *die Roßente.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 851. n. 49. ε. Bofchas maior naevia.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 199. Anas fera 3. feu maior; *ein Roß-Ente, Mertz-Endte, große wilde Endte.*

η. Nigra. *Die Schildente.*

Brisson, ornithol. II. p. 449. n. 4. D. Anas fera nigra; *Canard sauvage noir.*

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 705. n. 4. *die Schildente.*

42. Galericulata. *Die chinesische Haubenente.*
Müller, Natursyst. II. p. 300. n. 42. *Federkappe.*
Halle, Vögel, p. 564. n. 684. *die Chineserente, mit grünem Federbusche.*
Klein, av. p. 136. n. 34. Anas Sinensis.
Klein, Vorbereit. p. 251. n. 34. *sinesische Ente.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 143. n. 34. *sinesische Ente.*
Brisson, ornitholog. II. p. 478. n. 34. Sarcelle de la Chine.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 99. *sinesisches Kriechentlein.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 871. n. 98. Anas (Galericulata) crista dependente, dorsoque postico utrinque penna recurvata compressa elevata.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 128. n. 36. Anas (Galericulata) crista dependente dorsoque poco utrinque penna recurvata compressa elevata.

43. Sponsa. *Die Sommerente.* (8)
Müller, Natursf. II. p. 301. n. 43. *die Braut.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 20. n. 16. *die Braut.*
Halle, Vögel, p. 562. n. 677. *die amerikanische Sommerente, Plümagenente.*
Klein, av. p. 134. n. 21. Anas cristata americana.
Klein, Vorbereit. p. 248. n. 21. *Plümente aus Amerika.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 141. n. 21. *Plümente.*
Brisson, ornithol. II. p. 455. n. 11. Canard d'été.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 90. 94. *die Sommerente.*

(8) Flügelweite 30 Zoll. *Penn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 871. n. 97. Anas (Sponsa) crista dependente duplici viridi caeruleo alboque varia.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 37. Anas (Sponsa) crista dependente duplici viridi caeruleo alboque varia.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 263. n. 23. *die S mmerente.*

44. Arborea. *Die Baumente.*

Müller, Natursyst. II. p. 301. n. 44. *Baumente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 522. n. 410. *die Baumente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 138. n. 17. *schwarzschwänzige Gans.*

Brisson, ornitholog. II. p. 467. n. 24 Canard siffleur de la Jamaique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 852. n. 53. Anas (Arborea) grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque undulato.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 88. *die pfeifende Ente mit schwarzem Schnabel.*

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 102. *Schopfente mit breitem u. schwarzem Schnabel.*

Naturf. XII. p. 137. n. 85. *Baumente?*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 38. Anas (Arborea) grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque maculato.

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 207. n. 44. Anas (Arborea) grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque maculato.

Hermann, tab. affin. anim. p. 159. Anas arborea.

114. Cristata. *Die Haubenente von Statenland.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 870. n. 93. Anas (Cristata) cristata cinerea, fronte, genis colloque

que poſtico cineraſcentibus, gula iuguloque flaveſcentibus, maculis ferrugineis, ſpeculo alarum caeruleo ſubtus albo.

115. Obscura. *Die dunkelbraune Ente von Neuyork.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 525. n. 414. *die dunkelbraune Ente.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 871. n. 96. Anas (Obſcura) fuſca, collo ſtriis longitudinalibus obſcuris, ſpeculo alarum caeruleo nigro marginato, rectricibus albo marginatis.

116. Islandica. *Die gelbfüßige isländiſche Ente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 534. H. *die isländiſche Ente.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 871. n. 95. Anas (Islandica) criſtata nigra, iugulo, pectore abdomineque albis, pedibus croceis.

Olaſſen, Island, 1. p. 292. *Hrafn-Oend.*

117. Novae seelandiae. *Die ſchwarze neuſeeländiſche Ente.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 870. n. 92. Anas (N. Seelandiae) nigra viridi-nitens, ſubtus cineraſcens, capite colloque poſtice caeruleo et purpureo nitente, faſcia alarum alba.

118. Rufina. *Die Kolbenente.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 102. n. 46. *die einſame Ente.*

Halle, Vögel, p. 567. n. 692. *die Karminente.*

Klein, av. p. 135. n. 26. Anas criſtata flaveſcens.

Klein, Vorbereit. p. 249. n. 26. *Gelbſchups mit einem Federbuſche.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 142. n. 26. *Gelbſchopf.*

Briſſon, ornithol. II. p. 465. n. 22. Canard ſiffleur hupé.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 870. n. 94. Anas (Rufina) nigra, dorſo et alis fuſcis, capite colloque teſtaceo - rubris, vertice rufeſcente, ſpeculo albo nigro - marginato.

Pallas, Reiſe, Ausz. II. p. 240. *eine Art großer Seeenten mit rothem gehäubten Kopfe.*

Pallas, Reiſe, Ausz. II. Anh. p. 15. n. 28. Anas *rufina.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 12. *die Kolbente.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. Anas fiſtularis criſtata *Briſſ.*

Pallas, Naturgeſch. merkwürd. Thiere, VI. p. 40. Tab. 5. *die Rothkopfente.*

Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 1. p. 108. *die Kolbenente.*

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 201. Anas fera 9. ſeu Erythrocephalos 2; *ein Brandt - Endte, Rott-Hals, Rott - Kopf.*

Kramer, Auſtr. p. 339. n. 8. Anas roſtro coccineo, capite rufo criſtato, macula alarum pallide carnea; *türkiſche Ente.*

Rzaczynsk. hiſtor. natur. Polon. p. 357. Anas Erythrocephalos; *Brandente.*

119. NYRACA. *Die Nyraca.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 869. n. 91. Anas (Nyraca) atro - olivacea, capite, collo pectoreque caſtaneis, uropygio nigro, abdomine, criſſo maculaque alarum albis.

120. ARABICA. *Die arabiſche Ente.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 877. n. 113. Anas (Arabica) griſeo - maculata, ſubtus et uropygio

gio albida maculis cinereis, alarum speculo nigricante, anterius et posterius albo.

121. ALEXANDRINA. *Die alexandrinische Ente.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 114. Anas (Alexandrina) rostro crissoque nigris, collo cinereo semicirculis nigris, (beym *Forskål* steht *albis*) abdomine albo, pedibus cinereo flavis.

122. GATTAIR. *Die Gattair.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 115. Anas (Gattair) fusca, alis nigris subtus albis, margine fuscis, remigibus 4-20 medio albis.

123. SIRSAEIR. *Die Sirsaeir.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 116. Anas (Sirsaeir) rostro subtus flavo, speculo alarum oblique dimidiato, supra sericeo-viridi subtus nigro, antice et postice albo.

124. BALBUL. *Die Balbul.*(9)
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 874. n. 100. ♂. Anas rostro nigro, speculo alarum supra oblique viridi, infra oblique nigro.

45. FULIGULA. *Die europäische Haubenente.*
Müller, Natursyst. II. p. 302. n. 45. *europäische Haubenente.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 19. n. 15. *europäische Haubenente.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 721. n. 1. *die europäische Haubenente.* p. 723. *Straußente, Freseke, kleine Tauchente, Pfeifente, kleine Haubenente, rußfarbige Ente.*
Bechstein,

(8) Nach *Latham* eine Varietät von *Anas Crecca*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 695. 696. *Reiger-oder Straußente.*

Halle, Vögel, p. 558. n. 669. *die schwarze Seeente, mit dem Federbusche und weißem Flügelstriche.*

Onomat. hist. nat. I. p. 413. *die buschige oder kammige kriechende Straußente.*

Klein, av. p. 133. n. 11. Anas fuligula.

Klein, Vorbereit. p. 245. n. 11. *Schups-, schwarze Ente, Moorente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 140. n. 11. *schwarze Schopfente, Moorente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 534. G. *die Haubenente.*

Brisson, ornithol. II. p. 469. n. 26. petit Morillon.

Batsch, Thiere, I. p. 380. *die Haubenente.*

Gesner, Vögelb. p. 84. Anas Fuligula; *mit Abbildung des Kopfs.* (Rüsgenkopf.)

Gesner, Vögelb. p. 85. Anas cirrhata.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 869. n. 90. Anas (Fuligula) crista dependente, corpore nigro, abdomine speculoque alarum albis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 49. n. 90. *die europäische Haubenente.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 88. *Schopfente.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 341. *der Schwarzkopf.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 334. n. 86. *Moor-, Schopf-, Haubenente.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 189. III. p. 14. *rusigte Enten.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die Moorente.*

Stralsund. Magaz. I p. 147. Anas Fuligula.

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Fuligula.

Naturf.

Naturf. XII. p. 138. n. 86. *europäische Haubenente.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 69. n. 78. *die schwarze Ente, Schopfente.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Fuligula.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 18. Fuligula.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 128. n. 39. Anas (Fuligula) crista dependente, corpore nigro, ventre maculaque alarum albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 129. Anas (Fuligula) crista dependente, corpore nigro, abdomine speculoque alarum albis.

Brünich, ornitholog. bor. p. 21. n. 90. Anas Fuligula.

Kramer, Austr. p. 341. n. 12. Anas crista dependente, corpore nigro, ventre maculaque alarum albis.

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 2. Querquedula cristata s. Colymbus.

Jonston, av. p. 144. Querquedula cristata.

β. *Die braune Haubenente, mit schwarzem Kopf, Schnabel und Füßen.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 69. n. 78. erste Abänderung.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 869. n. 90. β. Anas cristata fusca, capite violaceo-nigro, uropygio fuliginoso albo vario, rostro pedibusque nigris.

γ. *Die schwarze Haubenente, mit braunem Rücken, mit rothbraunem Kopf, und dergleichen Anfang des Halses.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 69. n. 78. zweyte Abänderung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 869. n. 90. γ. Anas subcristata nigra, dorso fusco, capite ac initio colli

colli rufis, remigibus albis, ad basin alarum fascia alba.

δ. *Die Haubenente, mit weißem Unterleibe, rothbraunem Kopf und Halse.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 70. dritte Abänderung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 869. n. 70. δ. Anas cristata, subtus alba, capite rufo, temporibus viridi-nitidis, alis fascia rufa, postea viridi-nitente, denique nigra, remigibus fuscis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 194. β. Cygnus Mansuetus.	p. 501. n. 47. Anas Olor.
p. 206. β. Anas domestica.	p. 538. n. 113. Anas Domestica.
p. 197. n. 9. γ. Anser canadensis fuscus maculatus.	p. 509. n. 64. Anas Albifrons.

Das Geschlecht ist übrigens mit 79 Gattungen vermehrt. Bey der 11ten Gattung sind die zu dieser und *Anas Albifrons* n. 64, so wie bey der 13ten die zu dieser, und *Anas Erythropus* n. 11. gehörige Synonymen getrennt. Bey der 10ten Gattung sind *zwey*, bey der 15ten *zwey*, bey der 27ten *zwey*, bey der 28ten *zwey*, bey der 29ten *zwey*, bey der 31ten *drey*, bey der 33ten *zwey*, bey der 40ten *sieben*, bey der 45ten *vier* Varietäten aus einander gesetzt. Bey der 19ten ist die Var. γ, und bey der 37ten die Var. γ hinzugekommen.

B. *Un-*

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Die livländische Haubenente.*
 Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 90.
 Bock, Naturgeschichte von Preussen, IV. p. 334. n. 85.

2. *Die rothköpfige Ente.*
 Bock, Preussen, IV. p. 335. n. 87.
 Naturf. XII. p. 136. n. 87.

3. *Zwey Enten mit schieferfarbenem an der Spitze schwarzem Schnabel* u. s. w.
 Schneider, zool. Abh. p. 154.

4. *Eine Ente mit an den Seiten rothgelbem, vorn und in der Mitte schwarzem Schnabel, und lichtgelben Füßen.*
 Schneider, zool. Abh. p. 155.

5. *Die kurzschnäblige Ente.* (Anas Brachyrhynchos.)
 Beseke, Vögel Kurl. p. 49. n. 1. Tab. 5.

6. *Die weiße Ente mit zinnoberrothen Augenringen.* (Anas Erythrophthalmos.)
 Beseke, Vögel Kurlands, p. 50. n. 2.

7. *Die rußschwarze Ente.* (Anas Orphanos.)
 Beseke, Vögel Kurlands, p. 51. n. 3.

8. *Eine, der europäischen Haubenente ähnliche Ente, aber ohne Federbusch.*
 Beseke, Vögel Kurl. p. 51. n. 4.

9. Anas (Denudata) alba, occipite, dorso, remigibus secundariis rectricibusque, quatuor intermediis exceptis, aeneis, facie ultra oculos nuda, cera rostri medio depressa, antice in lobulum explanata.
 Hermann, tab. affin. anim. p. 158.

10. Anas

10. Anas (Melanocephala) albicans, dorſo nigricante, abdomine ſpeculoque alarum albis, capite tumido fuſco.

Hermann, tab. affin. anim. p. 161.

11. Anas (Leucotis) fuſca, ventre pallidiore, macula ante et poſt oculos, ſpeculoque alarum albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 161.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Die ganz ſchwarze Ente, mit weiſſen Flügelrändern und rothem Schnabel, aus Neuholland.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 834. n. 4. Anas (Atrata) tota atra, margine alarum albo, roſtro rubeſcente.

Phillips voy. Bot. Bay, p. 98. Black Swan.

2. *Die nelkenfarbige indianiſche Ente, mit blauen Füſſen.*

Latham, Syn. Supplement p. 276 Pink-headed Duck.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 866. n. 85. Anas (Caryophyllacea) fuſco badia, roſtro, capite colloque ſupremo caryophyllaceis, ſpeculo ferrugineo, pedibus caeruleis.

3. *Die Ente von der Inſel Aland.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 876. n. 110. Anas (Sparrmanni) ſubtus ſordide alba, ſupra nigro ferrugineo alboque varia, ſcapularibus nigris, margine lineisque diſci albo-ferrugineis, antice in angulum coaleſcentibus variegata.

Muſ. Carlſ. faſcic. III. Tab. 60. Anas alandica.

68. GE-

68. GESCHLECHT. MERGUS. *Der Sägetaucher. (Taucher, Tauchente, Wasserhuhn, Tauchgans, Säger, Sägeschnäbler.)*

Müller, Natursyst. II. p. 303. Gen. LXVIII.
Leske, Naturgesch. p. 268. Gen. LXXII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 20. Gen. XXXIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 227. Gen. LXXVII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 392. Gen. XXII.
Halle, Vögel, p. 578. Gen. III.
Pennant, arct. Zool. II. p. 498.
Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 411.
Onomat. hist. nat. V. p. 164.
Klein, av. p. 140. Gen. II. Plotus Serrator.
Brisson, ornith. II. p. 423. Gen. CV. Merganser.
Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. XC.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 828. Gen. XCVI.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 156.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 263. Gen. XXIX.

1. CUCULLATUS. *Der Kappentaucher.*

Müller, Natursystem, II. p. 303. n. 1. *Kappentaucher.*
Halle, Vögel, p. 581. n. 724. *der Mohrenvogel mit weißem Bunde.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 134. n. 120. *der Kappentaucher, virginische Taucher.*
Onomat. histor. nat. V. p. 166. *der Mohrenvogel, Mohrenmütze.*
Klein, av. p. 140. n. 3. Serrator Cucullatus.
Klein, Vorbereit. p. 259. n. 3. *Mohrenmütze.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 148. n. 3. *Säger mit der Mohrenmütze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 500. n. 385. *der Kappentaucher.*

Brisson, ornitholog. II. p. 429. n. 8. Harle hupé de Virginie.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 830. n. 5. Mergus (Cucullatus) crista globosa, utrinque alba, corpore supra fusco, subtus albo.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 88. *die gehaubte Ente.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 129. n. 1. Mergus (Cucullatus) crista globosa, utrinque alba, corpore supra fusco, subtus albo.

Jonston, av. p. 184. *Heatototl.*

Nieremberg, Hist. East. L. 10. c. 47. Heatototl.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 152. Mergus Cucullatus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 263. n. 1. *der Kappentaucher.*

2. Merganser. *Die Tauchergans.*

Müller, Natursyst. II. p. 304. n. 2. *Tauchergans.*

Leske, Naturgeschichte, p. 289. n. 1. *die Tauchergans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 21. n. 1. *der Seerache, die Tauchergans.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 227. n. 1. Mergus (Merganser) crista longitudinali-erectiuscula, pectore albido immaculato, rectricibus cinereis, scapo nigricante; *der Kneifer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 392. n. 1. *die Tauchergans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 724. n. 1. *die Tauchergans.* p. 732. *Seerachen, Seeraben, Täucherkiebitze, Gänsesägetaucher, Kneifer,*

fer, Schöbbeje, Straben, Mohren, Schnarrgänse, Bottervögel, Straußtäucher, Merch, Ganner, große Kolbentaucher, Winternörks.

Halle, Vögel, p. 579. n. 722. *der gezackte Taucher.*

Halle, Vögel, p. 578. n. 723. *der Täucherkiwiz.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 134. n. 121. *die Tauchergans.*

Onomat. histor. nat. V. p. 107. *der gezackte Taucher, Taucherfäge.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 498. n. 383. *die Tauchergans.*

Klein, av. p. 140. n. 1. Serrator.

Klein, Vorbereit. p. 258. n. 1. *Kneifer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 148. n. 1. *gemeiner Säger.*

Gesner, Vögelb. p. 95. Anas raucedula.

Gesner, Vögelb. p. 97. Merganser.

Brisson, ornitholog. II. p. 423. n. 1. Harle.

Batsch, Thiere, I. p. 380. *der Seerachen*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 828. n. 1. Mergus (Merganser) subcristatus albus, capite, collo supremo, dorso remigibusque nigro - nitentibus, cauda cinerea.

Beseke, Vögel Kurl. p. 52. n. 98. *die Tauchergans.*

Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 82. n. 91. *gezopfter Kneifer, Tauchergans.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 335. n. 88. *großer Taucher.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, III. p. 14. *große Tauchenten.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 78. n. 90. *der Mohr.*

Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. s. w. IV. 2. p. 148. *Tauchergans.*

Naturf. XII. p. 138. n. 88. *Tauchergans.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168. n. 1. *Skiörand.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 126. *Mort-Aender, Fisk-Aender.*

Pallas, Reis. III. p. 475. *Seerabe.*

Debes, Hist. der Insel Feroë, I. p. 130.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 73. *die Tauchergans.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 406. *die Schnarr-Ganß.*

Neue schwed. Abh. IV. p. 46. VI. p. 287. *Tauchergans.*

Sander, über die Grösse u. Schönheit in der Nat. I. p. 246. *die Tauchergans.*

Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 54. Merganser.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 1. Merganser.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 129. n. 2. Mergus (Merganser) crista dependente, capite nigrocaerulescente, collari albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 133. Mergus (Merganser) crista longitudinali erectiuscula, pectore albido immaculato, rectricibus cinereis, scapo nigricante.

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 1. Merganser.

Mus. Worm. p. 300. Merganser.

Moehring, av. gen. p. 61. n. 62. Mergus.

Jonston, av. p. 134. Merganser.

Schäfer, element. ornith. Tab. 47.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 264. n. 2. *die Tauchergans.*

β. CASTOR. *Der* (so genannte) *Bibertaucher.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 306. n. 4. *der Bibertaucher.*

Leske, Naturg. p. 289. ad n. 1. Mergus Castor.

Bech-

(9) Nach *Brisson* u. *Latham* eine eigne Gattung.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 731. Var. 1. *der Bibertaucher*.

Onomat. histor. nat. V. p. 166. *die Biber-Ente*.

Brisson, ornitholog. II. p. 428. n. 7. Harle cendré ou le Biévre.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 829. n. 2. Mergus (Castor) cristatus cinereus, capite colloque supremo spadiceis, gula, remigibus intermediis abdomineque albis.

Pennant, arct. Zool. II. p. 409. ad n. 383. *das Weibchen oder der kastanienbraune Taucher*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 76. n. 88. *der Vielfraß*.

Kramer, Austr. p. 343. n. 2. Mergus crista dependente cinereo albus, capite castaneo, pedibus luteis; *braunköpfiger Tilger, Taucher*.

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 4. Mergus ruber.

Jonston, av. p. 134. Mergus ruber.

γ. RUBRICAPILLUS. *Die rothköpfige Tauchergans*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 732. Var. 2. *die rothköpfige Tauchergans*.

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 168. n. 5. *Skallesluger*.

Neue Mannichfaltigk. III. p. 307. *der Muschelkönig*.

3. SERRATOR. *Der Meerrachen*. (10)

Müller, Natursyst. II. p. 305. n. 3. *der Langschnabel*. Tab. 9. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 282. n. 2. *der Meerrachen*.

 Borowsky,

(10) Flügelweite 2 Fuss 7 Z. Gewicht des Männchens 2 Pfund. *Pennant*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 22. n. 2. *der lang-schnäblige Meerrachen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 393. n. 2. *der Meerrachen.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 732. *der Meerrachen.* p. 337. *Langschnabel, langschnäbliger Säger, Schreckvogel, wahrer Sägetaucher, Sägeschnäbler, gezopfter Säger, Tauchente, Scharbege, Nörks, Fischtreiber.* Tab. 24.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 136. n. 122. *der Meerrache.*

Onomat. histor. nat. V. p. 168. *die Täuchergans, der Täucher-Kiwitz.*

Klein, av. p. 140. n. 2. Serrator Cirratus.

Klein, Vorbereit. p. 258. n. 2. *gezopfter Kneifer.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 148. n. 2. *gezopfter Kneifer.*

Klein, stemmat. av. p. 33. Tab. 37. fig. 1. a-c.

Gesner, Vögelb. p. 95. *ein Langschnabel oder Schluchtent;* mit Abbild. des Kopfs.

Brisson, ornithol. II. p. 424. n. 2. Harle hupé.

Batsch, Thiere, I. p. 380. *der langschnäblige Seerachen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 829. n. 4. Mergus (Serrator) crista dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus fuscis, cinereo variegatis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 85. *der größere rothbrüstige Taucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 499. n. 384. *der Meerrachen.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 337. n. 89. *der Langschnabel, gemeiner Säger.*

Lepechin, Tageb. d. russ. R. III. p. 14. *Sägetaucher.*

Pontop-

Pontoppidan, Dännemark, p. 168. n. 2. *Topand, Skräkke.*

Naturforscher, XII. p. 139. n. 89. *der Langschnabel.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 77. n. 89. *der weisslichte Taucher.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 71. *der See-Rachen.*

Sander, Grösse und Schönheit in der Natur, III. p. 174. *Meerrachen.*

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. VI. p. 223. *Meerrachen.*

Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 54. Mergus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 2. Mergus fuscus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 129. n. 3. Mergus (Serrator) crista dependente, capite nigro maculis ferrugineis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 134. Mergus (Serrator) crista dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus cinereis, scapo nigricante.

Schwenkfeld, aviar. Silef. p. 205. Anas longirostra 1; *ein Langschnabel, Schlicht-Endte, Teucher, Wieselchen, weisse Tuch-Endte.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 3. Mergus Longirostrus.

Jonston, av. p. 134. Mergus quem Bellonius gallice *Herle* vocat. p. 133. Mergus Longirostrus.

Fabric. fn. groenl. p. 75. n. 48. Mergus (Serrator) crista dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus fuscis, cinereo-variegatis.

Donndorf, Handb. der Thiergesch p. 264. n. 3. *der Meerrachen.*

β. Serratus. *Der Sägeschnäbler.* (1)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 736. Var. 1.

γ. Niger. *Der schwarze Meerrachen.* (2)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 737. Var. 2.
Gesner, Vögelb. p. 95. Mergus niger; *ein schwarzer Täucher.*
Brisson, ornithol. II. p. 427. n. 5. Harle noir.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 830. n. 4. γ. Mergus supra niger, subtus albus, collo spadiceo, taenia transversa in alis candida, remigibus maioribus rectricibusque nigris.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 207. Anas longirostra 3; *ein großer Taucher, Rache, Tauch-Endte, schwarzer Taucher.*
Jonston, av. p. 134. Mergus niger.

δ. Leucomelas. *Der bunte Meerrachen.* (3)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 337. Var. 4.
Brisson, ornith. II. p. 427. n. 4. Harle blanc et noir.
Latham, Syn. III. 2. p. 425. n. 3. Var. A.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 830. β. M. supra niger subtus albus, remigibus maioribus nigris, rectricibus fuscis.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 208. Anas longirostra 6; *eine große gescheckte Ente.*

4. Imperialis. *Der sardinische Sägetaucher* (4)
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 829. n. 3. Mergus (Imperialis) ex nigro fusco et griseo varius,

(1) Das Synonym aus Brün. n. 96. rechnet *Latham* zu seinem *Mergus Castor.*

(2) Nach *Brisson* u. a. eine eigne Gattnng. Nach *Latham* eine Spielart vom Weibchen des *M. Serrator.*

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(4) *Oedmann* hält ihn für das Weibchen einer unbekannten Art, die

rius, capite laevi, remigibus primoribus nigris, ſpeculo nullo, roſtro pedibusque ex rufeſcente albis.

Oedmann: neue ſchwed. Abhandl. VI. p. 289. n. 2. Anitra imperiale *Cetti*.

5. Albellus. *Der weiße Sägetaucher.* (5)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 306. n. 5. *die weiße Nonne.* Tab. 9. fig. 2.

Leske, Naturgeſch. p. 289. n. 3. *der weiße Sägetaucher.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 22. n. 3. *der weiße Sägetaucher.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 393. n. 5. *die weiße Tauchente.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 738. n. 3. *die weiße Tauchente.* p. 742. *weiße Nonne, Merchente, Eisente, Eistaucher, Nonnenentchen, Elſterentchen, niederländiſches Entchen, Winterente, Rheintaucher, Straßburger-Taucher, Scheckente, Kreutzente, weißer Sägetaucher, Weißzopf, Meventaucher, Mevendücker.*

Halle, Vögel, p. 564. n. 683. *die Winterente mit herabhängendem Federbuſch.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 501. n. 386. *die Merchente, Eisente.*

Onomat. hiſtor. natur. V. p. 165. *der weißliche Taucher.*

Klein, av. p. 140. n. 4. Serrator minimus.

Klein, Vorbereit. p. 259. n. 4. *kleiner weißköpfiger Säger.*

die nicht eher zu beſtimmen ſey, bis man das Männchen entdeckt habe.

(5) Länge 18 Zoll. Flügelweite 26 Zoll. Gewicht 34 Unzen. *Pennant*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 149. n. 4. *kleiner weisköpfiger Säger.*

Gesner, Vögelb. p. 92. *Rheinente.*

Brisson, ornitholog. II. p. 425. n. 3. petit Harle hupé, ou la Piette.

Batsch, Thiere, I. p. 380. *der weiße Sägetaucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 831. n. 6. Mergus (Albellus) crista dependente, occipite nigro, corpore albo, dorso temporibusque nigris, alis variegatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 53. n. 9. *die weiße Nonne.*

Bock, Naturgeschichte von Preussen, IV. p. 337. n. 90. *die weiße Nonne, Weißzopf.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 168. n. 3. *Hvidsiden.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 78. n. 91. *die Scheckente.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 413. *die Scheck-Ente.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 457. *die weiße Nonne.*

Naturf. XII. p. 139. n. 90. *die weiße Nonne.*

Neue schwed. Abh. I. p. 224. Mergus Albellus.

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 325. *die weiße Tauchente.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 129. n. 4. Mergus (Albellus) crista dependente, subtus nigra, corpore albo, dorso nigro, alis variegatis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 135. Mergus (Albellus) crista dependente, occipite nigro, corpore albo, dorso temporibusque nigris, alis variegatis.

Kramer, Austr. p. 344. n. 3. Mergus cristatus niger alboque varius, utrinque ad dorsi alarumque principium duabus semicirculis nigris.

Charleton,

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 1. Mergus Rhenanus, quibusdam Monialis alba.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 208. Anas longirostra 5. *Eys - Endte, Nonn - Endte.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 209. Anas longirostra 7. *geschecktes Endtlin, Elster - Endtlin, Nonn-Endtlin, Eyß-Endtlin, niederlendisch Endtlin.*

Jonston, av. p. 133. Mergus Rhenanus.

a. Mas. *Das Männchen.*

Klein, av. p. 135. n. 30. Anas Albella.

Klein, Vorbereit. p. 250. n. 30. *Weißzopf.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 142. n. 30. *Weißzopf.*

Naturf. XXV. p. 11. n. 5. Mergus Albellus.

b. Femina. *Das Weibchen.* (6)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 741. *die Sternente.*

Halle,

(6) Männchen und Weibchen sind bey dieser Gattung in Grösse und Farbe so sehr von einander verschieden, dass *Brisson* und mehrere Ornithologen sie für zwey verschiedene Gattungen gehalten haben. Uebrigens bemerke ich *hier* und bey der *folgenden* Gattung eine solche Verwechselung der Synonymen, dass man gar nicht weiss, wie man durch das Labyrinth sich durcharbeiten soll. In unserm System ist z. E. bey *Mergus Minutus* p. 548. n. 6. *Linnés* fn. Suec. II. n. 138. angeführt, der ganze Charakter aber wie in der XIIten Edition p. 209. n. 6. bestimmt. Hier finde ich aber die *fn. Suec.* nicht nur von *Linné* selbst gar nicht angeführt, sondern man kann auch bey Vergleichung der ältern Linnéischen Synonymen nicht wohl annehmen, dass diese Stelle hieher gehöre. Denn 1) in der Edit. X. I. p. 129. n. 5. ist auf fn. suec. I. n. 115. hingewiesen, und *Albin. wezel - coot* als das einzige Synonym angeführt, diess ist aber offenbar das Weibchen von *Mergus Albellus.* 2) In der *fn. Suec.* II. p. 49. n. 138. wird *fn. Suec.* I. n. 115. wieder als Synonym angeführt. Ich sehe also nicht ab, wie diese Stelle auf *Mergus Minutus* Ed. XIII. (wenn dies eine

Halle, Vögel, p. 563. n. 682. *die Sternente.*
Klein, av. p. 135. n. 29. Anas stellata.
Klein, Vorbereit. p. 250. n. 29. *Sternente.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 142. n. 29. *Sternente.*
Brisson, ornithol. II. p. 428. n. 6. Harle étoilé.
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 23. n. 3. *Mergus melanoleucus?*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 5. Mergus (Minutus) capite griseo laevi?
Linné, fn. Suec. I. n. 115. II. n. 138. Mergus (Minutus) capite griseo laevi?
Naturf. XXV. p. 11. n. 5. Mergus Albellus.

6. Minutus. *Der kleine Sägetaucher.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 306. n. 6. *Pfeilschwanz.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 742. Var. 1. *die kleine Tauchente.* p. 743. Var. 3. *die ungarische Tauchente.*
Onomat. histor. nat. V. p. 167. *die Sternente.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 502. A. *die kleine Tauchente.*
Gesner, Vögelb. p. 93. *eine weiße Tauchente.*
Brisson, ornitholog. II. p. 426. n. 3. (Femina.)
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 832. n. 7. Mergus (Minutus) cinereo-fuscus, subtus gulaque candida, capite et collo superiore ferrugineo, macula alarum ante et pone alba.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 337. n. 91. *Pfeilschwanz, Taucherlein.*

Scopoli,

eine eigne Gattung seyn soll) gehen könne. Noch auffallender ist es, dass *Latham* den *Mergus Minutus Linn.* Ed. XII. p. 209. n. 6. als das Weibchen von *Mergus Albellus* und die *fn. Suec.* II. n. 138. als Synonym von *Mergus Minutus* anführt.

(7) Nach *Leske*, *Bechstein*, *Latham* u. a. das Weibchen oder ein Junges von *Mergus Albellus.* S. die vorige Anmerk.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 79. n. 92. *die ungarische Tauchente.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 168. n. 3. *Tinus.* n. 6. *Soestierne.*

Naturf. XII. p. 139. n. 91. *Pfeilschwanz.*

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 322. n. 37. Mergus Tinus.

Kramer, Austr. p. 344. n. 4. Mergus vertice et fronte castaneo-ferrugineis, capite subcristato; pedibus nigris, nigro-cinereo alboque varius; *kleines Taucherl, kleines Eißantl, Tuckantl.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 2. Mergus Glacialis.

Jonston, av. p. 133. Mergus Glacialis. p. 134. Mergus Albus.

β. Asiaticus. *Der asiatische Sägetaucher.* (8)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 832. n. 7. β. Mergus capite laevi, dorso nigro abdomine albo, rostro pedibusque sanguineis, remigibus primoribus nigris, cauda cinerea.

Oedmann: neue schwed. Abhandl. VI. p. 289. n. 2. Mergus asiaticus.

7. Furcifer. *Der gabelschwänzige Sägetaucher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 832. n. 8. Mergus (Furcifer) niger, capite laevi, collo, ano, abdomine et rectricibus lateralibus albis, fronte genisque dilute fuscis, cauda furcata.

A. *Ver-*

(8) Soll, nach *Oedmann,* zu *Scopolis Mergus Aethiops* n. 90. — folglich zu *Mergus Merganser* unsers Systems gehören. *Scopoli* unterscheidet aber selbst seinen *Mergus Aethiops* vom *Mergus Merganser.* Diess wäre also eine neue Schwierigkeit.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 209. n. 4. Mergus Castor.	p. 545. n. 2. β. Castor.

Ausserdem ist das Geschlecht mit *zwey* Gattungen, der 4ten und 7ten, vermehrt. Bey der 1sten ist die Var. γ, bey der 6ten die Var. β. hinzugefügt. Bey der 3ten sind *vier* Varietäten aus einander gesetzt, und bey dieser sowohl als bey der 5ten die Geschlechts- (Sexus) Synonymen besonders geordnet.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Ein dem Mergus Castor Linn. ähnlicher Vogel, aber ohne Federbusch.*

Sander: Naturf. XIII. p. 190.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der braune Taucher von der Hudsonsbay.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 832. n. 9. Mergus (Fuscus) cristatus fuscus, subtus albus, gula pectoreque nigro maculatis, alis nigris fascia alba.

69. GESCHLECHT. Alca. *Der Papageytaucher. (Alk.)*

Müller, Natursyst. II. p. 308. Gen. LXIX.
Leske, Naturgesch. p. 292. Gen. LXXVII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 29. Gen. XXXVIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 228. Gen. LXXVIII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 397 Gen. XXVIII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 743. Gen. XVIII.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 471.

Onomat.

Onomat. hist. nat. I. p. 254.
Brisson, ornithol. II. p. 380. Gen. XCIII. *Fratercula.* p. 382. Gen. XCIV. *Alca.*
Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXVI.
Latham, Syst. ornith. II. p. 791. Gen. LXXXIX.
Pallas, Naturg. merkw. Thiere, VI. p. 9.
Hermann, tab. affin. anim. p. 149.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 264. Gen. XXX.

4. ARCTICA. *Der Puffin.* (9)
Müller, Natursyst. II. p. 311. n. 4. *der Seepapagey.* Tab. 9. fig. 3.
Leske, Naturgeschichte, p. 293. n. 3. *der Puffin.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 31. n. 2. *der Seepapagey, Lunde.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 228. n. 1. Alca (Arctica) rostro compresso-ancipiti sulcato, sulcis 4, oculorum orbita temporibusque albis, palpebra superiore mucronata; *der Papageyentaucher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 705. *Seepapagoy.*
Halle, Vögel, p. 594. n. 742. *die Polarente.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 144. n. 128. *die Seeelster.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 473. n. 344. *der Puffin.*
Klein, av. p. 146. n. 3. Plautus arcticus.
Klein, Vorbereit. p. 269. n. 3. *Weißback, Buttelnase.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 155. n. 3. *Weißback, Seepapagey.*

Handb.

(9) Flügelweite 21 Zoll. Gewicht 12 Unzen. *Penn.* — Man findet diesen Vogel bald mit weissen bald mit grauen Backen.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 351. *der Seepapagei.*
Brisson, ornitholog. II. p. 380. n. 1. Macareux.
Batsch, Thiere, I. p. 373. *der Seepapagay.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 792. n. 3. Alca (Arctica) rostro compresso-ancipiti sulcato, sulcis quatuor, oculorum orbita temporibusque albis, palpebra superiore mucronata.
Phipps, Reis. nach d. Nordpol, p. 97. *der Seepapagay.*
Olafsen, Island, I. p. 119. *Lunda oder Seepapagay.* p. 297. *der Lund.*
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 25. *Seetaucher.* p. 293. *der große nordische Taucher.*
Leem, Lappl. p. 146. *Lunder.*
Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 163. *Lund oder Lund Talle.*
Steller, Kamtschatka, p. 182. *Ipatka.*
Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 10. *Lunde, See-Papagoy.*
Frisch, Vögel, Tab. 192. *der Seepapagey.*
Eberhard, Thiergesch. p. 126. *der Seepapagoi.*
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 23. Arctica.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 3. Alca (Arctica) rostro compresso-ancipiti sulcato, sulcis quatuor, oculorum orbita, temporibusque albis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 140. Alca (Arctica) rostro compresso-ancipiti sulcato, sulcis quatuor, oculorum orbita temporibusque albis, palpebra superiore mucronata.
Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 15. Puffinus.
Moehring, av. gen. I. p. 62. n. 64. Spheniscus.
Herrmann, tab. aff. animal. p. 150. Alca arctica.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 265. n. 1. *der Puffin.*

β. La-

β. Latham, Syn. III. 1. p. 318 n. 3. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 792 n. 3. β. A. nigra, vertice cinereo, genis, pectore abdomineque albis.

6. LABRADORICA. *Der labradorische Papageytaucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 474. n. 346. *der Papageytaucher von Labrador.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 793. n. 4. Alca (Labradora) rostro carinato, mandibula inferiore gibba, ad apicem macula nigra, oculorum orbita temporibusque albidis, abdomine albo.

3. IMPENNIS. *Der große nordische Papageytaucher.*

Müller, Natursyst. II. p. 310. n. 3. *der nordische Penguin.*

Leske, Naturgesch. p. 292. n. 2. *der ungeflügelte Penguin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 32. n. 3. *der nordische Penguin, Fettgans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 143. n. 127. *der nordische Penguin.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 471. n. 341. *der große Papageytaucher.*

Brisson, ornithol. II. p. 382. n. 1. grand Pingoin.

Batsch, Thiere, I. p. 372. *der nordische Penguin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 791. n. 1. Alca (Impennis) rostro compresso-ancipiti sulcato, macula ovata utrinque ante oculos.

Pallas, Naturgesch. merkw. Thiere, V. p. 2. *der nordliche Penguin.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 42. *der nordliche Penguin.*

Sander, Größe u. Schönheit in der Nat. I. p. 243. Alca impennis.

Eberhard, Thiergeschichte, p. 127. *die nordische Fettgans.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 2. Anser magellanicus.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 2. Alca (Impennis) rostro compresso-ancipiti sulcato, macula ovata utrinque ante oculos.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 139. Alca (Impennis) rostro compresso-ancipiti sulcato, macula ovata utrinque ante oculos.

Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 10. Mergus Americanus.

Nieremb. exot. Lib. 10. c. 27. Mergus Americanus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 150. Alca Impennis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 265. *der große Papageytaucher.*

2. Pica. *Der Schwarzschnabel.* (10)

Müller, Naturs. II. p. 310. n. 2. *der Elster-Alk.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 398. n. 2. *der Elsteralk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 747. n. 2. *der Elsteralk.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 472. n. 343. *der Schwarzschnabel.*

Brisson, ornithol. II. p. 383. n. 3. *petit Pingoin.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 793. n. 5. β. A. rostro laevi compresso unisulcato, corpore toto subtus apicibusque remigum posticarum albis.

Müller,

(10) Flügelweite nach *Pennant* 25 Zoll. Gewicht 18 Unzen. — Nach *Latham* eine Varietät, oder vielmehr ein Junges von *Alca Torda.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 138. Alca (Pica) rostro laevi compresso, corpore toto subtus apicibusque remigum posticarum albis, pedibus rubris.

Neue schwed. Abhandl. III. p. 104. Alca pica.

Naturf. XIII. p. 180. Alca Pica?

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 12. Alca pica?

Jonston, av. p. 225. Mergus Bellonii.

Hermann, tab. affin. anim. p. 150. Alca pica.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 266. n. 3. *der Schwarzschnabel.*

β. BALTICA. *Der baltische Papageytaucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 749. *der baltische Alk?*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 473. ad n. 343. Alca baltica.

1. TORDA. *Der Klub-Alk.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 308. n. 1. *Alk.*

Leske, Naturgesch. p. 292. n. 1. *der Alk.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 33. n. 4. *der Klub-Alk, Scheerschnabel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 397. n. 1. *der Alk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 744. n. 1. *der Alk.* p. 747. *Scheerschnabel, Wasserschnabel, Alcke, Scheermesserschnäbler, Klubalk, Tordalk.*

Halle, Vögel, p. 596. n. 744. *der krummschnäblige Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 472. n. 342. *der Wasserschnabel, Alk.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 142. n. 126. *der Alk.*

(1) Flügelweite 27 Zoll. Gewicht an 23 Unzen. *Penn.*

Klein, Vorber. p. 271. n. 5. *Scheermesserschnäbler.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 156. n. 5. *Scheerschnäbler.*
Brisson, ornitholog. II. p. 383. n. 2. Pingoin.
Batsch, Thiere, I. p. 773. *der Klub-Alk.*
Latham, Syn. Supplement. p. 264. Razor-bill.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 793. n. 5. Alca (Torda) rostro sulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos.
Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 25. *Alken.* p. 285. *Papagaytaucher.*
Debes, Hist. der Insel Feröe, I. p. 128.
Leem, Nachricht von den Lappl. p. 146. *die Klubb-Alker.*
Pontoppidan, Norwegen, II. p. 124. *Alk.*
Pallas, Naturgesch. merkwürd Thiere, V. p. 12. *Scheerschnabel, oder Klubalk.*
Linné, auserles. Abh. II. p. 293. n. 81. *die krummschnäblige Polarente.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 81. n. 94. Alca Torda.
Eberhard, Thiergesch. p. 127. *die kleine Fettgans.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 3. Alca.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 1. Alca (Torda) rostri sulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 136. Alca (Torda) rostri sulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos.
Hermann, tab. affin. anim. p. 150. Alca Torda.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 266. n. 4. *der Klub-Alk.*

β. *Pallas*, Naturgesch. merkwürd. Th. V. p. 12. *eine Nebenart des Scheerschnabels, mit weniger als*

als halb so großem Schnabel, ohne Querfurchen und anstatt der weißen Halfterlinie am Vorkopf nur auf jeder Seite der Anfang eines schrägen weißen Strichs.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 794. n. 5. γ. A. subtus tota a rostro ad caudam candida, linea a rostro ad oculos nulla.

Müller, zool. dan. prodr. p. 17. n. 137. Alca (Baltica) subtus tota a rostro ad caudam candida?

Brünich, ornitholog. bor. p. 25. n. 1. Alca (Baltica) subtus tota a rostro ad caudam candida, linea a rostro ad oculos nulla?

7. CRISTATELLA. *Der Haubenpapageytaucher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 34. n. 6. *der gehäubelte Alk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 477. n. 351. *der Haubenpapageytaucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 794. n. 6. Alca (Cristatella) rostro compresso subsulcato, corpore nigricante, dorso maculis ferrugineis, crista frontali antrorsum inclinante.

Batsch, Thiere, I. p. 372. *der Haubenalk.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 26. *die gehäubelte Alke.* Tab. 3. n. 5. fig. 7-9.

Catal. mus. Petrop. p. 419. n. 60. Lunda minor cristata.

Steller, Beschr. von Kamtschatka, p. 181. *Starik.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 149. 196. Alca cristatella.

8. TETRACULA. *Der Hühner-Alk.*

Müller, Natursystem, Suppl. p. 105. n. 9. *der vierfärbige Papageyentaucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 477. n. 352. *der dunkelbraune Papageytaucher.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II p. 148. n. 131. *der Hühneralk.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 794. n. 7. Alca (Tetracula) rostro laevi compresso, corpore nigro subtus cinerascente, nucha maculis rectricibusque lateralibus apice ferrugineis, fronte subcristata.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 31. *die Hüner-Alke.*

Sander, Grösse und Schönheit in der Natur, I. p. 245. Alca tetracula

Hermann, tab. aff. anim. p. 141. Alca tetracula.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 266. n. 5. *der Hühner-Alk.*

9. PSITTACULA. *Der Meerpapagey.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 104. n. 7. *der Seeparkit.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 476. n. 350. *der Meerpapagey*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 147. n. 130. *die Alke mit dem Sichelschnabel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 794. n. 8. Alca (Psittacula) rostro compresso subsulcato, corpore nigricante, abdomine albo, facie producta, ad basin rostri coarctata.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 22. *die Alke mit dem Sichelschnabel.*

Steller, nov. Comment. Petropolit. IV. p. 426. Tab. 13. fig. 25. 26.

Hermann, tab. aff. anim. p. 149. Alca Psittacula.

10. CIRRHATA. *Der gehörnte Papageytaucher.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 104. n. 6. *Mänenpapagay.*

Borowsky,

Borowsky, Thierreich, III. p. 30. n. 1. *der Alk mit weißen Augenbraunfedern.* Tab. 38.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 146. n. 129. *der kamtschatkische Alk.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 475. n. 349. *der gehörnte Papageytaucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 791. n. 2. Alca (Cirrhata) rostro compresso-ancipiti sulcato, sulcis tribus, superciliis albis, postice flavis elongatis cirrhatis.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 15. *die Alke mit hängenden weißen Augenbraunfedern.* Tab. 1. u. 5. fig. 1-3.

Steller, nov. Comment. Petropolit. IV. p. 421. tab. 12. fig. 16.

Catal. musf. Petropol. p. 419. n. 56. Lunda maior cirrhata.

Steller, Kamtschatka, p. 182. *Mitschagatka oder Igylma.*

Kraschenimnikow, Kamtschatka, p. 189. *Meuschagatka, Igilma.* Alca monochroa, sulcis tribus, cirrho duplici utrinque dependente. Anas arctica cirrhata *Stell.*

Sander, Gröſse u. Schönheit in der Nat. I. p. 244. Alca cirrhata.

Herrmann, tab. affinit. animal. p. 150. Alca cirrhata.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 267. n. 6. *der gehörnte Papageytaucher.*

5. Alle. *Der kleine Papageytaucher.*

Müller, Natursyst. II. p. 312. n. 5. *grönländische Taube.* Tab. 9. fig. 4.

Pennant, arct. Zool. II. p. 474. n. 346. *der kleine Papageytaucher.*

Klein, av. p. 146. n. 1. Plautus Columbarius. (Mit *Colymbus Grylle* verwechselt.)

Klein, Vorber. p. 268. n. 1. *Taube aus Grönland.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 154. n. 1. *Seetaube.*

Brisson, ornithol. II. p. 378. n. 2. petit Guillemot.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 795. n. 10. Alca (Alle) rostro laevi conico, abdomine toto subtus remigumque posticarum apicibus albis, pedibus nigris.

Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 288. *Seetauben.*

Phipps, Reis. nach d. Nordpol, p. 97. *grönländische Seetaube.*

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 114. *Murre.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 77. *der kleine schwarz und weiße Taucher.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 131. n. 6. Alca (Alle) rostro laevi conico, abdomine fasciaque alarum alba, pedibus nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 142. Alca (Alle) rostro laevi conico, abdomine toto subtus, remigumque posticarum apicibus albis, pedibus nigris.

Hermann, tab. affin. animal. p. 149. Alca Alle.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 267. n. 7. *der kleine Papageytaucher.*

β. *Der weiße Papageytaucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 475. ad n. 346.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 795. n. 10. β. Alca candida.

γ. *Der Papageytaucher mit röthlicher Brust.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 475. ad n. 346.

11. Antiqua. *Der Greis.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 475. n. 347. *der Greis.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 795. n. 9. Alca (Antiqua) rostro nigro basi albido, corpore nigricante, abdomine albo, pennis cervicalibus linearibus elongatis albis.

12. PYGMAEA. *Der Zwergpapageytaucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 475. n. 348. *der Zwergpapageytaucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 796. n. 11. Alca (Pygmaea) rostro carinato basi depresso, corpore atro subtus cinereo.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *sieben* Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *zwey*, bey der 2ten *zwey*, bey der 4ten *zwey*, und bey der 5ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

APTENODYTES. *Der Penguin. (Fettgans.)*

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 228. Gen. LXXIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. Gen. XXVI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 176. Gen. XXXIV.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 878. Gen. XCVIII.

Forster, hist. aptenodyt. — in Comment. Soc. Sc. Gott. 1780. Vol. III. p. 121 sqq.

Brisson, ornithol. II. p. 385. Gen. XCV. Spheniscus.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 268. Gen. XXXI.

1. Chrysocome. *Der gehäubte Penguin.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 878. n. 1. Aptenodytes (Chrysocome) rostro rufo-fusco, pedibus flavescentibus, crista frontali erecta, auriculari deflexa sulphurea.

Phil. Transact. lxvi. p. 103.

2. Patagonica. *Die Fettgans von Patagonien.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 229. n. 1. Aptenodytes (Patagonica) rostro pedibusque nigris, macula parotica aurea.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 878. n. 2. Aptenodytes (Patagonica) rostro pedibusque nigris, macula ad aures utrinque flavo-aurea, collum ambiente.

Sonnerat, Reis. n. Neuguinea, p. 64. *die neuguineische Meergans;* mit 1 Figur.

Naturf. I. p. 258. *der patagonische Pinguin.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 268. n. 1. *die Fettgans von Patagonien.*

3. Papua. *Der Papuspenguin.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 879. n. 3. Aptenodytes (Papua) rostro pedibusque rubicundis, macula occipitali alba.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 64. *die Papusmeergans.*

4. Antarctica. *Der antarctische Penguin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 879. n. 4 Aptenodytes (Antarctica) rostro atro, pedibus rubicundis, linea gulari nigra.

5. Magellanica. *Der magellanische Penguin.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 229. n. 2. Aptenodytes (Magellanica) rostro nigro, pedibus

dibus rubicundis, fasciis duabus albis, una includente oculos, altera pectorali.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 880. n. 6. Aptenodytes (Magellanica) rostro nigro, fascia purpurascente, superciliis albis, fascia pectorali et torque medio colli nigris.

6. DEMERSA. *Der schwimmende Penguin.*

Müller, Natursystem, II. p. 321. n. 2. *schwimmende Penguin.*

Leske, Naturgesch. p. 293. n. 2. *der schwimmende Penguin*

Borowsky, Thierreich, III. p. 28. n. 2. *der schwimmende Penguin.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. *der schwimmende Penguin.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 176. *der schwimmende Penguin.*

Halle, Vögel, p. 595. n. 743. *die Fettgans mit ledrigen Flügeln, die entfedert scheinen.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere II. p. 152. n. 137. *der Penguin, Pinguin, die Meerpigmäe, magellanische Gans.*

Onomat. histor. nat. III. p. 621. *die Fettgans.*

Klein, av. p. 147. n. 4. Plautus pinguis.

Klein, Vorbereit. p. 270. n. 4. *Fettgans mit der vierten unächten Zehe.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 155. n. 4. *Fettgans.*

Brisson, ornitholog. II. p. 385. n. 1. Manchot.

Batsch, Thiere, I. p. 375. *der südliche Penguin, magellanische Gans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 879. n. 5. Aptenodytes (Demersa) rostro pedibusque nigris, superciliis albis, fascia pectorali nigra.

Selig-

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 83. *Penguins mit schwarzen Füßen.*

Eberhard, Thiergesch. p. 115. *die magellanische Gans.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 126. n. 2. *der schwimmende Penguin.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 131. n. 2. Diomedea (Demersa) alis impennibus, pedibus tetradactylis.

Charleton, onomast. zoic. p. 98. n. 5. Anser magellanicus.

Jonston, av. p. 181. Anser magellanicus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. Diomedea demersa.

β. *Brisson*, ornitholog. II. p. 386. n. 2. Manchot tacheté.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 880. n. 5. β. Apt. rostro nigro, fascia alba, superciliis albis, fascia pectorali nigra.

Latham, Syn. III. 2. p. 567. n. 5. A.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 83. *Penguin mit schwarzen Füßen.*

γ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 880. n. 5. γ. Aptenodytes rostro nigro fascia alba, mento orbitisque nigris.

Pernett. voy. II. p. 17. tab. 7. fig. 3. Pinguin à lunettes?

7. CATARRACTES. *Der rothfüßige Penguin.*

Müller, Natursystem, II. p. 337. n. 2. *der schwimmende Phaëton.*

Leske, Naturgeschichte, p. 291. n. 2. *der schwimmende Tropikvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 24. n. 2. *der schwimmende Phaëton.*

Onomat.

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 310. *der ſchwimmende Phaëton.*

Briſſon, ornith. II. p. 387. n. 1. Gorfou.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 881. n. 8. Aptenodytes (Catarractes) roſtro pedibusque rubris, capite fuſco.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 97. *die Fettgans.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 135. n. 2. Phaëton (Demerſus) alis impennibus, roſtro mandibulis edentulis, digito poſtico diſtincto.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. Phaëton demerſus.

8. Torquata. *Der Penguin mit dem Halsbande.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p 880. n. 7. Aptenodytes (Torquata) roſtro pedibusque nigris, areis oculorum nudis ſanguineis, ſemitorque albo.

Sonnerat, R. n. Neuguinea, p. 64. *die neuguineiſche Meergans mit dem Halsbande;* m. 1 Fig.

9. Minor. *Der kleine Penguin.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 881. n. 9. Aptenodytes (Minor) roſtro nigro, pedibus albidis.

10. Chiloensis. *Der Quethu.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 881. n. 10. Aptenodytes (Chiloenſis) corpore lanuginoſo cinereo.

11. Chilensis. *Der chileſiſche Penguin.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 881 n. 11. Aptenodytes (Molinae) cinereo caeruleoque varia, ſubtus alba, pedibus tridactylis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 268. n. 2. *der chileſiſche Penguin.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das ganze Geschlecht ist hier neu. Die *sechste* und *siebente* Gattung sind aus andern Geschlechtern hieher versetzt; die übrigen ganz neu hinzugekommen.

70. GESCHLECHT. PROCELLARIA. *Der Sturmvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 340. Gen. LXX.
Leske, Naturgesch. p. 291. Gen. LXXV.
Borowsky, Thierreich, III. p. 35. Gen. XXXIX.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 222. Gen. LXXIII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 398 Gen. XXIX.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 176. Gen. XXXVI.
Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 714.
Onomat. hist. nat. VI. p. 640.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 495.
Brisson, ornithol. II. p. 395. Gen. XCIX. Puffinus. p. 398. Gen. C. Procellaria.
Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXVII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 820. Gen. XCV.
Hermann, tab. affin. anim. p. 154.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 269. Gen. XXXII.

7. OBSCURA. *Der dunkelbraune Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 828. n. 24. Procellaria (Obscura) nigricans, subtus alba, collo lateribus fusco nebuloso, tectricibus alarum medio albido variegatis.

8. PACI-

8. PACIFICA. *Der Sturmvogel vom stillen Ocean.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 827. n 23. Procellaria (Pacifica) atra, subtus obscura, rostro plumbeo, pedibus pallidis.

9. CAERULEA. *Der blaue Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 827. n. 22. Procellaria (Caerulea) cano-caerulescens, corpore subtus et rectricibus apice albis, fascia pectoris alarumque expansarum obscuris.

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 93. 107. *die blauen Sturmvögel.*

10. VITTATA. *Der blaulichgraue Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 827. n. 21. Procellaria (Forsteri) caerulescens, subtus alba, remigibus, rectricibus apice fasciaque alarum expansarum fusco-nigris, rostro basi dilatato.

11. URINATRIX. *Der Sturmtaucher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 827. n. 20. Procellaria (Urinatrix) fusco-nigricans subtus alba, gula plicata nigra, calcare obsoleto.

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 120. 199. *die kleinen Sturmtaucher.*

1. PELAGICA. *Die Sturmschwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 315. n. 1. *der Ungewittervogel.* Tab. 9. fig. 5.

Leske, Naturgeschichte, p. 291. n. 1. *der Ungewittervogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 35. n. 1. *der Ungewittervogel.* Tab. 39.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 222. n. 1. Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo; *der Sturmvogel.*

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. I. p. 399. *der Ungewittervogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 177. *der Ungewittervogel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 323. *der Sturmvogel.*

Halle, Vögel, p. 599. n. 751. *der Sturmvogel.* Fig. 54.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 148. n. 132. *die Sturmschwalbe, der Sturmvogel, Sturmverkündiger, St. Petersvogel, Petrell, das Orkanmöwchen.*

Beckmann, Naturhist. p. 44. n. 2. *der Sturmvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 497. n. 381 *die Sturmschwalbe.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 647. *der Ungewittervogel.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 662. *der Sturmvogel.*

Klein, av. p. 148. n. 12. Plautus minimus, Procellarius.

Klein, Vorbereit. p. 272. n. 12. *Sturmmeve, kleiner schwarzer Sturmvogel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 158. n. 12. *Sturmvogel, Sturmmeve, Sturmfink.*

Brisson, ornitholog. II. p. 398. n. 1. Petrel.

Batsch, Thiere, I. p. 374. *der Ungewittervogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 269. Stormy Petrel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 826. n. 19. Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 111. *die kleinste Meve, mit röhrenförmigen Nasenlöchern.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 82. n. 95. *der kleine schwarze Sturmvogel.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 293. n. 84. *der See-Sturmvogel.*

Schwed. Abhandl. VII. p. 93. *Ungewittervogel.* Tab. 6.

Forster,

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 53. *die gewöhnlichen kleinen Sturmvögel.*

Berlin. Samml. V. p. 484. *Sturmvogel.*

Schriften der dronth. Gesellschaft, I. p. 161. *der Ungewitter-oder St. Peters-Vogel.*

Eberhard, Thiergesch. p. 117. *der Sturmvogel.*

Meidinger, Vorles. I. p. 125. n. 1. *der Ungewittervogel.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 196. n. 20. *der Sturmvogel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 1. Avis Petri.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 131. n. 1. Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 143. Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo.

Moehring, av. gen. p. 67. n. 72. Procellaria.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 269. n. 1. *die Sturmschwalbe.*

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 413. n. 18. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 826. n. 19. β. Pr. nigra, purpureo caerulescenteque varia, tectricibus alarum uropygioque albo maculatis.

Salern. ornithol. p. 383.

2. Fregatta. *Der Segler.*

Müller, Natursyst. II. p. 315. n. 2. *der Segler.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 645. *der Segler.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 826. n. 17. Procellaria (Fregatta) nigra, subtus alba, pedibus nigris.

12. Furcata. *Der Gabelschwanz.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 497. n. 380. *der Gabelschwanz.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 825. n. 16. Procellaria (Furcata) argenteo-grisea, gula palli-

 da,

da, crisso albo, remigibus caudaque forficata nigricantibus, rectrice extima extus alba.

13. Fuliginosa. *Der tahitische Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 825. n. 15. Procellaria (Fuliginosa) fuliginoso-fusca, capite, collo, remigibus rectricibusque nigris, cauda emarginata.

14. Desolata. *Der graugrüne Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 825. n. 14. Procellaria (Desolata) cinereo-caerulescens, subtus alba, rectricibus apice fasciaque alarum expansarum nigricantibus.

15. Nivea. *Der weiße Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 825. n. 13. Procellaria (Nivea) alba, rachibus pennarum nigris, rostro pedibusque caeruleis.

16. Melanopus. *Der nordamerikanische Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 824. n. 12. Procellaria (Melanopus) cinereo-nigricans, capistro gulaque griseis, maculis minutis nigricantibus, rostro toto digitisque dimidiato-nigris.

3. Glacialis. *Der Fulmar.*

Müller, Naturs. II. p. 316. n. 3. *das Seepferd.*

Leske, Naturgesch. p. 292. n. 2. *der große Sturmvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 36. n. 2. *der große Sturmvogel.*

Halle, Vögel, p. 570. n. 699. *die große Nordmöve, Eismöve, Mallemugge.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 149. n. 133. *die Eismöve, der Mallemucke.*

Onomat.

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 645. *das Seepferd.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 144. n. 2. *Mallemugge.*
Briſſon, ornithol. II. p. 399. n. 2. Petrel cendré.
Batſch, Thiere, I. p. 375. *der große Sturmvogel.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 823. n. 9. Procellaria (Glacialis) albicans, dorſo caneſcente, roſtro pedibusque flaveſcentibus.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 495. n. 378. *der Fulmar, Mallemucke.*
Phipps, Reiſ. n. d. Nordpol, p. 97. *Eisſturmvogel, oder Mallemucke.*
Forſter, Reiſ. Ed. in 8. p. 55. *der Malmuck.*
Pontoppidan, Naturhiſtorie von Norwegen, II. p. 143. *Hav-Heſt.*
Leem, Lappl. p. 143. *das Seepferd.*
Schriften der dronth. Geſellſch. I. p. 155. *das Seepferd.*
Schwed. Abh. XXI. p. 94. *eine Procellaria, die ſich um den Nordpol findet.*
Meidinger, Vorleſ. I. p. 125. n. 2. *der große Sturmvogel.*
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 144. Procellaria (Glacialis) albicans, dorſo caneſcente.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 270. n. 2. *der Fulmar.*

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 405. Var. A.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 823. n. 9. β. Pr. alba, dorſo medio caneſcente, alis nigricantibus.

17. Cinerea. *Der aſchgraue Sturmvogel.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 824. n. 10. Pr. (Cinerea) ſupra cinerea ſubtus alba, cauda nigricante, roſtro flavo, pedibus cineraſcentibus.

18. Gigantea. *Der größte Sturmvogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 498. n. 382. *der große Sturmvogel?*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 820. n. 1. Procellaria (Gigantea) fusco-nebulosa, subtus albida, remigibus rectricibusque nigricantibus, rostro pedibusque flavis.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 270. n. 3. *der größte Sturmvogel, Riesenvogel.*

19. Brasiliensis. *Der brasilianische Sturmvogel.*

Brisson, ornith. II. p. 397. n. 4. Puffin du Bresil.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 822. n. 2. Procellaria (Brasiliana) fusco-nigricans, collo inferiore flavo, rectricibus fusco-nigricantibus.

4. Aequinoctialis. *Der große schwarze Sturmvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 316. n. 4. *der Wetterrabe.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 643. *der Wetterrabe.*

Klein, av. p. 148. n. 14. Plautus Albatros spurius maior.

Klein, Vorbereit. p. 273. n. 14. *der größere unächte Albatroß.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 158. n. 14. *unächter Albatroß, der größte.*

Brisson, ornithol. II. p. 397. n. 3. Puffin du Cap de bonne esperance.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 821. n. 3. Procellaria (Aequinoctialis) fusca immaculata, rostro flavo, pedibus fuscis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 73. *der große schwarze Peter, ganz schwarz mit gelbem Schnabel.*

Forster,

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 56. *eine große schwarze Art von Sturmvögeln.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 132. n. 2. Procellaria (Aequinoctialis) fusca immaculata, rostro flavo.

Brown, Jamaika, p. 482. Shearwater?

β. *Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 498. n. 382. *der große Sturmvogel?*

Latham, Syn. III. 2. p. 399. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 821. n. 3. β.

20. Grisea. *Der graue Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 821. n. 4. Procellaria (Grisea) fuliginoso-atra, tectricibus alarum inferioribus albis, rostro fusco, pedibus antice caerulescentibus.

21. Gelida. *Der Eissturmvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 822. n. 5. Pr. (Gelida) cinereo-caerulescens, dorso nigricante, gula, iugulo pectoreque albis, rostro flavo, pedibus caeruleis.

22. Alba. *Der weißbrüstige Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 822. n. 6. Procellaria (Alba) fusco-nigricans, pectore, abdomine crissoque albis.

β. Pr. fuliginosa subtus cinerea, facie albo fuscoque varia, pedibus flavescentibus, digitis dimidiato nigris. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 822. n. 6. β.

23. Antarctica. *Der antarctische Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 822. n. 7. Procellaria (Antarctica) fusca, subtus albo-caerulescens,

lescens, remigibus secundariis, uropygio caudaque albis, rectricibus apice nigris.

Forster, Reis. Edit. in 8. p. 112. *die antarctischen Sturmvögel.*

5. CAPENSIS. *Der capsche Sturmvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 465. n. 5. *der Landzeiger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 37. n. 3. *der Landzeiger, die capische Taube.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II p. 149. n. 134 *die capsche Taube.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 644. *der Landzeiger, oder Damier.*

Klein, av. p. 148. n. 14. Plautus Albatros spurius minor.

Klein, Vorbereit. p. 273. n. 14. *der kleine schwarz und weiße unächte Albatroß.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 158. n. 14. *der schwarz und weißbunte.*

Brisson, ornithol. II. p. 400. n. 3. Petrel tacheté appellé vulgairement Damier.

Batsch, Thiere, I. p. 374. *der Landzeiger.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 822. n. 8. Procellaria (Capensis) albo fuscoque varia.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 75. *der weiß und schwarz gefleckte Peter.*

Forster, Reis. Edit. in 8. I. p. 53. *die Pintaden.* p. 93. *der Cap-Sturmvogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 133. n. 3. Procellaria (Capensis) albo fuscoque varia.

β. *Latham*, Syn. III 2. p. 402. var.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 823. n. 8. β. Pr. lutescente fuscoque varia.

6. PUFFI-

6. Puffinus. *Der Wasserscheerer.* (²)

Müller, Naturſyſt. II. p. 317. n. 6. *der Sturmverkündiger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 37. n. 4. *der Puffin.*

Halle, Vögel, p. 576. n. 715. *die Erdmöwe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 150. n. 135. *die Puffinmöwe.*

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 648. *der Puffinvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 496. n. 379. *der Waſſerſcheerer, Puffinmeve.*

Klein, av. p. 139. n. 18. Larus piger cunicularis, Puffinus ſeu Pupinus.

Klein, Vorbereit. p. 257. n. 18. *Pupin.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 146. n. 19. *Pupin.*

Briſſon, ornithol. II. p. 395. n. 1. Puffin.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 824. n. 11. Procellaria (Puffinus) corpore ſupra nigro, ſubtus albo, pedibus rufis.

Latham, Syn. Supplem. p. 269. Shearwater.

Pontoppidan, Naturgeſch. von Dännemark, II. p. 181. *Skrabe.*

Forſter, Reiſ. Ed. in 8. I. p. 52. *der gewöhnliche große Sturmvogel.* p. 118. *ſchwarze Sturmvögel.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 144 Procellaria (Puffinus) corpore ſupra nigro, ſubtus albo, pedibus rufis.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 94. n. 2. Diomedea avis.

Jonſton, av. p. 146. Puffinus. p. 128. Avis Diomedea.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 271. n. 4. *der Waſſerſcheerer.*

(²) Flügelweite 31 Zoll. Gewicht 17 Unzen. *Pennant.*

β. *Brisson,* ornith. II. p. 396. n. 2. Puffin cendré. (3)
Latham, Syn. III. 2. p. 407. n. 11. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 824. n. 11. β. Pr. supra cinerea, subtus alba, rectricibus candidis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 17 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *zwey*, bey de 3ten *zwey*, bey der 4ten *zwey*, bey der 5ten *zwey*, und bey der 6ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. Procellaria (Marina) dorso, tectricibus alarum fuscis, vertice et cervice caerulescenti-cinereis, uropygio caerulescente, genis corporeque toto subtus albis. *Latham,* Syst. ornith. II. p. 826. n. 18.

Latham, Syn. III. 2. p. 410. n. 17. Frigate Petrel.

71. GESCHLECHT. DIOMEDEA. *Der Albatroß* (Penguin, Schiffsvogel, Rinnenschnabel.)

Müller, Natursyst. II. p. 320. Gen. LXXI.
Leske, Naturgesch. p. 293. Gen. LXXVIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 27. Gen. XXXVII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 222. Gen. LXXIV.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 396. Gen. XXVII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 175. Gen. XXXIII.
Onomat. hist. nat. III. p. 621.
Brisson, ornitholog. II. p. 393. Gen. XCVIII. Albatrus.

Batsch,

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. LXXXVIII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 789. Gen. LXXXVIII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 153.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 271. Gen. XXXIII.

1. Exulans. *Der wandernde Albatroß.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 71. n. 1. *der fliegende Penguin.*
Leske, Naturg. p. 293. n. 1. *der fliegende Penguin.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 27. n. 1. *der Kriegsschiffs-Vogel, Albatros.* Tab. 37.
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 222. n. 1. Diomedea (Exulans) alis pennatis longissimis, pedibus aequilibribus tridactylis.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 396. n. 1. *der Kriegsschiffsvogel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 176. *der Kriegsschiffsvogel.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II p. 150. n. 136. *der Albatros.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 468. n. 340. *der wandernde Albatroß.*
Onomat. hist. nat. III. p. 622. *der Albatros, der Fremdling.*
Klein, av. p. 148. n. 13 Plautus Albatrus.
Klein, Vorbereit. p. 273. n. 13. *Albatroß.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 158. n. 13. *Albatros.*
Brisson, ornitholog. II. p. 394. n. 1. Albatros.
Batsch, Thiere, I. p. 375. *der Albatros oder Fregattvogel.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 789. n. 1. Diomedea (Exulans) supra fusco-rufescens, nigricante striata

(4) Flügelweite von 7 Fuss 7 Zoll bis zu 10 Fuss 7 Zoll. Gewicht von 12 bis zu 28 Pfund.

ſtriata et maculata, ſubtus alba, collo ſupra et lateribus fuſco transverſim ſtriatis, remigibus maioribus nigris, minoribus rectricibusque plumbeo-nigricantibus.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 71. *der Albatroß.*

Forſter, Reiſ. Edit. in 8. I. p. 53. 89. *Albatroſſe*, p. 124. *ein groſser weiſser Albatros.*

Pallas, Naturg. merkw. Thiere, V. p. 36. *Albatroß.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 128. *das Kriegsſchiff.*

Hawkesworth, Geſch. der engl. Seereiſ. II. p. 48. *Albatroß.*

Sander, Gröſse u. Schönheit in der Nat. I. p. 230. *Penguins.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 132. n. 1. Diomedea (Exulans) alis pennatis, pedibus tridactylis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 152. 154. 169. Diomedea Exulans.

Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 271. n. 1. *der wandernde Albatroß.*

β. *Pennant*, arct. Zool. II. p. 469. *der braune Albatroß.*

Pallas, Naturgeſch. merkw. Th. V. p. 41. *eine Spielart des Albatroß, über den ganzen Körper fahlſchwärzlich, obenher am dunkelſten.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 790. n. 1. β.

γ. *Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 469. *der weiße Albatroß.*

Pallas, Naturgeſch. merkw. Thiere, V. p. 41. *eine weiße Spielart, am Rücken zwiſchen den Flügeln ſchwärzlich, auch mit fahlſchwarzen Schwung- und Schwanzfedern.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 790. n. 1. γ.

2. Spa-

2. SPADICEA. *Der kastanienbraune Albatroß.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 790. n. 2. Diomedea (Spadicea) rostro albido, corpore saturate castaneo-fusco, abdomine pallido, facie alisque subtus albis.

3. CHLORORHYNCHOS. *Der gelbschnäblige Albatroß.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 790. n. 3. Diomedea (Chlororhynchos) rostro nigro, supra basique flavo, corpore supra atro-caeruleo, subtus uropygioque albo.

4. FULIGINOSA. *Der dunkelbraune Albatroß.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 791. n. 4. Diomedea (Fuliginosa) rostro nigro, corpore fuliginoso-fusco, pone oculos lunula alba.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 214. n. 2. Diomedea Demersa.	p. 557. n. 6. Aptenodytes demersa.

Das Geschlecht ist zwar überhaupt nur um *zwey* Gattungen vermehrt, aber es sind doch der *neuen* Gattungen *drey* hinzugekommen; die *zweyte* der XIIten Edition ist in ein anderes *neues* Geschlecht versetzt.

72. GESCHLECHT. PELECANUS. *Der Pelikan.*
Müller, Natursyst. II. p. 323. Gen. LXXII.
Leske, Naturgesch. p. 285. Gen. LXX.
Borowsky, Thierreich, III. p. 38. Gen. XL.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 223. Gen. LXXV.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. I. p. 399. Gen. XXX.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 749. Gen. XIX.
Halle, Vögel, p. 586. *b.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 538.
Onomat. hist. nat. VI. p. 238.
Klein, av. p. 142. Fam. VI.
Brisson, ornitholog. II. p. 489. Gen. CX. Sula. p. 494. Gen. CXI. Phalacorax. p. 497. Gen. CXII. Onocrotalus.
Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. CXII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 882. Gen. XCIX.
Hermann, tab. affin. anim. p. 154 sqq.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 272. Gen. XXXIV.

* *Mit ungezähneltem Schnabel.*

1. ONOCROTALUS. *Die Kropfgans.* (5)
Müller, Natursyst. II. p. 323. n. 1. *die Kropfgans.* Tab. 9. fig. 1.
Leske, Naturgesch. p 285. n. 1. *die Kropfgans.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 40. n. 2. *die Kropfgans, Pelikan.*

Blumen-

(5) Flügelweite 11 bis 15 Fuss. Gewicht 18 bis 25 Pfund. *Penn.* — Wird über 50 Jahr alt. Der beutelförmige Kropf am Unterschnabel lässt sich so ausdehnen, dass er wohl 30 Pfund Wasser fassen kann. Das Fleisch ist thranig, wird aber gegessen. Die Haut wird samt den Federn gegerbt, und als Pelzwerk getragen. Aus den Säcken werden Beutel, Säcke, Mützen u. dgl. gemacht. — Wenn im Frühjahr die Paarungszeit eintritt, so schwillt den Kropfgänsen an der Wurzel des Schnabels ein runder, wie ein Borstorferapfel grosser Höker empor, der schwammig, weich, und fleischfarbig ist, und sich im Sommer wieder verliert. — *Forskål* hat die Kropfgans in Arabien brüten gesehen, und gefunden, dass sie vier Eyer legt, die nicht grösser sind als Gänseyer. (a. a. O.)

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 223. n. 1. Pelecanus (Onocrotalus) gula saccata; *die Kropfgans.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 399. n. 1. *die Kropfgans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 750. n. 1. *die Kropfgans.* p. 156. *Pelikan, Beutelgans. Sackgans, Schneegans, Kropfpelikan, Riesenpelikan, Schwanentaucher, Vielfraß, Nimmersatt, Waßervielfraß, Ohrvogel, Eselschreyer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 324. *der Pelikan.*

Ebert, Naturl. II. p. 75. *der Pelikan.*

Halle, Vögel, p. 586. n. 732. *die Kropfgans.* Fig. 53.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 153. n. 138. *der Eselschreier* u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 538. n. 423. *der Riesenpelikan, Kropfgans,*

Beckmann, Naturhist. p. 44. *die Kropfgans.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 809. *Kropfgans.*

Onomat. histor. nat. V. p. 697. *die Kropfgans.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 393. *die Kropfgans.* Tab. 8.

Klein, av. p. 142. n. 1. Plancus Gulo.

Klein, Vorb. p. 263. n. 1. *Kropfgans, Schneegans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 151. n. 1. *Kropfgans.*

Gesner, Vögelb. p. 387. *Onvogel, Schneganß, Meerganß, Vogelheine. Eselschreyer, Kropffvogel, Sackgans.* Fig. p. 388.

Brisson, ornitholog. II. p. 497. n. 1. Pelican.

Batsch, Thiere, I. p. 383. *die Beutelgans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 882. n. 1. Pelecanus (Onocrotalus) albus, gula saccata.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 338. n. 92. *die Kropfgans.*

Wolf.

Wolf, Reis. n. Zeilan, p. 135. *Kropfgans.*
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 343. *die Löffelgans.* Tab. 6.
Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 307. *Kropfgänse.*
Adanson, Senegall, p. 202. *Pelekanen.*
Rytschkow, orenb. Topogr. p 242. *Baba.*
Pallas, Reis. Ausz. I p. 98. *Kropfgänse.* p. 314. *Baba.* II. p 7. *Kropfgänse.*
Pallas, nord. Beyträge, I. p. 7. *die Kropfgans.*
Le Brun, Reis. n. Mosk. u. Pers. II p. 161.
S. G. Gmelin, Reis. I. p. 123. *Kropfgans.*
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 79. *der Pelican.*
Perrault, Charras, u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 341. anatom. Beschreibung zweyer Pelikane. Tab. 85. *der Pelican.* Tab. 86. die Zergliederung.
Naturf. XII. p. 140. n. 92. *die Kropfgans.*
Berlin. Samml. V. p 277. *der Pelikan.*
Frisch, Vögel, Tab. 186. *die Kropfgans oder Schwanentaucher.*
Linné, auserles. Abhandl. II. p. 285. n. 51. *die Kropfgänse.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 83. n. 97. *der Nimmersatt, Kropfgans.*
Mannichfaltigk. IV. p. 211. *der Pelikan;* m. 1 F.
Neue Mannichfalt. III. p. 316. *der Pelikan.*
Neueste Mannichfaltigk. I. p. 171. II. p. 124. *der Pelikan.*
Hamb. Magazin, VI. p. 594. *der Pelikan.*
Neu Hamb. Magazin, St. 84. p. 463.
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. s. w. III. 2. p. 154. *Pelikane.*
Goeze, nützl. Allerley, I. p. 146. II. p. 216. n. 1. *der Pelikan.*

Beckmann,

Beckmann, phyſikal. ökonom. Bibl. VII. p. 132. *die Kropfgans.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 126. n. 1. *die Kropfgans.*

Oekonom. Zool. p. 74. n. 15. *die Kropfgans.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 114. *die Kropfgans, Meergans.*

Jablonſky, allgem. Lex. p. 561. *Pelikan.*

Loniceri, Kräuterb. p. 669. *Schneeganß, Meerganß.*

Franke, diſſ. de Pelecano. Lipſ. 1640. 4.

Funccii comment. de Pelecano. Gorlic. 1692. 4.

Deuſing, de Pelecano; in diſſertt. Faſc. diſſ. 14.

Ol. Borich. de Pelecano; in *Bartholin.* Epiſt. Cent III. ep. 93. p. 399.

Volkamer, de Pelecano; in Eph. Natur. Cur. Dec. III. an. 4. obſ. 119. p. 247.

Fiſcher, de Pelecano. Nov. Act. Nat. Cur. I. p. 284.

Neue geſellſch. Erzähl. II. p. 367. (über die Haut des Pelikans.)

Urlſperger, Nachricht. von Georg. u. Carolin. I. p. 849.

Cardan. de rer. variet. L. 7. c. 36. p. 214. Onocrotali.

P. Martyr, de nov. orb. Lib. 6. decad. 3.

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 54. Onocrotalus.

Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 1. Onocrotalus gula ſaccata.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 132. n. 1. Pelecanus (Onocrotalus) gula ſaccata.

Forſkål, faun. orient. p. 7. n. 6. Onocrotalus *Ahdjirbu.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 94. n. 1. Onocrotalus.

Moehring, av. gen. p. 63. n. 65. Onocrotalus.

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Silef. p. 311. Onocrotalus, Truo; *ein Kropffgans, Ohnvogel.*

Jonston, av. p. 126. Onocrotalus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 155. Onocrotalus.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 47. Onocrotali.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 10. n. 149. Πελεκανος.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 273. n. 1. *die Kropfgans.*

β. *Die Kropfgans mis gezähneltem Schnabel?*

Brisson, ornitholog. II. p. 499. n. 1. A. Pelican à bec dentelé. (6)

9. Roseus. *Die rosenfarbene Kropfgans.* (7)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 883. n. 2. Pelecanus (Roseus) roseus, gula saccata.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 34. *der Pelikan mit lebhaft rosenfarbenem Gefieder.*

10. Fuscus. *Die dunkelbraune amerikanische Kropfgans.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 725. ad n. 1. *der amerikanische Pelikan.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 539. n. 424. *der dunkelbraune Pelekan.*

Klein, av. p. 143. ad n. 1. Onocrotalus fuscus.

Klein, Vorbereit. p. 263. ad n. 1. *der braune Eselschreyer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 151. ad n. 1. *die braune Kropfgans.*

Brisson,

(6) *Latham* rechnet dies Synonym zu *P. Thagus* p. 577. n. 30.

(7) *Sonnerat* glaubt, diese Gattung möge wohl mit *Pelecanus Manillensis*, n. 11. einerley seyn, und der Vogel verändere vielleicht seine Farben nur mit dem Alter.

(8) Nach *Klein*, *Sloane*, *Linné*, u. a. nur eine Varietät von *Pelecanus Onocrotalus*.

Brisson, ornithol. II. p. 499 n. 2. Pelican brun.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 883. n. 3. Pelecanus (Fuscus) cinereo-fuscus, gula saccata.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 81. *der amerikanische Pelican.*

Ellis, Hudsonsb. p. 37. *der Pelican.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 346. *der amerikanische Pelikan.*

Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 110. *der Pelican.*

Mannichfaltigk. IV. p. 214. *der amerikanische Pelikan.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 133. n. 1. β. Onocrotalus s. Pelecanus fuscus.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 215. n. 1. β. Onocrotalus occidentalis.

Hist. Californ. I. p. 40. Great Gull.

Gentl. Magaz. XX. tab. p. 210. Brown Pelican.

11. Manillensis. *Die manillische Kropfgans.* (9)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 833. n. 4. Pelecanus (Manillensis) fuscus, gula saccata.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 34. *der braune Pelikan der Insel Luçon.*

12. Philippensis. *Die philippinische Kropfgans.* (10)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 883. n. 5. Onocrotalus (Philippensis) subcristatus albus, corpore supra griseo-cinereo, gula saccata.

13. Rufescens. *Die röthliche Kropfgans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 884. n. 6. Pelecanus (Rufescens) cristatus rufescens, capite collo-

(9) S. vorher die siebente Anmerkung.

(10) *Latham* rechnet hieher auch den *Alcatraz.* Phil. Transact. XXIII. p. 1394. n. 40.

colloque fuscescente-albis, cauda saturate-cinerea, gula saccata.

14. CAROLINENSIS. *Die carolinische Kropfgans.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 540. n. 425. *der carolinische Pelecan.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 884. n. 7. Pelecanus (Carolinensis) supra obscurus, subtus albus, gula saccata.
β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 884. n. 7. β.
γ. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 884. n. 7. γ.

15. ERYTHRORHYNCHOS. *Die rothschnabligt nordamerikanische Kropfgans.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 884. n. 8. Pelecanus (Trachyrhynchos) cristatus albus, gula saccata nigro striata.
Philos. Transact. LXII. p. 419. n. 54.

2. AQUILUS. *Die Fregatte.*
Müller, Naturs. II. p. 327. n. 2. *Fregatvogel.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 42. n. 3. *der Fregatvogel.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 223. n. 2. Pelecanus (Aquilus) alis amplissimis, cauda forficata, corpore nigro, rostro rubro, orbitis nigris; *die Fregatte.*
Halle, Vögel, p. 162. n. 100. *die Fregatte.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 154. n. 139 *die Fregatte.*
Onomat. histor. nat. III. p. 967. V. p. 239. *die Fregatte, der Meeradler.*
Brisson, ornitholog. II. p. 493. n. 6. Fregate.
Handb. d. Naturgesch. II. p. 387. *die Fregatte.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 885. n. 10. Pelecanus (Aquilus) cauda forficata, corpore nigro, rostro rubro, orbitis nigris.

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 383 *der Fregattvögel.*
Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 99. *die Fregatte.*
Forster, Reis. Edit in 8. I. p. 49. 257. *Fregattenvögel.*
Berlin. Samml. V. p. 520. *die Fregatte*
Eberhard, Thiergeschichte, p. 113. *die Fregatte.*
Neueste Mannichfalt. I. p. 549. *der Fregatvogel.*
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 133. n. 2. Pelecanus (Aquilus) cauda forficata, corpore nigro, capite abdomineque albis.
Moehring, av. gen. p. 82. n. 108. Attagen.
Jonston, av. p. 213. Caripira.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 154. Pelecanus Aquilus.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 273. n. 2. *die Fregatte.*

16. MINOR. *Die kleine Fregatte.* (1)
Brisson, ornith. II. p. 494. n. 7. petite Frégate.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 885. n. 11. Pelecanus (Minor) cauda forficata, corpore ferrugineo, rostro orbitisque rubris.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 7. *der kleine Seerabe?*

17. LEUCOCEPHALOS. *Der weißköpfige Pelikan.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 886. n. 12. Pelecanus (Leucocephalus) cauda forficata, corpore fusco, capite, collo, pectore et abdomine albis, rostro obscuro.

18. PALMERSTONI. *Der Pelikan von der Insel Palmerston.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 886. n. 13. Pelecanus (Palmerstoni) cauda forficata, corpore

fusco,

(1) Länge, nach *Brisson,* 2 3/4 Fuss 9 Zoll. *Brisson* ist geneigt, ihn für das Weibchen vom vorigen zu halten.

fusco, viridi nitente, subtus albo, iugulo albo nigroque vario, abdomine albo, crisso nigro.

3. CARBO. *Der Kormoran.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 328. n. 3. *der Kormoran.* Tab. II. fig. 3.

Leske, Naturgesch. p. 285. n. 2. *der Kormoran.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 38. n. 1. *der Kormoran.* Tab. 40.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 284. n. 3. Pelecanus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro, rostro edentulo, capite subcristato; *die Scharbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 401. n. 2. *der Kormoran.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 756. n. 2. *der Kormoran.* p. 761. *Wasserrabe, Seerabe, Feuchtarsch, Schaluchorn od. Schlucker, Scharb, schwarzer und kohlschwarzer Pelikan.*

Funke, Naturgesch. I. p. 324. *der Kormoran.*

Ebert, Naturl. II. p. 77. *Cormoran, Wasserrabe.*

Halle, Vögel, p. 589. n. 736. *der Seerabe.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II p. 155. n. 140. *der Wasserrabe.*

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 574. *Wasserrabe.*

Onomat. histor. nat. II. p. 634. V. p. 241. *der große schwarze Seeraab.*

Handb.

(2) Länge, nach *Brisson*, 2 7/12 Fuss 6 Linien. Flügelweite 4 1/2 Fuss 6 Linien — Länge nach *Pennant* 3 Fuss 4 Zoll. Flügelweite 4 Fuss 2 Zoll. Gewicht 7 Pfund. Wird oft mit der folgenden Gattung verwechselt — *Brünnich* hat *Linnés Pel. Carbo*, und *Brissons Phalacorax*, als zwey verschiedene Gattungen getrennt. *Müller* nimmt letztern als eine Varietät von *Pelecanus Graculus* L. an.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 390. *der Wasserrab.* Corvus aquaticus.

Klein, av. p. 144. n. 5. Plancus Corvus, lacustris, aquaticus.

Klein, Vorbereit. p. 266. n. 5. *Seewasser-Rabe, Feuchtars, Schlucker.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 153. n. 5. *Wasserrabe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 540. n. 427. *der Cormoran.*

Gesner, Vögelb. p. 97. 99. *Morfex, Stolucherez, Scholucher, Scharbe, Scauer, Schuluer, Scalucher*; Carbo aquaticus.

Brisson, ornithol. II. p. 495. n. 1. Cormoran.

Batsch, Thiere, I. p. 383. *der Kormoran.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 886. n. 14. Pelecanus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro, capite subcristato.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 82. n. 92. *Seerabe.*

Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 342. *der Cormoran.*

Olafsen, Reise d. Island, I. p. 34. *der Pelikan.* p. 257. *Skarfen.* III. p. 200. *Dilaskarfs, Hvidlaaring?*

Lepechin, Tageb. d. russ. R. I. p. 307. *Wasserraben.*

Pennant, Reise n. Schottl. I. p. 24. *Kormoran.*

Pallas, Reise, Ausz. II. p. 7. *Seeraben.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 13. *die Seeraben.* IV. p. 7. *der große Seerabe.* IV. p. 20. *der schwarze Wasserrabe.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 143. *Seeraben.*

Neuhoff, Gesandschaft nach China, I. p. 134. *Louwa.*

Dapper, Sina, p. 140. *Louwa.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 169. n. 1. *Aalekrage.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 181. *Skarbe.*

Allgem. Reis. V. p. 260. *Lou-wa*

Linné, auserl. Abh. II. p. 292. n. 8. *der Seerabe.*

Schneider, zool. Abh. p. 144. *der Seerabe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 84. n. 98. *der schwarze Pelekan.*

Goeze, nützl. All. I. p. 210. *der Kormoran.*

Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. s. w. I. 2. p. 11. *Wasserrabe.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 430.

Neues berlin. Intelligenzbl. 1788. p. 1141.

Mannichfaltigk. I. p. 808. fig. 812. II. p. 615. fig. 618.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Carbo aquaticus.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 23. n. 2. Carbo aquaticus.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 133. n. 3. Pelecanus (Carbo) cauda aequali, corpore cinereo, rostro edentulo.

Linné, fn. Suec. I. n. 116. Pelecanus corpore atro, subtus albicante, rectricibus quatuordecim.

Linné, fn. Suec. II. p. 51. n. 145. Pelecanus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro, rostro edentulo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 146. Pelecanus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro, rostro edentulo, capite subcristato.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 148. Pelecanus Phalacorax.

Brünniche, ornith. bor. p. 30. n. 120. Pelecanus (Carbo) capite laevi, rectricibus 14.

Brün-

Brünniche, ornith. bor. p. 31. n. 122. Phalacorax *Briss.*

Fabric. fn. groenl. p. 88. n. 57. Pelecanus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro, rostro edentulo, capite laevi.

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 5. Phalacorax.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 246. Corvus lacustris; *Seerabe, Wasserrabe, Feuchtars.*

Jonston, av. p. 131. Phalacorax. Corvus aquaticus. p. 134. Morfex.

Albert, hist. anim. Lib. 5. c. 3.

Hermann, tab. aff. anim. p. 146. Pelecanus Carbo.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 274. n. 3. *der Kormoran.*

4. Graculus. *Der kleine Kormoran.* (3)

Müller, Natursystem, II. p. 330. n. 4. *der Wasserrabe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 761. n. 3. *der Wasserrabe.* p. 763. *Seekrähe, Seeheher, Krähenpelikan.*

Halle, Vögel, p. 591. n. 737. *die Schwimmkrähe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 540. n. 426. *der Wasserrabe.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 242. *der kleine Cormoran.*

Klein, av. p. 145. n. 6. Plancus Corvus minor, aquaticus.

Klein, Vorbereit. p. 267. n. 6. *Seekrähe, Seeheher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 153. n. 6. *Seekrähe.*

Brisson, ornith. II. p. 496. n. 2. petit Cormoran.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 887. n. 15. Pelecanus (Graculus) cauda rotundata, corpore

 nigro

(3) Flügelweite 3 Fuss 8 Zoll. Gewicht 4 Pfund. *Pennant.* Wird von einigen für eine Varietät, von andern für das Weibchen von *Pel. Carbo* gehalten.

nigro, ſubtus fuſco, rectricibus duodecim, roſtro edentulo.

Bock, Naturgeſchichte von Preuſſen, IV. p. 338. n. 93. *der See-Waſſerrabe.*

Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 24. *Waſſerraben.*

Naturf. XII. p. 140. n. 93. *der Waſſerrabe.*

Perrault, Charras u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgeſch. I. p. 247. anatomiſche Beſchreib. eines Cormorans. Tab. 32. *der Cormoran.* Tab. 33. die Zergliederung.

Neue ſchwed. Abh. III. p. 104. Pelecanus Graculus.

Pontoppidan, Dännemark, p. 169. n. 2. *Fiskeren*, n. 3. *Hvidlaaring.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 3. Graculus palmipes.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 147. Pelecanus (Graculus) cauda rotundata, corpore nigro, ſubtus fuſco, rectricibus duodecim, roſtro edentulo.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 95. n. 6. Graculus palmipes, Corvus marinus, Mergus magnus niger.

Jonſton, av. p. 132. Graculus palmipes, ſeu Corvus aquaticus minor.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 274. n. 4. *der kleine Kormoran.*

β. P. roſtro edentulo, corpore ex nigro-virideſcente nigroque caeruleſcente varie fuſco, gula lutea, cauda cuneata. *

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 827. n. 15. β.

Muſ. Carlſon. faſc. III. Tab. 61.

γ. P. cauda rotundata, corpore nigricante, ſubtus fuſco, ſupra pennis margine nigris. *

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 828. n. 15. γ.

[*Buffon*,

[*Büffon*, hist. nat. des ois. VIII. p. 374. le petit fou brun.

Büffon, pl. enl. 974. Fou brun de Cayenne.]

Vid. Gmel. Syst. p. 579. ad n. 8.

19. PYGMAEUS. *Der Zwergpelikan.*

Müller, Natursystem, Suppl. p. 106. n. 4. a. *der Zwergpelikan.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 890. n. 25. Pelecanus (Pygmaeus) ater, pectore virescente, orbitis atomis albis sparsis, tectricibus alarum medio fuscis, collo, pectore lateribusque punctis sparsis niveis.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 14. n. 26. Pelecanus Pygmaeus. Tab. G.

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 7. Pelecanus pygmaeus. p. 240. *eine ganz kleine Art von Seeraben.*

β. P. gula murina, rostro edentulo, pedibus nigris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 890. n. 25. β.

20. PUNCTATUS. *Der punktirte Pelikan.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 889. n. 19. Pelecanus (Punctatus) cristatus niger, cauda rotundata, orbitis nudis, alis fusco-cinereis, nigro punctatis, lateribus colli linea utrinque alba.

21. CRISTATUS. *Der Haubenkormoran.*(4)

Pennant, arct. Zool. II. p. 542. A. *der Haubencormoran.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 888. n. 16. Pelecanus (Cristatus) corpore viridi-nitente, subtus obscuro, rostro pedibusque obscuris, capite cristato.

Olassen, Reis. durch Island, II. p. 295. *Topskarfr, Hraukur.*

(4) Flügelweite 3 Fuss 6 Zoll. Gewicht 3 3/4 Pfund. *Penn.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 18. n. 150. Pelecanus (Cristatus) crista suberecta, corpore atro immaculato, rectricibus duodecim.

22. Violaceus. *Der violette Kormoran.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 543. B. *der violette Cormoran.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 888. n. 17. Pelecanus (Violaceus) crista erecta, corpore toto nigro violaceo-nitente.

23. Urile. *Der Schnarrkormoran.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 543. C. *der Schnarrkormoran.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 888. n. 18. Pelecanus (Urile) viridi-nitens, gutture et orbitis albis, facie nuda ex caerulescente rubra, alis caudaque obscuris, pedibus nigris.

Steller, Kamtschatka, p. 179. *Urill der Kamtschadalen.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 275. n. 5. *der Schnarrkormoran.*

24. Naevius. *Der bunte Kormoran.*

Ist nach *Latham* mit *Pelecanus Punctatus*, n. 20. einerley.

25. Carunculatus. *Der warzige Kormoran.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 889. n. 20. Pelecanus (Carunculatus) niger, subtus albus, facie nuda carunculata rubra, orbitis elevatis caeruleis, fascia alarum alba.

26. Magellanicus. *Der magellanische Pelikan.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 889. n. 21. Pelecanus (Magellanicus) niger, macula pone oculos abdomineque albis, temporibus mentoque

toque nudis rubescentibus, hypochondriis albo striatis.

27. Varius. *Der braun und weiße Pelikan.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 890. n. 22. Pelecanus (Varius) fuscus, subtus albus, superciliis pallidis, dorso postico, uropygio, femoribus, remigibus caudaque nigris.

28. Cirrhatus. *Der neuseeländische gehäubte Pelikan.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 22. n. 23. Pelecanus (Cirrhatus) niger, subtus albus, vertice cristato, litura alarum alba, rostro, orbitis pedibusque flavis.

29. Africanus. *Der afrikanische Pelikan.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 890. n. 24. Pelecanus (Africanus) fusco-niger, subtus albo nigricanteque varius, gula alba, tectricibus alarum caeruleo-griseis, margine et apice nigris.

** *Mit gezähneltem Schnabel.*

30. Thagus. *Der Thage.* (s)
Latham, Syst. ornith. II. p. 884. n. 9. Pelecanus (Thagus) cauda rotunda, rostro serrato, gula saccata.

Vidaure,

(s) Ich habe schon in der not. 6. bey *Pel. Onocrotalus* n. 1. bemerkt, daſs *Latham* die im Syst. p. 569. aufgeführte Varietät *β*, und das daselbst befindliche *Brisson'sche* Synonym, hieher rechnet. Ist dieſs richtig, so muſs auch der *Alcatrae* des *Hernaud* und die übrigen von mir angeführten Synonymen hieher gezogen werden. *Molina*, ausser welchem ich in unsrem System kein Synonym bemerkt finde, sagt: daſs sein *Pelecanus Thagus*, der Spanier *Alcatraz* sey. Diese Benennung finde ich auch bey *Vidaure*, aber die Gröſse wird

von

Vidaure, Gesch. v. Chile, p. 72. *der Alcatraz.*

Hernand. Mex. tab. p. 672. Atototl Alcatraz, Onocrotalus mexicanus dentatus. Avis aquatica?

Hermann, tab. affinit. animal. p. 155. *Alcatraz.*

Journ. de Phys. 1779. Decembr. p. 475.

5. Bassanus. *Die schottische Gans.*

Müller, Natursyst. II. p. 330. n. 5. *die schottische Gans.* Tab. 11. fig. 2.

Borowsky, Thierreich, III. p. 42. n. 4. *die schottische Gans.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 224. n. 4. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi, corpore albo, rostro serrato, remigibus primoribus nigris, facie caerulea.

Halle, Vögel, p. 588. n. 733. *die schottische Gans.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 239. *die schottische Gans.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 541. n. 428. *der Bassaner, der Gannet.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 156. n. 141. *der Bassaner, Bassanergans.*

Klein, av. p. 143. n. 2. Plancus, Anser Bassanus.

Klein, Vorbereit. p. 265. n. 2. *Bassaner, schottische Gans.*

Klein,

von beyden ganz verschieden angegeben. *Molina* bestimmt den Körper des Thiers nicht gröſser als den einer Schnepfe; *Vidaure* hingegen kleiner als eines *kalekutischen Hahns.* *Molina* sagt: die Eingebornen des Landes gebrauchten seinen zusammengenäheten Beutel, um Taback darin aufzubewahren, auch verfertigten sie Laternen daraus, weil er, getrocknet, so durchsichtig wie Horn würde; er habe Lampen gesehen, die anderthalb Fuſs hoch gewesen, und aus einem einzigen solchen Sack gemacht wären — Wie ein Vogel von der *Gröſse einer Schnepfe* einen solchen Sack haben könne, ist wohl kaum zu begreifen.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 152. n. 2. *schottische Gans.*
Gesner, Vögelb. p. 135. *Solend od. Schottenganß.*
Brisson, ornith. II. p. 492. n. 5. Fou de Bassan.
Batsch, Thiere, I. p. 384. *die schottische Gans.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 891. n. 26. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi, corpore albo, rostro serrato, remigibus primoribus nigris, facie caerulea.
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 51. *Gannets od. Solandgänse.*
Pennant, R. d. Schottl. II. p. 272. *schottische Gänse.*
Pallas, nord. Beytr. II. p. 299. *der weiße Seerabe.*
Olafsen, Isl. I. p. 120. *Haf sula.* III. p. 201. *Sula.*
Pontoppidan, Norwegen, II. p. 145. *Hav-Sule, Gentelmann.*
Sander, Größe u. Schönheit in der Nat. I. p. 239. *Bassaner-Pelecan.*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 133. n. 4. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi; rostro serrato, remigibus primoribus nigris.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 149. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi, corpore albo, rostro serrato, remigibusque primoribus nigris, facie caerulea.
Moehring, av. gen. p. 64. n. 66. Graculus.
Jonston, av. p. 131. Anser Bassanus seu Scoticus.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 275. *die schottische Gans.*

β. SULA MAIOR. *Die Charniergans.* (6)
Halle, Vögel, p. 588. n. 734. *die Charniergans mit dem Schnabelgelenke.*

Klein,

(6) Nach *Brisson, Klein, Halle*, u. a. eine eigene Gattung.

Klein, av. p. 144. n. 3. Plancus congener Anseri Bassano.

Klein, Vorbereit. p. 265. n. 3. *großer Dölpel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 152. n. 3. *großer Dölpel.*

Brisson, ornithol. II. p. 490. n. 2. grand Fou.

Latham, Syn. III. 2. p. 620. n. 25. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 891. n. 26. β. P. fuscus albo-maculatus, capite, collo et pectore concoloribus, subtus albus, area oculorum nuda nigricante.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 541. ad n. 428.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 72. *der große Dölpel.* (der Kopf.)

Neue Mannichfaltigk. I. p. 401. *die große Charniergans.*

6. PISCATOR. *Der Fischer.*

Müller, Natursyst. II. p. 331. n. 6. *der Fischer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 43. n. 5. *der Einfaltspinsel, weiße Pelikan, Fischer.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 157. n. 142. *der Fischer.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 243. *der Fischer.* (Mit dem vorigen β verwechselt.)

Brisson, ornith. II. p. 491. n. 4. Fou blanc.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 892. n. 27. Pelecanus (Piscator) cauda cuneiformi, rostro serrato, corpore albo, remigibus omnibus nigris, facie rubra.

7. SULA. *Der weiße Fischer.*

Müller, Natursf. II. p. 332. n. 7. *der weiße Fischer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 44. n. 6. *der weiße Fischer.*

Halle, Vögel, p. 589. n. 735. *der Wassertölpel mit dem Schnabelgelenke.*

Onomat.

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 244. *der kleine Fiſcher, kleiner Tölpel.*

Klein, av. p. 144. n. 4. Plancus Morus.

Klein, Vorbereit. p. 266. *Dölpel.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 153. n. 4. *Dölpel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 489 n. 1 Fou.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 892. n. 28. Pelecanus (Sula) cauda cuneiformi, corpore albido, roſtro dentato, remigibus primoribus apice nigricantibus, facie rubra.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 74. *der Dölpel.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 134. n. 5. Pelecanus (Piſcator) cauda cuneiformi, roſtro ſerrato, remigibus omnibus nigris.

8. Fiber. *Der braune Fiſcher.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 332. n. 8. *der braune Fiſcher.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 241. *der braune Fiſcher.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 491. n. 3. Fou brun.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 893. n. 29. Pelecanus (Fiber) cauda cuneiformi, roſtro ſerrato, corpore fuſceſcente, remigibus omnibus nigricantibus, facie rubra.

31. Parvus. *Der kleine cayenniſche Pelikan.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 893. n. 30. Pelecanus (Parvus) niger, ſubtus albus, facie plumoſa.

32. Maculatus. *Der gefleckte Pelikan.* (7)

Latham, Syſt. ornith. II. p. 892. n 26. γ P. fuſcus, maculis albis triquetris, ſubtus albidus fuſco-maculatus, roſtro, remigibus, cauda pedibusque fuſcis.

A. *Ver-*

(7) Nach *Latham* eine Varietät von *Pelecanus Baſſanus.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 215. n. 1. *β*. Pel. onocr. Occidentalis.	p. 570. n. 10. Pelecanus Fuscus.

Das Geschlecht ist mit 24 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *zwey*, und bey der 5ten ebenfalls *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

73. GESCHLECHT. PLOTUS. *Der Schlangenvogel.* (Langhals, Breitfuss.)

Müller, Natursyst. II. p. 233. Gen. LXXIII.
Leske, Naturgesch. p. 288. Gen. LXXI.
Borowsky, Thierreich, III. p. 24. Gen. XXXV.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 221. Gen. LXXI.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 394 Gen. XXIV.
Onomat. hist. nat. VI. p. 586.
Brisson, ornithol. II. p. 485. Gen. CVIII. Anhinga.
Latham, Syst. ornith. II. p. 895. Gen. CI.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 276. Gen. XXXV.

1. ANHINGA. *Der Anhinga.*

Müller, Natursyst. II. p. 233. *Schlangenkopf.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 25. *der Schlangenvogel.* Tab. 35.
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 221. n. 1. Plotus (Anhinga) ventre albo.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 394. *der Schlangenvogel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 175. *der Schlangenvogel.*
Halle, Vögel, p. 592. n. 739. *der Schlangenvogel.*

Ebert,

Ebert, Naturl. II. p. 78. *der Anhinga.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 158. n. 143. *der Anhinga, Schlangenhals.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 587. *der Schlangenvogel.*
Klein, av. p. 145. n. 8. Plancus Brasiliensis.
Klein, Vorber. p. 268. n. 8. *brasilianischer Patschfuß, Anhinga genannt.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 154. n. 8. *Anhinga.*
Brisson, ornithol. II. p. 485. n. 1. Anhinga.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 895. n. 1. Plotus (Anhinga) capite laevi, abdomine albo.
Moehring, av. gen. p. 61. n. 63. Ptynx.
Jonston, av. p. 211. Anhinga.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 276. n. 1. *der Anhinga.*

2. Melanogaster. *Der schwarzbäuchige Schlangenvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 895. n. 2. Plotus (Melanogaster) capite laevi, abdomine albo.
Naturf. I. p. 275. n. 12. *Anhinga mit schwarzem Bauche.*
Berlin. Samml. IX. p. 194. n. 12. *der schwarzbäuchige Anhinga von Zeylon und Java.*
Neueste Mannichfaltigk. I. p. 190. n. 12.

β. *Latham,* Syst. ornithol. II. p. 896. n. 2. β. Pl. corpore supra fusco, subtus nigro, scapularibus striis tectricibusque alarum albo flavicantibus, cauda apice rufa.

γ. *Latham,* Syn. III. 2. p. 625. n. 2. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 896. n. 2. γ. Pl. niger, dorso et scapularibus albo maculatis, tectricibus alarum albo-flavicantibus, cauda apice rufa.

δ. *Latham*, Syn. III. 2. p. 626. n. 2. Var. C.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 896. n. 2. γ. Pl. niger, capite, collo et tectricibus alarum rufo fuscoque striatis.

3. Surinamensis. *Der surinamische Schlangenvogel.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 896. n. 3. Plotus (Surinamensis) corpore supra fusco, subtus albo, vertice et collo posteriore nigris, gula, iugulo et fascia oculari albis, lateribus colli albo nigroque lineatis.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 276. n. 2. *der surinamische Schlangenvogel.*

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *zwey* Gattungen vermehrt.

74. GESCHLECHT. Phaeton. *Der Phaëton.* (Tropiker, Tropikvogel.)

Müller, Natursyst. II. p. 335. Gen. LXXIV.
Leske, Naturgesch. p. 290. Gen. LXXIV.
Borowsky, Thierreich, III. p. 23. Gen. XXXIV.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 221. Gen. LXXII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 393. Gen. XXIII.
Onomat. hist. nat. VI. p. 310.
Brisson, ornith. II. p. 486. Gen. CIX. Lepturus.
Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 893. Gen. C.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 153.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277. Gen. XXXVI.

1. Aethe-

1. Aethereus. *Der Tropikvogel.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 335. n. 1. *der fliegende Phaëton.* Tab. II. fig. 3.

Leske, Naturgeſch. p. 291. n. 1. *der fliegende Tropiker.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 23. n. 1. *der fliegende Phaeton.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 221. n. 1. Phaëton (Aethereus) rectricibus duabus longiſſimis, roſtro ſerrato, pedibus aequilibribus, digito poſtico connexo; *Tropikvogel.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 394. *der fliegende Tropikvogel.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 174. *der fliegende Tropikvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 78. *der Tropikvogel.*

Halle, Vögel, p. 592. n. 738. *der Seefächer.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 158. n. 144. *die Tropikente.*

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 152. *Tropikvogel.*

Onomat. hiſtor. natur. IV. p. 790. *der fliegende Phaëton.*

Klein, av. p. 145. n. 7. Plancus Tropicus, Avis tropicorum.

Klein, Vorbereit. p. 267. n. 7. *Tropikvogel.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 154. n. 7. *Tropikvogel.*

Briſſon, ornithol. II. p. 486. n. 1. Paille en cul, ou oiſeau des Tropiques.

Batſch, Thiere, I. p. 368. *der Tropikvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 893. n. 1. Phaëton (Aethereus) albus, dorſo, uropygio tectricibusque alarum minoribus nigro ſtriatis, rectricum ſcapis baſi faſciaque ſupraoculari nigris, roſtro rubro.

Sander, Größe u. Schönheit in der Nat. I. p. 237. *Phaëton.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 549. *der Tropiker.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 134. n. 1. Phaeton (Aethereus) rectricibus duabus longissimis, rostro serrato, digito postico adnato.

Moehring, av. gen. p. 64. n. 67. Lepturus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 153. Phaëton aethereus.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277. n. 1. *der Tropikvogel.*

β. Lepturus candidus. *Der weiße Tropikvogel.* (8)

Halle, Vögel, p. 577. n. 718. *die Erdgürtelmöwe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 147. n. 22. *Tropikmeve.*

Brisson, ornitholog. II. p. 487. n. 2. Paille-en-cul blanc.

Latham, Syn. III. 2. p. 618. n. 1. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 894. n. 1. β. Phaëton albus, taenia supra oculos, scapularibus versus extremitatem fascia supra alas rectricumque scapis in exortu nigris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 111. *der Tropikvogel.* (in fliegender Figur, nebst besonderer Abbild. des Kopfs und Fußes, in natürlicher Größe.)

γ. Lepturus fulvus. *Der gelbe Tropikvogel.* (9)

Brisson, ornith. II. p. 488. n. 3. Paille-en-cul fauve.

Latham,

(8) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. Länge 2 5/12 Fuß. Flügelweite 3 Fuß.

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. Länge 1 5/6 Fuß 8 Linien. Flügelweite 2 3/4 Fuß 6 Linien.

Latham, Syn. III. 2. p. 619. n. 1. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 894. n. 1. γ.

2. Melanorhynchos. *Der schwarzschnäblige Phaeton.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 894. n. 2. Phaeton (Melanorhynchos) albo-nigroque striatus, subtus fronteque albus, taenia ante poneque oculos, rostro pedibusque cinereis.

3. Phoenicurus. *Der rosenfarbige Phaeton.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 894. n. 3. Phaëton (Phoenicurus) roseo-incarnatus, rostro rectricibusque 2 intermediis rubris, taenia superciliari pedibusque nigris.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277. n. 2. *der rosenfarbige Phaëton.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 219. n. 2. Phaëton demersus.	p. 558. n. 7. Aptenodytes Cataractes.

Die Anzahl der Gattungen dieses Geschlechts ist nur um *eine* vermehrt; aber die *zweyte* und *dritte* sind neu, denn die zweyte der XIIten Edition ist in ein anderes Geschlecht versetzt. Uebrigens sind bey der isten drey Varietäten aus einander gesetzt.

75. GESCHLECHT. Colymbus. *Der Taucher.* (Halbente, Steissfuss.)

Müller, Natursyst. II. p. 338. Gen. LXXV.
Leske, Naturgesch. p. 289. Gen. LXXIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 55. Gen. XLIII.

Blumenbach, Handb. der Naturgeschichte, p. 220. Gen. LXIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 402. Gen. XXXI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 763. Gen. XX.

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 811.

Onomat. hist. nat. III. p. 194. VII. p. 651.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 462. 478. 480.

Klein, av. p. 149.

Brisson, ornithol. II. p. 367. Gen. XCI. Colymbus. p. 377. Gen. XCII. Uria. p. 388. Gen. XCVII. Mergus.

Batsch, Thiere, I. p. 366 Gen. LXXXV.

Latham, Syst. ornith. II. p. 780. Gen. LXXXIV. Podiceps. p. 796. Gen. XC. Uria. p. 799. Gen. XCI. Colymbus.

Schriften der dronth. Gesellschaft, I. p. 201 ff.

Hermann, tab. affin. anim. p. 147.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277. Gen. XXXVII.

* *Mit dreyzehigen Füßen. Taucherhühner.*

12. MARMORATUS. *Der marmorirte Taucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 479. n. 355. *das marmorirte Taucherhuhn.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 799. n. 4. Uria (Marmorata) supra castaneo fuscoque undulata, subtus fusco alboque nebulosa, rostro nigro, pedibus fulvis.

13. LACTEOLUS. *Der milchweiße Taucher.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 42. *der milchweiße Seetaucher.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 798. n. 3. Uria (Lacteola) nivea, dorso, alis basique caudae pal-

lide

lide griseis, remigibus secundariis medio fuscescentibus.

β. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 798. n. 3. β. Uria macula nigra utrinque pone oculos, interscapuliis et areis alarum nigris, mandibula superiore nigra, inferiore flavescente.

1. Grylle. *Die grönländische Taube.*

Müller, Natursystem, II. p. 388. n. 1. *grönländische Taube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 57. n. 2. *die grönländische Taube.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 220. n. 1. Colymbus (Grylle) pedibus palmatis tridactylis, corpore atro, tectricibus alarum albis; *die grönländische Taube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 772. n. 2. *das schwarze Taucherhuhn.* p. 775. *Seetaube, Täuchertaube, Grylltaucher.* III. p. 702.

Halle, Vögel, p. 593. n. 740. *die Täuchertaube.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 158. n. 145. *die grönländische Taube.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 653. *die schwarze grönländische Taube.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 478. n. 354. *das schwarze Täucherhuhn.*

Klein, av. p. 168. n. 2. Columbus groenlandicus.

Klein, Vorbereit. p. 311. n. 2. *die grönländische Taube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 137. *grönländische Gans.*

Brisson, ornitholog. II. p. 379. n. 3. petit Guillemot noir, appellé vulgairement Colombe de Groenland.

Batsch, Thiere, I. p. 771. *die grönländische Taube.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 797. n. 2. Uria (Grylle) corpore atro, tectricibus alarum albis.

Phipps, Reis. nach d. Nordpol, p. 98. *Taucher-taube.*

Olaffsen, Isl. I. p. 257. 297. *Teista.*

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 189. *Teist.*

Steller, Beschr. von Kamtschatka, p. 183. *Cajover oder Kahjuhr-Vogel.*

Leem, Lappl. p. 146. *Teiste.*

Schwed. Abh. II. p. 224. Uria Grylle.

Schriften der dronth. Gesellsch. I. p. 220.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 4. Columba groenlandica.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 5. Alca (Grylle) rostro laevi subulato, abdomine maculaque alarum alba, pedibus rubris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 151. Colymbus (Gryllus) pedibus palmatis tridactylis, corpore atro, tectricibus alarum albis.

Moehring, av. gen. p. 67. n. 73. Uria.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 148. Colymbus Grylle.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 278. n. 1. *die grönländische Taube.*

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 333. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 797. n. 2. β. Uria fuliginosa, fascia alarum gemina alba.

Pennant, arct. Zool. II. p. 479. ad n. 354.

γ. *Klein*, av. p. 146. n. 1. Plautus Columbarius? (Mit *Alca Alle* verwechselt. Siehe diese.)

Latham, Syn. III. 2. p. 333. n. 9. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 798. n. 2. γ. Uria nigricans, striis transversis saturatioribus, sub-

tus

tus alba, taeniis cinereis varia, tectricibus alarum superioribus mediis candidis, nigro-variegatis.

Brisson, ornitholog. II. p. 379. n. 4. petit Guillemot rayé. (10)

Seligmann, Vögel, II. Tab. 99. *die gefleckte grönländische Taube.*

δ. ***Latham***, Syst. ornithol. II. p. 798. δ. Uria dorso caudaque nigris, capite, collo, corpore subtus maculaque alarum albis.

Brünnich, ornith. bor. p. 28. n. 115. Uria baltica?

ε. ***Latham***, Syst. ornitholog. II. p. 798. n. 2. ε. Uria nigra, vertice albo-nebuloso, tectricibus alarum maioribus corporeque subtus albo nigroque variis, gula tota alba.

ζ. ***Latham***, Syn. III. 2. p. 334. n. 3. Var. E.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 798. n. 2. ζ. Uria supra albo nigroque maculatim varia, subtus alba.

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 169. n. 4. *Sildeperris?*

Schriften der dronth. Gesellsch. I. p. 228. n. 1.

14. MINOR. *Das kleine Taucherhuhn.* (1)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 479. A. *das kleine Täucherhuhn.*

 Scopoli,

(10) Nach *Brisson* eine eigene Gattung. *Latham* rechnet *Brünnichs Uria baltica* n. 116. zu *Brissons Uria minor striata* n. 4.

(1) Flügelweite 26 Zoll. Gewicht 19 Unzen. *Penn.* — Nach *Latham* eine Varietät von *Colymbus Troyle*, n. 2. — Ueberhaupt bemerke ich hier eine Verwechselung der Synonymen. *Scopoli*, dessen *Uria Lomvia* n. 103. in unserm System hieher gezogen ist, führt *Brünnichs Uria Lomvia* n. 108. an, die in

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 88. n. 103. *die Lumme.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 797. n. 1. β. Uria supra nigra, subtus, genis fasciaque alarum alba.

Brünniche, ornitholog. bor. p. 27. n. 110. Uria Svarbag, Islandis *Svartbakur* ?

Brünniche, ornith. bor. p. 28. n. 111. Uria Ringvia, Islandis *Ringvia.*

2. Troile. *Die Lumer.*

Müller, Natursyst. II. p. 239. n. 2. *das Taucherhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 220. n. 2. Colymbus (Troile) pedibus palmatis tridactylis, corpore fusco, pectore abdomineque niveo, remigibus secundariis extremo apice albis; *die Lumer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 402. n. 1. *das dumme Täucherhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 764. n. 1. *das dumme Täucherhuhn.* p. 772. *die Lumer, Lumme, Loom, Tauchermöwe, Taucherhuhn, Mevenschnabel, Troiltaucher.*

Halle, Vögel, p. 593. n. 741. *das Täucherhuhn.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 164. n. 153. *die Täuchermöwe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 100. *der Mewenschnabel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 478. n. 353. *das dumme Taucherhuhn.*

Klein, av. p. 148. n. 8. Lomben.

Klein, Vorbereit. p. 272. n. 8. *Lomben.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 157. n. 7. *Lomme.*

Klein,

in unserm System zu *Colymbus Troile* gezählt wird. *Latham* rechnet auch das Synonym aus *Scopoli* zu *Colymbus Troile.* — Die Trivialbenennung *Colymbus Minor* findet sich in unserm System p. 591. n. 20. nochmals.

Klein, av. p. 168. n. 3. Lomben.
Klein, Vorber. p. 269. n. 2. *Mewenschnabel.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 155. n. 2. *Mevenschnäbler.*
Briſſon, ornithol. II. p. 377. n. 1. Guillemot.
Latham, Syn. Suppl. p. 265. Foolish Guillemot.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 796. n. 1. Uria (Troile) corpore nigro, pectore abdomineque niveo, remigibus ſecundariis apice albis.
Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 24. *Seetauben.*
Egede, Beſchr. v. Grönl. p. 123. *Lomme.*
Trampler, Wallfiſchfang, p. 68. *der Lum.*
Phipps, Reiſ. n. d. Nordpol, p. 98. *der kleine ſchwarz und weiße Taucher, oder das Taucherhuhn.*
Pontoppidan, Norwegen, II. p. 156. *Langivie, Lomgivie, oder Lomviſvie, Storfuglen.*
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 130. n. 4. Alca (Lomvia) roſtro laevi oblongo, mandibula ſuperiore margine flaveſcente.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 152. Colymbus (Troile) pedibus palmatis tridactylis, corpore nigro, pectore abdomineque niveo, remigibus ſecundariis apice albis.
Moehring, av. gen. p. 68. n. 75. Cataractes.
Jonſton, av. p. 135. Uria.
Hermann, tab. aff. anim. p. 148. Col. Troile.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 278. n. 2. *die Lumer.*

β. Col. rectricibus totis nigris. *
Brünniche, ornith. bor. p. 28. n. 112. Uria Alga; Danis *Aalge.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 797. n. 1. γ. Uria Alga.

γ. Col.

γ. Colymbus annulo oculorum et linea pone oculos albis. *?

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 152. a.

Olaffen, Reif. d. Isl. I. p. 190. n. 6. *Langevige?*

δ. Col. oculis et capite immaculatis. *?

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 152. b.

Olaffen, Reife d. Isl. I. p. 190. n. 7. *Stuttnefia?*

** *Mit vierzehigen Schwimmfüßen. Eigentliche Taucher.*

15. SINENSIS. *Der chinesische Taucher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 802. n. 8. Colymbus (Sinensis) fusco-virescens, maculis saturatioribus, pectore et abdomine rufo-albis, maculis rufis.

16. STRIATUS. *Der gestreifte Taucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 481. n. 359. *der gestreifte Taucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 802. n. 7. Colymbus (Striatus) nigricans, subtus albus, capite colloque griseis nigro lineatis.

3. SEPTENTRIONALIS. *Der rothkehliche Taucher.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 339. n. 3. *rothhälsiger Taucher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 58. n. 3. *der rothhalsige Taucher.*

Halle, Vögel, p. 584. n. 729. *das Seerothkehlchen.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 159. n. 146. *der rothhälsige Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 482. n. 360. *der rothkehlige Taucher.*

Klein,

(2) Flügelweite 3 Fufs 5 Zoll. Gewicht 3 Pfund. *Pennant.*

Klein, av. p. 142. n. 3. Mergus rostro nigro, capite et lateribus colli plumbeis, cervice et lateribus thoracis nigris lineolis variegatis, gula cum inferiori collo rubris, internis digitis lobus angustus additus.

Klein, Vorbereit. p. 261. n. 3. *Halbente mit einem schwarzen Schnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 150. n. 3. *dritte Halbente.*

Brisson, ornith. II. p. 390. n. 3. Plongeon à gorge rouge.

Batsch, Thiere, I. p. 371. *der Lunne oder rothhälsige Taucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 801. n. 5. Colymbus (Septentrionalis) corpore supra nigricante, subtus albo, collo antice macula scutiformi ferruginea.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 69. *der Taucher mit rother Kehle.*

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 53. n. 100. *der rothhalsige Taucher.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 459. n. 35. *rothhalsiger Taucher.*

Voyage en Sibirie, par Mr. l'Abbé Chappe d'Auteroche, p. 199. Tab. 9. Plongeon.

Schriften d. dronth. Gesellsch. I. p. 203. *der Lom.* Tab. 2. fig. 1.

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 158. *Lom, Liom, Lum;* mit 1 Figur.

Scheffer, Lappl. p. 334. *Loom.*

Leem, Nachricht von den Lappl. p. 142. *Loom.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 153. Colymbus (Septentrionalis) pedibus palmatis, tetradactylis, collo subtus macula scutiformi ferruginea.

Hermann,

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. Colymbus septentrionalis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 278. n. 3. *der rothkehliche Taucher.*

4. Arcticus. *Die Polar-Ente.*(3)

Müller, Natursyst. II. p. 339. n. 4. *die Polar-Ente.* Tab. 12. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 59. n. 4. *die Polar-Ente.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 403. n. 2. *der schwarzkehlige Taucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 775. *der schwarzkehlige Taucher.* p. 778. *Polarente, Polartaucher, Lumb, Lumbe, Lomme, Lumme.*

Halle, Vögel, p. 583. n. 727. *die gestreifte Halbente.*

Halle, Vögel, p. 583. n. 728. *der Seehahn.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 159. n. 147. *die Polarente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 482. n. 361. *der schwarzkehlige Taucher.*

Klein, av. p. 141. n. 2. Mergus arcticus.

Klein, Vorber. p. 261. n. 2 *die Polar-Halbente.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 149. n. 2. *zweyte Halbente.*

Klein, verb. Vögelh. p. 150. n. 4. *vierte Halbente.*

Klein, Vögeleyer, p. 35. Tab. 21. fig. 1.

Brisson, ornith. II. p. 391. n. 4. Plongeon à gorge noire.

Batsch, Thiere, I. p. 370. *die Polarente.*

Latham,

(3) Nistet am Ufer ins Schilf und die Sumpfgräser. Das Weibchen legt zwey braune, ziemlich grosse Eyer, welche von beyden Gatten wechselsweise in 4 Wochen ausgebrütet werden. Fleisch und Eyer werden genutzt, und die zähen Häute gahr gemacht, und zu Pulverbehältnissen, Mützenverbrämungen, Brustlätzen u. dgl. verarbeitet.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 800. n. 4. Colymbus (Arcticus) capite cano, collo subtus atro-violaceo, fascia alba interrupta.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 41. *die bunte Tauchente.*

Beseke, Vögel Kurlands, p. 54. n. 101. *die Polarente.*

Fischer, Naturgesch. von Livl. Zus. p. 46. n. 495. *Seehahntaucher.*

Bock, Naturgeschichte von Preussen, IV. p. 339. *Polarente.*

Lepechin, Tageb. d. russ. R. III. p. 14. *der große nordliche Taucher.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 142. *der Seehahn.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 22. *der große Seetaucher.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 282. n. 26. *der nordische Seehahn.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 293. n. 82. *der Seehahn, Taucherente.*

Naturf. XII. p. 140. n. 94. *Polarente.*

Schriften der drontheim. Gesellsch. I. p. 205. *der schwarz und weiß gesprenkelte Lom mit dem Halsbande, Hymber, Himbrine.* Tab. 2. fig. 2.

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 169. n. 1. *Lomme, Seehahn.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 1. Colymbus arcticus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 135. n. 1. Colymbus (Arcticus) pedibus palmatis indivisis, gutture nigro-purpurascente.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 154. Colymbus (Arcticus) pedibus palmatis tetradactylis, capite cano, collo subtus atro-violaceo, fascia alba interrupta.

Jonston

Jonston, av. p. 226. Hirundo exotica aquatica.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. Colymbus arcticus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 279. n. 4. *die Polar-Ente.*

17. STELLATUS. *Der gesprenkelte Taucher.* (4)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 481. n. 358. *der gesprenkelte Taucher.*

Halle, Vögel, p. 582. n. 726. *die größte gefleckte Täucherente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 779. n. 2. *der gesprenkelte Taucher.*

Klein, av. p. 141. n. 1. Mergus maximus.

Klein, Vorbereit. p. 260. n. 1. *größte Halbente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 149. n. 1. *erste Halbente.*

Klein, stemm. av. Tab. 37. fig. 2. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 90. *Aethyia?*

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 169. n. 2. *Havgasse, Soe-lane.*

Brisson, ornith. II. p. 389. n. 2. Petit Plongeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 800. n. 3. Colymbus (Stellatus) cinereo-fuscus, lineolis albidis varius, subtus albus, capite et collo superioribus cinereis, pennis ad latera cinereo-albo fimbricatis.

Nau: Naturf. XXV. p. 9. n. 2. *Spießgans.*

Otto: neue Mannichfalt. IV. p. 450. n. 2. *Aalscholwer.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 80. n. 93. *die hinkende Halbente.* Plotus claudicans.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 159. Colymbus (Stellatus) corpore supra nigricante,

(4) Flügelweite 3 Fuss 9 Zoll. Gewicht 2 1/2 Pfund. *Penn.*

te, maculis stellatis albis innumeris, subtus albo.

Moehring, av. gen. p. 69. n. 76. Cepphus.

5. GLACIALIS. *Der Eistaucher.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 340. n. 5. *Eißtaucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 480. n. 356. *der Eistaucher.*

Klein, av. p. 141. n. 1. (Mit dem vorigen verwechselt.)

Brisson, ornitholog. II. p. 392. n. 6. grand Plongeon tacheté.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 799. n. 1. Colymbus (Glacialis) capite colloque nigro-violaceo, fascia gulae cervicisque alba interrupta.

Phipps Reis. n. d. Nordpol, p. 98. *der große nordische Taucher.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 155. Colymbus (Glacialis) pedibus palmatis tetradactylis, capite colloque nigro-violaceo, fascia gulae cervicisque alba interrupta.

Fabric. fn. groenl. p. 97. n. 62. Colymbus (Glacialis) pedibus palmatis, capite colloque nigro-virescentibus, fascia gulae cervicisque interrupta ex albo nigroque lineata.

Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 11. Mergus Arcticus seu Farrensis.

Jonston, av. p. 225. Mergus maximus Farrensis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. Colymbus Glacialis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 279. n. 5. *der Eistaucher.*

β. *Brisson*,

(5) Flügelweite 4 Fuss 8 Zoll. *Penn.*

β. *Brisson*, ornitholog. II. p. 391. n. 5. Plongeon tacheté. (6)

6. IMMER. *Der Imber.*

Müller, Natursyst. II. p. 340. n. 6. *Adventsvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 60. n. 5. *der Adventsvogel, Immer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 780. n. 3. *der Imber.* p. 781. *Immer, Immertaucher, großer Seeflunder.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 162. n. 149. *der Imber.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 480. n. 357. *der Imber, Adventsvogel.*

Klein, av. p. 130. n. 12. Anser, Embergoose dictus.

Klein, Vorbereit. p. 241. n. 12 *Embergans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 137. n. 13. *Embergans.*

Klein, av. p. 150. n. 6. Colymbus maximus?

Klein, Vorbereit. p. 277. n. 6. *Buntflügel?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 161. n. 5. *Buntflügel?*

Brisson, ornith. II. p. 389. n. 1. grand Plongeon.

Batsch, Thiere, I. p. 371. *der Immer.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 800. n. 2. Colymbus (Immer) corpore supra nigricante albo undulato, subtus toto albo.

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 152. *Imber, Imbrim, Ember.*

Martini, Naturlexicon, I. p. 399. *Adventsvogel.* Tab. 20.

Sander, Gröſse u. Schönheit in der Nat. I. p. 236. *der Immer.*

Schriften der dronth. Gesellsch. I. p. 210. *Immer, Imber.* Tab. 3. fig. 1. 2. (Kopf und Fuſs.)

Müller,

(6) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. Länge 2 1/12 Fuſs. Flügelweite 3 1/4 Fuſs.

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 156. Colymbus (Immer) pedibus palmatis tetradactylis, corpore supra nigricante albo undulato, subtus toto albo.

Jonston, av. p. 135. Colymbus maximus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 148. Colymbus Immer.

*** *Mit vierzehigen gelappten Füßen. Steißfüße.*

7. Cristatus. *Der Haubentaucher.* (7)

Müller, Naturs. II. p. 341. n. 7. *Haubentaucher.*

Leske, Naturgesch. p. 290. n. 2. *der Haubentaucher, Schlaghan.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 56. n. 1. *der gehörnte Seehahn, Haubentaucher, Seeteufel, Lorch.* Tab. 43.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 403. n. 3. *der große Haubentaucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 783. n. 1. *der große Haubentaucher.* p. 790. *der große gehaubte Taucher, der große Kobeltaucher, Steißfuß, große Arschfuß, große Haubensteißfuß, Schlaghan, Greue, Merch, Straußtaucher, Meerrachen, Zorch.*

(7) Gewicht 2 1/2 Pfund. *Penn.* Länge, nach *Brisson*, 18 Zoll. Flügelweite 2 1/6 Fuss 9 Linien. Wer die von mir angeführten Stellen aus *Klein*, *Halle*, *Brisson* und *Latham* vergleicht, der wird finden, was für eine grosse Unbestimmtheit und Verwechslung der Synonymen bey dieser Gattung statt findet. Es ist fast unmöglich, sie aus einander zu finden, und überall richtig zu ordnen, da die Beschreibungen zum Theil so schwankend und zweydeutig sind. *Latham* rechnet auch den *Colymbus Urinator Linn.* als Spielart, oder vielmehr als einen einjährigen jungen Vogel hieher.

Halle, Vögel, p. 601. n. 753. *der große Taucher mit braungelbem Kiwizschopfe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 162. n. 150. *der Haubentaucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 463. A. *der große Haubensteißfuß.*

Onomat. histor. natur. III. p. 197. *der große gehaubte Taucher.*

[*Klein*, av. p. 149. n. 1. Colymbus albus maior cristatus.

Klein, Vorbereit. p. 274. n. 1. *bekappter und gehörnter Taucher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 159. n. 1. *bekappter und gehörnter Taucher.*]

Mit *Colymbus Auritus* und *Obscurus* verwechselt.

Brisson, ornith. II. p. 370. n. 4. Grebe cornue.

Batsch, Thiere, I. p. 370. *der Haubentaucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 780. n. 1. Podiceps (Cristatus) fuscus subtus albus, capite rufo tumido, collari nigro, remigibus secundariis albis. *(Adulta avis.)*

Beseke, Vögel Kurl. p. 54. n. 102. *der Haubentaucher.*

Fischer, Zus. z. Naturgesch. v. Livl. p. 45. n. 494. *gezopfter Taucher.*

Pennant, Reise d. Schottl. I. p. 18. *großkappichte Seehähne, (Gnauts.)*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 14. *Taucher mit dem Schopf.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 169. n. 2. *Topped Havskiärn, halskraved Dykker.*

Olaffen, Isl. II. p. 203. K. *Sef-Oend.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 85. n. 99. *der bekappte und gehörnte Taucher.*

Frisch,

Frisch, Vögel, Tab. 183. *der gehörnte Seehahn, oder Norike.*

Schneider, zool. Abh. p. 145. *gehaubte Taucher, Work, Lorch, Works.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 460. n. 36. *Haubentaucher.*

Stralsund. Magazin, I. p. 167. *die gehaubte Tauchente?*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 2. Colymbus cornutus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 135. n. 2. Colymbus (Cristatus) pedibus lobato-fissis, capite rufo, collari nigro, remigibus secundariis albis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 157. Colymbus (Cristatus) pedibus lobatis, capite rufo, collari nigro, remigibus secundariis albis.

Brünniche, ornith. bor. p. 41. n. 135. Colymbus Cristatus.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 298. Mergus maior; *Teucher, großer Kobel-Teucher, Strauß-Teucher, Merch.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 5. Mergus cirrhatus seu cristatus.

Nieremb. hist. exot. L. 10. c. 35. Lepus aqueus?

Jonston, av. p. 224. *Acitli*, seu aquatilis lepus?

Jonston, av. p. 135. Colymbus maior alter.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 152. Colymbus Cristatus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 280. n. 6. *der Haubentaucher.*

β. *Halle*, Vögel, p. 604. n. 758. *der Meerhaase, Acitli.*

Brisson, ornith. p. 369. n. 2. Grebe hupée. (8)

(8) Länge, nach *Brisson*, 1 7/12 Fuſs 6 Lin. Flügelweite 2 1/2 F. 6 Lin. — eigne Gattung. Ich wiederhole hier die vorige Anmerkung.

Klein, av. p. 151. n. 3. Gargoas?
Klein, Vorbereit. p. 278. n. 3. *Gargoas?*
Klein, verb. Vögelhist. p. 161. n. 7. *Gargoas?*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 780. n. 1. Podiceps subtus albus, gutture fasciculo plumoso utrinque longiore, remigibus secundariis albis. *(Avis biennis?)*

γ. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 789. *Haubentaucher mit schwärzlichem Halskragen.*

δ. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 789. *Haubentaucher mit gelber Kehle und schwärzlichen Flügeln.*

18. SUBCRISTATUS. *Der graukehlige Haubentaucher.* (9)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 404. n. 2. *der graukehlige Haubentaucher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 790. n. 2. *der graukehlige Haubentaucher.* Tab. 25.
Beseke, Vögel Kurl. p. 54. n. 104. Colymbus subcristatus; *der kurzschopfige Taucher.*

8. AURITUS. *Der Ohrentaucher.*

Müller, Natursyst. II. p. 341. n. 8. *Ohrentaucher.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 61. n. 6. *der Ohrentaucher.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 404. n. 5. *der Ohrentaucher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 796. n. 5. *der Ohrentaucher.*

Halle,

(9) Nistet auf stehenden schilfigen Wassern, macht sich von dem über dem Wasser hervorstehenden Schilfe, durch niederbeugen und flechten und auftragen einen Damm, an welchem er sein aus Schilf geflochtenes Nest befestigt, und legt 5 bis 6 Eyer. Brütet auch in Kurland.

Halle, Vögel, p. 602. n. 755. *der Meerdrehhals.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 163. n. 151. *der Meerdrehhals.*
Onomat. hist. nat. III. p. 196. *der geöhrte Taucher.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 464. B. *der geöhrte Steißfuß.*
Klein, av. p. 150. n. 4. Colymbus minor. (Mit *Colymbus Obscurus* u. *C. Minor* verwechselt.)
Klein, Vorber. p. 276. n. 4. *Dachentlein, Schwarztäucherlein, Käferente.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 160. n. 4. *schwärz Täucherlein.*
Gesner, Vögelb. p. 104. *ein ander Geschlecht Düchelein, oder Duchentlein.*
Brisson, ornith. II. p. 372. n. 6. Grebe à oreilles.
Batsch, Thiere, I. p. 370. *der Ohrentaucher.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 781. n. 3. Colymbus (Auritus) fusco-nigricans, subtus albus, capite nigro, auribus cristato-ferrugineis.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 87. *der geöhrte Taucher.*
Beseke, Vögel Kurlands, p. 54. n. 103. *der Ohrentaucher.*
Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, III. p. 14. *geöhrte Taucher.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der geöhrte Taucher*
Neue schwed. Abhandl. III. p. 104. Colymbus Auritus.
Linné, auserl. Abhandl. II. p. 293. n. 83. *die großöhrige Taucherente.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 86. n. 100. *der geöhrte Taucher.*
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 23. n. 3. Trapazorola.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 135. n. 3. Colymbus (Auritus) pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato-ferrugineis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 20. n. 158. Colymbus (Auritus) pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato-ferrugineis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 299. Mergulus; *ein klein schwarz Täucherlein, Duch-Endtlin, Käfer-Endtle.*

Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 7. 2. Colymbus Minor.

Jonston, av. p. 135. Colymbus minor.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 280. n. 7. *der geöhrte Taucher.*

β. *Der kleine Ohrentaucher.* (10)

Gesner, Vögelb. p. 103. Mergulus?

Brisson, ornitholog. II. p. 371. n. 5. petite Grebe cornue.

Latham, Syn. III. 1. p. 286. n. 4. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 782. n. 3. β.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 87. n. 101. *der schwärzlichte Taucher?*

19. Cor-

(10) Auch hier findet sich, so wie bey der ganzen Gattung, eine grosse Verwechselung der Synonymen, und ganz verschiedene Eintheilung derselben bey den Ornithologen. *Latham* nimmt *Brissons Colymbus cornutus minor* als Spielart von *Colymbus Cornutus* (p. 591. n. 19.) an, und zieht *Brissons Colymbus cristatus minor* (Ornith. II. p. 369. n. 3.) den *Brisson* selbst sehr ungewiss bestimmt, und dessen ich in unserm System gar nicht gedacht finde, als Varietät von unserm *Colymbus Auritus* hieher. *Brisson* sieht seinen *Colymbus cornutus minor* als eine eigne Gattung an, und rechnet auch *Edw. Eared or horned Dobchiek* Tab. 49 (*Col. cornutus Linn.* p. 591. n. 19.) so wie *Fernand.* und *Raj. Yacapitzahoac*, den *Latham* zum *Colymbus minor* (Linn. p. 591. n. 20.) zählt, mit dahin.

19. CORNUTUS. *Der gehörnte Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 462. n. 334. *der gehörnte Steißfuß.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 782. n. 5. Colymbus (Cornutus) cristatus, collo subtus pectoreque fulvis, capite nigro tumido, per oculos fascia cirrhata flava.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 40. *das gehörnte Wasserhuhn.*

β. Col. Cristatus, collo subtus castaneo, capite colloque supremo nigro-virescentibus, fasciculo pone oculos aurantio-rufescente. *

Latham, Syn. III. 1. p. 228. n. 6. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 783. n. 5. β.

Büffon, oiss. VIII. p. 237. le petit Grebe cornu.

Büffon, pl. enl. 404. f. 2. Grebe d'Esclavonie.

Raj, Syn. p. 190. 14. Colymbus sive Podiceps minor.

20. MINOR. *Der kleine Taucher.* (1)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 405. n. 7. *der kleine Taucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 798. n. 6. *der kleine Taucher.* p. 803. *Duckchen, schwärzlicher Taucher, gemeines Taucherchen, Tauchentchen, Käferentchen.*

Klein, av. p. 150. n. 4. Colymbus minor. (Mit *Colymbus Auritus* verwechselt.)

Gesner, Vögelb. p. 90. Urinatrix. p. 91. *Lounam, Doucker, Ducher.*

Kkk 5 *Brisson.*

(1) Die Trivialbenennung, *Colymbus Minor*, ist p. 585. schon einmal da gewesen. Um beyde zu unterscheiden, könnte man jenen *Colymbus Ringuia*, oder diesen mit Brisson *Colymbus fluviatilis* nennen.

Brisson, ornitholog. II. p. 374. n. 9. Grebe de riviere ou Castagneux.

Latham, Syst. ornith. II. p. 784. n. 9. Colymbus (Minor) fulvo-fuscus, corpore subtus macula remigum uropygioque infimo albo-argenteis, collo subtus griseo-fulvo.

Neue schwed. Abh. III. p. 105.

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. p. 223. n. 8. γ.

Raj, Syn. p. 177. *Tacopitzahoac?*

Jonston, av. p. 135. Colymbus minor Bellonii.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 208. n. 8. *der kleine Taucher.*

β. *Gesner*, Vögelb. p. 105. *Castagneux?*

Latham, Syn. III. 1. p. 290. n. 10. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 784. n. 9. β.

21. PAROTIS. *Der schwarz und weiße Taucher.* (2)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 783. n. 6. β. Podiceps capite laevi nigro, gulae, aurium et subocularibus regionibus albidis nigro lineatis.

22. LUDOVICIANUS. *Der louisianische Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 463. n. 336. *der louisianische Steißfuß.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 785. n. 13. Colymbus (Ludovicianus) fuscus, lateribus colli et corporis ferrugineis, corpore subtus albo, maculis transversis nigricantibus.

23. THOMENSIS. *Der Taucher von der Insel St. Thomae.*

Müller, Naturs. II. p. 107. n. 13. *der St. Thomastaucher.*

Brisson, ornithol. II. p. 374. n. 8. Grebe de l'isle de S. Thomas.

Latham,

(2) Nach *Latham* eine Varietät von *Colymbus Rubricollis* n. 24.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 784. n. 11. Colymbus (Thomensis) fuscus, subtus albus maculis griseis, remigibus pallide rufis, macula pectoris nigra.

24. Rubricollis. *Der rothhälsige Taucher.* (3)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 795. *der rothhälsige Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 464. C. *der Rothhals.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 783. n. 6. Colymbus (Rubricollis) subcristatus fuscus, gula, genis, regione aurium cinerascentibus, collo subtus pectoreque ferrugineo-rubris, abdomine remigibusque secundariis albis.

Latham, Syn. Suppl. p. 260. tab. 118. Red-necked Grebe.

Linné, fn. Suec. II. p. 54. n. 152. *(Alia.)*

Brünniche, ornith. bor. p. 42. n. 138. Colymbus Auritus.

25. Obscurus. *Der dunkelbraune Taucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 794. n. 4. *der dunkelbraune Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 463. n. 337. *der dunkelbraune Steißfuß.*

Brisson, ornith. II. p. 373. n. 7. petite Grebe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 782. n. 4. Colymbus (Obscurus) fusco-nigricans, subtus albus, macula utrinque inter rostrum et oculum, marginibus alarum remigibusque intermediis candidis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 87. *der schwarz und weiße Taucher.*

26. Cayen-

(3) Nach *Bechstein* das Männchen von *Colymbus Obscurus* n. 25.

26. CAYENNENSIS. *Der cayennische Taucher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 781. n. 2. Colymbus (Cayanus) fusco-nigricans, subtus albus, collo subtus rufo.

9. URINATOR. *Der Erztaucher.* (4)
Müller, Natursystem, II. p. 342. n. 9. *der Erztaucher.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 61. n. 7. *der Erztaucher.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 220. n. 3. Colymbus (Urinator) capite laevi, palpebra inferiore lutea, macula alarum alba.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 405. n. 6. *der Erztaucher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 792. n. 3. *der Erztaucher.*
Halle, Vögel, p. 602. n. 754. *der große Taucher ohne herabhängenden Schopf.*
Klein, av. p. 150. n. 3. Colymbus maior.
Klein, Vorber. p. 276. n. 3. *schlichtköpfiger grosser Taucher.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 160. n. 2. *schlichtköpfiger großer Taucher.*
Brisson ornithol. II. p. 368. n. 1. Grebe.
Batsch, Thiere, II. p. 371. *der Erztaucher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 781. n. 1. β. Podiceps fuscus, subtus albus, capite laevi, macula alarum alba.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 87. n. 102. Colymbus vulgaris; *das Täuchentlein, gemeine Täucherlein.*
Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 7. 1. Colymbus maior.

Möhring.

(4) Soll, nach *Latham*; ein einjähriger junger Vogel von *Colymbus Cristatus* seyn.

Moehring, av. gen. p. 69. n. 77. Colymbus.
Jonston, av. p. 134. Colymbus maior primus.

27. CASPIUS. *Der caspische Täucher.* (5)
Latham, Syst. ornithol. II. p. 784. n. 7. Podiceps (Caspicus) capite laevi, corpore supra ex fusco nigricante, infra ex argenteo albo, rostro plumbeo, gula genisque albis, tectricibus alarum fuscis.

10. DOMINICUS. *Der domingische Tauchrr.*
Müller, Natursyst. II. p. 343. n. 10. *domingischer.*
Brisson, ornitholog. II. p. 376. n. 1. Grebe de riviere de S. Domingue.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 785. n. 10. Podiceps (Dominicus) capite laevi, corpore subtus confertim maculato.

28. HEBRIDICUS. *Der hebridische Taucher.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 785. n. 11. Podiceps (Hebridicus) nigricans, gula nigra, iugulo ferrugineo, abdomine cinereo argenteo vario.

11. PODICEPS. *Der buntschnäblige Taucher.* (6)
Müller, Natursf. II. p. 343. n. 11. *der Arschfuß.*
Halle, Vögel, p. 603. n. 756. *der kleine braune Täucher, mit schwarzem Nasenpflaster.*
Pennant,

(5) Grösse einer Haustaube. Soll, nach *Latham*, zu *Colymbus Rubricollis* gehören.

(6) Alle Taucher und Tauchenten *(Podicipes)* können auf der glatten Spiegelfläche des Wassers mit Hülfe der ausgespannten Flügel nicht nur gehen, sondern auch sehr schnell laufen, wobey sie sich in perpendiculairer Richtung erhalten. Sie verrichten auch den Coitus auf dem Wasser perpendiculair stehend, denn das Männchen kann bey der Begattung das

Pennant, arct. Zool. II. p. 462. n. 335. *der Bunt-schnabel.* Tab. 22. unt. Fig.

Klein, av. p. 150. n. 5. Colymbus fuscus.

Klein, Vorbereit. p. 276. n. 5. *braun Täucherlein mit einem bunten Schnabel.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 160. n. 4. *braun Täucherlein.*

Brisson, ornith. II. p. 375. n. 10. Grebe de riviere de la Caroline.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 785. n. 12. Podiceps (Carolinensis) corpore fusco, rostro fascia sesquialtera, gula nigra.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 82. *braun Täucherlein.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 136. n. 4. Colymbus (Podiceps) pedibus lobatis, corpore fusco, rostro fascia sesquialtera.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 223. n. 8. γ. Colymb. Fluviatilis.	p. 591. n. 20. Colymbus Minor.

Das Geschlecht ist mit *siebzehn* Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *sechs*, bey der 5ten *zwey*, bey der 7ten *vier* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Un-*

das Weibchen nicht besteigen, sich auch nicht ohne Füsse darauf erhalten. Dass *Linné* den Namen *Podiceps* für einen Gattungsnamen seiner Spec. 11. gebraucht hat, ist wohl nicht recht, weil diess eine Eigenschaft aller Colymben und vieler Enten (Tauchenten, *Podicipes)* ist; und zu einem Irrthum verleiten kann, als ob diese Eigenschaft nur dieser einzigen Gattung zukäme. Uebrigens ist die Colymbologie überhaupt noch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. S. *Beseke* Vögel Kurl. p. 55.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. Colymbus (Pyrenaicus) pedibus tridactylis lobatis, gutture castaneo, macula rostri nivea, alis brevissimis.
Thunberg, neue schwed. Abh. III. p. 105.

2. Colymbus (Longirostris) pedibus lobatis, tetradactylis, gula alba, maxilla triplici fascia fusca, rostro compresso, longissimo.
Thunberg, neue schwed. Abh. III. p. 105.

3. *Der unbekannte Taucher.*
Colymbus (Ignotus) corpore supra cinereo, subtus albo, lateribus colli cinerei maculis albis angulatis.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 782. n. 4.

4. *Ein dem Colymbus Troile ähnlicher Vogel.*
Sander, Naturf. XIII. p. 192.

5. Colymbus (Borealis) corpore supra nigricante, maculis stellatis albis innumeris, subtus albo, collo antice rufo vix maculato.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 801. n. 6.
Brünniche, ornith. bor. p. 39. n. 131. *Hav-Gasse.*

76. GESCHLECHT. LARUS. *Die Meve.* (Möwe.) (7)

Müller, Natursyst. II. p. 344. Gen. LXXVI.
Leske, Naturgesch. p. 284. Gen. LXIX.
Borowsky,

(7) Die Larologie ist noch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Es giebt sicherlich noch viele Ungewissheiten und Lücken; die Ursache von beyden liegt in der grossen Schwierigkeit ihrer habhaft zu werden, da nur selten ein Jäger auf die Höhe des Meers kommt, wo sie sich aufzuhalten pflegen, und wenn sie auch auf das angrenzende Land, bey stürmischem Wetter, längst den Flüssen ziehen, so sind sie schen

Borowsky, Thierreich, III. p. 44. Gen. LXI.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 220. Gen. LXX.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 406. Gen. XXXIII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 803. Gen. XXI.
Halle, Vögel, p. 568. it. p. 596 sqq.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 488.
Oedmann: neue schwed. Abhandl. IV. p. 89.
Neuer Schaupl. der Natur, V. p. 645.
Onomat. hist. nat. IV. p. 746.
Klein, av. p. 136. Gen. II.
Brisson, ornith. II. p. 401. Gen. CI. Stercorarius. p. 403. Gen. CII. Larus.
Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. XCI.
Latham, Syst. ornith. II. p. 811. Gen. XCIV.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 142 sqq.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 281. Gen. XXXVIII.

1. Rissa. *Die isländische Meve.* (8)
Müller, Natursyst. II. p. 344. n. 1. *die isländische Mewe.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 804. n. 1. *die isländische Meve.*

Onomat.

scheu und fliegen auch sehr hoch. So wie es ohnstreitig noch mehrere Gattungen giebt, so haben auch wahrscheinlich Alter und Geschlecht (Sexus) durch ihre Verschiedenheit unter den schon angenommenen Verwirrung veranlaßt. S. *Beseke* Vögel Kurl. p. 56. Ich will bey den folgenden Gattungen die Abweichungen der Ornithologen, bey Auseinandersetzung der Synonymen, bemerken.

(8) Nach *Oedmann* eine Varietät von *Larus Tridactylus* — *Latham* nimmt den *Larus Tridactylus Oedman.* zur Hauptgattung, und den *Larus Tridactylus Linn.* als Spielart davon an.

Onomat. hist. nat. IV. p. 756. *die isländische Möwe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 490. n. 373. *die isländische Meve.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 817. n. 11. Larus (Tridactylus) dorso canescente, rectricibus albis, digito postico mutico.

Phipps, Reis. n. d. Nordpol, p. 98. *isländische Meve.*

Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 51. *Kittivake.*

Olaffen, Reis. d. Isl. I. p. 190. n. 9. *Skegla-Ritur.* Tab. 23. Larus Rytsa.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 222. n. 4. *die dreyzehige Mewe.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 169. n. 8. *Lille Sölvet.*

Berlin. Samml. IX. p. 570. n. 1. *die schwedische Meve.*

Neue schwed. Abh. IV. p. 114. n. 15. Larus Rissa.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 160. Larus (Rissa) albus, dorso cano, rectricibus totis albis, pedibus tridactylis.

Fabric. fn. groenl. p. 98. Larus (Tridactylus) albus dorso cano, extremitatibus remigum nigris, pedibus tridactylis.

2. Tridactylus. *Die Wintermeve.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 345. n. 2. *die Wintermewe.*

Borowsky,

(9) *Oedmann* ordnet die Synonymen nach dem verschiedenen Alter des Vogels folgendergestalt: *a)* Der junge *Tridactylus* ist das erste Jahr sehr dunkel, manchmal mehr oder weniger gefleckt. An jedem Ohre zeigt sich ein Fleck. Den Hintertheil des Halses umgiebt ein schwarzer Ring und Halsband. In diesem Alter findet man den Vogel unter folgenden Namen; 1) *Brissons* Gavia cinerea p. 185. f. 2. —

Borowsky, Thierreich, III. p. 47. n. 2. *die Wintermöwe.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 221. n. 1. Larus (Tridactylus) albicans, dorso canescente, rectricum apicibus, excepto extremo, nigris, pedibus tridactylis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 407. n. 2. *die Wintermeve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 805. *die Wintermeve.* p. 808. *Tarrok, weiße Meve, Hafmeve, dreyfingerige Meve.*

Halle, Vögel, p. 570. n. 698. *die graue Fischermöwe.*

Halle, Vögel, p. 598. n. 748. *der Seefächer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 495. D. *der Tarrok.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 754. *die Wintermöwe.*

Klein, av. p. 137. n. 3. Larus cinereus piscator.

Klein, Vorbereit. p. 253. n. 3. *weiße Mewe, Seeschwalbe, Fischahrmewe.*

Klein,

2) *Linné* Larus cinereus, Syst. N. n. 5. — 3) *Olaffens* Rissa iunior. Tab. 25. — 4) *Pennants* Tarrock, n. 251. — 5) *Raji* Larus cinereus, *Bellonii* Tarrock, p. 128. n. 4. — 6) *Gunneri* Krima-krykje. Act. Nidrof. Tom. 3. — 7) *Albin* To. 2. Tab. 87. — 8) *Linné* Larus Tridactylus, Syst. N. n. 2. Fn. Suec. n. 157. — *b*) Nach einiger Zeit verschwindet das Halsband, aber die Flecken der Ohren erhalten sich noch. In dieses Zeitalter gehört: 1) *Sibbalds* Kittivake. 2) *Pennants* Kittivake, n. 250. tab. 89. — 3) *Brissons* Gavia cinerea minor, p. 178. Tab. 17. fig. 1. — 4) *Linné* Larus Cinerarius, Syst. Nat. n. 4. — 5) Larus Dingla. *Forsk.* descr. anim. p. 8. — *c*) Endlich verschwinden die Ohrenflecke, und in diesem dritten Stadio bekommen wir 1) *Brünnichs* Larus Rissa, n. 140. — 2) *Linné* Larus Rissa, S. N. n. 1. — 3) *Pontoppidan* Larus Rissa. — 4) *Ströms* Krykje, 1. 241-18. *Cranz* Grönl. I. 114. Tattaret. — 5) *Martens* Kurge-gef. Spitzb. p. 59. Tab. N. lit. A. — 6) *Phipps* Nordp. a. a. O.

Klein, verb. Vögelhist. p. 144. n. 4. *weiße Meve.*
Klein, av. p. 148. n. 9. *Larus Kuutge-Gef.*
Klein, Vorber. p. 272. n. 9. *Kuutge-Gef.*
Klein, verb. Vögelh. p. 157. n. 8. *Kutgegeef.*
Klein, av. p. 169. n. 4. *Kautke-Gef.*
Klein, Vorber. p. 311. *Kautke-Gef.*
Brisson, ornithol. II. p. 410. n. 11. Mouette cendrée tachetée.
Batsch, Thiere, I. p. 382. *die Wintermöwe.*
Latham, Syn. Supplem. p. 268. *Tarrok.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 817. n. 11. β. Larus albicans, dorso canescente, rectricum apicibus, excepto extimo, nigris, pedibus tridactylis.
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 340. n. 95. *Wintermeve, größte bunte Meve, Hafmeve.*
Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 83. n. 93. *weisse Mewe.*
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 148. *Krokke?*
Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 156. *Krykkie.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 223. Larus Tridactylus.
Naturf. XII. p. 142. n. 95. *Wintermewe.*
Neue schwed. Abh. IV. p. 111. Larus Tridactylus.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 1 Larus (Tridactylus) albicans, dorso canescente, rectricibus excepto extimo nigris, pedibus tridactylis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 161. Larus (Tridactylus) albicans, dorso canescente, rectricum apicibus excepto extimo nigris, pedibus tridactylis.
Jonston, av. p. 129. Larus albus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 281. n. 1. *die Wintermeve.*

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 393. n. 18. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 818 n. 11. *γ*. L. albus, dorso canescente, rectricum apicibus excepto extimo nigris, fascia alarum obliqua nigra.

12. Minutus. *Die kleine Meve.* (10)
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 5. Larus (Minutus) niveus, capite nigro, alis leucophaeis, pedibus coccineis.
Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 12. n. 35. Larus minutus.
Neue schwed. Abh. IV. p. 120. Larus (Minutus) niveus, alis leucophaeis, pedibus coccineis.

13. Hybernus. *Die Ringelmeve.* (1)
Halle, Vögel, p. 572. n. 705. *die Ringmöve.*
Halle, Vögel, p. 572. n. 706. *die Wintermöve.*
Klein, av. p. 138. n. 9. Larus hybernus.
Klein, Vorbereit. p. 254. n. 9. *Ringelmewe.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 10. *Ringelmeve.*
Brisson, ornith. II. p. 411. n. 12. Mouette d'hyver.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 816. n. 9. *β*. L. cinereus subtus niveus, capite albo, maculis fuscis vario, collo supra fusco, alis variis, rectricibus albis, fascia nigra.
Brünniche, ornitholog. bor. p. 44. n. 146. 147. Larus maculatus?
Jonston, av. p. 199. Guaca Guacu.

14. Eburneus. *Die weiße Meve.*
Halle, Vögel, p. 597. n. 745. *der Klippenvogel, Rathsherr.*

Pennant,

(10) Nach *Oedmann* zu *Larus Atricilla* gehörig.

(1) Nach *Latham* eine Varietät von *Larus canus*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 491. n. 374. *die weiße Meve.*

Klein, av. p. 148. n. 6. Plautus Senator.

Klein, Vorbereit. p. 272. n. 6. *Rathsherr.* p. 310. *der Raedsherr.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 156. n. 6. *Rathsherr.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 816. n. 10. Larus (Eburneus) corpore toto niveo, rostro pedibusque plumbeis.

Phipps, Reis. n. d. Nordpol, p. 98. Larus (Eburneus) niveus immaculatus, pedibus plumbeo-cinereis.

Trampler, Wallfischf. p. 70. *Rathsherren.*

Hermann, tab. aff. anim. p. 146. Larus eburneus.

Fabric. fn. groenl. p. 103. n. 67. Larus (Candidus) totus niveus, rostro pedibusque nigris.

3. Canus. *Die graue Meve.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 345. n. 3. *die kleine graue Mewe.*

Leske, Naturgesch. p. 284. n. 1. *die graue Meve.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 47. n. 3. *die kleine graue Mewe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 408. n. 3. *die gemeine Meve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 808. n. 3. *die gemeine Meve.* p. 812. *Fischmeve, graue Meve, kleine graue Möve, weißgraue Meve, Fischer, große Seekrähe, Seemeve.*

Halle, Vögel, p. 570. n. 700. *die kleine Graumöve.*

(2) Flügelweite, nach *Pennant*, 3 Fuss. Gewicht 12 1/2 Unze. *Oedmann* rechnet hieher: 1) *Raj.* Larus fuscus sive hibernus, p. 130. n. 14. — 2) *Pennants* Vintergull, n. 248. Tab. 86. — 3) *Brissons* Gavia Hyberna, n. 12. — 4) *Brünnichs* Larus Maculatus n. 146.

Halle, Vögel, p. 571. n. 701. *die gelbweiße Möve.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 173. n. 155. *die kleine graue Möwe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 491. n. 375. *die gemeine Meve.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 748. *Meve mit einem schwarzen Schnabel.*

Klein, av. p. 137. n. 5. Larus rostro nigro.

Klein, Vorbereit. p. 253. n. 5. *Mewe mit einem schwarzen Schnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 145. n. 6. *schwarzschnäblige Meve.*

Klein, av. p. 137 n. 4. Larus cinereus minor.

Klein, Vorber. p. 253. n. 4. *gemeine graue Mewe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 145. n. 5. *gemeine graue Meve.*

Brisson, ornith. II. p. 408. n. 8. Mouette cendrée.

Batsch, Thiere, I. p. 382. *die graue Möwe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 815. n. 9. Larus (Canus) albus, dorso cano, remigibus primoribus extremitate nigris, quarta et quinta macula apicis nigra, extima extus nigra.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 55. n. 105. *die kleine graue Mewe.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 341. n. 96. *kleine graue Mewe.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 83. n. 95. *graue Mewe.*

Pennant, R. d. Schottl. I. p. 285. *graue Meven.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die aschfarbene Fischmeve.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 89. n. 104. *die weißgraue Meve.*

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 47. *die Fischmeve.*

Pontop-

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 169. n. 1. *Graanakke.*

Leem, Lappl. p. 148. * Larus canus.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 221. n. 3. *die gemeine Mewe.*

Naturf. XII. p. 143. n. 96. *kleine graue Mewe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 437. *die kleinere Meve.*

Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 54. Larus.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 25. n. 1. Larus albus dorso cano.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 136. n. 2. Larus (Canus) albus dorso cano.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 162. Larus (Canus) albus, dorso cano.

Jonston, av. p. 139. Larus cinereus alter.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 281. n. 2. *die graue Meve.*

β. *Brisson*, ornitholog. II. p. 410. n. 10. *grande Mouette cendrée.* (3)

Charleton, onomast. zoic. p. 94. n. 3. Larus cinereus minor?

4. Cinerarius. *Die große aschgraue Meve.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 346. n. 4. *die große aschgraue Mewe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 812. n. 4. *die aschgraue Meve.* p. 814. *die größte graue Meve, kleine aschfarbene Meve.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 749. *die kleine aschfarbene Möwe.*

(3) Nach *Brisson* eine eigene Gattung. Nach *Latham* gehört dies Synonym zu *Larus Argentatus*, n. 18. wohin es auch *Brünniche*, ornith. bor. p. 44. n. 149. rechnet

(4) Nach *Oedmann* zu Larus Tridactylus gehörig. Nach *Latham* eine Varietät von *Larus Ridibundus* n. 9.

Gesner, Vögelb. p. 374. *weiße Meermeben.*
Brisson, ornithol. II. p. 409. n. 9. petite Mouette cendrée.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 812. n. 2. β. L. albus, dorso cano, macula pone aures fusca.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 342. n. 97. *die große aschgraue Mewe.*
Pallas, Reis. Ausz. I. p. 370. Larus cinerarius.
Naturf. XII. p. 143. n. 97. *die große aschgraue Mewe.*
Neue schwed. Abh. IV. p. 113. n. 12.
Jonston, av. p. 129. Larus cinereus primus. — Larus albus maior.

β. *Brisson*, ornith. II. p. 408. n. 7. petite Mouette grise. (5)

γ. *Forskål*, descr. animal. p. 8. n. 17. Larus rostro rubro, apice nigro, macula nigra temporali. (Visa ad Dardanellas, vernalis Februario advolans, aestate non permanens.) (6)
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 113. n. 13.

15. Erythropus. *Die rothfüßige Mve.* (7)
Pennant, arct. Zool. II. p. 495. E. *das Rothbein.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 812. n. 2. γ. Larus albidus, capite fusco, maculis albis, dorso cano, rectricibus decem intermediis fascia nigra.

5. Nae-

(5) Nach *Brisson* eine eigene Gattung. *Brisson* rechnet hieher auch *Larus maculatus Marf.* Dan. V. p. 94. tab. 45. und *Klein* av. p. 38. n. 14. — *Latham* nimmt *Brissons Gavia grisea minor*, und die eben genannten Synonymen als Variet. von *Larus crepidatus* n. 20. an.

(6) Nach *Oedmann* zu *Larus Tridactylus* gehörig; s. vorher not. 9.

(7) Nach *Latham* eine Varietät von *Larus Ridibundus.*

5. NAEVIUS. *Die gefleckte Meve.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 346. n. 5. *die gefleckte Mewe.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 814. n. 5. *die gefleckte Meve.*

Halle, Vögel, p. 572. n. 704. *die große Falkmöve.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 753. *die graue Fiſcher-möve, weiße Möve, Seeſchwalbe.* (Lauter Namen, die ihr nicht zukommen.)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 489. n. 370. *die gefleckte Meve.*

Klein, av. p. 137. n. 6. Larus griſeus maximus.

Klein, Vorbereit. p. 254. n. 6. *graubraune große Mewe.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 145. n. 7. *graubraune große Meve.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 406. n. 5. Goiland varié ou le Griſard.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 814. n. 6. γ. L. albus, dorſo cinereo, rectricibus apice nigris.

Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 223. Larus Naevius.

Pallas, Reiſ. Ausz. I. p. 370. Larus naevius.

Neue ſchwed. Abh. IV. p. 112. n. 2.

β. *Briſſon*, ornithol. II. p. 410. n. 11. Mouette cendrée tachetée. (9)

(8) Länge, nach *Pennant*, an 2 Fuſs; Flügelweite 4 F. 8 Z.; Gewicht 32 Unzen. Nach *Latham* eine Varietät von *Larus Marinus* n. 6. — Nach *Oedmann* zu *Larus Tridactylus* gehörig. — *Latham* rechnet hieher auch mit *Briſſon*, den *Wagellus Cornubienſium Raj. av.* p. 130. A. 13. (Gmel. Syſt. Linn. p. 562. n. 3. *Proc. Glacialis.*) *Briſſon* wirft hier alles unter einander.

(9) Dies Synonym aus *Briſſon* iſt im Syſtem p. 595. bey Spec. 2. ſchon einmal angeführt, wohin es auch *Latham* und *Oedmann*,

γ. *Pallas*, nord. Beyträge, IV. p. 10. *die befleckte Möve.*

6. MARINUS. *Die Mantelmeve.* (10)

Müller, Naturf. II. p. 346. n. 6. *die Seemewe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 48. n. 4. *die Seemewe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 408. n. 4. *die Mantelmeve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 815. *die Mantelmeve.* p. 817. *Seemeve, Fischmeve, größte bunte Meve.*

Halle, Vögel, p. 568. n. 696. *die große Seemöve.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 174. n. 156. *die Seemöwe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 488. n. 368. *die Seemeve, Mantelmeve.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 752. *die große Seemöwe.*

Klein, av. p. 136. n. 1. Larus maximus ex albo et nigro vel subcaeruleo varius.

Klein, Vorber. p. 252. n. 1. *größte bunte Mewe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 144. n. 1. *größeste bunte Meve.*

Brisson, ornith. II. p. 403. n. 1. Goiland noir.

Batsch, Thiere, I. p. 381. *die Seemöwe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 6. Larus (Marinus) albus, dorso cano.

Beseke, Vögel Kurl. p. 56. n. 106. *die Seemewe.*

Pennant, Reise d. Schottl. I. p. 285. *Seemeven.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 169. n. 2. *Svartbag, Blaamaage.*

Leem,

Oedmann zählen. Das Synonym aus *Brünniche* rechnet *Oedmann* zu *Larus canus*. S. neue schwed. Abh. IV. p. 109. 112.

(10) Flügelweite nach *Pennant* 5 Fuss 9 Zoll. Gewicht zuweilen 5 Pfund. — *Latham* rechnet auch den *Larus Argentatus*, und *Larus Naevius*, als Spielarten hieher.

Leem, Nachricht von den Lapp. p. 147. *Sortbag?*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 220. n. 1. *die Mantelmewe.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 461. n. 39. *die Seemeve.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 100. n 3. Larus marinus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 24. n. 3. Larus albus dorso atro.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 3. Larus (Marinus) albus dorso nigro.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 163. Larus (Marinus) albus dorso nigro.

Fabric. fn. groenl. p. 102. n. 66. Larus (Marinus).

Moehring, av. gen. p. 66. n. 70. Gavia.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 282. n. 3. *die Seemeve.*

16. Ichthiaetus. *Die caspische Fischmeve.*

Müller, Natursystem, Suppl. p. 108. n. 12. *der Fischjäger.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 811. n. 1. Larus (Ichthiaetus) capite colloque supremo nigris, dorso alisque grisescentibus, remigibus primoribus albis, exterioribus quinque apice nigris, palpebris caudaque albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 14. n. 27. Larus Ichthiaetus.

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 240. *die größte schwarzköpfigte Seemöve.*

Gmelin, Reis. I. p. 152. tab. 30. 31. *die große Lachmöve.*

[*Forskål*, faun. orient. p. 7. n 7. Μαρτις.

Forskål, descr. anim. p. 11. *Adjum*, humano more ridendo clamat.] Nach *Oedmann.*

7. Fuscus.

7. Fuscus. *Die braune Meve.* (1)

Müller, Naturf. II. p. 347. n. 7. *die braune Mewe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 49. n. 5. *die Heringsmewe, die braune Mewe, große Hafmewe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 408. n. 5. *die Heringsmeve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 818. n. 7. *die Heringsmeve.* p. 819. *große Graumeve, Bürgermeister.*

Halle, Vögel, p. 569. n. 697. *die große Graumöve.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 488. n. 369. *die Heringsmeve.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 751. *die größte Graumöwe.*

Klein, av. p. 137. n. 2. Larus cinereus maximus.

Klein, Vorber. p. 252. n. 2. *größte graue Mewe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 144. n. 3. *größeste graue Meve.*

Brisson, ornith. II. p. 405. n. 3. Goiland gris.

Batsch,

(1) Flügelweite, nach *Pennant*, 4 Fuss 4 Zoll. Gewicht an 30 Unzen. *Brisson* und (sonst) *Pennant* machen diesen zu *Martens Bürgermeister.* Die Gegengründe hat *Oedmann* in den neuen schwed. Abhandl. a. a. O. aus einander gesetzt. Aus den Jungen dieses Vogels haben mehrere Schriftsteller eine besondere Gattung gemacht. *Oedmann* bringt dahin folgende Synonymen, als Abänderungen des jüngern Alters. 1) *Pennants* Vogel n. 247. tab. 88. — 2) *Raii* Vogel p. 130. n. 13. den man für *Martens Mallemuck* und *Bürgermeister von Grönland* angesehen hat. — 3) *Brissons Larus varius sive Skua*, II. p. 406. n. 5. (In unserm System wird dies Synonym zu *Larus Naevius* p. 598. n. 5. gezogen.) — 4) *Brissons Gavia grisea* p. 407. n. 6. Hiermit stimmt auch *Latham* a. a. O. überein. Aber *Brisson* rechnet dazu: Goiland ou Larus chlamyde leucophaea alis brevioribus, *Feuillée* III. p. 14. *Klein*, p. 139. n. 17. — 5) *Brünnichs Larus varius* p. 45. n. 150. (*Gmelin* Syst. Linn. p. 598. ad n. 5.)

Batsch, Thiere, I. p. 382. *die Heringsmöwe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 815. n. 8. Larus (Fuscus) albus, dorso fusco, pedibus flavis.
Beseke, Vögel Kurlands, p. 56. n. 107. *die braune Mewe.*
Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 83. n. 94. *große graue Mewe.*
Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 300. *Mewe.*
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 25. *braune Meeven.*
Leem, Finnm. p. 148. *Sobmer?*
Pontoppidan, Dännemark, p. 169. n. 3. *Sildemaage.*
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 104. n. 4. Larus fuscus.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 220. n. 2. *die Häringsmewe.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 90. n. 107. *die graubraune Meeve.*
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 24. n. 2. Larus albus dorso fusco.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 4. Larus (Fuscus) albus dorso fusco.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 164. Larus (Fuscus) albus, dorso cano.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 282. n. 4. *die braune Meve.*

17. GLAUCUS. *Der Bürgermeister.* (2)
Halle, Vögel, p. 597. n. 746. *die Täuchermöwe.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 494. *der Bürgermeister.*

Klein,

(2) Keine Mevenart hat den Schriftstellern mehr zu thun gemacht als diese. Sie führen ihn sparsam an, welches wohl daher zu rühren scheint, daſs er in geringer Anzahl vorhanden ist, und abgelegene Oerter bewohnt. Die Eyer sind ganz bläulich, mit 5 bis 6 schwarzen Flecken bezeichnet. Manche

Klein, av. p. 148. n. 7. Plautus Praeconsul.

Klein, Vorbereit. p. 272. n. 9. *Bürgermeister.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 157. n. 9 *Burgermeister.*

Brisson, ornith. II. p. 404. n. 2. Goiland cendré.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 814. n 7. Larus (Glaucus) albus dorso alisque canis, remigibus apice albis, rostro flavo, angulo croceo.

Leem, Finnm. p. 148. ** Larus hyperboreus, dorso dilute cinereo, extremitatibus remigum albis; *Blaamager*, *Quitmaase.*

Trampler, Wallfischf. p. 75. *Burgemeisters.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 96. n. 1 Larus glaucus.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 21. n. 169. Larus (Glaucus) totus albus, dorso et alis canis, remigibus apice albis.

Pontoppidan, Dännemark, p. 169. n. 4. *Perlemaage.*

Olaffen, Reise d. Isl. I. p. 190. *Maar*, *Maasur.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 282. n. 5. *der Burgermeister.*

18. Argentatus. *Die silberweiße Meve.* (3)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 494. C. *die silberweiße Meve.*

Latham,

Manche haben mehr und grösere Flecken. Durchmesser der Länge 3 Zoll 3 Lin. der Breite 2 Zoll 4. Lin. Umkreis der Schale, wo sie am dicksten ist, 6 Zoll 10 Lin. Sie sind am kleinen Ende ungewöhnlich spitzig, also von allen andern Meveneyern merklich unterschieden. *Oedmann.*

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *Larus Marinus* n. 6. Dieser und *Brünniche* rechnen *Brissons Gavia cinerea maior* p. 410. n. 10. hieher. (*Gmel. Syst. Linn.* p. 597. n. 3. *β.*) *Oedmann* will jedoch diese zu *Larus canus* ebenfalls rechnen; a. a. O. p. 120. n. 2.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 814. n. 6. β. L. albus, dorso alisque canis, remigibus primoribus versus apicem nigris.

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 169. n. 7. Larus Argentatus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 21. ad n. 161. L. Argentatus.

8. Atricilla. *Die schwarzfüßige Lachmeve* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 348. n. 8. *der Spötter.*

Halle, Vögel, p. 575. n. 713. *die kleine weiße Möwe mit dem Mohrenkopf und rothem Schnabel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 489. n. 371. *die Lachmeve.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 175. *der Spötter.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 748. *die kleine weiße Möwe.*

Klein, av. p. 139. n. 16. Larus minor, capite nigro, rostro rubro.

Klein, Vorbereit. p. 256. n. 16. *Rothschnabel mit einem schwarzen Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 146. n. 17. *Roth.*

Brisson, ornith. II. p. 412. n. 13. Mouette rieuse.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 4. Larus (Atricilla) albus, capite nigricante, rostro rubro; pedibus nigris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 78. *die kleine Mewe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 90. n. 106. *die weiße Meeve.*

Nov. Comment. Petrop. XV. p. 478. tab. 22. fig. 2. (Pullus.)

Linné,

(4) *Oedmann* rechnet hieher: 1) *Gmelin*, R. d. Russl. I. p. 72. II. p. 192. russ. *Tschaka.* 2) *Albin.* II. Tab. 86. Brown headed Gull. (Gmel. Syst. Linn. p. 601. ad n. 9.)

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 5. Larus (Atricilla) albus, capite alarumque apicibus nigris, rostro rubro.

19. ATRICILLOIDES. *Die sibirische Meve.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 3. Larus (Atricilloïdes) ex rubicundo albus, capite, orbitis colloque nigris, dorso alisque cinereis, pedibus coccineis.

9. RIDIBUNDUS. *Die rothfüßige Lachmeve.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 348. n. 9. *die Lachmeve.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 408. n. 6. *die schwarzköpfige Lachmeve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 819. n. 8. *die schwarzköpfige Lachmeve.*

Halle, Vögel, p. 571. n. 702. *die graue Möve mit dem Mohrenkopfe, Seekrähe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 490. n. 372. *die schwarzköpfige Lachmeve.*

Klein, av. p. 138. n. 8. Larus albus erythrocephalus.

Klein, Vorbereit. p. 254. n. 8. *Braunkopf, rothköpfiger Seeschwalm.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 9. *Braunkopf.*

Klein, stemm. av. p. 32. Tab. 36. fig. 2. a-c.

Brisson, ornithol. II. p. 413. n. 14. Mouette rieuse à pattes rouges.

Latham, Syn. Suppl. p. 268. Black-headed Gull.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 811. n. 2. Larus (Ridibundus) albidus, capite nigricante, rostro pedibusque rubris.

Beseke,

(5) Flügelweite, nach *Pennant*, 37 Zoll; Gewicht 10 Unzen. *Latham* rechnet den *Larus Cinerarius* p. 597. n. 4. und den *Larus Erythropus*, p. ead. n. 15. als Spielarten hieher. Nach *Oedmann* ist auch *Charletons Larus niger*, Onomat. zoic p. 95. n. 4. hieher zu ziehen.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 56. n. 108. *die Lachmeve.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 224. n. 5. *die Lachmewe.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 83. n. 96. *Lachmeve.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die große Lachmeve.*

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 89. n. 105. *die aschgraue Meve.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 292. Larus maior cinereus; *ein weiße Seeschwalbe, großer Seeschwalm, grawer Meerschwalm, Fischahr.*

Jonston, av. p. 130. Larus cinereus tertius.

Schäfer, element. ornith. tab. 44.

10. Parasiticus. *Der Strundjäger.*

Müller, Naturs. II. p. 348. n. 10. *der Struntjäger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 45. n. 1. *der Strundjäger, Strandjäger.* Tab. 41.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 407. n. 1. *der Strundjäger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 821. n. 9. *der Strundjäger.* p. 824. *Mevenbüttel, Schmarotzermeve.*

Halle, Vögel, p. 577. n. 717. *die Polarmöwe.*

Halle, Vögel, p. 598. n. 749. *der Strandjäger.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 175. n. 158. *die Schmarotzermöve, Labbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 492. n. 376. *die arctische Meve, Struntjäger.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 755. *die Polarmöwe, Scheißfalke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 147. n. 21. *Polmeve.*

Klein, av. p. 148. n. 10. Plautus Stercorarius.

Klein, Vorbereit. p. 272. n. 10. *Scheißfalke*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 157. n. 11. *Strontjäger*.

Brisson, ornith. II. p. 401. n. 1. Stercoraire.

Brisson, ornitholog. II. p. 402. n. 3. Stercoraire à longue queue.

Batsch, Thiere, I. p. 381. *der Strunt-od. Strandjäger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 819. n. 15. Larus (Parasiticus) supra niger, collo, pectore et abdomine albis, rectricibus duabus intermediis longissimis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 43. *der Nordvogel den man für den Er hält*.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 44. *der Nordvogel den man für die Sie hält*.

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 150. *Kive*, *Kive Joen*.

Olaffen, Isl. I. p. 121. 305. *Kioe*, *Kioven*.

Trampler, Wallfischf. p. 69. *die Struntjäger*.

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 154. *Jo-Fugl*, *Jo-Tyv*, *Kirve*.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Caprotherus.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 24. n. 4. Larus rectricibus intermediis longissimis.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 136. n. 6. Larus (Parasiticus) rectricibus duabus intermediis longissimis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 166. Larus (Parasiticus) rectricibus duabus intermediis longissimis.

Philos. Transact. LXII. p. 421. n. 23.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 283. n. 6. *der Struntjäger, arctische Meve*.

20. CREPIDATUS. *Die schwarzzehige Meve.* (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 492. n. 377. *die Meve mit schwarzen Zehen.*

Brisson, ornith. II. p. 401. n. 2. Stercoraire rayé.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 819. n. 14. Larus (Crepidatus) luteo fuscoque varius, subtus pallidior, macula alarum alba.

Müller, zool. dan. prodr. p. 21. n. 168. Larus Cepphus.

Philos. Transact. LII. p. 135.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 283. n. 7. *die schwarzzehige Meve.*

β. L. griseus ex albo varius, subtus albus, remigibus primoribus rectricibusque nigricantibus albo terminatis, harum lateribus intus maxima parte albis? * (7)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 819. n. 14. β.

Latham, Syn. III. 2. p. 382. n. 10. Var. A.

11. CATARRHACTES. *Die Skua.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 350. n. 11. *der gestreifte Struntjäger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 50. n. 6. *der gestreifte Strandjäger.*

Halle, Vögel, p. 571. n. 703. *die braune Stoßmöve.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 176. n. 159. *die braune Stosmöve, Skua.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 493. A. *die Skua.*

Klein, av. p. 137. n. 7. Larus fuscus.

(6) Länge, nach *Brisson*, 1 1/2 Fuss 3 Lin. Flügelweite 3 1/2 F. 3 Lin. — Gewicht, nach *Pennant*, 11 Unzen.

(7) Siehe vorher die Anmerkung 5, bey *Larus Cinerarius* β.

(8) Flügelweite 4 1/2 Fuss, Gewicht 3 Pfund. *Penn.*

Klein, Vorber. p. 254. n. 7. *braun und geschuppte Mewe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 145. n. 8. *braun geschuppte Meve.*

Brisson, ornithol. II. p. 405. n. 4. Goiland brun.

Gesner, Vögelb. p. 374. *Catarractes.*

Batsch, Thiere, I. p. 381. *der gestreifte Strandjäger.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 818. n. 12. Larus (Catarrhactes) grisescens, remigibus rectricibusque basi albis, cauda subaequali.

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 113. *die große nordliche Meve.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 21. n. 167. Larus (Cataractes) grisescens, remigibus rectricibusque basi albis, cauda subaequali.

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 182. *Skue.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 6. Larus Catarracta.

Jonston, av. p. 130. Catharracta.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 154. Larus Catarractes.

Aristot. histor. animal. L. 9. c. 10. n. 161. Καταρρακτης?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 283. n. 8. *die Skua.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *neun* Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind *zwey*, bey der 3ten *zwey*, bey der 4ten *drey*, bey der 5ten *vier*, bey der 9ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Un-*

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. Larus (Maximus) tetradactylus, albus, dorso alisque superne canis, palpebris sanguineis, remigum sex primorum apicibus nigris, albo terminatis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 146.

2. Larus (Keeask) fuscus, tectricibus alarum albo variegatis. cauda nigra, albo maculata, apice albo.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 818. n. 13.

77. GESCHLECHT. STERNA. *Die Meerschwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 351. Gen. LXXVII.
Leske, Naturgesch. p. 283. Gen. LXVIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 51. Gen. XLII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 219. Gen. LXVIII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 409. Gen. XXXIII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 825. Gen. XXV.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 484.
Onomat. hist. nat. VII. p. 299
Brisson, ornith. II. p. 415. Gen. CIII.
Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXIV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 803. Gen. XCIII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 143.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 284. Gen. XXXIX.

8. CASPIA. *Die caspische Meerschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 825. n. 1. *die kaspische Meerschwalbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 487. B. *die kaspische Meerschwalbe.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 803. n. 1. Sterna (Caſpia) corpore ſupra plumbeo-cinereo, ſubtus colloque albo, roſtro coccineo, capillitio pedibusque nigris.

Pallas, Reiſe, I. p. 429. II. p. 471.

Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 370. *Tſchagrawi.*

Neue ſchwed. Abhandl. III. p. 221. Sterna: cauda forficata alba breviori, roſtro coccineo, capillitio aterrimo, pedibus nigris. Maxima; *die Wimmermeve.*

Muſ. Carlſon. faſc. III. Tab. 62.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 284. n. 1. *die caſpiſche Meerſchwalbe.*

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 351. n. 1. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 804. n. 1. β. St. cinereo-cana, corpore ſubtus colloque albis, vertice nigro albo maculato, rectricibus ad apicem faſciis fuſcis.

γ. *Latham*, Syn. III. 2. p. 351. n. 1. Var. B.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 804. n. 1. γ. St. cinereo-cana, corpore ſubtus colloque albis, vertice nigro, occipite ſubcriſtato, rectrice extima a medio ad apicem alba.

δ. St. roſtro albo, capillitio nigro alboque vario, aurium regionibus nigris, dorſo et alis cinereis, plumarum remigum primariarum apicibus nigris. *

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 804. n. 1. δ.

9. Cayennensis. *Die große cayenniſche Meerſchwalbe.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 804. n. 2. Sterna (Cayana) griſea, pennis rufo-marginatis, occipite nigro, corpore ſubtus albo.

10. Su-

10. SURINAMENSIS. *Die surinam. Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 804. n. 3. Sterna (Surinamensis) cinerea, subtus alba, rostro, capite, collo pectoreque nigris, pedibus rubris.

11. FULIGINOSA. *Der Eyvogel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 485. n. 364. *die rußschwarze Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 804. n. 4. Sterna (Fuliginosa) fuliginoso-atra, fronte corporeque subtus albis, striga per oculos nigra.
Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 119. *der Eyvogel.*

12. AFRICANA. *Die afrikanische Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 805. n. 5. Sterna (Africana) alba, corpore supra caerulescente, vertice nigro, alis fusco-maculatis.

1. STOLIDA. *Die Noddy.* (9)
Müller, Natursyst. II. p. 351. n. 1. *der Pinsel.*
Leske, Naturgesch. p. 283. n. 1. *die kirre Meerschwalbe.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 51. n. 1. *die kirre Meerschwalbe.* Tab. 42.
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 219. n. 1. Sterna (Stolida) corpore nigro, fronte albicante, superciliis atris.
Halle, Vögel, p. 575. n. 712. *die kleine weißköpfige Seeschwalbe.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 484. n. 363. *die dumme Meerschwalbe.*
Onomat. histor. nat. VII. p. 306. *die dumme Meerschwalbe.*
Klein, av. p. 139. n. 15. Larus, hirundo marina minor, capite albo.

(9) Gewicht 4 Unzen. *Penn.*

Klein, Vorbereit. p. 256. n. 15. *Weißkopf.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 146. n. 16. *Weißkopf.*

Brisson, ornith. II. p. 414. n. 15. Mouette brune.

Batsch, Thiere, I. p. 369. *die kirre Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 805. n. 6. Sterna (Stolida) corpore nigro, fronte albicante, superciliis atris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 76. *die Meerschwalbe mit dem weißen Kopfe.*

Samml. zur Phys. und Naturgesch. I. p. 227. *die Meerschwalbe.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 568. *Meerschwalben.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 137. n. 1. Sterna (Stolida) cauda cuneiformi, corpore nigro, fronte albicante.

Charleton, onomast. zoic. p. 115. n. 22. Passer stultus.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 143. Sterna Stolida.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 284. n. 2. *die Noddy.*

13. Simplex. *Die kleine cayennische Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 805. n. 8. Sterna (Simplex) plumbescens, subtus alba, vertice albido, tectricibus alarum mediis et maioribus albis.

β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 806. n. 8. 1. St. cinereo-nigricans, fronte, collo, corpore subtus rectricibusque alarum inferioribus albis.

14. Nilotica. *Die ägyptische Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 806. n. 9. Sterna (Nilotica) cinerea, subtus alba, vertice colloque superiore maculis nigricantibus, orbitis nigris albo maculatis.

Hassel-

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 325. n. 41. Sterna nilotica.

15. CANTIACA. *Die kentische Seeschwalbe.* (10)
Latham, Syn. Suppl. p. 266. Boy's Sandwich.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 806. n. 10. Sterna (Boysii) alba, dorso alisque canis, pileo nigro, fronte maculis albis, remigibus nigricantibus scapo albo.

β. St. supra nigro albo cinerascenteque varie fusca, subtus alba, cauda forficata, rostro pedibusque nigris. *
Latham, Syst. ornithol. II. p. 806. n. 10. γ.
Mus. Carls. fasc. III. Tab. 63. Sterna nubilosa. (Pullus.)

2. HIRUNDO. *Die Seeschwalbe.* (1)
Müller, Natursyst. II. p. 352. n. 2. *die europäische Meerschwalbe.* Tab. 13. fig. 3.
Leske, Naturgesch. p. 284. n. 2. *die größere Meerschwalbe.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 52. n. 3. *die europäische Meerschwalbe.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 219. n. 2. Sterna (Hirundo) cauda forficata, rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis; *die Seeschwalbe.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 409. n. 2. *die gemeine Meerschwalbe.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 828. n. 3. *die gemeine Meerschwalbe.* p. 831. *europäische Meerschwalbe, Schwarzkopf, kleinere Meve,* *Rohr-*

(10) Nach *Latham* gehört auch *Sterna Naevia*, p. 609. n. 5. als Spielart hieher.

(1) Flügelweite 30 Zoll; Gewicht 4 1/4 Unze. *Penn.*

Rohrmeve, Rohrschwalm, Seeschwalbe, Meerschwalbe.

Halle, Vögel, p. 573. n. 708. *die große Seeschwalbe mit gespaltenem Schwanze.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 177. n. 161. *die Seeschwalbe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 485. n. 365. *die große Meerschwalbe.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 302. *die europäische Seeschwalbe.*

Klein, av. p. 138. n. 10. Larus albicans.

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 10. *Schwarzkopf.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 11. *Schwarzkopf.*

Klein, av. p. 138. n. 11. Larus minor cinereus?

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 11. *Rohrschwalm, Fischerlein?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 12. *Rohrmeve, Rohrschwalm?*

Klein, stemmat. av. p. 32. Tab. 36. fig. 3. a-c.

Gesner, Vögelb. p. 372. *Stirn;* mit 1 Fig. p. 373. *Spirer, Schnirring.*

Brisson, ornith. II. p. 415. n. 1. grande Hirondelle-de-mer.

Batsch, Thiere, I. p. 369. *die europäische Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 807. n. 15. Sterna (Hirundo) cauda forficata, rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis.

Frisch, Vögel, Tab. 219. *die schwarzplättige Schwalbenmöve.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 342. n. 98. *die europäische Meerschwalbe.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 57. n. 109. *die europäische Meerschwalbe.*

Siemssen,

Siemssen, meklenb. Vögel. p. 216. n. 1. *die gemeine Meerschwalbe.*

Phipps Reis. n. d. Nordpol, p. 99. *die europäische Seeschwalbe.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 245. *Seeschwalben.*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 370. Sterna Hirundo.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 24. Sterna Hirundo.

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 282. n. 28. *die Seeschwalbe.*

Fabricius, Reisen n. Norwegen, p. 290. Sterna hirundo.

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 1. *Tärne, Kropkirne.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 176. *Sandtärne, Sandtal, Tendelöh, Ten.*

Olafsen, Isl. I. p. 122. *Therna, Kriia.*

Naturf. XII. p. 143. n. 38. *europäische Meerschwalbe.*

Schneider, zool. Abh. p. 145. 151. Larus hirundo; *kleine Fischmeve, oder Fischmeise.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 91. n. 111. *die Schwalbenmeeve.*

Leem, Finnm. p. 150. *die Seeschwalben, Tänner.*

Berlin. Samml. IX. p. 571. *die Meerschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 24. n. 1. Hirundo marina.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 137. n. 2. Sterna (Hirundo) cauda forficata, rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 21. n. 1. Sterna (Hirundo) cauda forficata, rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis.

Kramer, Austr. p. 345. n. 1. Larus rostro pedibusque miniaceis, vertice et nucha atris, dorso cano, abdomine albo; *grauer Fischer.*

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Silef. p. 293. Larus minor cinereus; *ein klein Seeschwalbe, Rohrschwalm, Fischerlein?*

Charleton, onomaft. zoic. p. 94. n. 3. Larus Piscator?

Moehring, av. gen. p. 68. n. 74. Larus.

Jonston, av. p. 129. Larus albus minor?

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 285. n. 3. *die Seeschwalbe.*

β. *Latham*, Syft. ornith. II. p. 808. n. 15. β. Sterna pedibus nigris, rectricibus extimis toto albis.

16. Panayensis. *Die Meerschwalbe von Panay.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 808. n. 16. Sterna (Panaya) fubtus alba, vertice nigro maculato, cervice grifeo-nigricante, alis caudaque fufcis.

Büffon, oif. VIII. p. 344. L'Hirondelle de mer de l'Isle de Panay.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 44. *die Meerschwalbe von der Insel Panay.*

17. Cinerea. *Die aschgraue Meerschwalbe.*

Brisson, ornitholog. II. p. 417. n. 3. Hirondelle-de-mer cendrée.

Latham, Syft. ornithol. II. p. 808. n. 17. Sterna (Cinerea) cinerea, capite nigro, marginibus alarum, et tectricibus caudae inferioribus nigris.

Jonston, av. p. 130. Larus fidipes alius, alis brevioribus.

18. Alba. }
19. Candida. } *Die weiße Meerschwalbe.* (2)

Latham, Syn. Suppl. p. 266. White Tern.

Latham,

(2) Ich nehme diefe beyden Gattungen hier zufammen, weil *Latham* feine *White Tern* felbft für *Sparrmanns fterna alba* ausgiebt, und im Syftem fich weiter kein Synonym findet.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 808. n. 18. Sterna (Alba) corpore toto albo, rostro pedibusque nigris.

20. OBSCURA. *Die unbestimmte Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 810. n. 25. Sterna (Obscura) supra fusca, subtus alba, alis fusco cinereoque variis, capite nigro.

3. NIGRA. *Die schwarze Meerschwalbe.* (3)
Müller, Natursyst. II. p. 253. n. 3. *die schwarze Meerschwalbe.* Tab. 13. fig. 4.
Borowsky, Thierreich, III. p. 52. n. 2. *der Brandvogel, Meyvogel, die schwarze Meerschwalbe.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 836. n. 6. *die graue Meerschwalbe.*
Halle, Vögel, p. 574. n. 709. *die kleine schwarze Seeschwalbe?*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 177. n. 162. *der Mayvogel?*
Onomat. histor. natur. VII. p. 305. *die graue Seeschwalbe.*
Brisson, ornithol. II. p. 418. n. 5. Hirondelle-de-mer à tête noire ou Gachet.
Batsch, Thiere, I. p. 369. *die schwarze Meerschwalbe.*
Latham, Syn. III. 2. p. 367. n. 22. Var. A.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 810. n. 24. Sterna (Nigra) cauda forficata, corpore cano, capite rostroque nigris, pedibus rubris.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 343. n. 99. *die schwarze Meerschwalbe.*
Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 299. *Meerschwalbe. Pallas.*

(3) Wird oft mit *Sterna Fissipes* n. 7. verwechselt. *Latham* hält sie auch fast nur für eine Spielart.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 370. Sterna nigra.

Leem, Finnm. p. 150. *Glitter.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170. n. 2. *Söesvale*, *Sortkirre*, *Glitter.*

Naturf. XII. p. 144. n. 99. *die schwarze Meerschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 24. n. 2. Sterna nigra.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 137. n. 3. Sterna (Nigra) cauda subforficata, corpore cano, capite rostroque nigro, pedibus rubris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 21. n. 171. Sterna (Nigra) cauda subforficata, corpore cano, capite rostroque nigro, pedibus rubris.

21. Australis. *Die Südmeerschwalbe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 809. n. 21. Sterna (Australis) cinerea subtus grisea, fronte albo-flavescente, remigibus albis.

22. Sinensis. *Die chinesische Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 809. n. 20. Sterna (Sinensis) alba, dorso cinereo, alis caudaque subforficata, griseo-canis, fascia verticali nigra.

23. Metopoleucos. *Die sibirische Meerschwalbe.*

Latham, Syn. III. 2. p. 365 n. 21. Hooded Tern.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 809 n. 22. Sterna (Metopoleucos) capite colloque nigris, dorso cano-nigricante, remigibus cinereis, fronte, corpore subtus caudaque forficata albis.

4. Minuta. *Die kleine Meerschwalbe.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 353. n. 4. *der kleine Fischer.* Tab. 13. fig. 1.

Borowsky,

(4) Flügelweite 19 1/2 Zoll. Gewicht 2 Unzen 8 Gran. *Penn.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 55. n. 5. *der kleine Fischer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 837. n. 7. *die kleine Meerschwalbe.* p. 838. *das Fischerlein, die kleine Seeschwalbe, die zweyfarbige Meve, die kleinste Fischmeve.*

Halle, Vögel, p. 574. n. 710. *die kleinste Fischmöve.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 486. n. 366. *die kleinere Meerschwalbe.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 503. *das Fischerlein.*

Klein, av. p. 138. n. 11. Larus minor cinereus?

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 11. *Rohrschwalm?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 12. *Rohrmeve?*

Klein, av. p. 138. n. 13. Larus Piscator.

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 13. *Fischerlein, kleinste Meve.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 146. n. 14. *Fischerlein.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 217. n. 2. *die kleine Meerschwalbe.*

Gesner, Vögelb. p. 373. *Mebe, Fischerlein genannt.*

Brisson, ornith. II. p. 416. n. 2. Petite Hirondelle-de-mer.

Batsch, Thiere, I. p. 369. *die kleine Möwe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 809. n. 19. Sterna (Minuta) cauda forficata, corpore albo, dorso cano, fronte superciliisque albis.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 343. n. 100. *der kleine Fischer.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 91. n. 110. Larus bicolor; *die zweyfarbigte Meve.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 293. Larus minor cinereus?

Jonston, av. p. 129. Larus albus minor?

Charleton, onom. zoic. p. 94. n. 3. Larus piscator.

5. Nae-

5. NAEVIA. *Die gefleckte Meerschwalbe.* (5)

Müller, Natursystem, II. p. 353. n. 5. *die Kirrmeve.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 54. n. 4. *die Kirrmeve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 831. n. 4. *die gefleckte Meerschwalbe.* p. 833. *Kirrmeve, Girrmöve, Scheerke.*

Halle, Vögel, p. 575. n. 711. *die grünbunte Möwe?*

Onomat. hist. nat. VII. p. 304. *die bunte Meerschwalbe, Kirrmöwe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 487. A. *die kamtschatkische Meerschwalbe.*

Klein, av. p. 103. n. 3. Rallus cinereus, facie Lari.

Klein, Vorbereit. p. 192. n. 3. *graue Rall, Aftermeve.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 3 *graue Ralle.*

Brisson, ornithol. II. p. 419. n. 6. Hirondelle-de-mer tachetée.

Batsch, Thiere, I. p. 369. *die Kirrmöwe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 806. n. 10. β. St. cauda emarginata, corpore variegato, macula aurium nigra.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 370. Sterna naevia.

Linné, auserles. Abh. II. p. 296. n. 92. *die Halbmeve, Ralle.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 125. n. 156. *der meevenförmige Rall.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 153. n. 3. Rallus (Lariformis) subtus albido-flavescens, cervice caerulescenti-maculato, digitis marginatis.

24. STRIA-

(5) Nach *Latham* eine Varietät von *Sterna Cantiaca*, n. 15.

24. STRIATA. *Die gestreifte Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 807. n. 11. Sterna (Striata) alba, occipite nuchaque nigris, corpore supra alisque striis transversis nigris.

25. VITTATA. *Die Meerschwalbe mit weißer Kopfbinde.*
Latham, Syn. III. 2. p. 359. n. 11. Wreathed Tern.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 807. n. 12. Sterna (Vittata) cinerascens, capite superiore nigro vitta alba circumdato, uropygio, crisso caudaque albis.
β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 801. ad n. 12.

26. SPADICEA. *Die braunrothe Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 807. n. 13. Sterna (Spadicea) fusco-rubescens, crisso albo, dorsi pennis rectricibusque alarum margine albidis, scapularibus remigibusque secundariis apice albis.

6. FUSCATA. *Die braune Meerschwalbe.*
Müller, Natursyst. II. p. 354. n. 6. *die St. Domingische Kirrmeve.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 301. *die braune Meerschwalbe.*
Brisson, ornith. II. p. 420. n. 7. Hirondelle-de-mer brune.
Latham, Syn. III. 2. p. 360. n. 13. Dusky Tern.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 807. n. 14. Sterna (Fuscata) cauda emarginata, corpore nigricante immaculato, pedibus rubris, rostro fusco.

7. FISSIPES. *Der Brandvogel.* (6)
Müller, Natursyst. II. p. 354. n. 7. *der Spaltfuß.*
Bechstein,

(6) Wird in den Synonymen und Beschreibungen häufig mit *Sterna Nigra* n. 3. verwechselt.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 410. n. 3. *die schwarze Meerschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 833. n. 5. *die schwarze Meerschwalbe.* p. 835. *Brandvogel, Maivogel, schwarze Meve, kleine schwarze Seeschwalbe, Kleinmevchen, spaltfüßige Meerschwalbe, Amselmeve.*

Halle, Vögel, p. 574. n. 709. *die kleine schwarze Seeschwalbe?*

Pennant, arct. Zool. II. p. 486. n. 367. *die schwarze Meerschwalbe.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 300. *die schwarze Mewe, Brandvogel.*

Gesner, Vögelb. p. 373. *Meyvögelein.*

Brisson, ornithol. II. p. 417. n. 4. Hirondelle de mer noire ou Epouvantail.

Klein, av. p. 138. n. 12. Larus minor niger.

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 12. *schwarze Mewe, Meyvogel, Brandvogel.*

Klein, verb. Vögelh. p. 145. n. 13. *schwarze Mewe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 267. Black Tern.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 810. n. 23. Sterna (Fissipes) cauda emarginata, corpore nigro, dorso cinereo.

Frisch, Vögel, Tab. 715. *die kleinste Möve.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 218. n. 3. *die schwarze Meerschwalbe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 90. n. 108. *die Amselmeve.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 4. Larus Niger.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 294 Larus minor niger; *ein klein schwarze Seeschwalbe, schwarzer Mewe, Meyvogel, klein Mübeßlin.*

Jonston, av. p. 130. Larus niger. Larus fidipes primus.

Hermann,

Hermann, tab. affinit. anim. p. 143. Larus fissipes.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 185. n. 4. *der Brandvogel.*

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 19 Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Die Tiegermeve.* Larus Tigrinus.
 Klein, verb. Vögelhist. p. 147. n. 23.
 Halle, Vögel, p. 577. n. 719.
2. *Die Helische Schneemeve.*
 Klein verbess. Vögelhist. p. 147. n. 24.
 Halle, Vögel, p. 577. n. 720.
3. *Die Meve mit gelbem Schnabel und Füßen.*
 Klein, verbess. Vögelhist. p. 147. n. 25.
4. *Helisches Fischerlein.*
 Klein, verbess. Vögelhist. p. 148. n. 26.
 Halle, Vögel, p. 578. n. 721. *das Möwchen.*

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Die Stübbersche Meerschwalbe. Kleine Stübbersche Kirke.*
 Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 828. n. 2.
2. *Die philippinische Meerschwalbe.*
 Latham, Syst. ornithol. II. p. 805. n. 7. Sterna (Philippina) vinaceo-grisea, pileo albo, vitta per oculos, remigibus, cauda, rostro pedibusque nigris.
 Latham, Syn. Suppl. p. 267. Philippine Tern.

78. GESCHLECHT. RYNCHOPS. *Der Verkehrtschnabel.*

Müller, Natursyst. II. p. 355. Gen. LXXVIII.
Leske, Naturgesch. p. 283. Gen. LXVII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 25. Gen. XXXVI.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 219. Gen. LXVII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. Gen. XXV.
Onomat. hist. nat. VI. p. 863.
Brisson, ornithol. II. p. 420. Gen. CIV. Rygchopsalia.
Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXIII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 802. Gen. XCII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 144.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 285. Gen. XL.

1. NIGRA. *Der Wasserschneider.*

Müller, Natursyst. II. p. 355. n. 1. *der schwarze Verkehrtschnabel.*
Leske, Naturgesch. p. 283. *der schwarze Verkehrtschnabel.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 26. n. 1. *der schwarze Wasserscherer.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 219. n. 1. Rhinchops (Nigra) nigricans, subtus alba, rostro basi rubro.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. *der schwarze Verkehrtschnabel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 175. *der schwarze Verkehrtschnabel.*
Funke, Naturgesch. I. p. 325. *der Verkehrtschnabel.*
Ebert, Naturl. II. p. 80. *der Wasserbeißer oder, Wasserscherer.*
Halle, Vögel, p. 586. n. 731. *der Wasserbeißer, die Seescheere.*

Gatterer,

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 179. n. 166. *der Wasserbeißer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 483. n. 362. *der Wasserschneider.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 863. *der schwarze Wasserbeißer.*

Klein, Vorber. p. 262. n. 2. *verkehrter Schnäbler.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 150. n. 2. *verkehrter, ungleicher Schnäbler.*

Brisson, ornith. II. p. 421. n. 1. Bec-en-ciseau.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 802. n. 1. Rhynchops (Nigra) nigricans, subtus alba, rostro basi rubro.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 80. *die große Meve mit ungleichem Schnabel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 138. n. 1. Rhynchops (Nigra) nigra, subtus alba, rostro basi rubro.

Moehring, av. gen. p. 83. n. 109. Phalacorax.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 144.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 285. *der Wasserschneider.*

2. FULVA. *Der gelbe Verkehrtschnabel.*

Müller, Natursf. II. p. 356. n. 2. *der Fahle.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 26. n. 2. *der fahle Wasserscherer.*

Brisson, ornith. II. p. 422. n. 1. Var. A. Bec-en-ciseau fauve.

Onomat. histor. nat. VI. p. 863. *der gelbe Wasserbeißer.*

Latham, Syn. III. 2. p. 348.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 803. n. 1. β. Rh. fulva, rostro nigro.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 138. n. 2. Rhynchops (Fulva) fulva, rostro nigro.

VIERTE ORDNUNG.

GRALLAE. *(Sumpfvögel. Stelzenläufer.)*

79. GESCHLECHT. PHOENICOPTERUS. *Der Flamingo.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 358. Gen. LXXIX.
Leske, Naturgeſch. p. 281. Gen. LXVI.
Borowsky, Thierreich, III. p. 66. Gen. XLIV.
Blumenbach, Handb. der Naturgeſchichte, p. 210. Gen. LI.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 412. Gen. XXXIV.
Briſſon, ornithol. II. p. 501. Gen. CXIII.
Batſch, Thiere, I. p. 385. Gen. XCIII.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 788. Gen. LXXXVII.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 286. Gen. XLI.

1. RUBER. *Der* (rothe) *Flamingo.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 358. n. 1. *der Flaminger.* Tab. 14. fig. 2.
Leske, Naturgeſch. p. 281. *der Flamant.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 66. n. 1. *der Flaminger, Flammenvogel, Flammenreiher.* T. 44.
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. I. p. 210. n. 1. Phoenicopterus (Ruber) ruber, remigibus nigris; *Flamingo, Flamant, Schartenſchnäbler, Korkorre.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 179. *der rothe Flamant.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 412. *der rothe Flamant.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 325. *der Flamingo.*
Ebert, Naturl. II. p. 81. *der Flaminger.* Tab. 36.

Halle,

Halle, Vögel, p. 536. n. 637. *der Flammenreiher, Pflugschnabel.*

Halle, Vögel, p. 538. n. 638. *der Flammenreiher mit rosenfarbenem Flügel.*

Halle, Vögel, p. 539. n. 639. *der weiße Flammenreiher.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 179. n. 167. *der Flamant, Karminpelikan.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 581. *Phoenikopter.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 461. *Flaminger.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 467. n. 339. *der rothe Flamant.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 379. *der Flamant.*

Klein, av. p. 126. B. Phoenicopterus.

Klein, Vorbereit. p. 234. B. *Schartenschnäbler.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 133. n. 1. *rother Flamant.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 134. n. 2. *rothflügelichter Flamant.*

Klein, verb. Vögelh. p. 134. n. 3. *weißer Flamant.*

Gesner, Vögelb. p. 402. *Flambant, Flamman.*

Brisson, ornith. II. p. 502. Flamant.

Batsch, Thiere, I. p. 387. *der Flamingo.*

Latham, Syn. Suppl. p. 263. Red Flamingo.

Latham, Syst. ornith. II. p. 788. n. 1. Phoenicopterus (Ruber) remigibus nigris.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 46. *Flamingo, Phoenicopter.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 47. *der Schnabel des Phoenicopters in natürlicher Größe.*

Adanson, Senegall, p. 243. *Flammenreiger.*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 371. *rothe Gänse.* p. 357. *der Flamingo.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 321. *Flamingo oder rothe Gänse.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 303. *der Flamant.* Tab. 5.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 125. *der Phoenikopter.*

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 215. *Becharu.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 387. *der Flamand.*

Allgem. Reis. II. p. 168. 445. *Flamingos.* V. p. 201. Tab. 16. *der Flamingo.* XIII. p. 241. *die Fläminger.* XVII. p. 671. *Fläminge.* (genaue Beschreib. des Nests.)

Dampier, Reis. I. p. 134. *Flamingos.*

Perrault, Charras u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 217. anatomische Beschreib. eines Becharu oder Flamingos. Tab. 69. *der Becharu.* Tab. 70. die Zergliederung.

Frisch, Vögel, II. Tab. 152. *der weiße Schertenschnäbler.* (Ein einjähriger Vogel.)

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 93. n. 114. *der rothe Flamand.*

Samml. z. Phys. u. Naturgesch. I. p. 227. *der Flamingo.*

Goeze, nützl. All. II. p. 217. n. 22. *der Flamingo.*

Eberhard, Thiergesch. p. 120. *der Flamant.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 338. *Flamingos.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 139. n. 1. Phoenicopterus (Ruber) ruber, remigibus primoribus nigris.

Charleton, onomast. zoic. p. 102. n. 3. Phoenicopterus.

Jonston, av. p. 150. Phoenicopterus.

Moehring, av. gen. p. 59. n. 59. Phoenicopterus Auctorum.

Hermann, tab. aff. anim. p. 142. Phoenicopterus.

Scaliger, exercit. 232. p. 730.

Heliodor.

Heliodor. hiſt. aethiop. Lib. 6.
Gaſſend. vit. Peireſc. Lib. 2. in fin.
Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 48. Phoenicopterus.
Sueton. Vitell. c. 13. Caligul. c. 22. Phoenicopterus.
Martial. epigr. L. 3. ep. 71. Phoenicopterus.
Ariſtophan. av. v. 553. Φοινικοπτερος.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 286. n. 1. *der Flamingo.*

2. CHILENSIS. *Der chileſiſche Flamingo.*
Vidaure, Chile, p. 71. *Flamingo.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 789. n. 2. Phoenicopterus (Chilenſis) ruber, remigibus albis.
Goeze, nützl. Allerley, III. p. 124. n. 9. *der Flamingo.*

Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.

Das Geſchlecht iſt mit *einer* Gattung vermehrt.

80. GESCHLECHT. PLATALEA. *Der Löffelreiher.*
Müller, Naturſyſtem, II. p. 361. Gen. LXXX.
Leske, Naturgeſch. p. 280. Gen. LXIV.
Borowsky, Thierreich, III. p. 68. Gen. XLV.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 211. Gen. LII.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 413. Gen. XXXV.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. III. p. 1. Gen. XXIII.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 409.
Klein, av. p. 126. Trib. III. A.
Briſſon, ornith. II. p. 300. Gen. LXXIX. Platea.
Batſch, Thiere, I. p. 385. Gen. XCIV.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 667. Gen. LXIV.
Onomat. hiſt. nat. VI. p. 561.
Neuer Schauplatz der Natur, V. p. 185.
Hermann, tab. affin. anim. p. 135.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 257. Gen. XLII.

1. Leucordia. *Die Löffelgans.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 361. n. 1. *der weiße Löffler.* Tab. 23. fig. 2.
Leske, Naturgeſch. p. 281. n. 1. *der weiße Löffelreiher.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 68. n. 1. *der weiße Löffelreiher.* Tab. 45.
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 211. n. 1. Platalea (Leucordia) corpore albo, gula nigra, occipite ſubcriſtato; *die Löffelgans.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 413. *der weiße Löffelreiher.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 2. *der weiße Löffelreiher.* p. 4. *Löffelgans, Spatelgans, Löffler, Pelikan.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 326. *die Löffelgans.*
Ebert, Naturl. II. p. 82. *die Löffelgans.*
Halle, Vögel, p. 535. n. 635. *der weiße Löffelreiher, Pelikan.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 180. n. 168. *die Löffelgans.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 410. A. *der weiße Löffelreiher.*
Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 798. *der weiße Löffelreiher.*
Klein, av. p. 126. n. 1. Platea, Leucordia.
Klein, Vorbereit. p. 233. n. 1. *Löffelgans.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 132. n. 1. *weißer Löffler.*

Klein,

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 4.
Gesner, Vögelb. p. 364. *Löffler*, *Löffelganß*, *Leffler*, *Lepler*, *Schufler*. Fig. p. 365.
Briſſon, ornitholog. II. p. 300. n. 1. Spatule.
Batſch, Thiere, I. p. 388. *der weiße Löffelreiher.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 667. n. 1. Platalea (Leucordia) corpore albo, gula nigra occipite ſubcriſtato.
Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 344. n. 101. *der weiße Löffler.*
Fiſcher, Naturgeſch. von Livl. p. 84. n. 97. *Löffelgans.*
Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 370. 315. *Löffelreiger.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 13. *Löffelreiger.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. H. Edit. in 4. p. 402. *der Pelican.* Tab. 41. *Löffelgans.*
Friſch, Vögel, Tab. 200. *der Löffelreiger mit hubbrigem Schnabel.* (das Männchen.)
Friſch, Vögel, Tab. 201. *der Löffelreiher mit glattem Schnabel.* (das Weibchen.)
Scopoli Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 95. n. 115. *die weiß roſenfarbene Löffelganß.*
Naturforſcher, XIII. p. 201. n. 101. *der weiße Löffler.*
Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgeſch. II. p. 193. anatom. Beſchreibung von vier Palletten, Löffel- oder Spatelgänſen. Tab. 65. *die Spatelgans.* Tab. 66. die Zergliederung.
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 126. n. 1. *der Löffelreiher.*
Linné, Syſt. Natur. Edit. II. p. 48. Platea.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 1. Platea.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 139. n. 1. Platalea (Leucordia) corpore albo.

Müller,

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 172. Platalea (Leucordia) corpore albo, gula nigra, capite subcristato.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 341. Platea; *Löffel-Ganß, Löffler, Pelecan.*

Charleton, onomast. zoic. p. 103. n. 2. Ardea alba, Cochlearia, Plateola.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 135. Pl. Leucordia.

Albert. Magn. de anim. L. 23. c. de Aedra.

Cicero, de nat. Deor. L. 2. Sect. 49. Platalea.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 40. Platalea.

Aristot. de nat. anim. L. 9. c. 10. Πελεκανες.

Aelian. hist. anim. L. 2. c. 20. Πελεκανες.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 287. n. 1. *die Löffelgans.*

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 668. n. 1. β.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 33. *der fast ganz weiße Löffler, mit gelben ins rothe fallenden Füßen.*

γ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 668. n. 1. γ.

Sonnerat, a. a. O. *der ganz weiße Löffler, mit einer Haube auf dem Kopfe, und hellrothen und blassen Füßen.*

2. AJAJA. *Der rothe Löffelreiher.*

Müller, Natursyst. II. p. 362. n. 2. *der rothe brasilianische Löffler.* Tab. 14 fig. 2.

Leske, Naturgesch. II. p. 281. n. 2. *der rothe Löffelreiher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 69. n. 3. *der rothe brasilianische Leffler, der Karminpelekan.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 562. *der rothe brasilianische Löffler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 409. *der rothe Löffelreiher.*

Klein,

Klein, av. p. 126. n. 2. Platea Brasiliensis, Ajaja dicta, *Colherado* Lusit.

Klein, Vorber. p. 233. n. 2. *rosenfarbener Löffler.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 132. n. 2. *rosenfarbener Löffler.*

Brisson, ornith. II. p. 302. n. 2. Spatule couleur de Rose.

Batsch, Thiere, I. p. 388. *der rothe brasilianische Löffler.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 668. n. 2. Platalea (Ajaja) corpore roseo, tectricibus caudae coccineis, rectricibus roseis.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 102. *die gujanische Löffelgans.*

Fermin, Surinam, II. p. 132. *der Löffler.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 2. Platalea (Ajaja) corpore sanguineo.

Barrere, av. p. 135. Ardea rosea Spatula dicta.

Jonston, av. p. 198. Ajaja. p. 213. Ayaya.

β. *Halle*, Vögel, p. 536. n. 636. *der Karminpelekan mit schwarzem Halsringe.*

Klein, av. p. 126. n. 3. Platea sanguinea tota. Tlauquechul.

Klein, Vorbereit. p. 233. n. 3. *ganz blutrothe Löffler.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 133. n. 3. *hochrother Löffler.*

Brisson, ornitholog. II. p. 303. n. 3. Spatule rouge. (7)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 668. n. 2. β. Pl. corpore sanguineo, collo candido, torque nigro, rectricibus coccineis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 140. n. 2. β. Tlauhquechul, s. Platea mexicana.

Charle-

(7) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

Charleton, onomast. zoic. p. 116. n. 2. Tlauquechul.

Jonston, av. p. 182. Tlauhquechul.

8. Pygmaea. *Der Zwerglöffelreiher.*

Müller, Naturs. II. p. 363. n. 3. *der Zwerglöffler.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 669. n. 3. Platalea (Pygmaea) corpore supra fusco, subtus albo.

Onomat. hist. natur. VI. p. 563. *der Zwerglöffler.*

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 103. *die oben braune und unten weiße Platalea.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 3. Platalea (Pygmaea) corpore supra fusco, subtus albo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 135. Platalea Pygmea.

81. GESCHLECHT. Palamedea. *Der Anhima.*

Müller, Natursyst. II. p. 364. Gen. LXXXI.

Leske, Naturgesch. p. 278. Gen. LIX.

Borowsky, Thierreich, III. p. 69. Gen. XLVI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 211. Gen. LIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 414. Gen. XXXVI.

Onomat. hist. nat. VI. p. 1.

Brisson, ornith. II. p. 348. Gen. LXXXV. Cariama. p. 349. Gen. LXXXVI. Anhima.

Latham, Syst. ornith. II. p. 669. Gen. LXV.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 136. 169.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 288. Gen. XLIII.

1. Cornuta. *Der Anhima.*

Müller, Naturs. II. p. 364. n. 1. *der Hornträger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 69. *der Hornträger, Anhima.*

Blumen-

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 211. n. 1. Palamedea (Cornuta) alulis bispinosis, fronteque cornuta.

Bechstein, Naturgesch. I. p 414. *der Hornträger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 180. *der Hornträger.*

Halle, Vögel, p. 523. n. 610. *der graue braun gewässerte Kranich, über dem Schnabel und an den Flügeln gehörnt.*

Onomat. hist. nat. I. p. 446. *der Anhimavogel.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 346. *der Kamichy.*

Brisson, ornithol. II. p. 349. n. 1. *Kamichy.*

Batsch, Thiere, I. p. 396. *der brasilian. Kranich.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 669. n. 1. Palamedea (Cornuta) alulis bispinosis, fronteque cornuta.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 122. *der gehörnte Wasserträger.*

Samml. zur Phys. und Naturgesch. II. p. 614. *Camoucle, Kamichi.*

Eberhard, Thiergeschichte, p. 102. *der gehörnte amerikanische Adler.*

Goeze, Natur, Menschenl. und Vors. V. p. 346. *der Camoucle.*

Moehring, av. gen. p. 84. n. 111. Palamedaea.

Jonston, av. p. 209. Anhima Brasiliensibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 136. Palamedea cornuta.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 281. *der Hornträger.*

2. CRISTATA. *Der Cariama.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 365. n. 2. *der Bastard-Kranich.*

Halle,

(8) Aus diesem hat *Brisson* ein eignes Geschlecht gemacht, weil ihm die Flügelstacheln und das Horn an der Stirne fehlen.

Halle, Vögel, p. 523. n. 609. *der graue braun gewässerte Kranich, mit dem Federbusche über dem Schnabel.*

Brisson, ornithol. II. p. 348. n. 1. Cariama.

Latham, Syst. ornith. II. p. 669. n. 1. Palamedea (Cristata) inermis, fronte cristata.

Onomat. histor. nat. II. p. 646. *der brasilianische Kranich.*

Jonston, av. p. 197. Cariama.

82. GESCHLECHT. Mycteria. *Der Jabiru.* (Kahlkopf.)

Müller, Natursyst. II. p. 366. Gen. LXXXII.

Leske, Naturgesch. p. 278. Gen. LX.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 211. Gen. LIV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 180. Gen. XLIV.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 670. Gen. LXVI.

Donndorff, Handb. der Thiergeschichte, p. 288. Gen. XIV.

1. Americana. *Der amerikanische Jabiru.*

Müller, Natursystem, II. p. 366. *der brasilianische Reiher.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 80. n. 3. *der brasilianische Storch.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 211. n. 1. Myćteria Americana.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 180. *der Jabiru.*

Halle, Vögel, p. 522. n. 607. *der weiße nackte Kranich.*

Halle, Vögel, p. 522. n. 608. *der weiße Helmkranich.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. V. p. 401. *der Kahlkopf, brasilianische Reiher, Nhanduapoa.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 670. n. 1. Mycteria (Americana) alba, remigibus rectricibusque nigro-purpurascentibus.

Brisson, ornith. II. p. 306. n. 4. Cigogne du Brésil.

Batsch, Thiere, p. 392. *der brasilianische Storch.*

Samml. z. Phys. u. Naturg. II. p. 613. Touioucou.

Neueste Mannichfalt. II. p. 124. *Jabiru.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 1. Mycteria americana.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 133. Mycteria.

Jonston, av. p. 195. *Jabiru guacu* Petiguaribus; *Nhanduapoa* Tupinambis; Belgis *Deurvogel.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 288. *der Kahlkopf.*

β. *Müller,* Natursystem, II. p. 367. *Auarou?*

Onomat. hist. nat. VII. p. 402. *Avarou?*

Brisson, ornithol. II. p. 307. n. 5. Cigogne de la Guiane.

Jonston, av. p. 195. *Jabiru* Brasiliensibus; Belgis vulgo *Negro.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Brissons Ciconia Guianensis, den dieser als eine eigne Gattung ansieht, ist als Varietät von seinem *Ciconia Brasiliensis* angenommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der asiatische Jabiru.*

Latham, Syn. Suppl. p. 231. Indian Jabiru.

Latham, Syst. ornith. II. p. 670. n. 2. Mycteria (Asiatica) alba, fascia per oculos, dorso infimo, remigibus rectricibusque nigris.

83. GESCHLECHT. CANCROMA. *Der Hohlschnabel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 361. Gen. LXXXIII.
Borowſky, Thierreich, III. p. 105. Gen. LVI.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 212. Gen. LV.
Briſſon, ornitholog. II. p. 344. Gen. LXXXIII. Cochlearius.
Batſch, Thiere, I. p. 401.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 671. Gen. LXVII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 134.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 289. Gen. XLV.

1. COCHLEARIA. *Der Löffelſchnabel.*

Müller, Naturſ. II. p. 368. n. 1. *der Löffelſchnabel.*
Borowſky, Thierreich, III. p. 106. n. 2. *der Löffelſchnabel.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 212. n. 1. Cancroma (Cochlearia) ventre rufeſcente.
Briſſon, ornitholog. II. p. 344. n. 1. Cuilliere.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 671. n. 1. Cancroma (Cochlearia) criſtata cineraſcens, ventre rufo, vertice lunulaque cervicis nigra.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 298. n. 1. *der Löffelſchnabel.*

β. *Müller*, Naturſyſt. II. p. 368. *Arapapa.*
Briſſon, ornith. II. p. 345. A. Cuilliere tachetée.
Latham, Syn. III. 1. p. 27. Spotted Boat-bill.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 671. n. 1. β.

2. CANCROPHAGA. *Die Tamatia.*(9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 368. n. 2. *Krebsfreſſer.* Tab. 23. fig. 4.

Borowsky,

(9) Nach *Latham* eine Varietät oder das Weibchen von *Cancroma Cochlearia.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 105. n. 1. *der Krebsfresser.* Tab 56.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 183. *der Krebsfresser.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 424. Tamatia.

Brisson, ornith. II. p. 345. n. 2 Cuilliere brune.

Latham, Syn. III. 1. p. 28. Brown Boat-bill.

Latham, Syst. ornith. II. p. 671. n. 1. γ C. cristata rufo-fusca, abdomine albido, vertice nigro.

Jonston, av. p. 203. Tamatia.

Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Bey der 1sten Gattung ist die Var. β aus *Brisson* hinzugekommen.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

SCOPUS. *Der Schattenvogel.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 183. Gen. LIX.

Brisson, ornith. II. p. 343. Gen. LXXXII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 672 Gen. LXVIII.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 289. Gen. XLVI.

1. UMBRETTA. *Die Umbrette.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 184. *die Umbrette.*

Brisson, ornith. II. p. 343. n. 1. Ombrette.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 672. n. 1. Scopus Umbretta.

Eberhard, Thiergesch. p. 101. *der senegalische Scopus.*

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 289. *Ombrette.*

84. GESCHLECHT. ARDEA. *Der Reiher.*(10)

Müller, Naturſyſt. II. p. 369. Gen. LXXXIV.
Leske, Naturgeſch. p. 279. Gen. LXIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 73. Gen. XLVIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 212. Gen. LVI.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 416. Gen. XXXVIII. p. 419. Gen. XXXIX. p. 420. Gen. XL.
Bechſtein, Naturg. Deutſchl. III. p. 5. Gen. XXIV. p. 46. Gen. XXV. p. 59. Gen. XXVI.
Ebert, Naturl. II. p. 83 ff.
Halle, Vögel, p. 517. 524. 533.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 410.
Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 740. VII. p. 81. VIII. p. 623.
Onomat. hiſtor. nat. I. p. 684. IV. p. 48.
Klein, av. p. 121. Gen. XVIII. p. 122. 125. Gen. XIX. Trib. 1. 2.
Briſſon, ornitholog. II. p. 304. Gen. LXXX. Ciconia. p. 312. Gen. LXXXI. Ardea. p. 346. Gen. LXXXIV. Balearica.
Batſch, Thiere, I. p. 386. Gen. XCVII.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 672. Gen. LXIX.
Hermann, tab. affinit. anim. p. 132 ſqq.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 289. Gen. XLVII.

* *Mit Federbüſchen auf dem Kopfe: Der Schnabel iſt nicht länger als der Kopf.*

1. PAVONIA. *Der Pfauenreiher.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 370. n. 1. *der Pfauenreiher.* Tab. 14. fig. 3.

Leske,

(10) *Briſſon* und einige neuere machen aus dem *Reiher, Kranich* und *Storch* drey verſchiedene Geſchlechter.

Leske, Naturgesch. p. 279. n. 1. *der Pfauenreiher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 73. n. 1. *der Pfauenreiher.* Tab. 48.

Ebert, Naturl. II. p. 85. *der gekrönte kapsche Kranich, Akkaviak.* Tab. 28. fig. 1.

Halle, Vögel, p. 518. n. 601. *der weiße kurzschnäblige Kranich, mit trichterförmigem Federbusche, Wasserpfau, Diademkranich.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 187. n. 175. *der balearische Kranich, Pfauenreiher, Seepfau, Königsvogel.*

Klein, av. p. 121. n. 3. Grus Balearica.

Klein, Vorbereit. p. 224. n. 3. *Kranich von den balearischen Inseln.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 126. n. 1. *Akkaviak.*

Brisson, ornith. II. p. 346. n. 1. Oiseau royal.

Batsch, Thiere, I. p. 391. *der Pfauenreiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 672. n. 1. Ardea (Pavonia) caerulescens, crista setosa erecta, temporibus palearibusque binis nudis.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 87. *der gekrönte afrikanische Kranich.*

Frisch, Vögel, Tab. 195. *der afrikanische oder barbarische gekrönte Kranich.*

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 355. anatomische Beschreib. zweyer Königsvögel. Tab. 87. *der Königsvogel.* Tab. 88. die Zergliederung.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 141. n. 1. Ardea (Pavonia) crista setosa erecta, temporibus palearibusque binis nudis.

Charleton, onomast. zoic. p. 110. n. 1. Grus Balearica.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 3. Pavo Chinensis sine cauda.

Moehring, av. gen. p. 72. n. 83. Ciconia.
Jonston, av. p. 168. Tab. 54. Grus Balearica.
Hermann, tab. aff. anim. p. 133. Ardea pavonica.
Gentl. Magaz. XX. Tab. p. 264. Crowned Heron.
Plin. hiſt. nat. L. 2. c. 37. Grus balearica.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 290. n. 1. *der Pfauenreiher.*

2. VIRGO. *Die numidiſche Jungfer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 371. n. 2. *die numidiſche Jungfer.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 84. *die numidiſche Jungfer, der Gaukler.*
Ebert, Naturl. II. p. 86. *das Fräulein von Numidien.*
Halle, Vögel, p. 521. n. 605. *der Opernkranich, Operette.* Fig. 43.
Halle, Vögel, p. 521. n. 606. *der Opernkranich, Gaukler.*
Onomatol. hiſt. nat. IV. p. 54. *das Fräulein aus Numidien.*
Klein, av. p. 121. n. 6. Grus Numidiae.
Klein, Vorbereit. p. 225. n. 6. *Fräulein von Numidien.*
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 127. n. 7. *Fräulein aus Numidien.*
Briſſon, ornith. II. p. 311. n. 12. Grue de Numidie, appellée vulgairement Demoiſelle de Numidie.
Batſch, Thiere, I. p. 393. *die numidiſche Jungfer.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 673. n. 2. Ardea (Virgo) ſuperciliis albis, poſtice retrorſumque longe criſtatis.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 29. *die Jungfer von Numidien.*

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. III. p. 14. *die numidiſche Jungfer.*

Schneider, zool. Abhandl. p. 141. *die numidiſche Jungfer.*

Allg. Reiſ. III. p. 332. Tab. 13. fig. 3. *der afrikaniſche oder guineiſche Pfau, Kaiſervogel, numidiſche Jungfer.*

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 141. n. 2. Ardea (Virgo) ſuperciliis albis, retrorſum longe criſtatis.

Moehring, av. gen. p. 73. n. 84. Scops.

Forſkål, deſcr. anim. p. 9. n. 4. *Kurki?*

Philoſ. Transact. LVI. p. 210. Tab. 11. p. 215.

** *Kraniche, mit kahlem Kopfe.*

3. CANADENSIS. *Der canadiſche Kranich.* (¹)

Müller, Naturſyſt. II. p. 371. n. 3. *der canadiſche Kranich.*

Halle, Vögel, p. 520. n. 604. *der große aſchfarbene Kranich.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 411. n. 257. *der braune Reiher.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 127. n. 5. *braunbunter Kranich.*

Briſſon, ornith. II. p. 310. n. 11. Grue de la Baye de Hudſon.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 675. n. 7. Ardea (Canadenſis) ſincipite nudo papilloſo, corpore cinereo, alis extus teſtaceis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 28. *der braune und aſchfarbene Kranich.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 290. n. 2. *der braune Reiher.*

(¹) Flügelweite 3 Fuſs 5 Zoll. Gewicht 7 1/2 Pfund. *Penn.*

4. GRUS. *Der gemeine Kranich.* (2)

Müller, Naturſyſt. II. p. 372. n. 4. *der gemeine Kranich.*

Leske, Naturgeſch. VI. p. 279. n. 2. *der Kranich.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 82. n. 2. *der gemeine Kranich.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 212. n. 1. Ardea (Grus) occipite nudo papilloſo; corpore cinereo, alis extus teſtaceis; *der Kranich.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 421. n. 1. *der gemeine Kranich.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 60. n. 1. *der gemeine Kranich.* p. 70. *Kranig, Kranch, Scherian.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 240. *der Kranich.*

Ebert, Naturl. II. p. 83. *der gemeine Kranich.*

Halle, Vögel, p. 517. n. 599. *der ſchwarzgraue gemeine Kranich.*

Meyer, Thiere, I. Tab. 64.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 188. n. 175. *der Kranich.*

Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 48. *der ſchwarzgraue gemeine Kranich.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 341. *der Kranich.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 109. *der Kranich.*

Klein, av. p. 121. n. 1. Grus noſtras. Avis Palamedis.

Klein, Vorbereit. p. 224. n. 1. *grauer Kranich.*

Klein,

(2) Die Länge dieſes Vogels wird von den Ornithologen gar verſchieden angegeben. *Pennant* beſtimmt ſie auf 6 Fuſs. *Gmelin* nimmt 5 Fuſs an. *Briſſon* 3 1/2 Fuſs, Flügelweite 5 2/3 Fuſs. *Borowsky* und *Bechſtein* 3 1/2 Fuſs u. ſ. w. Das Gewicht iſt, nach *Pennant*, 10 Pfund. Die Eyer ſind von der Gröſse der Schwaneneyer.

Klein, verb. Vögelhist. p. 126. n. 1. *grauer Kranich.*
Klein, Vögeleyer, p. 23. Tab. 17. fig. 1.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 422. A. *der gemeine Kranich.*
Siemssen, meklenb. Vögel. p. 157. n. 1. *der Kranich, Kroon.*
Gesner, Vögelb. p. 349. *Kranich, Kran, Kranch, Krye.* Fig. p. 350.
Brisson, ornith. II. p. 307. n. 6. Grue.
Batsch, Thiere, I. p. 392. *der gemeine Kranich.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 674. n. 5. Ardea (Grus) occipite nudo papilloso, pileo remigibusque nigris, corpore cinereo, tectricibus intimis laceris.
Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 57. n. 110. *der gemeine Kranich.*
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 345. n. 102. *der gemeine Kranich.*
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 270. *der Kranich.*
Fischer, Naturg. v. Livl. p. 84. n. 98. *Kranich.*
Taube, Slavon. u. Syrmien, I. p. 23. *Kraniche.*
Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, II. p. 5. *Kraniche.*
Pallas, Reis. Ausz. I. p. 357. *der Kranich.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 15. IV. p. 22. *Kraniche.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. p. 401. *die Kraniche.*
Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 170. n. 1. *Trane.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 101. n. 122. *der Kranich.*
Rytschkow, orenb. Topogr. p. 243. *Kraniche*
Linné, auserles. Abh. II. p. 282. n. 30. p. 285. n. 50. *der Kranich.*

Zorn, Petinoth. I. p. 432. II. p. 512. *der Kranich.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 45. *der Kranich.*
Naumann, Vogelſteller, p. 175. *der Kranich.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 371. *Kranich.*
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 131. n. 9. *der Kranich.*
Goeze, nützl. All. II. p. 217. n. 23. *der Kranich.*
Oekon. Zool. p. 76. n. 17. *der gemeine Kranich.*
Schneider, zool. Abh. p. 137. 143. *der Kranich.*
Frideric. II. Imp. de art. venand. c. avib. p. 88. Grues.
Naturf. XIII. p. 202. n. 102. *der gemeine Kranich.*
Helwing, Lithograph. Angerb. I. p. 6.
Meidinger, Vorleſ. I. p. 135. n. 1. *der Kranich.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 100. *der Kranich.*
Stralſund. Magazin, I. p. 157. *Kranich.*
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 550. *Kranich.*
Krünitz, Encyklop. Art. *Kranich.*
Loniceri, Kräuterb. p. 665. *Kranich.*
Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 98.
Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1505.
Hübner, Handlungslex. p. 1018.
Lemmery, Materiallex. p. 504.
Hamburg. Magaz. VI. p. 594.
Wittenb. Wochenbl. XIII. p. 305. (Beſchaffenheit der Luftröhre.)
Beckmann, Naturhiſt. p. 46. d. *der Kranich.*
Merklein, Thierreich, p. 300. *Kranich.*
Kraft, Ausrott. grauſ. Thiere, I. p. 233. 251. 533. *Kranich.*
Bartholin. Gruis anatome; in *hiſt. anat.* Cent. IV. hiſt. 12. p. 231.
Hartmann. anatome Gruis pinguedine ſuffocatae. Eph. Nat. Curioſ. Dec. II. an. 7. obſ. 33. p. 71. cum fig.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Grus.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 1. Grus.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 141. n. 4. Ardea (Grus) vertice nudo papilloso, fronte, remigibus occipiteque nigris, corpore cinereo.
Linné, fn. Suec. I. n. 131. Ardea vertice papilloso.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 137. Ardea (Grus) occipite nudo papilloso, pileo remigibusque nigris, corpore cinereo, tectricibus intimis laceris.
Schwenkfeld, av. Sil. p. 284. Grus; *Kranich*, *Kran.*
Charleton, onomast. zoic. p. 110. n. 1. Grus.
Moehring, av. gen. p. 71. n. 79. Grus.
Jonston, av. p. 166. Grus.
Hermann, tab. affinit. anim. p. 134. Ardea Grus.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 23. L. 31. c. 16. Grues.
Hesiod. oper. et d. v. 446. Γεϱανος.
Aristot. histor. anim. L. 9. c. 14. n. 148. c. 18. n. 165. Γεϱανοι.
Aelian. hist. anim. L. 3. c. 13. Γεϱανος.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 290. n. 3. *der Kranich.*

β. Grus japonensis. *Der japanische Kranich.* (3)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 110. n. 6. c. *der japanische Kranich.*
Klein, av. p. 121. n. 4. Grus Japponensis. (Mit *Ardea Americana* verwechselt.)
Klein, Vorbereit. p. 225. n. 4. *weißer Krahn aus Japon.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 127. n. 4. *weißer Kranich.*
Brisson, ornith. II. p. 309. n. 9. Grue du Japon.
Latham, Syn. III. 1. p. 42. Japan Crane.

Latham,

(3) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 675. n. 5. β. Ardea occipite nudo papilloso rubro, corpore albo, collo inferiore remigibusque nigris.
Allgem. Reis. XIII. p. 692. *der Tsuri.*
Berlin. Samml. X. p. 152. *der Tsuri.*
Kämpfer, Japan; in *du Halde* Chin. IV. p. 140. *der Tsuri oder Kranich.*
Charleton, onomast. zoic. p. 110. n. 2. Grus Japponensis.
Jonston, av. p. 168. Grus Japponensis.

5. AMERICANA. *Der Keichreiher.*
Müller, Natursyst. II. p. 373. n. 5. *der americanische Kranich.*
[*Halle*, Vögel, p. 520. n. 603. *der weiße Kranich.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 127. n. 4.]
Mit der vorhergehenden Var. β verwechselt.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 410. n. 256. *der Keichreiher.*
Brisson, ornith. II. p. 309. n. 10. Grue d'Amerique.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 675. n. 6. Ardea (Americana) vertice, nucha temporibusque nudis papillosis, fronte, nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo.
Seligmann, Vögel, III. Tab. 50. *der weiße amerikanische Kranich.*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 142. n. 5. Ardea (Americana) vertice temporibusque nudis papillosis, fronte, nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 291. n. 4. *der Keichreiher.*

6. ANTIGONE. *Der ostindische Kranich.*
Müller, Natursf. II. p. 374. n. 6. *der ostind. Kranich.*

Klein,

Klein, av. p. 121. n. 5. Grus indica maior.
Klein, Vorbereit. p. 225. n. 5. *graue Indianer.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 127. n. 6. *grauer Indianer.*
Briſſon, ornith. II. p. 308. n. 7. Grue des Indes orientales.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 674. n. 4. Ardea (Antigone) capite nudo collarique papilloſo rubris, corpore cinereo, remigibus primoribus nigris.
Seligmann, Vögel, II. Tab. 89. *der groſſe indianiſche Kranich.*
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 142. n. 6. Ardea (Antigone) capite nudo collarique papilloſo, corpore cinereo, remigibus nigris.

11. GIGANTEA. *Der ſibiriſche Kranich.*
Müller, Naturſyſt. Supplem. p. 109. n. 6. a. *der weiſſe Kranich.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 424. B. *der ſibiriſche Kranich.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 674. n. 3. Ardea (Gigantea) nivea, orbitis nudis, remigibus decem primoribus nigris, roſtro pedibusque rubris.
Pallas, Reiſ. Ausz. II. Anh. p. 16. n. 30. *Grus Leucogeranos.* Tab. I.
Pallas, Reiſ. Ausz. II. p. 309. III. p. 474. *der weiſſe Kranich.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 10. IV. p. 10. *der groſſe weiſſe Storch.*
Lichtenberg u. *Voigt*, Magaz. f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 1. p. 105. *die groſſen weiſſen Störche.*
Hermann, tab. aff. anim. p. 132. Grus Leucogeranos.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 291. n. 5. *der ſibiriſche Kranich.*

**** Störche,*

**** Störche mit nackten Augenkreisen.*

7\. CICONIA. *Der gemeine Storch.*

Müller, Natursystem, II. p. 374. n. 7. *der weiße Storch.* Tab. 23. fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 280. n. 3. *der Storch.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 78. n. 1. *der weiße Storch.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 212. n. 2. Ardea (Ciconia) alba, orbitis nudis remigibusque nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis; *der Storch, Hennotter, Aehbähr.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 419. n. 1. *der weiße Storch.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 48. n. 1. *der weiße Storch.* p. 56. *gemeiner Storch, Stork, Adebar, Ebeher, Ebiger, Odoboer, Hennotter, Aehbähr.*

Funke, Naturgesch. I. p. 241. *der Storch.*

Ebert, Naturl. II. p. 87. *der Storch.*

Halle, Vögel, p. 533. n. 632. *der weiße Storch.* Fig. 47.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 190. n. 177. *der Storch.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 424. C. *der weiße Storch.*

Beckmann, Naturhist. p. 46. c. *der Storch.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 625. *der gemeine Storch.*

Onomat. hist. nat. I. p. 688. *der Storch.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 336. *der Storch.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 109. *der Storch.*

Klein, av. p. 125. n. 1. Ciconia alba.

Klein, Vorber. p. 232. n. 1. *bunte, weiße, gemeine Storch.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 131. n. 1. *weißer Storch.*

Klein,

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 17. fig. 2.
Gesner, Vögelb. p. 487. *Storck*. Fig. p. 488. gut.
Brisson, ornith. II. p. 305. n. 2. Cigogne blanche.
Batsch, Thiere, I. p. 391. *der weiße Storch.*
Latham, Syn. Suppl. p. 234. White Stork.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 676. n. 9. Ardea (Ciconia) alba, orbitis nudis remigibusque nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis.
Frisch, Vögel, Tab. 196. *der Storch.*
Beseke, Vögel Kurlands, p. 57. n. 111. *der weisse Storch.*
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 346. n. 103. *der bunte oder weiße Storch.*
Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 84. n. 99. *Storch.*
Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 274. *die Störche.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 158. n. 2. *der Storch, Adebaar, Langbeen.*
Taube, Slavon. und Syrm. I. p. 23. *Störche.*
Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. *Störche.*
Pallas, Reise, Ausz. I. p. 98. *Störche.*
Rytschkow, orenburg. Topogr. p. 241. *Aist oder Sterch?*
Kämpfer, Japan, p. 141. *die Störche.*
De la Porte, Reis. I. p. 166. *Storch.*
Shaw, Reis. p. 353. *der Storch.*
Wolf, Reis. n. Zeil. p. 135. *der Storch.*
Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 2. *Stork.*
Pontoppidan, Norwegen, II. p. 186. *Stork.*
Allgem. Reis. VII. p. 79. XI. p. 692. *Störche.*
Döbel, Jägerpraktik, I. p. 70. *der Storch.*
Perrault, Charras u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 237. anatomische Beschreib. zweyer Störche. Tab. 73. *der Storch.* Tab. 74. die Zergliederung.

Naumann,

Naumann, Vogelſteller, p. 200. *der Storch.*
Linné, auserl. Abh. II. p. 295. n. 87. *der Storch. Reiger.*
Scopoli Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 102. n. 123. *der Storch.*
Naturf. VII. p. 38. *der weiße Storch.*
Naturf. XIII. p. 203. n. 103. *der weiße Storch.*
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 1. p. 106. *der gemeine Storch.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 14. 67. 416. 488. 550. 686. 711. *der Storch.*
Stralſund. Magazin, I. p. 157. *der Storch.*
Loniceri, Kräuterb. p. 666. *Stork*, *Ebiger.*
Anweiſung Vögel zu fangen, u. ſ. w. p. 554. *der Storch.*
Oekon. Zool. p. 77. n. 18. *der Storch.*
Jablonſky, allgem. Lex. p. 1146. *Storch.*
Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 101.
Geoffroy, mat. med. VII. p. 358. *der Storch.*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 218. n. 24. *der Storch.*
Lemmery, Materiallex. p. 308.
Meidinger, Vorleſung. I. p. 155. n. 2. *der Storch.*
Merklein, Thierreich, p. 369. *Storch.*
Kraft, Ausrott. grauſ. Th. I. p. 285. 530. *Storch.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 99. *der gemeine Storch.*
Aldrov. encom. Cicon. in *Donav.* Amphith. I. p. 448.
Schollii orat. de laude Ciconiae; in Ej. prax. Rhetor. Fref. 1607. 8. p. 144.
Schwalbach, diſſ. de Ciconiis, gruibus et hirundinibus, eorumque hybernaculis. Spir. 1630. 4.
Heinſii diſſ. de pia ave, Ciconia. Witt. 1637. 4.
Schoockii tract. de Ciconiis. Gröning. 1620. 12. Amſt. 1661. 12. (Edit. emend.)
Morhof, Carmen in Ciconiam. 1667. 4.

Lettaw,

Lettaw, diss. de Ciconiis, earumque proprietatibus. Freib. 1679. 4.
Straussii diss. de Ciconia. Giess. 1679. 4.
Camerar. Ciconiarum admiranda natura, bonitas et praestantia; in Syst. memorab. Cent. VII. P. 64. p. 475.
Naturgesch. des Storchs. Frankf. Beytr. 1780. St. 19.
Müller, Bemerk. vom Storche. *Mylii* phys. Belust. St. 18. p. 538.
Paullini de grata Ciconiae pietate. Eph. Natur. Cur. Dec. II. an. 4. p. 213.
Schulze, de Ciconiae vindicta. ib. Dec. I. an. 6. et 7. obs. 166. p. 230.
Jacobaei anatome Ciconiae. Act. Hafniens. V. p. 247. *Mangeti* Bibl. Tom. II. P. I. p. 8.
Schellhammer, Ciconiae anatome. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obs. 109. p. 206.
Limprecht, Ciconiae anatome. ibid. Cent. VI. obs. 18. p. 209.
Fog, diss. de Ciconiarum hybernaculis. Hafn. 1692. 4.
Von der Wiederkunft der *Störche* und Schwalben. Bressl. Nat. u. Kunstgesch. 7. Vers. p. 321. 8. Vers. p. 457. 19. Vers. p. 283. 28. Vers. p. 409.
Neu Hamburg. Magaz. St. 81. p. 195.
Mannichfaltigk. I. p. 621.
Beckmann, physik. ökon. Bibl. I. p. 339.
Böhmer, syst. litter. Handb. II. 1. p. 521.
Sturm, disput. de agricolarum regulis, p. 8.
Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 53. Ciconia.
Linné, Syst. N. Ed. VI. p. 25. n. 6. Ciconia alba.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 142. n. 7. Ardea (Ciconia) alba, remigibus nigris, cute sanguinea.

Müller, zool. dan. prodr. p. 22. n. 174. Ardea (Ciconia) alba, orbitis nudis remigibusque nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis.

Kramer, Austr. p. 348. n. 12. Ardea alba remigibus nigris.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 234. Ciconia; *Storch, Stork, Ebinger.*

Charleton, onomast. zoic. p. 102. n. 1. Ciconia.

Moehring, av. gen. p. 71. n. 81. Ardea.

Schäfer, element. ornith. Tab. 26.

Jonston, av. p. 147. Ciconia.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 23. Ciconia.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 20. n. 167. Πελαργος.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 292. n. 6. *der Storch.*

22. Maguari. *Der amerikanische Storch.*

Müller, Natursyst. II. p. 377. ad n. 8. *Maguari.*

Halle, Vögel, p. 534. n. 634. *der weiße Storch mit rother Haut um den Augen.*

Onomat. hist. nat. II. p. 858. *der amerikan. Storch.*

Klein, av. p. 125. n. 3. Ciconia Americana.

Klein, Vorber. p. 232. n. 3. *amerikanischer Storch.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 132. n. 3. *amerikanischer Storch.*

Brisson, ornitholog. II. p. 305. n. 3. Cigogne d'Amerique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 677. n. 10. Ardea (Maguari) alba, orbitis nudis coccineis, remigibus nigro-virescentibus, tectricibus caudae superioribus nigris.

Jonston, av. p. 198. Maguari.

8. Nigra. *Der schwarze Storch.*

Müller, Natursyst. II. p. 376. n. 8. *der schwarze Storch.*

Müller,

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 111. n. 8. *der braune Storch.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 79. n. 2. *der schwarze Storch.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 420. n. 2. *der schwarze Storch.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 56. n. 2. *der schwarze Storch.*

Halle, Vögel, p. 534. n. 633. *der schwarze Storch.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 191. n. 178. *der schwarze Storch.*

Pennant, arct. Zoöl. II. p. 426. D. *der schwarze Storch.*

Klein, av. p. 125. n. 2. Ciconia nigra.

Klein, Vorber. p. 232. n. 2. *schwarze Storch.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 132. n. 2. *schwarzer Storch.*

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 494. *schwarze Storck.* Fig. p. 495.

Brisson, ornith. II. p. 304. n. 1. Cigogne brune.

Batsch, Thiere, I. p. 392. *der schwarze Storch.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 677. n. 11. Ardea (Nigra) nigra, orbitis nudis, pectore abdomineque albo.

Frisch, Vögel, Tab. 197. *der schwarze Storch.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 57. n. 112. *der schwarze Storch.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 159. n. 3. *der schwarze Storch.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 85. n. 100. *schwarzer Reiher.*

Bock, Preussen, IV. p. 350. *der schwarze Storch.*

Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 283. *der schwarze Reiher?* Aghiron nero? Perdezornadas?

Rytſchkow, orenb. Topogr. p. 241. *Aiſt?*
Strahlenberg, Aſien, p. 421. *Störche.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 11. *der ſchwarze Storch, Aiſt.*
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 1. p. 106. *der ſchwarze Storch.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 103. n. 124. *der ſchwarze Reyher.*
Linné, auserleſ. Abh. II. p. 295. n. 88. *die ſchwarzen Reiger.*
Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 170. n. 3. *der ſchwarze Storch.*
Naturf. VII. p. 40. *ſchwarzer Storch.*
Naturf. XIII. p. 205. n. 104. *der ſchwarze Storch.*
Stralſund. Magazin, I. p. 157.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 25. n. 5. Ciconia nigra.
Müller, zool. dan. prodr. p. 22. n. 175. Ardea (Nigra) orbitis nudis, pectore abdomineque albo.
Kramer, Auſtr. p. 348. n. 11. Ardea nigra pectore abdomineque albo.
Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 236. Ciconia nigra.
Rzaczynsk. hiſtor. natur. Polon. p. 274. Ciconia nigra.
Muſ. Worm. p. 306. Ciconia nigra.
Jonſton, av. p. 147. Ciconia nigra.
Decouv. Ruſſ. II. p. 77.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 292. n. 7. *der ſchwarze Storch.*

**** *Reiher. Der mittlere Vorderzehe am innern Rande gezähnelt.*

27. DUBIA. *Der unbeſtimmte Reiher.*
Latham, Syn. Suppl. p. 232. Tab. 115.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 676. n. 8. Ardea (Argala) cinerea, capite, collo ſacculoque

que iugulari nudis, abdomine humerisque candidis.

28. TORQUATA. *Der braunrückige Reiher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 688. n. 42. Ardea (Torquata) occipite nigro cristato, dorso fusco, collo et abdomine sordide albis, pectore nigro, lunulis flavescentibus.

9. NYCTICORAX. *Der Nachtreiher.*
Müller, Natursyst. II. p. 371. n. 9. *der Quackreiher.* Tab. 15. fig. 1.
Borowsky, Thierreich, III. p. 74. n. 2. *der Schildreiher.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 417. n. 2. *der Nachtreiher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 37. n. 14. *der Nachtreiher.* p. 41. *Nachtrabe, Schildreiher, Quackreiher, bunter Reiher, Focke.* Tab. 3.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 708.
Ebert, Naturl. II. p. 89. *Quackreiher.*
Halle, Vögel, p. 528. n. 617. *der Nachtreiher.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 191. n. 179. *der bunte Reiher.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 420. n. 273. *der Nachtreiher.*
Neuer Schauplatz der Natur, VI. p. 15. *Nachtrabe.*
Onomat. hist. nat. V. p. 650. *der Nacht-Reiher.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 328. *der Nachtrab.*
Klein, av. p. 123. n. 5. Ardea varia.
Klein, Vorbereit. p. 228. n. 5. *bunter Reyger, Nachtram u. s. w.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 129. n. 7. *bunter Reyger, Focken.*
Klein, stemmat. av. p. 29. Tab. 31. fig. 1-4.

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 384. *Nachtram oder Nacht-rabe.* Abbild. mittelm.

Briſſon, ornithol. II. p. 341. n. 45. Bihoreau.

Batſch, Thiere, I. p. 391. *der Schildreiher.*

Latham, Syn. Suppl. p. 234. Night-Heron.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 678. n. 13. Ardea (Nycticorax) criſta occipitis tripenni alba horizontali, dorſo nigro, abdomine flaveſcente. (*Mas.*)

Friſch, Vögel, Tab. 203. *der aſchgraue Reiher mit drey Nackenfedern.*

Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 160. n. 4. *der Quackreiher.*

Götz, Naturgeſchichte einiger Vögel, p. 86. *der Quackreiher.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 351. n. 105. *der Nachtrabe.*

Cetti, Sardinien, II. p. 281. *der Schildreiher.*

Fiſcher, Livland, p. 85. n. 101. *Nachtrabe.*

Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſ. I. p. 309. *ſchwarze Reyher.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der türkiſche Reiger.*

S. G. Gmelin, Reiſ. I. p. 124.

Lapeirouſe: neue ſchwed. Abh. III. p. 105. Ardea nycticorax.

Naturf. XIII. p. 206. n. 105. *der Quackreiher.*

Naturf. XV. p. 261. *der Quackreiher.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 96. n. 116. *der Nachtreyher*, *Focke.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 129. n. 5. *der Nachtreiher.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 142. n. 9. Ardea (Nycticorax) criſta occipitis tripenni dependente, dorſo nigro, abdomine flaveſcente.

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Silef. p. 226. Ardea varia; *ein bundter Reger, Schild-Reger, Focker, Focke, Nachtram.*

Charleton, onomaft. zoic. p. 71. n. 9. Nycticorax.

Jonfton, av. p. 132. Nycticorax.

Hermann, tab. affin. anim. p. 135. A. Nycticorax.

Dec. Ruff. II. p. 77.

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 293. n. 8. *der Nachtreiher.*

b. GRISEA. *Der graue Reiher.* (4)

Müller, Naturfyftem, II. p. 386. n. 22. *der oftindifche Reiher.*

Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. III. p. 38. *der graue Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 317. n. 9. Heron gris.

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 678. n. 13. β. A. capite laevi fufco, corpore fufcefcente fubtus albo, remigibus primoribus apice macula alba. (*Femina.*)

Dec. Ruff. II. p. 146.

29. JAMAICENSIS. *Der jamaicaifche Reiher.* (5)

Latham, Syft. ornith. II. p. 679. n. 14. Ardea (Jamaicenfis) fubcriftata fufca, collo abdomineque

(4) In der XIIten Edition nahm Linné diefen Reiher mit *Briffon* als eine eigne Gattung an. *Briffon* befchreibt ihn umftändlich, ohne irgend ein Synonym anzuführen. *Gmelin* und *Latham* betrachten ihn als das Weibchen von *A. Nycticorax.* Wenn man aber erwägt was *Bechftein* a. a. O. p. 38, *S. G. Gmelin*, Reif. I. p. 114, und *Lapeiroufe*, neue fchwed. Abh. III. p. 105. darüber fagen, fo fcheint die Sache noch nicht fo ganz ausgemacht zu feyn.

(5) Nach *Latham* ift es noch ungewifs, ob diefe Gattung vom Weibchen der *A. Nycticorax* wirklich verfchieden fey.

que fuſco alboque ſtriatis, tectricibus alarum apice macula triangulari alba.

30. Caledonica. *Der neucaledoniſche Reiher.*(6)
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 679. n. 15. Ardea (Caledonica) fuſco-ferruginea, ſubtus superciliisque albis, vertice nigra, criſta occipitis tripenni alba.

31. Cayennensis. *Der cayenniſche Reiher.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 680. n. 17. Ardea (Cayanenſis) criſta ſexpenni, corpore caeruleo-cinereo, dorſo ſtriis nigris, capite nigro, pileo faſciaque ſuboculari albis.

10. Purpurea. *Der Purpurreiher.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 378. n. 10. *der Purpur-Reiher.* Tab. 15. fig. 2.
Borowſky, Thierreich, III. p. 74. n. 3. *der Purpurreiher.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 18. n. 3. *der Purpurreiher.* Tab. 2. p. 21. *Bergreiher.*
Briſſon, ornithol. II. p. 321. n. 14. Héron pourpré hupé.
Batſch, Thiere, I. p. 391. *der Purpurreiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 697. n. 72. Ardea (Purpurea) occipite nigro, criſta dependente, pennis duabus elongatis, corpore olivaceo, ſubtus purpuraſcente.
Lepechin, Tageb. d. ruſſ. R. I. p. 324. *purpurfarbener Reyher.*

b. Ardea caspia. *Der caſpiſche Reiher.*(7)
Latham, Syn. Suppl. p. 237. African Heron.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 698. n. 73. Ardea (Caſpica) criſtata, corpore cinereo, collo, pectore

(6) Nach *Latham* vielleicht eine Spielart von *A. Nycticorax.*
(7) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

ctore abdomineque ferrugineis, gula alba, collo lineis tribus nigris.

12. MAIOR. *Der große Reiher.* (8)

Müller, Naturf. II. p. 380. n. 12. *der blaue Reiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 15. n. 2. *der große Reiher.* Tab. I. ib. p. 707.

Halle, Vögel, p. 524. n. 611. *der graue Reiher mit dem Federbusche.* Fig. 44.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 413. n. 260. *der gemeine Reiher.*

Gesner, Vögelb. p. 443. *ein anderes Reigelgeschlecht.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 161. n. 5. *der Reiher, Schittreiher.*

Brisson, ornithol. II. p. 313. n. 2. Heron hupé.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 691. n. 54. Ardea (Cinerea) occipite crista nigra dependente, corpore cinereo, collo subtus linea fasciaque pectorali nigris. *(Mas.)*

Frisch, Vögel, Tab. 199. *der Reiger mit weisser Platte.*

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 207. *der graue europäische Reiher.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 98. n. 117. *der aschgraue Reyher.*

Zinnan. Uov. p. 113. Tab. 21. fig. 101. Garza cinerizia grossa.

b. CINEREA. *Der gemeine Reiher.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 378. n. 11. *der graue Reiher.* Tab. 23. fig. 6.

(8) S. die folgende Anmerkung.

(9) *Brisson, Linné* u. a. m. haben diesen Reiher als eine eigne Gattung aufgeführt. Neuere Ornithologen geben ihn für das Weibchen

Leske, Naturgeſchichte, p. 280. n. 4. *der graue Reiher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 75. n. 4. *der graue Reiher.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 212. n. 3. Ardea (Cinerea) occipite nigro laevi, dorſo caeruleſcente, ſubtus albido, pectore maculis oblongis nigris; *der graue Reiher, Fiſchreiher.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 416. n. 1. *der gemeine Reiher.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 5. n. 1. *der gemeine Reiher.* p. 13. *der Reiher, Reyer, Reiger, graue Reiher, groſse Kammreiher, Fiſchreiher.* it. p. 706.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 192. n. 180. *der Reiher* u. ſ. w.

Onomat. hiſtor. nat. I. p. 689. *der aſchgraue Reiger, groſse Kammreiger.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 109. *der Reiher, Fiſchreiher.*

Klein, av. p. 122. n. 1. Ardea Pella, pulla, cinerea.

Klein, Vorbereit. p. 226. n. 1. *grauer, blauer, aſchfarbener Reyger, Reihel, Heergans.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 128. n. 1 *grauer Reyger.*

Gesner, Vögelb. p. 436. *aſchfarbener oder grawer Reigel;* mit 1 Fig.

Beckmann, Naturhiſt. p. 46. a. *der Reiher.*

Briſſon, ornith. II. p. 312. n. 1. Héron.

Batſch, Thiere, I. p. 390. *der graue oder gemeine Reiher.*

Latham,

Weibchen von *Ardea Maior* aus. Die Sache ſcheint aber ſo ganz ausgemacht noch nicht zu ſeyn. *Bechſtein* hat a. a. O. p. 13 ff. die Gegengründe ſehr überzeugend aus einander geſetzt. Im Magen eines Weibchens vom *gemeinen Reiher* fand dieſer eine *gemeine Spitzmaus.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 691. n. 54. Ardea occipite nigro laevi, dorso caerulescente, subtus albida, pectore maculis oblongis nigris. (*Femina.*)

Frisch, Vögel, Tab. 198. *der gemeine Reiher.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 161. β. *der ungehäubte Reiher.*

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 58. n. 113. *der graue Reiher.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 351. n. 106. *der graue aschfarbige Reiher.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 284. Airon nero.

Fischer, Livl. p. 85. n. 102. *grauer Reiher.*

Leem, Finnm. p. 130. *Guorga.*

Olaffen, Isl. I. p. 190. Hegre.

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 309. *graue Reyher.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 170. n. 4. *Fischreiher oder Fischhäher.*

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 146. *Heire.*

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 131. *der aschfarbene Reiger.*

Naturf. XIII. p. 207. n. 106. *der graue Reyger.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 69. *Fisch-Reiher oder Reiger.*

Loniceri, Kräuterb. p. 674. *Reyger.*

Naumann, Vogelsteller, p. 189. *Reiger.*

Sander, Nat. u. Rel. p. 228. *Reiher.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 127. n. 2. *der gemeine Reiher.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 219. n. 25. *der Fischreiher.*

Zorn, Petinoth. II. p. 417. *der Reiger, Fischreiger.*

Oekon.

Oekon. Zool. p. 77. n. 28. *der gemeine Reiher.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 348. *der graue Reiher.*

Merklein, Thierreich, p. 342. *Reyer.*

Kraft, Ausrott. grauſ. Thiere, I. p. 284. *Fiſch-Reyher.*

Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 101.

Hannöv. Magaz. 1780. p. 422.

Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1500. IV. p. 1016.

Lemmery, Materiallex. p. 94.

Meidinger, Vorleſung. I. p. 136. n. 3. *der graue Reiher.*

Jablonſky, allgem. Lex. p. 904. *Reiger.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 53. Ardea cinerea.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 3. Ardea cinerea criſtata.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 143. n. 10. Ardea (Cinerea) occipite criſta pendula, dorſo caeruleſcente, ſubtus albida, pectore maculis oblongis nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 176. Ardea (Cinerea) occipite nigro laevi dorſo caeruleſcente; ſubtus albida, pectore maculis oblongis nigris.

Muſ. Worm. p. 307. Ardea.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 223. Ardea ſubcaerulea; *aſchenfarbener Reger, blawer Reger, grauer Reigel.*

Jonſton, av. p. 151. Ardea cinerea maior.

Schäfer, element. ornith. tab. 21.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 293. n. 9. *der Fiſchreiher.*

c. Ardea rhenana. *Der Rheinreiher.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 12. c.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 692. ad n. 54.

13. Gar-

13. GARZETTA. *Der kleine Silberreiher.*
Müller, Naturſyſtem, II. p. 381. n. 13. *der weiße Reiher.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 213. n. 4. Ardea (Garzetta) occipite criſtato, corpore albo, roſtro nigro, loris pedibusque vireſcentibus.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 43. n. 16. *der kleine Silberreiher.*
Halle, Vögel, p. 526. n. 614. *der kleine weiße Reiher?*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 194. n. 181. *der kleine weiße Reiher.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 415. n. 264. *der kleine Silberreiher.*
Briſſon, ornith. II. p. 322. n. 16. Aigrette.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 694. n. 64. Ardea (Garzetta) occipite criſtato, corpore albo, roſtro nigro, loris pedibusque vireſcentibus.
Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 353. *der kleine weiße Reiher.*
Naturf. XIII. p. 208. *der weiße Reyger?*
Lapeirouſe: neue ſchwed. Abh. III. p. 106. Ardea Garzetta.
Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 129. n. 6. *der kleine Silberreiher.*
Kramer, Auſtr. p. 346. n. 3. Ardea tota alba, criſta dependente, roſtro ſuperius nigro, inferius albido, pedibus nigris; *kleiner weißer Rager.*
Charleton, onom. zoic. p. 103. Garzetta.
Jonſton, av. p. 153. Garzetta.

32. LEUCOGASTER. *Der weißbäuchige Reiher.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 694. n. 62. Ardea (Leucogaſter) criſtata, caeruleo-nigricans, alis ſubtus, abdomine femoribusque albis.

33. Ru-

33. RUFESCENS. *Der röthliche Silberreiher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 416. n. 265. *der röthliche Silberreiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 694. n. 61. Ardea (Rufescens) cinereo-nigricans, capite, collo dorsoque postico fulvo-rufis.

34. EGRETTA. *Der große Silberreiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 41. n. 15. *der große Silberreiher.* p. 43. *der türkische, indische Reiher.* Tab. 4.

Pennant, arct. Zool. II. p. 415. n. 263. *der große Silberreiher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 694. n. 63. Ardea (Egretta) occipite cristato, corpore albo, pennis scapularibus longissimis laceris, rostro pedibusque nigris.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 24. Ardea Egretta.

Jonston, av. p. 204. *Guiratinga?*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 294. n. 10. *der Silberreiher.*

35. AGAMI. *Der Agami.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 699. n. 79. Ardea (Agami) cristata caerulea, orbitis gulaque albis, collo supremo, corpore subtus femoribusque rufis.

14. COCOI. *Der Cocoi.*

Müller, Natursyst. II. p. 381. n. 14. *der aschgraue Reiher.*

Brisson, ornith. II. p. 314. n. 3. Heron hupé de Cayenne.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 699. n. 80. Ardea (Cocoi) occipite crista dependente, dorsoque cine-

cinereis, collo ſubtus nigro maculato, capitis lateribus nigris.

Jonſton, av. p. 203. Cocoi Braſilienſibus.

36. JOHANNAE. *Der Reiher von der Inſel Johanna.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p 700. n. 82. Ardea (Johannae) criſta occipitis nigra, corpore ſupra griſeo, ſubtus albo, collo antice maculis remigibusque nigris.

37. HOACTLI. *Der Hoactli.*

Briſſon, ornith. II. p. 319. n. 11. Heron hupé du Mexique.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 700. n. 84. Ardea (Hoactli) criſta capitis nigra, corpore nigrovireſcente, ſubtus albo, alis caudaque cinereis.

Jonſton, av. p. 183. Hoactli ſive Tobactli.

38. HOHU. *Der Hohu.*

Briſſon, ornithol. II. p. 315. n. 5. Heron cendré du Mexique.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 701. n. 85. Ardea (Hohou) criſtata cinerea, fronte albo nigroque varia, alis albo cinereo et cyaneo variis, pedibus variegatis.

15. HERODIAS. *Der Rieſenreiher.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 381. n. 15. *der Rieſe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 195. n. 183. *der Rieſe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 412. n. 258. *der groſse Reiher.*

Klein, av. p. 125. n. 14. Ardea criſtata maxima americana.

Klein, Vorbereit. p. 231. n. 14. *höchſter amerikaniſcher Reyger.*

Klein,

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 131. n. 17. *höchſter amerikaniſcher Reyger.*

Briſſon, ornith. II. p. 318. n. 10. Heron hupé de Virginie.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 692. n. 56. Ardea (Herodias) occipite criſtato, dorſo fuſco, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 108. *der gröſste amerikaniſche Reyger mit dem Federbuſche.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 98. n. 118. Ardea Herodias.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 143. n. 11. Ardea (Herodias) occipite criſtato, dorſo cinereo, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris.

59. LUDOVICIANA. *Der louiſianiſche Reiher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 417. n. 267. *der louiſianiſche Reiher.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 690. n. 51. Ardea (Ludoviciana) criſtata cinerea, collo abdomineque rufis, vertice, alis caudaque viridi-nigricantibus.

16. VIOLACEA. *Der gelbköpfige Reiher.* (10)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 382. n. 16. *Violet-Reiher.*

Halle, Vögel, p. 529. n. 623. *der blaue Reiher mit gelbem Federbuſche.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 196. n. 184. *der Violetreiher.*

Pennant,

(10) Gewicht 1 1/2 Pfund. Brütet auf den Bahamainſeln unter den Büſchen auf den Felſen, und iſt daſelbſt in ſo ungeheurer Menge, daſs zwey Perſonen, die auf das Ausnehmen der Jungen ausgehen, in wenig Stunden ein kleines Boot damit anfüllen können. Sie werden auf den Büſchen und Felſen ſitzend gefangen, und ſuchen auch nicht zu entfliehen, ob ſie gleich ihre völlige Gröſse erreicht haben.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 417. n. 269. *der Gelbkopf.*

Klein, av. p. 124. n. 9. Ardea ſtellaris criſtata americana.

Klein, Vorbereit. p. 229. n. 9. *blauer Reiher mit einer gelben Mütze.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 130. n. 11. *blauer Reyger mit gelber Mütze.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 337. n. 41. Crabier de Bahama.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 690. n. 50. Ardea (Violacea) occipite luteo, criſta alba, corpore albo nigroque ſtriato, ſubtus caeruleſcente, pedibus luteis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 58. *amerikaniſche Rohrdommel mit dem Federbuſch.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 353. n. 108. *der violette Reyher??*

Naturf. XIII. p. 208. n. 108. *der Violett-Reyger??*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 143. n. 12. Ardea (Violacea) criſta flava, corpore nigro-caeruleſcente, faſcia temporali alba.

17. CAERULEA. *Der blaue Reiher.* (1)

Müller, Naturſyſt. II. p. 383. n. 17. *der Krabbenfreſſer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 417. n. 268. *der blaue Reiher.*

Klein, av. p. 124. n. 7. Ardea cyanea.

Klein, Vorbereit. p. 229. n. 7. *hochblauer karoliniſcher Reyger.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 130. n. 9. *hochblauer Caroliner.*

Halle,

(1) Gewicht 15 Unzen. Scheint in Jamaica zu überwintern.

Halle, Vögel, p. 529. n. 621. *der blaue Reiher mit dem Federbusche.*

Brisson, ornith. II. p. 338. n. 42. Crabier bleu.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 48. Ardea (Caerulea) occipite cristato, corpore caeruleo, crista colloque violaceis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 51. *der blaue Reiger.*

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 279. n. 7. *der blaue Reiger.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 143. n. 13. Ardea (Caerulea) occipite cristato, corpore caeruleo.

β. *Der blaue Reiher mit braunrothen Kopf und Hals.* (2)

Latham, Syn. III. 1. p. 79. n. 45. A. Blue Heron.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 690. n. 49. Ardea (Caerulescens) cristata, corpore obscure caeruleo, capite colloque fusco-rufis, occipite pennis duabus elongatis.

γ. *Der grün-blaue Reiher mit weißen Kinn u. Kehle.*

Latham, Syn. III. 1. p. 79. n. 45. B. Blue Heron.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 48. β. Ardea subcristata viridi-caerulea, gula iuguloque albis.

δ. *Der stahlfarbene Reiher.* (3)

Brisson, ornitholog. II. p. 337. n. 40. *Crabier du Brésil.*

Latham, Syn. III. 1. p. 80. n. 45. C. Blue Heron.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 48. γ. A. fusco flavo cinereoque varia, supra nigro-chalybea subtus alba, remigibus rectricibusque virescentibus.

Jonston, av. p. 204. Ardeola.

40. Ru-

(2) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(3) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

40. RUBIGINOSA. *Der Reiher mit roſtfarbigem Schnabel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 421. n. 275. *der Reiher mit dem roſtfarbigen Schnabel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 693. n. 58. Ardea (Rubiginoſa) ſubcriſtata ferruginea, gula alba, abdomine albo nigro ſtriato, collo ſubtus lineis quatuor nigris.

18. HUDSONIAS. *Der hudſoniſche Reiher.*

Müller, Naturſ. II. p. 384. n. 18. *der hudſon. Reiher.*

Halle, Vögel, p. 520. n. 602. *der braunbunte Kranich.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 413. n. 259. *der Reiher mit rothen Schultern.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 316. n. 7. Heron de la Baye de Hudſon.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 693. n. 57. Ardea (Hudſonias) vertice criſtato nigro, corpore fuſceſcente, ſubtus albido, collo ſubtus nigro-rufeſcente maculato.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 27. *der groſse Kranich von der Hudſonsbay.*

41. COMATA. *Deo Squakko-Reiher.* (4)

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. III. p. 46. *der Sqvakko-Reiher.*

Briſſon, ornith. II. p. 335. n. 37. Crabier jaune.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 687. n. 39. Ardea (Comata) criſtata luteo-rufeſcens, uropygio, corpore ſubtus, alis caudaque albis.

Pallas, Reiſ. Ausz. II. p. 240. *ein vortrefflich ſchönes gelbbraunes Reigerchen mit langen Haupt- und Nackenfedern.*

(4) *Bechſtein* hält ihn für das Männchen von *Ardea Caſtanea* p. 633. n. 46.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 17. n. 31. Ardea comata.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 75. n. 39. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 687. n. 39. β. A. alba, capite superiore, cervice, pectore dorsoque rufescentibus, capite laevi.

γ. A. fronte colloque albido testaceo nigroque striatis, alis testaceis, uropygio abdomine femoribusque albis. *
Latham, Syst. ornithol. II. p. 687. n. 39. γ.

42. Erythrocephala. *Der rothköpfige Reiher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 688. n. 43. Ardea (Erythrocephala) occipitis crista dependente rubra, corpore albo.

43. Thula. *Der Thula.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 688. n. 44. Ardea (Thula) occipitis crista, et toto corpore albis.

44. Cyanocephala. *Der blauköpfige Reiher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 688. n. 45. Ardea (Cyanocephala) vertice cristato dorsoque caeruleis, alis nigris, margine albis.

45. Candidissima. *Der schneeweiße gehäubte? Reiher.*
Ist nach *Latham* mit *Ardea Nivea*, p. 640. n. 59. einerley.

46. Castanea. *Der Rallenreiher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 45. n. 17. *der Rallenreiher.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 687. n. 40. Ardea (Castanea) cristata alba, lateribus capitis colloque castaneo-flavis, dorso castaneo, remigibus intus rectricibus apice albo maculatis.

Scopoli,

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 100. n. 121. *der kleine Reyher.*

Decouv. Ruff. I. p. 164.

47. Squaiotta. *Der schwarz und weiß gehäubte italienische Reiher.*

Brisson, ornith. II. p. 333. n. 33. Crabier.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 686. n. 36. Ardea (Squaiotta) cristata castanea, pennis scapularibus basi albis, crista medio alba, lateribus nigra.

Charleton, onomast. zoic. p. 103. n. 6. Squaiotta Italorum.

Jonston, av. p. 153. Squaiotta Italorum.

48. Galatea. *Der milchweiße, karmoisinrothfüssige Reiher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 696. n. 68. Ardea (Galatea) occipite subcristato, corpore lacteolo, rostro luteo, pedibus coccineis.

49. Ferruginea. *Der rostfarbene Reiher.* (5)

Latham, Syst. ornith. II. p. 688. n. 41. Ardea (Ferruginea) subcristata nigricans rufo-maculata, subtus rufo albido cinereo fuscoque variegata.

88. Erythropus. *Der rothfüßige Reiher.*

Brisson, ornith. II. p. 334. n. 35. Crabier roux.

Latham, Syst. ornith. II. p. 686. n. 38. A. (Erythropus) cristata croceo-castanea, subtus saturatior, rostro caeruleo, pedibus rubris.

Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 106.

19. Striata. *Der guianische gestreifte Reiher.*

Müller, Natursyst. II. p. 384. n. 19. *der gestreifte Reiher.*

 Latham,

(5) Nach *Bechstein* a. a. O. III. p. 39. ein altes Weibchen von *Ardea Nycticorax.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 691. n. 52. Ardea (Striata) occipite ſubcriſtato, dorſo cano ſtriato, collo ſubtus ferrugineo, remigibus ſecundariis apice albis.

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 103. *der guianiſche Reiger.*

Decouv. Ruſſ. II. p. 146.

20. Virescens. *Der grüne Reiher.*

Müller, Naturſ. II. p. 385. n. 20. *der grüne Reiher.*

Halle, Vögel, p. 528. n. 618. *der grüne Nachtreiher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 416. n. 266. *der grüne Reiher.*

Klein, av. p. 123. n. 6. Ardea ſtellaris minima.

Klein, Vorbereit. p. 228. n. 6. *grüne Nachtrabe.*

Klein, verb. Vögelh. p. 130. n. 8. *grüne Nachtrabe.*

Briſſon, ornith. II. p. 339. n. 43. Crabier verd.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 684. n. 31. Ardea (Vireſcens) occipite ſubcriſtato, dorſo viridinitente, pectore rufeſcente, loris luteis, rectricibus viridi-aureis. *(Mas.)*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 60. *die kleinſte Rohrdommel.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 279. n. 9. *der grünliche Reiger.*

Neueſte Mannichf. I. p. 569. *der Krabbenfreſſer.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 144. n. 15. Ardea (Vireſcens) occipite ſubcriſtato, dorſo viridi, pectore rufeſcente.

b. *Briſſon,* ornithol. II. p. 340. n. 44. Crabier verd tacheté. (6)

Latham, Syſt. ornith. II. p. 684. n. 31. A. fuſca viridi-aurea, corpore ſubtus albido, collo rufeſcente

(6) Nach *Briſſon* eine eigene Gattung.

fescente albo striato, tectricibus alarum remigibusque albo maculatis. *(Femina.)*

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 63. n. 30. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 684. n. 31. β. A. cristata cinerea, collo antice albo striis rufis, tectricibus alarum virescentibus, rufo marginatis, vertice caudaque nigris.

γ. *Klein*, av. p. 124. n. 8. Ardea fusca. (7)
Klein, Vorber. p. 229. n. 8. *brauner Reyger.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 130. n. 10. *brauner Reyger.*
Halle, Vögel, p. 529. n. 622. *der braune Reiher.*
Brisson, ornithol. II. p. 332. n. 32. Butor tacheté d'Amerique.
Latham, Syn. III. 1. p. 70.
Latham, Syst. ornith. II. p. 685. n. 31. γ. A. fusca, subtus dilutior, alis albo punctulatis, remigibus rectricibusque caerulescenti-cinereis.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 56. *amerikanische Rohrdommel.*

21. Stellaris. *Die Rohrdommel.*
Müller, Natursystem, II. p. 385. n. 21. *die Rohrdommel.* Tab. 15. fig. 5.
Leske, Naturgesch. II. p. 280. n. 5. *die Rordommel.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 76. n. 5. *der Rohrdommel.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 213. n. 5. Ardea (Stellaris) capite laeviusculo, supra testacea, maculis transversis, subtus pallidior, maculis oblongis fuscis; *die Rohrdommel, der Iprump.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 418. n. 4. *der Rohrdommel.*

(7) Nach *Brisson*, *Klein* u. a. eine eigene Gattung.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 24. n. 8. *der Rohrdommel.* p. 30. *Rohrtrummel, Wasserochs, Moosochse, Mooskrähe, Moosreiher, Rohrbrüller, Usrind, Meerrind, Rohrpompe, Moosriegel, Erdbull, Hortyhel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 245. *die Rohrdommel.*

Ebert, Naturl. II. p. 89. *die Rohrdommel.*

Halle, Vögel, p. 527. n. 616. *der Rohrdommel.* Fig. 45.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 196. n. 186. *die Rohrdommel.*

Beckmann, Naturhist. p. 46. b. *der Rohrdommel.*

Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 225. *Rohrdommel.*

Onomat. hist. nat. I. p. 690. *Rohrdommel.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 325. *der Rohrdommel.*

Handb. d. deutsch. Thierg. p. 110. *Rohrdommel.*

Klein, av. p. 123. n. 4. Ardea stellaris.

Klein, Vorber. p. 227. n. 4. *Moosreigel, Rohrdrummel, Rohrtrumm.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 129. n. 4. *Rohrdommel* u. s. w.

Klein, stemm. av. p. 29. Tab. 32. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 3.

Gesner, Vögelb. p. 439. *Moßreigel oder Urrind;* mit 1 Fig. p. 440. *Ocnus, Meerrind, Moßkuh, Rortrumm, Rordrumb, Rorreigel, Lorrind.*

Brisson, ornith. II. p. 327. n. 24. Butor.

Batsch, Thiere, I. p. 390. *der Rohrdommel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 234. Bittern.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 680. n. 18. Ardea (Stellaris) capite laeviusculo, supra testacea, maculis transversis, subtus pallidior, maculis oblongis fuscis.

Beseke,

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 58. n. 114. *die Rohrdommel.*

Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 163. n. 6. *die Rohrdommel, Ruhrdump.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 353. n. 109. *die Rohrdommel.*

Cetti, Sardinien, II. p. 282. *die Rohrdommel.*

Fiſcher, Naturgeſch. v. Livl. p. 85. n. 103. *Rohrdommel.*

Taube, Slavon. u. Syrm. I. p. 23. *Rohrdommel.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 8. *der Reiger.* (Buik.)

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 5. *Rohrdommel.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 70. *Rohrdommel.*

Naumann, Vogelſteller, p. 190. *Rohrdommel.*

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 103. n. 125. *die Rohrdommel, Mooßochſe.*

Naturf. XIII. p. 208. n. 109. *die Rohrdommel.*

Lichtenberg, Magazin f. d. Neueſte u. ſ. w. II. 4. p. 151. *Reiger.*

Bechſtein, Muſterung ſchädl. Thiere, p. 128. n. 3. *die Rohrdommel.*

Jablonsky, allgemein. Lex. p. 934. *Rohrdommel.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 101. *die Rohrdommel.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 136. n. 4. *die Rohrdommel.*

Hannöv. Magaz. 1780. p. 423. 424.

Valentins anat. Ardeae Stellaris. Eph. Nat. Cur. Vol. I. obſ. 131. p. 283.

Breſsl. Nat. u. Kunſtgeſch. 34 Verſ. p. 650. (Anat.)

Muralto, de Ardea Stellari. Eph. Nat. Curioſ. Dec. II. an. 2. obſ. 31. p. 60. c. f.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 4. Ardea Stellaris.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 144. n. 16. Ardea (Stellaris) capite laeviuſculo, ſupra teſtacea,

maculis transversis, subtus pallidior, maculis oblongis fuscis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 22. n. 177. Ardea (Stellaris) capite laeviusculo, supra testacea, maculis transversis, subtus pallidior maculis oblongis fuscis.

Kramer, Austr. p. 347. n. 9. Ardea vertice nigro, collo pallido, maculis longitudinalibus ferrugineo nigris, pedibus viridibus; *Moosskuh, Rohrtrummel.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 225. Ardea stellaris; *Moos-Reigel, Rohr-Drummel.*

Mus. Worm. p. 307. Ardea Stellaris.

Charleton, onomast. zoic. p. 103. n. 5. Ardea stellaris, Asterias.

Jonston, av. p. 153. Ardea stellaris minor.

Zinnan. Uov. p. 112. tab. 20. fig. 100. Garza bionda o di color d'oro.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 135. Ardea Stellaris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 294. n. 11. *die Rohrdommel.*

β. *Die Rohrdommel aus der Hudsonsbay.* (8)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 420. n. 274. *der Rohrdommel.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 129. n. 5. *Rohrdommel aus der Hudsonsbay.*

Brisson, ornithol. p. 328. n. 25. Butor de la Baye de Hudson.

Latham, Syn. Suppl. p. 67.

Latham, Syst. ornith. II. p. 680. n. 18. β.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 31. *der Reiger aus der Hudsonsbay.*

50. Bo-

(8) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

50. BOTAURUS. *Der ſchwarz geſcheitelte italieniſche Reiher.*
Briſſon, ornith. II. p. 330. n. 28. grand Butor.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 698. n. 74. Ardea (Botaurus) criſtata, cinereo-fuſca, ſubtus rufa, vertice nigro, gula iuguloque albo ſtriis nigris.
Gesner, Vögelb. p. 441. Ardea ſtellaris maior; *groſse Rorreigel.* Fig. p. 441.
Jonſton, av. p. 154. Ardea ſtellaris maior.

51. SOLONIENSIS. *Der braunrothe italieniſche Reiher.*
Briſſon, ornith. II. p. 330. n. 21. Butor roux.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 681. n. 19. Ardea (Solonienſis) nigricans, ſubtus rufeſcens, capite colloque ferrugineis, uropygio albo, tectricibus alarum albo ferrugineoque variegatis.

52. MARSIGLI. *Der ſchwäbiſche Reiher.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 33. n. 10. *der ſchwäbiſche Reiher.*
Halle, Vögel, p. 531. n. 628. *der grüngelbe Reiher?*
Klein, av. p. 124. n. 13. Ardea viridi-flaveſcens?
Klein, Vorber. p. 230. n. 13. *grüngelber Reyger?*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 131. n. 15. *graugelblichter Reyger?*
Briſſon, ornithol. II. p. 329. n. 26. petit Butor.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 681. n. 20. Ardea (Marſigli) rufeſcens, fuſco-ſtriata, rectricibus albicantibus, collo ſubtus albo.
Marſil. Danub. p. 22. Tab. 9. Ardea viridi-flaveſcens, nova ſpecies?

53. DANUBIALIS. *Der geſtrichelte Reiher.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 34. n. 11. *der geſtrichelte Reiher.*

Briſſon,

Briſſon, ornithol. II. p. 329. n. 27. Butor rayé.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 681. n. 21. Ardea (Danubialis) lineolis fuſcis nigris et ruſeſcentibus ſtriata, collo ſubtus pectoreque albicantibus, roſtro fuſco, ſubtus flavo.

54. Undulata. *Der gewäſſerte Reiher.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 681. n. 22. Ardea (Undulata) ruſo-griſea, pileo nigro, corpore ſupra ſtrigis undulatis ſubtus angulatis nigris.

23. Brasiliensis. *Der braſilianiſche Reiher.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 387. n. 23. *der weſtindiſche Reiher.*

Halle, Vögel, p. 532. n. 630. *der Perlreiher.*

Briſſon, ornith. II. p. 326. n. 23. Héron du Breſil.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 681. n. 23. Ardea (Braſilienſis) capite laevi, corpore nigricante flavo punctato, remigibus, rectricibus, roſtro pedibusque nigricantibus.

Jonſton, av. p. 195. Soco Braſilienſibus.

55. Tigrina. *Der getiegerte Reiher.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 682. n. 24. Ardea (Tigrina) maculis nigris difformibus notata, ſupra rufa, ſubtus albida, vertice caudaque nigris, rectricibus faſciis quatuor albis.

Fermin, Beſchreib. von Surinam, II. p. 131. *der getiegerte Reiger.*

56. Lineata. *Der geſtreifte cayenniſche Reiher.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 682. n. 25. Ardea (Lineata) flavo fuſco rufoque transverſim lineata, ſubtus albida, capite colloque rufis, faſciolis fuſcis, anterius linea longitudinali alba.

57. Fla-

57. Flava. *Der gelbe Reiher.*
Brisson, ornithol. II. p. 321. n. 3. Butor du Bresil.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 682. n. 26. Ardea (Flava) striata, supra fusca subtus alba, capite colloque rufescentibus, rectricibus striis transversis albis.

58. Bononiensis. *Der bononische Reiher.*
Brisson, ornitholog. II. p. 325. n. 22. Heron noir à collier.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 678. n. 12. Ardea (Bononiensis) nigricans, collo torque albo, rostro flavo, medio et apice macula nigra.
Charleton, onomast. zoic. p. 104. n. 8. Ardea nigra.

24. Alba. *Der große weiße Reiher.*
Müller, Natursystem, II. p. 387. n. 24. *der weiße Gelbschnabel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 23. n. 6. *der große weiße Reiher.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 414. n. 261. *der große weiße Reiher.*
Onomatol. hist. nat. I. p. 687. *der große weiße Reiger.*
Klein, av. p. 122. n. 2. Ardea alba maior.
Klein, Vorber. p. 227. n. 2. *weißer Reigel.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 129. n. 2. *weißer Reyger.*
Halle, Vögel, p. 525. n. 612. *der große weiße Reiher ohne Federbusch.*
Brisson, ornith. II. p. 322. n. 15. Heron blanc.
Gesner, Vögelb. p. 437. *weißer Reigel.* Fig. p. 438.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 695. n. 65. Ardea (Alba) capite laevi, corpore albo, rostro fulvo, pedibus nigris.

Cetti,

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 284. *der weiße Reiher.*

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 185. *der weiße Reiher.*

Lepechin, Tageb. d. russ. R. I. p. 309. *weiße Reyher.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 24. Ardea alba.

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 279. n. 8. *der weiße Reiger.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 104. n. 127. *der weiße Reyher mit rothem Schnabel.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 130. n. 8. *der große weiße Reiher.*

Linné, Syst. N. Ed. VI. p. 25. n. 2. Ardea alba.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 144. n. 17. Ardea (Alba) capite laevi, corpore albo, rostro rubro.

Linné, fn. Suec. I. n. 132. Ardea tota alba, capite laevi.

Kramer, Austr. p. 346. n. 2. Ardea tota alba, capite laevi, rostro luteo; *großer weißer Rager.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 224. Ardea candida; *weißer Reger.*

β. *Der gehaubte weiße brasilianische Reiher.* (9)

Brisson, ornith. II. p. 323. n. 17. Ardea Brasiliensis candida; *Heron blanc du Bresil.*

Latham, Syn. III. 1. p. 92. Black-crested white Heron.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 695. n. 66. Ardea (Pileata) occipite cristato, corpore albo, ventre nigro.

59. Nivea. *Der schneeweiße, ungehaubte? Reiher.* (10)

Latham, Syn. Suppl. p. 236. Snowy Heron.

Latham,

(9) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

(10) Ist, nach *Latham*, mit *Ardea candidissima* p. 633. n. 45. einerley. *Bechstein* ist (a. a. O. III. p. 44.) geneigt, ihn bloss für

Latham, Syſt. ornith. II. p. 696. n. 67. Ardea (Nivea) criſtata nivea, pennis occipitis, colli dorſique longioribus ſetoſis, digitis croceis.
Decouv. Ruſſ. I. p. 164.

60. HELIAS. *Der ſurinamiſche Sonnenreiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p 725. n. 38. Scolopax (Helias) corpore nigro fulvo alboque faſciato, abdomine ſtrigisque capitis albis, collo rufo, lineis transverſis nigris, cauda nebuloſa, faſcia nigra.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 295. n. 12. *der ſurinamiſche Sonnenreiger.*

61. SACRA. *Der heilige Reiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 696. n. 69. Ardea (Sacra) alba capite laevi, tectricibus interioribus alarum, rectricibusque nigro lineatis, pennis dorſalibus laceris albis.
β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 93. n. 62. Var. A.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 696. n. 69. β. Ardea capite laevi, corpore albo, nigro variegato, pennis dorſalibus laceris nigris.

62. ATRA. *Der ſchwarze Reiher.* (1)
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 24. n. 7. *der ſchwarze Reiher.*
Halle, Vögel, p. 526. n. 615. *der ſchwarze Reiher?*
Klein, av. p. 123 n. 3. Ardea nigra.
Klein, Vorbereit. p. 227. n. 3. *ſchwarzer Reyger.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 129. n. 3. *ſchwarzer Reyger.*

Briſſon,

für einen *alten* Vogel von *Ardea Garzetta*, p. 628. n. 13. zu halten; und die *Ardea Xanthedactylos* (Syſtem. Linn. p. 640. n. 59. β.) als einen *jungen* anzuſehen.

(1) *Bechſtein* meynt, dies könne wohl gar *der ſchwarze Storch (Ardea nigra)* ſeyn.

Briſſon, ornithol. II. p. 325. n. 21. Heron noir.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 697. n. 71. Ardea (Atra) nigricans, tectricibus alarum cinereo-caerulescentibus, rectricibus nigricantibus, roſtro pedibusque nigris.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 224. Ardea nigra; *ein ſchwarzer Reger.*

63. PURPURATA. *Der glattköpfige Purpurreiher.* (2)

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 21. n. 4. *der glattköpfige Purpurreiher.*

Halle, Vögel, p. 531. n. 637. *der graugelbe Reiher?*

Klein, av. p. 124. n. 12. Ardea cinerea flaveſcens?

Klein, Vorbereit. p. 230. n. 12. *graugelblicher Reyger?*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 131. n. 15. *graugelblichter Reyger?*

Briſſon, ornitholog. II. p. 320. n. 12. Heron pourpré.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 698. n. 75. Ardea (Purpurata) capite laevi colloque cinereo-nigricantibus, corpore ſupra caſtaneo-purpureo ſubtus cinereo.

Marſil. Danub. p. 20. Tab. 8. Ardea cinerea flaveſcens, nova ſpecies?

64. SPADICEA. *Der mexikaniſche Purpurreiher.*

Briſſon, ornith. II. p. 320. n. 13. Heron pourpré du Mexique.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 699. n. 76. Ardea (Spadicea) caſtaneo-purpurea, capite remigibusque ſpadiceis, vertice nigro.

Moehring, av. gen. p. 72. n. 82. Crex.

25. AEQUI-

(2) *Büffon* hält ihn für das Weibchen von *Ardea Purpurea*, p. 626. n. 10. *Bechſtein* aber für ein Junges von demſelben.

25. AEQUINOCTIALIS. *Der kleine weiße Reiher.*
Müller, Naturſ. II. p. 388. n. 25. *der weiſſe Grünſchnabel.*
Klein, av. p. 124. n. 10. Ardea alba minor Carolinenſis.
Klein, Vorber. p. 229. n. 10. *weißer kleiner Karoliner, mit rothem Schnabel.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 130. n. 12. *weißer kleiner Caroliner.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 414. n. 262. *der kleine weiße Reiher.*
Briſſon, ornith. II. p. 324. n. 18. Héron blanc de la Caroline.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 696. n. 70. Ardea (Aequinoctialis) capite laevi, corpore albo, remigibus duabus primis, margine exteriore fuſcis.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 54. *der kleinere weiße caroliniſche Reiger.*

β. *Briſſon,* ornithol. II. p. 325. n. 20. petit Heron blanc. (3)
Latham, Syn. III. 1. p. 94. n. 63. Var. A.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 697. n. 70. β. A. capite laevi, corpore albo, vertice et pectore croceis, loris pedibusque flavo-croceis.

γ. *Briſſon,* ornith. II. p. 324. n. 19. Heron blanc du Mexique. (4)
Latham, Syn. III. 1. p. 94. n. 63. Var. B.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 697. n. 70. γ. Ardea capite laevi, corpore albo, loris luteis, roſtro purpureo, pedibus pallide purpuraſcentibus.

65. CRA-

(3) Nach *Briſſon* eine eigene Gattung.
(4) Nach *Briſſon* eine eigene Gattung.

65. CRACRA. *Der Cracra.*
Briſſon, ornith. II. p. 336. n. 39. Crabier d'Amerique.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 699. n. 77. Ardea (Cracra) rufeſcente-variegata, ſupra cinereo-caeruleſcens, ſubtus cinerea, collo ſubtus pectoreque albis.

66. LEUCOCEPHALA. *Der violetfarbige Reiher.*
Latham, Syn. Suppl. p. 236. Violet Heron.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 699. n. 78. Ardea (Leucocephala) nigro-violacea, vertice nigro, capite, collo ſuperiore, criſſo tectricibusque ſubcaudalibus albis, roſtro pedibusque fuſco-rubris.

67. RUFA. *Der braungraue Reiher.* (5)
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 22. n. 5. *der braunrothe Reiher.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 692. n. 55. Ardea (Rufa) cinereo-fuſca, ſubtus caſtaneo-ferruginea, criſta dependente.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 99. n. 119. *der braunrothe Reiher.*
Kramer, Auſtr. p. 347. n. 6. Ardea cinereo-fuſca, ſubtus caſtaneo-ferruginea, criſta dependente; *brauner Rager.*

68. SINENSIS. *Der chineſiſche Reiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 700. n. 81. Ardea (Sinenſis) fuſca ſtriis pallidioribus, ſubtus dilutior, remigibus rectricibusque nigris.

69. VIRGATA. *Der geſtreifte nordamerikan. Reiher.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 418. n. 271. *der geſtreifte Reiher.*

Latham,

(5) Nach *Bechſtein* ein junges Männchen von *Ardea Purpurea.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 693. n. 60. Ardea (Virgata) fuſco-nigricans, collo ſubtus albo, iugulo nigro ſtriato, tectricibus alarum flaveſcente ſtriatis.

70. CANA. *Der aſchgraue Reiher.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 418. n. 270. *der aſchgraue Reiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 693. n. 59. Ardea (Cana) cinerea, collo fuſco-cineraſcente, abdomine, genis gulaque albis.

71. CARUNCULATA. *Der geläppte Reiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 691. n. 53. Ardea (Carunculata) vertice, dorſo tectricibusque alarum caeruleo-cinereis, abdomine nigro, capite, collo carunculisque ſub gula geminis pennaceis albis.

72. MALACCENSIS. *Der malackiſche Reiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 689. n. 47. Ardea (Malaccenſis) alba, dorſo fuſco, collo fuſco alboque ſtriato, roſtro pedibusque flavis.

73. CINNAMOMEA. *Der zimmetfarbene Reiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 689. n. 46. Ardea (Cinnamomea) caſtaneo-cinnamomea, collo antice fuſco ſtriato, gula, macula maxillari, criſſoque albis.

74. PUMILA. *Der kaſtanienbraune caſpiſche Reiher.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 683. n. 28. Ardea (Pumila) caſtanea, tectricibus alarum mediis albo flavoque variis, collo antice ſtria longitudinali, abdomine caudaque albis.

75. BADIA. *Der kaſtanienbraune ſchleſiſche Reiher.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 34. n. 12. *der kaſtanienbraune Reiher.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 334. n. 34. Crabier marron.

Latham, Syſt. ornithol. II p. 687. n. 40. Ardea (Caſtanea) criſtata alba, lateribus capitis colloque caſtaneo-flavis, dorſo caſtaneo, remigibus intus, rectricibus apice albo maculatis.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 225. Ardea rubra; *ein rodter Reger, Sand-Reger.*

77. PHILIPPENSIS. *Der philippiniſche Reiher.*

Briſſon, ornith. II. p. 336. n. 38. Crabier des Philippines.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 686. n. 35. Ardea (Philippenſis) caſtanea ſubtus albida, dorſo ſtriis tranſverſis nigris, tectricibus alarum nigricantibus albo marginatis, remigibus caudaque nigris.

78. NOVAE GUINEAE. *Der neuguineiſche Reiher.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 685. n. 34. Ardea (Novae Guineae) corpore toto nigro, iridibus flavis, roſtro pedibusque fuſcis.

79. CYANOPUS. *Der blaufüſsige Reiher.*

Briſſon, ornithol. II. p. 316. n. 6. Heron cendré d'Amerique.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 685. n. 33. Falco (Cyanopus) cinerea, ſubtus alba, remigibus partim nigris partim candidis, roſtro, loris pedibusque caeruleis.

80. MACULATA. *Der gefleckte Reiher.* (6)

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 35. n. 13. it. p. 39. u. 708. *der gefleckte Reiher.*

Bech-

(6) Iſt, nach *Latham*, mit dem folgenden einerley. *Bechſtein* hält ihn für ein Junges von *Ardea Nycticorax*, oder vielmehr von *Ardea Griſea*, p. 625 *b*.

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 130. n. 4. *der gefleckte Reiher.*

Brisson, ornithol. II. p. 332. n. 31. Butor tacheté ou le Pouacre.

81. GARDENI. *Der gardensche Reiher.* (7)

Pennant, arct. Zool. II. p. 419. n. 272. *der gardensche Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 685. n. 32. Ardea (Gardeni) nigricans albo maculata, subtus albida fusco striata, remigibus margine apiceque albis, cauda fusca.

82. SENEGALENSIS. *Der senegalische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 684. n. 30. Ardea (Senegalensis) fusca, abdomine, alis caudaque albis, capite colloque nigro striatis, alarum medio fascia longitudinali pallide rufa.

83. EXILIS. *Der kleinste Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 683. n. 29. Ardea (Exilis) rufo castanea, collo rufo, antice abdomineque albo, lunula pectorali rectricibusque nigris.

26. MINUTA. *Die kleine Rohrdommel.*

Müller, Natursyst. II. p. 388. n. 26. *die kleine Rohrdommel.* Tab. 15. fig. 4.

Borowsky, Thierreich, III. p. 77. n. 6. *die kleine Rohrdommel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 30. n. 9. *die kleine Rohrdommel.*

Ebert, Naturl. II. p. 90. *der kleine gestirnte Reiher aus der Barbarey.*

(7) *Pennant* hält *Catesb.* brown Bittern I. Tab. 78. (Syst. Linn. p. 635. n. 20. γ.) wegen der weissen Linienstreifen auf den Flügeln mit diesem für einerley.

Halle, Vögel, p. 528. n. 619. *der kleine Rohrdommel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 422. n. 276. *der kleine Rohrdommel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 129. n. 6. *kleine Rohrdommel aus der Barbarey.*

Brisson, ornith. II. p. 341. n. 46. Blongios.

Latham, Syn. Suppl. p. 235. Little Bittern.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 683. n. 27. Ardea (Minuta) capite laevi, vertice, dorso, remigibus rectricibusque nigro-virescentibus, collo, tectricibus alarum abdomineque pallide fulvis. *(Mas.)*

Shaw, Reise, p. 161. *der Bu-onk.*

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 128. n. 4. *die kleine Rohrdommel.*

Kramer, Austr. p. 348. n. 10. Ardea vertice dorsoque nigris, collo antice et alarum tectricibus lutescentibus; *Stauden-Ragerl, kleine Mooskuh.*

Gentl. Magaz. XIX. Tab. p. 497.

β. *Brisson*, ornithol. II. p. 342. n. 47. *Blengios tacheté.* (8)

Latham, Syst. ornith. II. p. 683. n. 27. A. capite laevi, corpore fusco, marginibus pennarum rufescentibus, subtus rufescente, vertice, dorso, remigibus caudaque nigris. *(Femina.)*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 65. *die kleine braune Rohrdommel.*

***** *Mit in der Mitte klaffendem Schnabel.*

84. Pondiceriana. *Der Reiher von Pondichery.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 702. n. 90. Ardea (Pondiceriana) cinereo-grisea, remigibus nigris, rostro lateribus glabro, apice mucronato.

86. Co-

(8) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

86. Coromandeliana. *Der Reiher von Coromandel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 702. n. 91. Ardea (Coromandeliana) alba, facie, dorſo ſupremo, remigibus, caudaque nigris, roſtro lateribus ſerrato, apice dentato.

87. Scolopacea. *Der Schnepfenreiher.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 701. n. 89. Ardea (Scolopacea) cupreo-fuſca, collo pectoreque ſtriis albis, gula nigra.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 239. n. 22. Ardea Griſea.	p. 625. n. 9. *b.* Ardea Nycticorax. *(Femina.)*
p. 236. n. 11. Ardea Cinerea.	pag. 627. n. 12. Ardea maior *b.*

Die Anzahl der Gattungen in der XIIIten Edit. beläuft ſich, der höchſten Nummer nach, auf 88. Es fehlen aber die Nummern 22, 76, und 85; mithin bleiben ihrer, nach Abgang dieſer drey, nur 85; alſo 59 mehr als in der XIIten Edition. Ueberdem ſind bey der 4ten Gattung *zwey*, bey der 6ten *zwey*, bey der 10ten *zwey*, bey der 12ten *zwey*, bey der 17ten *vier*, bey der 20ten *drey*, bey der 21ten *zwey*, bey der 24ten *zwey*, bey der 25ten *drey* Varietäten aus einander geſetzt. — Bey der 26ten iſt *Briſſons Ardeola naevia* n. 47. als Varietät von deſſen *Ardeola* n. 46. angenommen, da es in der XII. Ed. umgekehrt war.

B. *Unbeſtimmtere Thiere.*

1. *Der Kranich mit abgeſtumpftem einer Ruderſchaufel ähnlichen Schnabel.*
 Carver, Reiſ. d. Nordamer. p. 387.

2. *Ein Reiher der nicht ganz Ardea maior, und nicht ganz Ardea cinerea iſt.*
 Sander: Naturf. XIII. p. 195. n. 6.

3. *Der bunte Reiher.*
 Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 100. n. 120.
 Latham, Syſt. ornithol. II. p. 692. n. 56. Ardea (Variegata) ferruginea, fuſco-maculata, ſubtus pallidior, fronte nigra, gula alba.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der ſlavoniſche Reiher.*
 Latham, Syſt. ornithol. II. p. 679. n. 16. Ardea (Obſcura) occipite criſtato, penna ſolitaria, corpore caſtaneo ſupra vireſcente-aureo, ſubtus caſtaneo albo ferrugineoque longitudinaliter liturato, remigibus apice macula alba.

2. *Der braune cayenniſche Reiher.*
 Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 700. n. 83. Ardea (Fuſca) criſta capitis nigricante, corpore fuſco-nigricante, ſubtus albo, pectore maculis fuſcis elongatis.
 Büffon, oiſ. VII. p. 381. pl. enl. 858. Heron brun.

3. *Der indianiſche Reiher.*
 Latham, Syn. Suppl. p. 238. Lohaujung Heron.
 Latham, Syſt. ornithol. II. p. 701. n. 86. Ardea (Indica) fuſca viridi-varia, remigibus ſecundariis viridibus, cauda nigra, tectricibus alarum, remigibus primoribus corporeque ſubtus albis.

4. *Der gelbhälſige Reiher.*
 Latham, Syn. Suppl. p. 239. Yellow-necked Heron.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 701. n. 87. Ardea (Flavicollis) crista occipitis corporeque nigris, collo lateribus flavescente, anterius castaneo, pennis albo nigroque marginatis.

5. *Der neuholländische Reiher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 701. n. 88. Ardea (Novae Hollandiae) subcristata plumbeo-cinerea, subtus ruso-ferruginea, facie ultra oculos gula iuguloque albis.

85. GESCHLECHT. TANTALUS. *Der Brachvogel.* (Sichelreiher.)
Müller, Natursyst. II. p. 389. Gen. LXXXV.
Leske, Naturgesch. p. 275. Gen. LV.
Borowsky, Thierreich, III. p. 71. Gen. XLVII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 213. Gen. LVII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 415. Gen. XXXVII.
Bechstein, Naturg. Deutschl. II. p. 70. Gen. XXVII.
Halle, Vögel, p. 509. Gen. II.
Onomat. hist. nat. VII. p. 435.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 426.
Klein, av. p. 109. Trib. II. A. Numenius.
Brisson, ornitholog. II. p. 289. Gen. LXXVIII. Numenius.
Batsch, Thiere, I. p. 385. Gen. XCVI.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 702. Gen. LXX.
Hermann, tab. affinit. anim. p. 133. 141.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 295. Gen. XLVIII.

1. LOCULATOR. *Der Waldpelikan.*
Müller, Natursystem, II. p. 389. n. 1. *der Nimmersatt.*
Leske, Naturgesch. p. 276. n. 1. *der Nimmersatt.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 71. n. 1. *der Nimmersatt, Harpunreiher.*

Funke, Naturgesch. I. p. 314. *Nimmersatt.*

Ebert, Naturl. II. p. 90. *Nimmersatt, amerikanischer Pelikan.*

Halle, Vögel, p. 511. n. 588. *der schwarze große Brachvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 197. n. 187. *der Waldpelikan.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 426. n. 277. *der Waldpelekan.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 438. *der große schwarze Brachvogel.*

Klein, av. p. 109. n. 6. Numenius niger, Curiaca.

Klein, Vorber. p. 203. n. 6. *schwarzer Braacher.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 112. n. 6. *schwarzer Braacher.*

Klein, av. p. 127. C. Tantalus, Loculator.

Klein, Vorbereit. p. 235. C. *hochbeiniger Mauchler, Baumpelikan.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 133. n. 3. *der Nimmersatt, Sackträger.*

Brisson, ornithol. II. p. 295. n. 8. grand Courly d'Amerique.

Batsch, Thiere, I. p. 389. *der Nimmersatt, Harpunreiher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 702. n. 1. Tantalus (Loculator) facie caerulescente, rostro rubescente, pedibus, remigibus rectricibusque nigris, corpore albo.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 62. *der amerikanische Pelikan.*

Taube, Slavon. u. Syrm. I. p. 23. *Nimmersatt.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 279. n. 2. *der Kropf-Pelekan.*

Meidinger,

Meidinger, Vorlef. I. p. 138. n. 1. *der Nimmerfatt.*
Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 1. Tantalus Loculator.
Jonfton, av. p. 187. Curicaca.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 133. Tantalus Loculator.
Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 296. n. 1. *der Waldpelikan.*

β. T. capite et collo albis flavo variegatis, corpore nigro, dorfo, capite ventreque cinereis. *
Latham, Syft. ornithol. II. p. 703. n. 1. β.
Will. ornithol. p. 295. Tab. 54. — Raj. Syn. p. 103. n. 4. Curicaca.

γ. T. albus, alis fere totis caudaque nigris. *
Latham, Syft. ornithol. II. p. 703. n. 1. γ.

2. FALCINELLUS. *Der Sichelfchnabel.*
Müller, Naturfyftem, II. p. 390. n. 2. *der Sichelfchnabel.*
Borowfky, Thierreich, III. p. 72. n. 2. *der Sichelfchnabel.*
Bechftein, Naturgefch. I. p. 415. n. 1. *der Sichelfchnabel.*
Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. III. p. 70. n. 1. *der Sichelfchnäbler.*
Halle, Vögel, p. 510. n. 586. *der dunkelbraune Brachvogel.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 429. A. *der Sichelfchnabel.*
Onomat. hiftor. nat. VII. p. 436. *der braungrüne Brachvogel.*
Klein, av. p. 110. n. 8. Numenius fubaquilus.
Klein, Vorbereit. p. 203. n. 8. *braunrother Bracher.*

Klein,

Klein, verb. Vögelhift. p. 112. n. 8. *braunrother Braacher.*

Gesner, Vögelb. p. 444. *ein welscher Vogel, Sichler oder Sägyser genannt*; mit 1 Fig.

Brisson, ornithol. II. p. 293. n. 4. Courly verd.

Batsch, Thiere, I. p. 389. *der Sichelschnabel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 67. Bay Ibis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 707. n. 14. Tantalus (Falcinellus) facie nigra, pedibus caeruleis, alis caudaque violaceis, corpore castaneo.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 355. *der Sichelschnabel, kleiner Brachvogel.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 8. Scolopax Falcinellus; *Ryle, Domschnepfe.* Tab. 13.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 106. n. 131. *der rothbraune Brachvogel mit grünen Flügeln.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 134. n. 3. *der braungrüne Brachvogel.*

Naturf. XIII. p. 210. n. 111. *der Sichelschnabel.*

Neue schwed. Abhandl. III. p. 106. Tantalus Falcinellus.

Charleton, onom. zoic. p. 103. n. 7. Falcinellus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 22. n. 178. Tantalus (Falcinellus) facie nigra, pedibus caeruleis, alis caudaque violaceis, corpore castaneo.

Kramer, Austr. p. 350. n. 2. Numenius rostro arcuato, corpore castaneo, alis et cauda caeruleo viridi violaceoque splendentibus, pedibus obscure virentibus; *türkischer Goisser, türkischer Schnepf.*

Brünniche, ornith. bor. p. 49. n. 167. Scolopax (Falcinellus) rostro depresso, apicibus decurvatis, corpore fusco lituris luteis, rectricibus cinereis apice albis, intermediis nigris immaculatis.

Jonston, av. p. 154. Falcinellus seu Falcata.

β. Bech-

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 72. *der kastanienbraune Sichelschnäbler.*

Halle, Vögel, p. 511. n. 589 *der rothe kleine Brachvogel mit grünen Flecken.*

Brisson, ornith. II. p. 294. n. 5. Courly marron.

Latham, Syn. III 1. p. 114. n. 12. Var. A. (9)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 707. n. 14. β. T. splendide castaneus, pectore viridi.

Marsil. Dan. V. p. 40. Tab. 18. Arcuata minor, puniceo colore, pectore virescente.

8. VIRIDIS. *Der grüne Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 707. n. 15. Tantalus (Viridis) viridis aureo splendens, capite, collo corporeque subtus nigricantibus, facie nuda colloque anterius fasciis tribus nigris.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. *der grüne Tantalus.*

9. IGNEUS. *Der feuerglänzende Brachvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 708. n. 16. Tantalus (Igneus) corpore nigricante caeruleo-viridi- et vinaceo-variegato-nitente, capite colloque nigris, pennis albido fimbricatis.

19. LEUCOCEPHALUS. *Der weißköpfige Brachvogel* (10)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 706. n. 10. Tantalus (Leucocephalus) facie rostroque flavis, corpore albo, tectricibus alarum remigibusque nigris, uropygii pennis longissimis pedibusque roseis.

Latham, Syn. Suppl. p. 240. White-headed Ibis.

Naturf.

(9) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

(10) Im Naturf. a. a. O heißt es: während der Regenzeit verloren seine schönen rosenrothen Federn *ihre Farbe.*

Naturforsch. I. p. 274. n. 10. *der weißköpfige Ibis oder Nilreiher.*

Berlin. Samml. IX. p. 193. *der weißköpfige zeylonische Ibis.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 189. p. 627. mit 1 Fig.

11. Calvus. *Der kahlköpfige Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 708. n. 17. Tantalus (Calvus) capite colloque supremo nudis, corpore nigro viridi splendente, pileo, rostro pedibusque rubris.

12. Manillensis. *Der luçonische Brachvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 708. n. 18. Tantalus (Manillensis) ruso-fuscus, rostro lateribusque capitis nudis virescentibus, pedibus rubris.

Sonnerat, Reis. n. Neuguinea, p. 32. *der braunrothe Krummschnabel.*

3. Minutus. *Der kleine Brachvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 391. n. 3. *der kleine Kropfvogel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 439. *der kleinere Brachvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 91. *Courly, Matuicui.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 708. n. 19. Tantalus (Minutus) facie, rostro pedibusque virescentibus, corpore ferrugineo subtus albo.

13. Cristatus. *Der gehäubte Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 709. n. 20. Tantalus (Cristatus) cristatus ferrugineus, capite, crisso caudaque nigris, alis albis.

14. Ni-

14. NIGER. *Der ſchwarze Ibis.* (1)
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 214. ad n. 1. *der ſchwarze etwas kleinere Ibis.*
Halle, Vögel, p. 512. n. 590. *der ſchwarze Brachvogel.*
Klein, av. p. 110. n. 9. Numenius holoſericus?
Klein, Vorbereit. p. 203. n. 9. *Seidenbracher?*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 112. n. 9. *Sammeter Braacher.*
Gesner, Vögelb. p. 340. *der ſchwarze Ibis.*
Briſſon, ornithol. II. p. 299. n. 13. Ibis.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 707. n. 13. Tantalus (Niger) niger, capite anteriore nudo rubro, rectricibus nigris, roſtro pedibusque rubris.
Pallas, Reiſe, Ausz. I. p. 316. *ſchwarze Sichelſchnepfen??* Tantalus niger??
Mannichf. II. p. 620. *der ſchwarze ägypt. Storch.*
Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 144. n. 18. *β.* Ibis nigra.
Linné, Syſt. Nat. Edit. XII. I. p. 241. n. 4. *Obſ.* Ibis nigra.
Charleton, onomaſt. zoic. p. 102. n. 2. Ibis nigra.
Jonſton, av. p. 149. Ibis nigra.
Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 30. Ibis nigra.

4. IBIS. *Der Ibis.* (2)
Müller, Naturſyſt. II. p. 391. n. 4. *der egyptiſche.*
Leske,

(1) Vorerſt bleibt es allerdings noch völlig unentſchieden, ob dieſs wirklich eine eigne Gattung ſey oder nicht. Dieſs bey Seite geſetzt aber begreiſe ich nicht, wie *Latham* a. a. O. ſagen kann: *Habitat copioſe in Volgae paludoſis.* Vielleicht gründet ſich dieſe Behauptung auf eine Relation von *Pallas*, ob er ihn gleich nicht anführt. Aber ſollte des *Pallas Tantalus niger* wirklich dieſe Gattung ſeyn?

(2) Das berühmte, ehedem in Aegypten auf den daſigen alten Denkmählern verewigte, göttlich verehrte, und ſo, wie die dama-

Leſke, Naturgeſch. p. 276. n. 2. *der Ibis.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 72. n. 3. *der Ibis, ägyptiſche Brachvogel, Nilreiher.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 213. n. 1. Tantalus (Ibis) facie rubra, roſtro luteo, pedibus griſeis, remigibus nigris, corpore ruſeſcente-albido.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 415. n. 2. *der Ibis.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 314. *der Ibis.*
Ebert, Naturl. II. p. 91. *der Ibis.*
Halle, Vögel, p. 530. n. 626. *der Nilreiher.* Fig. 46.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, p. 198. n. 188. *der Nilreiher.*
Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 289 *Ibis.*
Onomat. hiſtor. nat. IV. p. 490. *der Nilreiher.*
Handb. d. Naturgeſch. II. p. 333. *der Ibis.*
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 131. n. 14. *ägyptiſcher Ibis.*
Gesner, Vögelb. p. 340. *der Ibis.*
Briſſon, ornith. II. p. 299. n. 14. Ibis blanc.
Batſch, Thiere, I. p. 389. *der Ibis oder ägyptiſche Brachvogel.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 706. n. 11. Tantalus (Ibis) facie rubra, roſtro luteo, pedibus griſeis, remigibus nigris, corpore ruſeſcente-albido.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 706. n. 12. Tantalus (Aethiopicus) albus, capite colloque ſuperiore fuſcis, dorſo poſtico remigibusque nigris.

Bruce,

damaligen menſchlichen Leichen zu Mumien koſtbar einbalſamirte, und in beſondern Gewölbern in gröſster Menge beygeſetzte, allen Familien bekannte Thier, iſt jetzt, wie *Shaw* a. a. O. p. 352. ſagt, daſelbſt ſo auſserordentlich ſelten geworden, daſs er nicht einmal erfahren können, daſs man es angetroffen habe.

Bruce, Reiſ. n. d. Quellen des Nils, V. p. 175. Tab. 35. *Abou Hannes.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 103. *der Schnabel vom ägyptiſchen Reyger, Ibis genannt.*

Shaw, Reiſ. p. 305. 352. 369. *der Ibis.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 105. n. 128. Ardea Ibis.

Eberhard, Thiergeſch. p. 98. *der Ibis.*

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgeſch. II. p. 237. anatomiſche Beſchreib. des weiſsen Ibis. Tab. 73. *der Ibis.* Tab. 74. die Zergliederung.

Berlin. Samml. VI. p. 269. *der Ibis.*

Gazet. lit. de Berlin. 1773. p. 355. *Ibis?*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 102. n. 2. Ibis candida.

Jonſton, av. p. 149. Ibis candida.

Cicero, de nat. Deor. L. I. c. 36. Ibes.

Plin. hiſt. nat. L. 8. c. 27. L. 10. c. 12. 28. 30. Ibis.

Aelian. de nat. anim. L. 2. c. 38. Ἶβις.

Ariſtot. hiſtor. anim. L. 9. c. 37. Ἴβιες.

Strabo, geogr. L. 17. p. 823. Ἶβις.

Plutarch, de ſolert. anim. p. 972. et de Iſid. p. 381.

Gaudent. Merul. memorab. L. 3. c. 50.

Middleton's miſcellan. works. Vol. IV. Tab. 10. p. 90 ſqq.

Caylus, Recueil d'Antiquités Vol. VI. Tab. XI. fig. 1.

Hermann, tab. aff. anim. p. 133. Tantalus Ibis.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 296. n. 2. *der Ibis.*

5. Ruber. *Der ſcharlachrothe Brachvogel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 392. n. 5. *der rothe Brachvogel.*

Halle, Vögel, p. 510. n. 587. *der karminrothe Brachvogel.*

Halle, Vögel, p. 530. n. 625. *der Purpurreiher.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 198. *der rothe Brachvogel.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 440. *der rothe Brachvogel.*

Klein, av. p. 124. n. 11. Ardea porphyrio.

Klein, Vorbereit. p. 230. n. 11. *rother Reyger.*

Klein, av. p. 109. n. 5. Numenius ruber.

Klein, Vorbereit. p. 202. n. 5. *rother Braacher.*

Klein, verb. Vögelh. p. 112. n. 5. *rother Braacher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 427. n. 278. *der ſcharlachrothe Ibis.*

Briſſon, ornithol. II. p. 298. n. 12. Courly rouge du Bréſil.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 703. n. 2. Tantalus (Ruber) facie, roſtro pedibusque rubris, corpore ſanguineo, alarum apicibus nigris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 68. *der rothe Brachvogel.*

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 103. *der guianiſche Keilhaken, oder der indianiſche rothe Keilhaken.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 1. Scolopax (Rubra) roſtro arcuato, pedibus rubris, corpore ſanguineo, alarum apicibus nigris.

Moehring, av. gen. p. 71. n. 80. Ibis.

Bellon. av. L. 4. c. 3. Ibis.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 116. n. 3. Guara.

Jonſton, av. p. 198. Guara.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Tantalus Ruber.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 297. n. 3. *der ſcharlachrothe Ibis.*

6. ALBUS.

6. Albus. *Der weiße Brachvogel.*

Müller, Naturſ. II. p. 392. n. 6. *der weiße Brachvogel.*

Halle, Vögel, p. 510. n. 585. *der weiße Brachvogel mit rothem Schnabel.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 535. *der weiße Brachvogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 428. n. 280. *der weiße Ibis.*

Klein, av. p. 109. n. 3. Numenius albus.

Klein, Vorber. p. 202. n 3. *weißer Braacher.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 112. n. 3. *weißer Braacher.*

Briſſon, ornithol. II. p. 296. n. 10. Courly blanc du Bréſil.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 705. n. 9. Tantalus (Albus) facie, roſtro pedibusque rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 64. *der weiße Brachvogel.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 279. n. 11. *die weiße Schnepfe.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 2. Scolopax (Alba) roſtro arcuato, pedibus rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Tantalus Albus.

7. Fuscus. *Der braune Brachvogel.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 392. n. 7. *der braune Brachvogel.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 438. *der braune amerikaniſche Brachvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 428. n. 279. *der braune Ibis.*

Klein, av. p. 109. n. 4. Numenius fuſcus.

Klein, Vorber. p. 202. n. 4. *brauner Braacher.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 112. n. 7. *dunkel-brauner Braacher.*

Briſſon, ornithol. II. p. 297. n. 11. Courly brun du Breſil.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 705. n. 8. Tantalus (Fuſcus) roſtro apice inflexo, corpore nigro albo nebuloſo, uropygio alisque ſubtus albis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 66. *der braune Brachvogel.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 3. Scolopax (Fuſca) roſtro arcuato, pedibus rubris, corpore fuſco, cauda baſi alba.

15. Coco. *Der Koko.* (9)

Latham, Syn. Suppl. p. 241. Coco Ibis.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 705. n. 9. β. T. facie roſtroque flavo-carneis, pedibus ex carneo pallentibus, corpore albo, remigibus 3. extimis apice nigris.

16. Pillus. *Der Pillu.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 709. n. 22. Tantalus (Pillus) facie, roſtro pedibusque fuſcis, corpore albo, remigibus rectricibusque nigris.

17. Cayennensis. *Der cayenniſche Brachvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 704. n. 3. Tantalus (Cayanenſis) viridi-nigricans, remigibus rectricibusque ſaturatioribus, roſtro nigricante, pedibus flaveſcentibus.

18. Mexicanus. *Der mexicaniſche Brachvogel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 295. n. 7. Courly varié du Mexique.

Latham,

(9) Nach *Latham* eine Varietät von *Tantalus Albus* n. 6.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 704. n. 4. Tantalus (Mexicanus) purpureo viridi et nigricante varius, ſubtus fuſcus rubro variegatus, tectricibus alarum viridibus, roſtro caeruleſcente.

19. Melanopis. *Der Brachvogel mit ſchwarzem Geſicht.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 704. n. 5. Tantalus (Melanopis) dorſo, alis faſciaque pectorali cineris, capite colloque fulvis, remigibus, rectricibus, femoribus criſſoque nigris.

20. Albicollis. *Der weißhälſige Brachvogel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 704. n. 6. Tantalus (Albicollis) fuſcus griſeo undulatus, capite colloque rufo-albis, tectricibus alarum maioribus albis.

21. Griseus. *Der graue Brachvogel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 296. n. 9. petit Courly d' Amerique.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 705. n. 7. Tantalus (Griſeus) albidus, capite poſteriore colloque griſeis, uropygio, remigibus rectricibusque nigro-vireſcentibus.

Jonſton, av. p. 211. Matuitui.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 14 Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung iſt die Varietät β hinzugekommen. Bey der 4ten iſt *Tantalus Niger* als eine beſondere Gattung von *T. Ibis* getrennt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der schwarzköpfige indianische Brachvogel.*
Latham, Syn. Suppl. p. 240. Black-headed Ibis.
Latham, Syst. ornithol. II. p 709. n. 21. Tantalus (Melanocephalus) albus, rostro, capite pedibusque nigris.

2. *Der Hagedash vom Vorgeb. der g. Hoffn.*
Latham, Syst. ornith. II. p 709. n. 23. Tantalus (Hagedash) cinereus, dorso viridi flavoque vario, alis caeruleo-nigris, tectricibus minoribus violaceis.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

CORRIRA. *Der Laufvogel.*
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 181. Gen. XLIX.
Brisson, ornitholog. II. p. 505. Gen. CXV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 787. Gen. LXXXVI.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 297. Gen. XLIX.

1. ITALICA. *Der italienische Laufvogel.* (*)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 181. III. p. 223. *der italienische Kurrier.*
Onomat. histor. nat. VII. p. 582. *der Laufer.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 383. *der Curier.*
Eberhard, Thiergesch. p. 121. *der Courier.*
Brisson, ornith. II. p. 505. n. 1. Coureur.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 787. n. 1. Corrira (Italica) supra ferruginea, subtus alba, rectricibus binis intermediis candidis, apice nigris.
Charleton, onomast. zoic. p. 97. n. 9. Trochilus, Corrira, seu Tabellaria Aldrovandi.
Jonston, av. p. 196. Trochilus, Corrira.

86. GE-

(*) Soll, nach *Bechstein*, der *Charadrius Oedicnemus* seyn, dem man Füfse von der *Avocette* angesetzt hatte.

86. GESCHLECHT. SCOLOPAX. *Die Schnepfe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 393. Gen. LXXXVI.
Leske, Naturgeſch. p. 274. Gen. LIV.
Borowsky, Thierreich, III. p. 86. Gen. LI.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 214. Gen. LVIII.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 423. Gen. XLI.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. III. p. 72. Gen. XXVIII.
Halle, Vögel, p. 479. Gen. I.
Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 740.
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 25.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 429. 430.
Klein, av. p. 99. Gen. XI. p. 109. Trib. II. A.
Briſſon, ornith. II. p. 277. Gen. LXXVI. Limoſa. p. 284. Gen. LXXVII. Scolopax. p. 289. Gen. LXXVIII. Numenius.
Batſch, Thiere, I. p. 386. Gen. CI.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 710. Gen. LXXI. Numenius (*Curlew*). p. 713. Gen. LXXII. Scolopax (*Snipe.*)
Hermann, tab. affinit. animal. p. 140.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 297. Gen. L.

1. GUARAUNA. *Die braſilianiſche Schnepfe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 394. n. 1. *der braſilianiſche Schnepf.*
Onomat. hiſt. natur. IV. p. 98. *der dunkelbraune Brachvogel.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 102. Guarauna.
Briſſon, ornithol. II. p. 294. n. 6. Courly brun d'Amerique.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 712. n. 8. Numenius (Guarauna) roſtro flavicante, corpore fuſco albo-ſtriato, pedibus fuſcis.

Jonston, av. p. 199. Guarauna Brasiliensibus; Rusticola aquatica.

17. BOREALIS. *Die Esquimauxschnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 429. n. 281. *der Esquimauxbrachvogel.* Tab. 19. unt. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 712. n. 9. Numenius (Borealis) rostro pedibusque nigris, corpore fusco griseo maculato, subtus ochroleuco.

19. AFRICANA. *Die afrikanische Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 712. n. 10. Numenius (Africanus) cinereus, facie, collo subtus, abdomine, uropygio, tectricibus alarum mediis apice albis, pectore cinerascente ferrugineo maculato.

20. PYGMEA. *Die Lerchenschnepfe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 87. n. 4. *die Lerchenschnepfe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 291. not. o.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 713. n. 11. Numenius (Pygmeus) fusco ferrugineo alboque variegatus, corpore subtus uropygioque albo, remigibus rectricibusque exterioribus albo marginatis.

2. MADAGASCARIENSIS. *Die madagascarische Schnepfe.*

Müller, Natursystem, II. p. 394. n. 2. *der madagascarische Schnepf.* Tab. 16. fig. 1.

Onomat. histor. nat. VII. p. 41. *die Schnepfe aus Madagascar.*

Brisson, ornitholog. II. p. 292. n. 3. Courly de Madagascar.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 710. n. 11. Numenius (Madagascariensis) rostro pedibusque

que rufescentibus, maculis dorsi rhomboidalibus.

3. ARQUATA. *Die Doppelschnepfe.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 394. n. 3. *der Krummschnabel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 86. n. 1. *der Wettervogel, Doppelschnepfe.* Tab. 51.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 424. n. 1. *die Doppelschnepfe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 73. n. 1. *die Doppelschnepfe, der große Brachvogel, Keilhaken.* p. 79. *der Wettervogel, Brachvogel, Brachhuhn, Giloch, Windvogel, Gewittervogel, (Güthvogel, Geisvogel, Himmelgeis, Goißar, Brachschnepfe, Kronschnepfe, Regenworp, Regenwulp,) braunschnäblige Schnepfe, Krummschnabel, Fastenschlier.* Tab. 5.

 Halle,

(4) Flügelweite 3 1/3 Fuss nach *Brisson*. Gewicht 22 bis 37 Unzen, nach *Pennant*. Ersterer vergleicht die Stärke (Crassities) mit den Kapaunen, welches aber übertrieben ist. Diese Vögel fliegen nicht so schnell wie andere Schnepfen, sind auch, ob sie gleich scheu sind, doch in Vergleichung mit andern dieses Geschlechts noch am leichtesten zu berücken. In Deutschland sieht man sie mehrentheils als Zugvögel am Ende des Septembers oder Anfang des Octobers in grossen und kleinen Heerden auf Sümpfen und Rieden, oder Brach- und Saatfeldern schnell herumlaufen. Im Frühjahr und Herbst ziehen sie sich immer nach den Ufern des Meers, der Landseen, Teiche, Flüsse, und nach den Sümpfen. Sie brüten im April, und die Brützeit über lebt jedes Paar für sich allein. Das Nest besteht nur aus einigen Grashalmen, und ist in Sümpfen auf einem trocknen Rasenhügel angebracht. Die Eyer werden drey Wochen bebrütet. Man kann diese Thiere mehrere Jahre lebendig unterhalten, wenn man ihnen grüne Kräuter unter Gerstenschrot und Brodt mengt. Die Jungen erhalten erst im zweyten Jahre ihre eigentlichen Farben.

Halle, Vögel, p. 509. n. 583. *der Gewittervogel.* Fig. 40.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 210. n. 191. *die Doppelſchnepfe.*

Onomat. hiſtor. nat. I. p. 776. *der Brachvogel, Wettervogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 430. A. *der Wettervogel, die Doppelſchnepfe.*

Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 110. *der große Brachvogel.*

Klein, av. p. 109. n. 1. Numenius, Arquata Gesn.

Klein, Vorbereit p. 201. n. 1. *deutſcher Braacher, Brachvogel, Regen-, Wind-, Wettervogel.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 112. n. 1. *teutſcher Bracher, großer Feldmäher.*

Klein, ſtemm. av. p. 24. Tab. 24. fig. 3.

Klein, Vögeleyer, p. 31. Tab. 11. fig. 5.

Gesner, Vögelb. p. 47. *Brachvogel;* m. 1 Fig.

Briſſon, ornith. II. p. 289. n. 1. Courly.

Batſch, Thiere, I. p. 200. *der Wettervogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 242. Common Curlew.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 710. n. 1. Numenius (Arquata) cineraſcente nigroque varius, pedibus caeruleſcentibus, alis nigris, maculis niveis.

Beſeke, Naturgeſch. der Vögel Kurl. p. 59. n. 115. *der Krummſchnabel, die Kronſchnepfe.*

Siemſſen, meklenburg. Vögel, p. 171. n. 7. *die krummſchnablichte Schnepfe, Regenwölp.*

Graumann, diätet. Wochenbl. II. p. 104. *Keilhaken.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 355. *der Krummſchnabel, Bracher, Jütvogel.*

Fiſcher, Naturgeſch. v. Livl. p. 86. n. 104. *Bracher, Wettervogel.*

Leem,

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 133. *Gusgaſtak.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 107. n. 2. *Heel-ſpove.*

Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 271. *Krumm-ſchnabel.*

Olaffen, Reiſ. d. Isl. I. p. 308. a. *Spoe, Spov.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *Brach- oder Korn-ſchnepfe.*

Naturf. XIII. p. 210. n. 112. *der Krummſchnabel.*

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 283. n. 34. *der Gewittervogel.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 1. Arquata.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 5. Scolopax (Arquata) roſtro arcuato, pedibus caeruleſcentibus, alis nigris, maculis niveis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 179. Scolopax (Arquata) roſtro arcuato, pedibus caeruleſcentibus, alis nigris, maculis niveis.

Kramer, Auſtr. p. 350. n. 1. Numenius roſtro arcuato, alis nigris, maculis niveis, pedibus caeruleſcentibus; *Goiſſer, Brachſchnepf.*

Moehring, av. gen. p. 74. n. 87. Numenius.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 315. Pardalus primus; *ein Geißvogel, Brackhun, Giloch, Himmel-Geiß, großer Brachvogel.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 106. n. 2.' Arquata, Arcuata, Numenius veterum, Curlinus.

Muſ. Worm. p 307. Arquata ſeu Numenius.

Jonſton, av. p. 158. Arquata.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Scolopax Arquata.

Schäfer, element. ornith. tab. 50.

Sepp, Voy. tab. p. 109. — *Collin.* anat. II. tab. 21.

Donn-

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 298. *die Doppelschnepfe.*

β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 710. n. 1. β. Numenius rufo-nigroque varius, corpore subtus pallide-rufescente, pedibus nigris, alis nigris maculis rufescentibus.

γ. *Die rosenrothpunktirte Doppelschnepfe.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 79. n. 1.

δ. *Die weiße Doppelschnepfe, mit grauem Schnabel und gelblichweißen Füßen.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 79. n. 2.

21. Luzoniensis. *Die gefleckte luçonische Schnepfe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 711. n. 3. Numenius (Luzoniensis) albus, capite colloque striis, abdomine caudaque fasciis nigris, dorso fusco maculis albis, vertice nigro.
Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 32. *der gefleckte Krummschnabel.*

22. Tahitiensis. *Die tahitische Schnepfe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 711. n. 4. Numenius (Tahitiensis) albo-rubescens, collo striis nigris, dorso tectricibusque alarum nigricante et albido undulatis, cauda basi maculis, ad apicem fasciis nigris.

23. Leucocephala. *Die weißköpfige Schnepfe.*
Latham, Syn. Supplem. p. 242. White-headed Curlew.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 711. n. 5. Numenius (Leucocephalus) cyaneus, capite et collo supremo griseo-albis, remigibus nigris, rostro rubro.

4. Phaeo-

4. PHAEOPUS. *Der Regenvogel.* (5)

Müller, Naturf. II. p. 395. n. 4. *der Regenvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 87. n. 2. *der Regenvogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 424. n. 2. *der Regenvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 80. n. 2. *der Regenvogel.* p. 83. *Saatvogel, mittlerer Brachvogel, Güsvogel, Regenworp, Regenwelp, Güthvogel, Weid- u. Wettervogel, türkischer Goiser, türkische Schnepf, Blaubeerschnepfe, Blaufuß.*

Halle, Vögel, p. 509. n. 584. *der kleinere Gewittervogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 430. B. *der Regenvogel.*

Onomat. hist. nat. I. p. 777. *der kleine Brachvogel.*

Klein, av. p. 109. n. 2. Numenius minor.

Klein, Vorbereit. p. 202. n. 2. *kleinere Braacher.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 112. n. 2. *kleiner Braacher.*

Klein, stemmat. av. p. 24. Tab. 24. fig. 4.

Brisson, ornith. II. p. 291. n. 2. petit Courly ou le Corlieu.

Batsch, Thiere, I. p. 398. *der Regenvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 711. n. 6. Numenius (Phaeopus) rostro nigro, pedibus caerulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus, uropygio albo.

Frisch,

(5) Flügelweite 2 5/12 Fuss. *Brisson.* Gewicht 12 Unzen. *Penn.* Im Syst. ist *Kramer* El. p. 350. angeführt, aber *ohne Nummer;* so auch beym *Latham* n. 2. kann es nicht seyn; denn diese ist schon bey *Tantalus Falcinellus* p. 648. n. 2. umständlicher citirt; gleichwohl führt *Bechstein* beym *Regenvogel* die Synonymen *türkischer Goiser, türkische Schnepf* mit an, und dies wäre dann *Kram.* n. 2. — Wer hat Recht?

Frisch, Vögel, Tab. 225. *die krummschnäblige Schnepfe oder Keilhake, der Brach- oder Regenvogel, die kleinere Art.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 97. *der Wimbrell oder kleine Bracher.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 59. n. 116. *der Regenvogel, Blaubeerschnepfe.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 171. n. 8. *die Moorschnepfe.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 86. n. 110. *Blaubeerschnepfe.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 356. *der Regenvogel.*

Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 19. *Regenvögel.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 107. n. 132. *der Brachvogel mit blaugrauen Füßen.*

Naturforsch. XIII. p. 210. n. 113. *der Regenvogel.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 3. *Mellemspove.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 184. *Spove.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 2. Numenius minor.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 146. n. 6. Scolopax (Phaeopus) rostro arcuato, pedibus caerulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 180. Scolopax (Phaeopus) rostro arcuato, pedibus caerulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Scolopax Phaeopus.

5. Fusca.

5. FUSCA. *Die dunkelbraune Schnepfe.*
Müller, Naturſyſtem, II. p. 395. n. 5. *der gewölkte Schnepf.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 438. n. C. *die dunkelbraune Schnepfe.*
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 32. *die braune Schnepfe.*
Briſſon, ornithol. II. p. 280. n. 4. Barge brune.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 724. n. 35. Scolopax (Fuſca) roſtro apice inflexo, corpore nigro albo nebuloſo, uropygio aliſque ſubtus albis.
Fiſcher, Livland, p. 86. n. 105. *gewölkter Schnepf.*
Tengmalm: neue ſchwed. Abhandl. IV. p. 47. Scolopax Fuſca.

24. CINEREA. *Der Terek.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 466. A. *die aſchgraue Avoſette. der Terek.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 724. n. 36. Scolopax (Terek) cinereo fuſco maculata ſubtus alba, collo ſubtus pectoreque cinereo nebuloſis, faſcia alarum remigibusque ſecundariis apice albis.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Scolopax cinerea.

25. SUBARQUATA. *Die rothbäuchige Schnepfe.* (6)
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 425. n. 3. *die rothbäuchige Schnepfe.*

Bechſtein,

(6) Hält ſich an groſsen Mooren, ſumpfigen Wieſen, und ſolchen Orten auf, wo Teiche und Flüſſe oft austreten. Kömmt in Thüringen in der Mitte des Märzes in kleinen Heerden an, und zieht in der letzten Hälfte des Octobers weg. Nährt ſich von Inſekten, Würmern, Grasſpitzen, Graswurzeln, auch grüner Saat. Legt im April auf einen Maulwurfs- oder Grashügel, in eine kleine Aushöhlung, ohne alle Zubereitung vier bis fünf gelbliche mit dunkelbraunen Flecken gezeichnete Eyer. Brütet 16 Tage. Die Jungen laufen

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 84. n. 3. *die rothbäuchige Schnepfe.* Tab. 6.

Hermann, tab. affin. anim. p. 141. Scolopax Subarquata.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 737. n. 39. (Mit *Tringa Islandica* einerley.)

26. Incana. *Die graue Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 724. n. 34. Scolopax (Incana) cinerea, iugulo, abdomine medio maculaque ante oculos albis.

27. Grisea. *Die braune Schnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 432. n. 286. *die braune Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 724. n. 34. Scolopax (Grisea) cinereo-fusca, nigro nebulosa, alis fuscis, dorso abdomine caudaque albis, uropygio rectricibusque nigro fasciatis.

28. Noveboracensis. *Die Schnepfe v. Neuyork.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 432. n. 285. *die Rothbrust.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 723. n. 32. Scolopax (Noveboracensis) nigro cinereo rubroque varia, dorso, abdomineque albis, alis cinereis, cauda albo nigroque fasciata.

29. Nigra. *Die schwarze Schnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 437. n. 298. *die schwarze Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 723. n. 31. Scolopax (Nigra) corpore toto aterrimo, rostro pedibusque rubris.

30. Nu-

laufen sogleich ins Gras, und nehmen ihre von der Mutter vorgezeigte Nahrungsmittel auf. *Bechstein.*

30. Nutans. *Die Nickſchnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 433. n. 287. *die Nickſchnepfe.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 723. n. 30. Scolopax (Nutans) cinerea ferrugineo varia, abdomine, uropygio caudaque albis, collo ſubtus, pectore, femoribus uropygioque maculis, cauda faſciis nigris.

31. Flavipes. *Die gelbbeinige Schnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 436. n. 295. *das Gelbbein.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 723. n. 29. Scolopax (Flavipes) albida nigro maculata, alis fuſcis, collo ſubtus pectoreque albo nigroque maculatis, abdomine tectricibusque caudae albis, rectricibus albis faſciis fuſcis.

32. Melanoleuca. *Die Steinſchnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 435. n. 293. *die Steinſchnepfe.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 723. n. 38. Scolopax (Melanoleuca) corpore maculis, uropygio caudaque faſciis albis nigrisque, remigibus primoribus nigricantibus, pedibus flavis.

33. Semipalmata. *Die Schwimmſchnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 437. n. 297. *die Schwimmſchnepfe.* Tab. 20. *Größ. Fig.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 722. n. 27. Scolopax (Semipalmata) nigro maculata, ſupra cinerea, ſubtus alba, remigibus primoribus faſcia, ſecundariis rectricibusque extimis toto albis.

6. Rusticola. *Die Waldschnepfe.* (7)

Müller, Natursystem, II. p. 396. n. 6. *die Waldschnepfe.*

Leske, Naturgesch. p. 275. n. 1. *die Waldschnepfe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 88. n. 3. *die Waldschnepfe.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 214. n. 1. Scolopax (Rusticola) rostro basi rufescente, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capitis nigra.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 425. n. 4. *die Waldschnepfe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 90. n. 6. *die Waldschnepfe.* p. 107. *gemeine Schnepfe, Schneppe, Holzschnepfe, Buschschnepfe, Wasserrebhuhn, Bergschneppe, Schnepphuhn.* it. p. 718. 719.

Funke, Naturgesch. I. p. 249. *die Waldschnepfe.*

Ebert, Naturl. II. p. 92. *die gewöhnliche Waldschnepfe.*

Halle, Vögel, p. 479. n. 519. *die Waldschnepfe.* Fig. 35.

Meyer, Thiere, II. Tab. 90.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere II. p. 211. n. 193. *die Waldschnepfe.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 43. *die gemeine Schnepfe, Waldschnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 437. A. *die europäische Waldschnepfe.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 315. *die Schnepfe.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 110. *die Waldschnepfe.*

Klein,

(7) Länge etwas über 13 Zoll; nach *Brisson*. Flügelweite 1 1/2 Fuss, nach *Bechstein*. Gewicht 12 Unzen, nach *Pennant* und *Gesner*.

Klein, av. p. 99. n. 1. Scolopax.
Klein, Vorber. p 184. n. 1. *Waldschnepfe, Busch-, Holz-, Bergschnepfe.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 100. n. 1. *Waldschnepfe.*
Klein, stemmat. av. p. 20. Tab. 20. fig 1. a-c.
Klein, Vögeleyer, p. 30. Tab. 11. fig. 1. 2.
Gesner, Vögelb. p. 235. *Riethschnepffe, oder grösserer Schnepff.*
Gesner, Vögelb. p. 417. Scolopax.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 164. n. 1. *die Waldschnepfe.*
Brisson, ornitholog. II. p. 284 n. 1. Becasse.
Batsch, Thiere, I. p. 398. *die Waldschnepfe.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 713. n. 1. Scolopax (Rusticola) castaneo nigro griseoque varia, subtus rufescens fasciolis nigris, fascia capitis nigra, femoribus tectis.
Beseke, Vögel Kurlands, p. 59. n. 117. *die Waldschnepfe.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 356. *die Waldschnepfe.*
Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 186. n. 106. *Busch- oder Bergschnepfe.*
Cetti, Sardinien, II. p. 250. *die Schnepfe.*
White, Naturgesch. von England, p. 61. n. 5. *die Schnepfe.*
Boswell, Corsica, p. 45. *Schnepfen.*
Wolf, Ceyl. p. 136. *Waldschnepfen.*
Pallas, Reis. Ausz. III. p. 474. *Waldschnepfe.*
Taube, Slavon. u. Syrmien, I. p. 22. *Schnepfen?*
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170. n. 4. *Blomrokke.*
Döbel, Jägerpraktik, I. p. 49. *Waldschnepffen.*
Naumann, Vogelsteller, p. 159. *Waldschnepfe oder Becasse.*

Naturf. XIII. p. 211. n. 114. *der Waldſchnepf.*

Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 297. n. 102. *die Waldſchnepfe.*

Oekon. Zool. p. 78. n. 20. *die Waldſchnepfe.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 133. n. 1. *die Waldſchnepfe.*

Jablonsky, allgemein. Lex. p. 1014. *Holz- oder Waldſchnepfen.*

Zorn, Petinoth. II. p. 287. *die Waldſchnepfe.*

Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 96.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 108. n. 134. *die Waldſchnepfe.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 4. Ruſticola.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 146. n. 7. Scolopax (Ruſticola) roſtro recto laevi, pedibus cinereis, femoribus tectis, faſcia frontis nigra.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 181. Scolopax (Ruſticola) roſtro recto baſi ruſeſcente, pedibus cinereis, femoribus tectis, faſcia capitis niger.

Kramer, Auſtr. p. 351. n. 5. Numenius roſtri apice laevi, capite linea utrinque nigra, rectricibus nigris, apice albis; *Wald-Schnepff.*

Moehring, av. gen. p. 77. n. 97. Ruſticola.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 329. Perdix ruſtica maior; *Schnepffe*, *Schnep-Hun.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 108. n. 7. Scolopax, Ruſticola maior.

Schäfer, element. ornith. Tab. 61.

Jonſton, av. p. 160. Scolopax ſeu Perdix ruſtica.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 298. n. 2. *die Waldſchnepfe.*

β. *Die weiße Waldſchnepfe.*

Briſſon, ornithol. II. p. 285. A. Becaſſe blanche.

Klein, av. p. 100. n. 6. Scolopax alba. (Mit *Scol. Guarauna* verwechſelt.)

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 186. n. 6. *weiſse Waldſchnepfe.*
Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 102. *weiſse Waldſchnepfe.*
Latham, Syn. III. 1. p. 131.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 714. n. 1. β.
Friſch, Vögel, Tab. 230. *der weiſse Schnepf.*
Albin. av. III. 85. white Wood-Cock.

γ. *Die ſtrohgelbe Schnepfe.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 714. n. 1. δ.
Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 165. β. *die Wacholderſchnepfe, Macholler ſchnepp.*

δ. *Die Schnepfe mit röthlichem Kopfe, weiſsem Leibe und braunen Flügeln.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 714. n. 1. δ.

ε. *Die geſchäckte Schnepfe.* *
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 107. Var. 4.

ζ. *Die weiſsflügelige Schnepfe.* *
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 107.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 714. n. 1. ε. Scolopax corpore uſitato, alis totis niveis.

34. MINOR. *Die kleine Waldſchnepfe.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 430. n. 282. *die kleine Waldſchnepfe.* Tab. 19. obere Fig.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 714. n. 2. Scolopax (Minor) caſtaneo nigro rufoque varia, ſubtus flaveſcens, occipite nigro, faſciis quatuor transverſis flaveſcentibus, cauda nigra.

35. PALUDOSA. *Die Sumpfſchnepfe.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 714. n. 3. Scolopax (Paludoſa) ruſo nigroque varia, ſubtus albida nigro undulata, loris ſuperciliisque nigris.

36. MAIOR. *Die große sibirische Schnepfe.* (8)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 108. 719. *die Mittelschnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 438. B. *die große Schnepfe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 714. n. 4 Scolopax (Maior) nigro maculata, supra testacea, subtus albida, linea verticis testacea, altera utrinque nigra.

Frisch, Vögel, Tab. 228. *die Doppelschnepfe?*

37. CAYENNENSIS. *Die cayennische Schnepfe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 715. n. 5. Scolopax (Cayanensis) cinereo fusca testaceo varia, corpore subtus uropygioque albo, tectricibus alarum maioribus remigibusque primoribus basi albidis.

7. GALLINAGO. *Die Heerschnepfe.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 397. n. 7. *der Heerschnepf.*

Leske, Naturgesch. p. 275. n. 2. *die Heerschnepfe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 89. n. 4. *die Heerschnepfe.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 214. n. 2. Scolopax (Gallinago) rostro recto tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis fuscis quaternis; *Heerschnepfe, Himmelsziege, Haberbock.*

Bechstein,

(8) Gewicht 8 Unzen. *Penn.* — *Frischens* Doppelschnepfe scheint der Gestalt nach eine noch ungemauserte junge *Waldschnepfe*, der Beschreibung nach aber eine *Heerschnepfe* zu seyn.

(9) Frisst auch Getraide, zumal Hafer, und weiche Sumpfgraswurzeln. Das Weibchen brütet seine Eyer allein in drey Wochen aus. Die Streifen am Kopfe sind vor dem ersten Mausern noch nicht deutlich, auch oft in der Anzahl verschieden.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 426. n. 5. *die Heerschnepfe.*

Bechstein, Naturg. Deutschl. III. p. 110. n. 8. p. 720. *die Heerschnepfe.* p. 115. *die Becassine, Heerdschnepfe, Wasserschnepfe, Sumpfschnepfe, Riedschnepfe, Dobbelschnepfe, Grasschnepfe, Moosschnepfe, Wasserhühnchen, Bruchschnepfe, Himmelgeis, Schnibbe, Haarekenblatt, Haberbock, Haberlämmchen, Schnepfchen, kleine Pfulschnepfe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 249. *die Heerschnepfe, Becassine.*

Ebert, Naturl. II. p. 93. *die Wasserschnepfe.*

Halle, Vögel, p. 482. n. 521. *die Himmelsziege.*

Meyer, Thiere, II. Tab. 11.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 211. n. 194. *die Heerschnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 431. n. 283. *die gemeine Schnepfe.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 34. *die Sumpfschnepfe, Moosschnepfe, Heerschnepfe.*

Handb. d. deut. Thiergesch. p. 111. *die Becassine.*

Klein, av. p. 99. n. 2. Scolopax media.

Klein, Vorber. p. 185. n. 2. *Duppelschnepfe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 101. n. 2. *Duppelschnepfe.*

Klein, av. p. 100. n. 3. Scolopax quae *Capella coelestis* autorum.

Klein, Vorber. p. 185. n. 3. *Himmelsziege, Schnepfe, Herren- und Fürstenschnepfe, Becasse.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 101. n. 3. *Heerschnepfe.*

Klein, stemmat. av. p. 20. Tab. 20. fig. 2. a-c.

Gesner, Vögelb. p. 239. Gallinago, rusticola minor; *Herrschnepff, Harschnepff, Grasschnepff, Schnepfflein.*

Briſſon, ornith. II. p. 285. n. 2. Becaſſine.

Batſch, Thiere, I. p. 397. *die Heer-oder Sumpf-ſchnepfe.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 715. n. 6. Scolopax (Gallinago) roſtro tuberculato, corpore nigricante et fulvo vario, ſubtus albo, frontis lineis fuſcis quaternis.

Beſeke, Vögel Kurl. p. 59. n. 118. *die Heerſchnepfe.*

Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 166. n. 2. *die Heerſchnepfe, Haberzöge, Bekkaſſine.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 357. n. 115. *die Doppelſchnepfe.* p. 358. n. 116. *die Heerſchnepfe.*

Fiſcher, Livland, p. 86. n. 107. *Doppelſchnepfe, Heer-, Mooſſchnepfe.*

Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 252. *die Heerſchnepfe.*

White, Naturgeſch. von Engl. p. 61. n. 6. *Mooſſchnepfe.*

Nau, Entdeck. aus der Naturgeſch. I. p. 248. Scolopax Gallinago.

Leem, Finnm. p. 133. *Myrebuk.*

Oloffen, Reiſe d. Isl. I. p. 308. b) *Hroſſa Gökr, Myre-Skitr.*

Ström, Lappl. p. 247. *Myre-Snipe.*

Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 170. n. 5. *Myrſneppe, Horſegiäg.*

Pontoppidan, Naturhiſt. von Norwegen, p. 183. *Myr-Sneppe.*

Naturforſch. XII. p. 211. n. 115. *Doppelſchnepfe.* p. 212. n. 116. *Heerſchnepfe.*

Naturf. XVIII. p. 68. *Mooſſchneppe.*

Wigand, Abh. vom Guckguck u. ſ. w. p. 19-21. *Heerſchnepfe.*

Zorn, Petinoth. II. p. 422. *Waſſer-od. Mooſſchnepf.*

Naumann,

Naumann, Vogelfteller, p. 195. *Wafferschnepfe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 73. *Himmelsziege.*

Anweisung Vögel zu fangen, u. f. w. p. 394. *der Moosschnepf.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 111. n. 138. *die Moosschnepfe.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 219. n. 26. *die Becassine.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 133. n. 2. *die Moosschnepfe.*

Hannöv. Magaz. 1780. p. 415.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 96.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 6. Gallinago.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 147. n. 1. Scolopax (Gallinago) rostro recto, apice tuberculato, pedibus fuscis, lineis frontis fuscis quaternis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 23. n. 182. Scolopax (Gallinago) rostro recto tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis fuscis quaternis.

Kramer, Austr. p. 352. n. 6. Numenius capite lineis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculoso, femoribus seminudis; *Moosschnepf.*

Brünniche, ornith. bor. p. 48. n. 161. Scolopax (Gallinago) lineis frontis fuscis ternis, rectricibus lateralibus albis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 330. Perdix rustica minor; *Wafferschnepf.*

Charleton, onomast. zoic. p. 108. n. 8. Gallinago, Scolopax minor, Molliceps Aristotelis.

Fabric. fn. groenl. p. 106. n. 71. Scolopax (Gallinago) rostro recto tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis fuscis quaternis.

Jonston, av. p. 161. Scolopax, seu Gallinago minor.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 299. n. 3. *die Heerschnepfe.*

β. Sc. remige prima a latere anteriori non alba, sed nigra. *

Brünniche, ornith. bor. p. 49. n. 162.

38. GALLINARIA. *Die finnmarkische Schnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 438. D. *die finnmarkische Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 715. n. 7. Scolopax (Gallinaria) rostro tuberculato, corpore variegato, capite griseo, pedibus flavis.

8. GALLINULA. *Die Haarschnepfe.* (10)

Müller, Natursystem, II. p. 398. n. 8. *das Wasserhühnchen.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 90. n. 5. *das Wasserhühnchen, Rohrschnepfe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 427. n. 6. *die Haarschnepfe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 120. n. 10. *die Haarschnepfe.* p. 123. *Wasserhühnchen, Rohrschnepfe, Wasserschnepfe, Halbschnepfe.*

Halle, Vögel, p. 482. n. 522. *die Haarschnepfe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 212. n. 195. *die Haarschnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 432. n. 284. *das Wasserhühnchen.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 36. *Haarschnepfe, kleinste Schnepfe, Halbschnepfe.*

Klein, av. p. 100. n. 4. Scolopax minima.

Klein, Vorbereit. p. 185. n. 4. *kleinste Schnepfe.*

Klein,

(10) Gewicht, nach *Pennant*, unter 2 Unzen. Legt 4 bis 5 grüngelbe dunkelbraun gefleckte Eyer. Von den feinen, gleichsam haarigen Federn hat sie den Namen erhalten.

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 101. n. 4. *Haarſchnepfe, Pudelſchnepfe.*
Klein, ſtemm. av. p. 20. Tab. 20. fig. 4. a. b.
Briſſon, ornith. II. p. 287. n. 3. petite Becaſſine.
Batſch, Thiere, I. p. 397. *das Waſſerhühnchen.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 715. n. 8. Scolopax (Gallinula) roſtro tuberculato, corpore variegato, uropygio violaceo vario, pedibus vireſcentibus, loris fuſcis.
Beſeke, Naturgeſch. der Vögel Kurl. p. 59. n. 119. *das Waſſerhühnchen, Haarſchnepfe.*
Siemſſen, meklenburg. Vögel, p. 167. n. 3. *die Haarſchnepfe, Haarbull.*
Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 358. *das Waſſerhühnchen.*
Fiſcher, Naturgeſch. v. Livl. p. 86. n. 109. *kleinſter Schnepfe.*
White, Naturg. v. Engl. p. 61. n. 7. *Halbſchnepfe.*
Naturf. XIII. p. 213. n. 117. *das Waſſerhühnchen.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 112. n. 139. *die kleinſte Schnepfe.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 73. *Mittel - oder Haarſchnepfe.*
Graumann, diätet. Wochenbl. II. p. 104.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 184. Scolopax (Gallinula) roſtro recto tuberculato, pedibus vireſcentibus, loris fuſcis, uropygio violaceo vario.
Charleton, onomaſt. zoic. p. 108. n. 11. Cinclus.
Jonſton, av. p. 163. Cinclus quartus, Gallinago minima Bellonii.

39. Belgica. *Die niederländiſche Schnepfe.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 716. n. 9. Scolopax (Belgica) roſtro rectiſſimo apice nigro, capite

pite, collo et pectore ferrugineis, abdomine albo, dorso, alis, cauda pedibusque nigris.

40. PUSILLA. *Der Dunlin.* (1)
Pennant, arct. Zool. II. p. 443. n. 308. *der Dunlin.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 22. ad n. 8. *der Dunlin.*
Brisson, ornitholog. II. p. 288. n. 5. Becassine d'Angleterre.

41. OBSCURA. *Die purpurschnäblige Schnepfe.*
Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 10. Scolopax obscura *Gmelin.*

9. FEDOA. *Die große Pfulschnepfe.*
Müller, Natursyst. II. p. 398. n. 9. *der rothe Pfulschnepf.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 433. n. 288. *die große Pfulschnepfe.*
Onomat. histor. nat. III. p. 883. *das rothe amerikanische Berghuhn.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 13. *langschnäblicht Wasserhuhn.*
Brisson, ornitholog. II. p. 283. n. 7. Barge rouge d'Amerique.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 718. n. 14. Scolopax (Fedoa) rostro flavicante, corpore rufo nigroque, subtus albido, pedibus fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctatis.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 32. *das größere amerikanische Haselhuhn.*
Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 461. n. 8. *die rothe Pfulschnepfe.*
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 146. n. 8. Scolopax (Fedoa) rostro recto longo, pedibus fuscis,

(1) Ist, nach *Latham*, mit *Tringa Alpina* p. 676. n. 11. einerley; daher auch beyder Synonymen von ihm zusammen gezogen werden.

fuſcis, remigibus ſecundariis rufis nigro punctatis.

10. Glottis. *Die Regenſchnepfe.* (2)
Müller, Naturſyſt. II. p. 399. n. 10. *der Regenſchnepf.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 90. n. 6. *die Regenſchnepfe.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 130. n. 13. *die Regenſchnepfe.* p. 132. *groſse Pfulſchnepfe, Grünbein, Meerhuhn.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 436. n. 296. *das Grünbein.*
Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 37. *die groſse graue Pfulſchnepfe, Meerhuhn.*
Gesner, Vögelb. p. 240. *Glutt;* m. 1 Fig.
Gesner, Vögelb. p 252. *Limoſa.*
Briſſon, ornithol. II. p. 279. n. 3. grande Barge griſe.
Latham, Syn. Suppl. p. 249. Greenſhank.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 720. n. 21. Scolopax (Glottis) griſeo-fuſca, maculis nigricantibus varia, ſuperciliis, dorſo infimo corporeque ſubtus albis, rectricibus albis, faſciis fuſcis.
Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 359. *die Regenſchnepfe.*
Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 168. n. 4. *die Regenſchnepfe.*
Graumann, diätet. Wochenbl. II. p. 104.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 110. n. 137. Scolopax Glottis.

Natur-

(2) Gewicht, nach *Pennant*, 5 Unzen. Legt 6 ſchmutzig ſtrohgelbe, mit leberfarbenen und purpurblauen, einzelnen groſſen und kleinen Flecken beſprengte Eyer, von der Gröſse der Rebhühnereyer. Wird oft mit der folgenden Gattung verwechſelt.

Naturforsch. XIII. p. 213 n. 118. *Regenschnepfe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 5 Glottis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 146. n. 9. Scolopax (Glottis) rostro recto, basi inferiori rubro, pedibus virescentibus.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 185. Scolopax (Glottis) rostro recto, basi inferiore rubro, corpore subtus niveo, pedibus virescentibus.

Charleton, onomast. zoic. p. 104. n. 9. Limosa.

Charleton, onomast. zoic. p. 109. n. 3. Pluvialis maior.

Jonston, av. p. 156. Limosa. p. 165. Pluvialis maior Aldrov.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 299. n. 4. *die Regenschnepfe.*

11. CALIDRIS. *Die rothfüßige Schnepfe.*

Müller, Naturs. II. p. 400. n. 11. *der Rothfuß.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 127. n. 12. *die rothfüßige Schnepfe.* p. 130. *Rothfuß, Rothbein, der kleine Rothschenkel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 436. n. 294. *das Rothbein, Strandschnepfe.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 29. *das Rothbein.*

Halle, Vögel, p. 484. n. 525. *das Wasserhuhn mit rothen Füßen und Schnabel.*

Klein, av. p. 101. n. 1. Glareola I.

Klein, Vorber. p. 187. n. 1. *Rothbeinlein, Rothfüßel, Wasserhünlein mit rothen Beinen.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 102. n. 1. *Rothbeinlein.*

Klein, stemmat. av. p. 21. Tab. 21. fig. 11. a. b.

Brisson, ornitholog. II. p. 261. n. 3. Chevalier.

Gesner, Vögelb. p. 239. *Rothbein.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 225. Redſhank.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 722. n. 25. Scolopax (Calidris) roſtro rubro, pedibus coccineis, corpore cinereo, remigibus ſecundariis albis.

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 62. n. 2. (das zweyte Exemplar.)?

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 138. *Laxe-Titing.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 359. *der Rothfuß.*

Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 19. *Rothſchenkel.*

Naturf. XIII. p. 213. n. 119. *der Rothfuß.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 186. Scolopax (Calidris) roſtro recto rubro, pedibus coccineis, remigibus ſecundariis albis.

Kramer, Auſtr. p. 353. n. 5. Tringa roſtro nigro, baſi rubra, pedibus coccineis; *Rothfüßler.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 107. n. 2. Gallinula Erythropus.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 106. n. 5. Calidris Bellonii, Fedoa.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 106. n. 4. Totanus.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 281. Glareola I. *Rottbein, Rotfüßel.*

Jonſton, av. p. 159. Calidris Bellonii.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 151. n. 1. Var. A. Chineſe Redſhank.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 722. n. 25. β. Sc. corpore ſupra griſeo, ſubtus candido, collo ſubtus et pectore lateribus nigricante maculatis, uropygio et cauda albo nigroque faſciatis.

12. Totanus. *Die Strandſchnepfe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 400. n. 12. *der Strandſchnepf.*

Borowsky.

Borowſky, Thierreich, III. p. 91. n. 7. *die Strandſchnepfe.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 123. n. 11. *die Strandſchnepfe.* p. 125. *der groſse Rothſchenkel, die gefleckte Pfulſchnepfe, das Meerhuhn.*

Onomat. hiſtor. natur. VII. p. 45. *das Meerhuhn, Strandſchnepfe.*

Klein, av. p. 102. n. 12. Glareola, Barker Albini.

Klein, Vorbereit. p. 189. n. 12. *der Barker.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 104. n. 12. *Barker.*

Briſſon, ornith. II. p. 279. n. 2. Barge griſe.

Gesner, Vögelb. p. 251. *Totanus.*

Batſch, Thiere, I. p. 397. *die Strandſchnepfe.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 721. n. 24. Scolopax (Totanus) nigricans maculis albis, ſubtus alba, pectore lineolis, rectricibus lateralibus faſciis nigricantibus, pedibus rubris.

Siemſſen, meklenburg. Vögel, p. 169. n. 5. *die Strandſchnepfe.*

Fiſcher, Naturgeſch. von Livland, p. 86. n. 108. *Pfulſchnepfe.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 134. *Skrüg-Kjeld.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 13. *die Strandſchnepfe.* IV. p. 10. Scol. Totanus.

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 1. *Rödbeener.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 187. Scolopax (Totanus) roſtro ſubrecto, pedibus fuſcis, ſuperciliis, pectore, abdomine uropygioque albis.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 106. n. 3. Crex?

β. *Pennant*, arct. Zool. II. p. 434. n. 291. *die gefleckte Pfulſchnepfe.*

Latham,

Latham, Syn. III. 1. p. 149. n. 19. Var. A.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 721. n. 24. β.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 125. *die geſleckte Strandſchnepfe.*

13. Limosa. *Die gemeine Pfulſchnepfe.* (3)
Müller, Naturſyſtem, II. p. 401. n. 13. *die gemeine Pfulſchnepfe.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 428. n. 8. *die kleine Pfulſchnepfe.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 116. n. 9. *die Pfulſchnepfe.* p. 120. *die gemeine kleine Pfulſchnepfe, Becaſſine, Stickup.*
Halle, Vögel, p. 483. n. 523. *die Uferſchnepfe?*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 213. n. 197. *die Pfulſchnepfe.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 435. n. 292. *die kleine Pfulſchnepfe, Jadreka.*
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 40. *die gemeine Pfulſchnepfe.*
Handbuch der deutſchen Thiergeſch. p. 111. *Pfulſchnepfe, Waſſerſchnepfe.*

Klein,

(3) Gewicht, nach *Pennant*, 9 Unzen. Iſt der Becaſſine ſehr ähnlich, nur daſs bey jener der Schnabel etwas länger, die Farben des Oberkörpers dunkler, und der Unterleib weiſser iſt. Ob *Olaſſens*, *Fabrizens*, und *Müllers* *Jadreka* ebenderſelbe Vogel ſey, ſcheint noch nicht ganz ausgemacht zu ſeyn. In unſerm Syſtem iſt ſie mit hieher gerechnet, und *Pennant* zieht gleichfalls die Synonymen zuſammen. *Olaſſen* ſagt von ſeiner *Jadreka*, daſs ſie zwar in vielen Stücken mit der Pfulſchnepfe übereinkomme, aber es fehlten dieſer doch wichtige Merkmale, die jene habe. Sie lege 4 Eyer. *Fabric.* ſagt: er habe nur ein einziges Exemplar von dieſem Vogel geſehen, er gehöre unter die ſeltenſten Vögel Grönlands, und ſeine Oekonomie ſey gar nicht bekannt. *Müller* will ihn faſt zur *Waldſchnepfe* (Sc. Ruſticola) rechnen.

Klein, av. p. 100. n. 5. Scolopax, Rusticola Aldr.?

Klein, Vorbereit. p. 186. n. 5. *Riedschnepfe?*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 102. ad n. 5.

Brisson, ornithol. II. p. 277. n. 1. Barge.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 719. n. 18. Scolopax (Limosa) rostro subrecurvato basi rubro, corpore griseo-fusco rufo variegato subtus albo, remigibus basi albis, quatuor primis immaculatis, cauda basi alba.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 60. n. 120. *die Pfulschnepfe, Doppelschnepfe.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 359. *die kleine Pfulschnepfe, Pudelschnepfe, Moorschnepfe.* (Mit der Haarschnepfe verwechselt.)

Pennant, Reise d. Schottl. I. p. 19. *Pfulschnepfen mit rother Brust.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 194. *langbeinigte Schnepfen.*

Olassen, Reis. d. Isl. II. p. 201. G. *Jadreka.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 172. n. 2. *die Pfulschnepfe.*

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 113. *die große Schnepfe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 73. *Ried - Pfuhl - oder Puhlschnepfe.*

Naumann, Vogelsteller, p. 196. *Pfulschnepfe.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 461. n. 41. *gemeine Pfulschnepfe.*

Naturf. XIII. p. 214. n. 120. *die gemeine Pfulschnepfe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Limosa.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 3. Numenius medius.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 147. n. 10. Scolopax (Limosa) rostro recto laevi, pedibus fuscis,

cis, remigibus macula alba, quatuor primis immaculatis.

Müller, zool. dan. prodr p. 23. n. 190. Scolopax (Jadreka) roſtro recto laevi, pedibus plumbeis, remigibus linea obliqua uropygioque albo, rectricibus macula nigra.

Fabric. fn groenl. p. 107. n. 72 Scolopax (Jardreka) roſtro recto laevi, remigibus linea obliqua, uropygio albo, rectricibus macula nigra.

Moehring, av. gen. p. 74. n. 88. Totanus.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 104. n. 10. Barge Gallorum.

Jonſton, av. p. 156. Barge Gallorum.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 300. n. 5. *die gemeine Pfulſchnepfe.*

14. CAPENSIS. *Die capſche Schnepfe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 402. n. 14. *der capſche Schnepf.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 51. *die Schnepfe vom Vorgeb. d. g. Hoffnung.*

Latham, Syn. Suppl. p. 244. Cape Snipe.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 716. n. 10. Scolopax (Capenſis) roſtro lineaque verticis rufeſcentibus, faſcia pectorali nigra, linea utrinque dorſali alba

Briſſon, ornitholog. II. p. 288. n. 6. Becaſſine du Cap de bonne Eſperance.

Sparrmann, Reiſe n. d. Vorgeb. der g. Hoffn. p. 148. Kieviten. *(Kiebitze.)*

β. *Latham*, Syſt. ornitholog. II. p. 716. n. 10. β. Sc. olivaceo-viridis, collo nigro, vertice iuguloque ferrugineis, orbitis ſcapularibus abdomineque albis, remigibus caudaque maculis fulvis.

γ. *Latham*, Syn. III. 1. p. 139. n. 9. Var. B.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 717. n. 11. Scolopax (Sinenſis) caeruleſcente fuſco rufo nigroque variegata, ſuperciliis, linea verticis, gula abdomineque albis. (4)

δ. *Latham*, Syn. III. 1 p. 139. n. 9. Var. C.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 717. n. 10. γ. Scolopax cinereo griſeo nigroque undulata, capite colloque rufis, orbitis, gula, ſcapularibus abdomineque albis, faſcia pectoris ſuperciliisque nigris, remigibus caudaque maculis ovatis nigris.

42. Maderaspatana. *Die Rebhuhnſchnepfe.*
Briſſon, ornithol. II. p. 287. n. 4. Becaſſine de Madras.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 717. n. 12. Scolopax (Maderaſpatana) nigricante fulvoque varia, ſubtus alba, capite faſciis tribus dorſo duabus fuſco-nigricantibus, pectoris unica nigra.

43. Indica. *Die indianiſche Schnepfe.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 718 n. 13. Scolopax (Indica) griſea fuſco-undulata, ſubtus alba, capite albido, collo ſubtus ſtriis, vitta per oculos alteraque ſubtus griſeis, roſtro pedibusque nigris.

15. Lapponica. *Die lappländiſche Schnepfe.* (5)
Müller, Naturſyſt. II. p. 402. n. 15. *der lapländiſche Schnepf.* Tab. 16. fig. 1.
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 39. *die lappländiſche Schnepfe.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 433. n. 289. *die rothe Pfulſchnepfe.*

Klein,

(4) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

(5) Flügelweite 2 Fuſs 4 Zoll. Gewicht 12 Unzen. *Penn.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 104. n. 14. *rothbrüſtiges Waſſerhuhn.*

Briſſon, ornithol. II. p. 281. n. 5. Barge rouge.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 718. n. 15. Scolopax (Lapponica) roſtro flaveſcente, pedibus nigris, ſubtus tota ruſo-ferruginea.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 33. *das rothgebrüſtete Haſel-Huhn.*

Pallas, Reiſ. Ausz. II. p. 240. Scolopax lapponica.

Linné, Syſt. Natur. Edit. X. I. p. 147. n. 12. Scolopax (Lapponica) roſtro ſubrecurvato, pedibusque nigris, pectore ferrugineo.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 147. n. 14. Scolopax (Haemaſtica) roſtro recto flaveſcente, pedibus fuſcis, corpore ſubtus fulvo fuſco-undulato.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 188. Scolopax (Lapponica) roſtro ſubrecurvato flaveſcente, pedibusque nigris, ſubtus tota ruſo-ferruginea.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 143. n. 13. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 719. n. 15. β. Sc. fuſca, capite colloque cinereis, gula, ſuperciliis abdomineque albis, pectore ferrugineo nebuloſo.

16. Aegocephala. *Die Geiskopfſchnepfe.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 402 n. 16. *der Geiſskopf.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 427. n. 7. *der Geiskopf.*

(6) Hier findet ſich in Anſehung der Synonymen bey den Ornithologen eine ganz verſchiedene Ordnung, die ich nicht unbemerkt laſſen kann. In unſerm Syſtem iſt *Pennants Common Godwit Brit. zool.* II. n. 179. *Arct. zool.* n 373. hieher gerechnet. *Latham* trennt dieſe ganz von der *Scol. Aegocephala,*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 132. n. 14. *die Geiskopfschnepfe.*

Halle, Vögel, p. 483 n. 523. *die Uferschnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 434. n. 290. *gemeine Pfulschnepfe, Geiskopf.*

Onomat hist. nat. VII. p. 27. *die Uferschnepfe.*

Klein, av. p. 102. n. 11. Glareola, Aegocephalus.

Klein, Vorber. p. 189. n. 11. *Gelbnase, Rothhals.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 11. *Gelbnase.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 719. n. 16. Scolopax (Aegocephala) rostro flavo-rubente, pedibus virescentibus, capite colloque rufescentibus, remigibus tribus nigris basi albis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 147. n. 13. Scolopax (Aegocephala) rostro recto, pedibus virescentibus, capite colloque rufescentibus, remigibus tribus nigris, basi albis.

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 134. *der rothe Geiskopf.*

Brisson, ornith. II. p. 282. n. 6. grande Barge rousse.

Shaw, Reis. p. 163. *das Rebhuhn in der Barbarey.*

44. Canescens. *Die grau- und weißbunte Schnepfe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 721. n. 22. Scolopax (Canescens) cinereo alboque varia, gula pectore-

cephala, nimmt *Brissons Limosa grisea maior* (Gmel. System. p. 664. n. 10. Scol. Glottis) dazu, und macht daraus p. 719. n. 17. eine eigne Gattung: *Scolopax (Leucophaea) fusca, albido marginata, collo albido, maculis parvis fuscis, gula abdomineque albis, rectricibus albis, nigro fasciatis.* Dagegen zieht er zu *Scolopax Glottis, Brissons Limosa Grisea* n. 2. (Gmel. p. 665. n. 12. Scol. Totanus) und bey *Scol. Totanus* findet sich bey ihm gar kein Brissonsches Synonym. — In *Penn. arct. zoolog.* hingegen ist *Briss. grande Barge grise* mit unter den Synonymen von *Common Godwit* aufgeführt.

pectoreque albis, cauda fasciis pectoreque maculis cinereis.

45. Cantabrigiensis. *Die engländische Schnepfe.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 721. n. 23. Scolopax (Cantabrigiensis) cinereo-fusca, subtus alba, tectricibus alarum rectricibusque nigro-fasciatis, rostro rubro.

18. Candida. *Die weiße Schnepfe.*
Müller, Natursyst. II. p. 403. n. 18. *der hudsonische Schnepf.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 30. *die weiße Schnepfe mit gelben Füßen.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 16. *weißes Wasserhuhn.*
Brisson, ornith. II. p. 266. n. 8. Chevalier blanc.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 722. n. 26. Scolopax (Candida) rostro recto pedibusque aurantiis, corpore albicante, rectricibus candidis, griseo fasciatis.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 34. *der weiße Wasserschnepf.*

26. Curonica. *Die kurländische Schnepfe.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 724. n. 37. Scolopax (Curonica) griseo-maculata, alis nigricantibus, rostro nigricante, mandibula inferiore subtus a basi ad medium coccinea, pedibus lateritiis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 247. n. 17. Scolopax alba.	p. 694. n. 3. Recurvirostra alba.

Das Geschlecht ist mit 28 Gattungen der Zahl nach, sonst aber mit 29 neuen Schnepfenarten vermehrt, denn die 17te Gattung der XIIten Edition ist in ein anderes Geschlecht versetzt, und deren Stelle mit einer neuen besetzt. Bey der 3ten Gattung ist die Var. β, bey der 6ten die Var. β, γ, δ; bey der 11ten die Var. β, bey der 12ten die Var. β, bey der 14ten die Var. β, γ, δ, bey der 15ten die Var. β hinzugekommen, und bey der 16. ist *Briss.* n. 6. als Spielart von der Hauptgattung angenommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Eine dem Scol. Lapponica und Scol. Alba Linn.* (Recurvirostr. alba Gmel.) *ähnliche Schnepfe.*

Beseke, Vögel Kurland, p. 63. n. 3.

2. *Die punktirte Schnepfe.*

Nau: Naturf. XXV. p. 27. Scolopax (Punctata) rostro arcuato, gula rufescente, dorso fusco, punctis albis, pedibus nigris.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 88. n. 5. *die punktirte Schnepfe.*

3. *Die rothfüßige Schnepfe auf den Pyrenäen und im südlichen Frankreich.*

Thunberg: neue schwed. Abhandl. III. p. 107. Scolopax (Rufipes) rostro subrecurvato, basi cinnabarino, pedibus cinnabarinis, tectricibus caudae crissisque albo fuscoque striatis.

4. *Die kleine Strandschnepfe.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 169. n. 6. Scolopax (Dethardingii) rostro subrecto, dorso pedibusque fuscis, collo pectoreque griseis, cauda cinerea, gula, abdomine, crisso et uropygio candidis.

C. *Neue-*

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Die marmorirte Schnepfe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 245. Marbled Godwit.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 730. n. 19. Scolopax (Marmorata) nigricante pallideque rufo, maculatim varia, abdomine medio, ſuperciliis gulaque albidis, pectore fuſco-undulato, remigibus rufeſcentibus, quatuor primis extus apiceque nigris.

2. *Die hudſoniſche Schnepfe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 246. Hudſonian Godwit.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 720. n. 20. Scolopax (Hudſonica) fuſca maculis albis, ſubtus caſtaneo-ferruginea, faſciis fuſcis, ſuperciliis, gula, uropygio rectricibusque baſi albis.

87. GESCHLECHT. TRINGA. *Der Strandläufer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 404. Gen. LXXXVII.

Leske, Naturgeſch. p. 273. Gen. LIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 91. Gen. LII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 215. Gen. LIX.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 428. Gen. XLII.

Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. III. p. 135. Gen. XXIX.

Halle, Vögel, p. 99. Gen. IV.

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 556.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 439.

Briſſon, ornith. II. p. 259. Gen. LXXV. p. 361. Gen. LXXXIX. Phalaropus.

Batſch, Thiere, I. p. 386. Gen. CII.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 725. Gen. LXXIII. p. 775. Gen. LXXXII. Phalaropus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 300. Gen. LI.

1. Pugnax. *Der Kampfhahn.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 404. n. 1. *der Kampfhahn.* Tab. 23. fig. 7.

Leske, Naturgesch. p. 273. n. 1. *der kämpfende Strandläufer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 92. n. 1. *der Kampfhahn.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 215. n. 1. Tringa (Pugnax) rostro pedibusque rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis; *der Kampfhahn.*

Bechstein, Naturg. I. p. 431. n. 1. *der Kampfhahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 155. n. 7. *der Kampfhahn.* p. 161. *Streithuhn*, *Heidehuhn*, *Hausteufel*, *Renomist*, *Brausehahn*, *Mönnik*, *Streitvogel*, *Struußhahn*, *Seepfau.* (*Beginen*, die Weibchen.)

Funke, Naturgesch. I. p. 250. *der Kampfhahn.*

Ebert, Naturl. II. p. 95. *der Kampfhahn.*

Halle, Vögel, p. 488. n. 532. *das Hausteufelchen.* Fig. 36.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 215. n. 189. *das Streithuhn.*

Neuer

(7) Ist fast der einzige wilde Vogel, der in Rücksicht der Farbe so sehr wie das Hausgeflügel abändert. Verläſst Deutschland im September, und kömmt im April oder May zurück. Hält sich besonders an der Seeküste oder in grofsen Sümpfen und Morästen auf. Nährt sich von Insekten und Gewürmen, vorzüglich Regenwürmern, auch einigen Wasserkräutern und deren Wurzeln. Läſst jung gefangen sich zähmen, und an den in der Stube auferzogenen bemerkt man gar nichts von der ihnen sonst eignen Streitsucht. Im ersten Jahre sind Männchen u. Weibchen nicht von einander zu unterscheiden.

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 959. *Braushahn.*
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 574. *der Hausteufel.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 446. A. *der Kampfhahn.*
Handb. der Naturgeſch. II. p. 312. *das Kampfhähnchen.*
Klein, av. p. 102. n. 10. Glareola Pugnax.
Klein, Vorber. p. 188. n. 10. *Hausteufel.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 103. n. 10. *Kampfhähnchen, Braushahn.*
Klein, ſtemmat. av. p. 21. Tab. 21. fig. 1. a. b.
Briſſon, ornith. II. p. 273. Combattant, ou Paon-de-ner.
Batſch, Thiere, I. p. 399. *die Kampfhähne.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 725. n. 1. Tringa (Pugnax) roſtro pedibusque rufis, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis.
Beſeke, Vögel Kurl. p. 64. n. 124. *der Kampfhahn.*
Siemſſen, meklenburg. Vögel, p. 173. n. 1. *der Kampfhahn, Bruhshahn.*
Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 360. n. 121. *der Kampfhahn.*
Fiſcher, Livland, p. 87. n. 111. *Streit-od. Brauſehahn.*
Leem, Finnm. p. 132. *Bruuns-Kopper.*
Lepechin, Tagebuch der ruſſ. Reiſe, III. p. 14. *Kampfhähne.*
Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 16. *Kampfhähne.*
Naturf. XIII. p. 214. n. 121. *der Kampfhahn.*
Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 170. n. 1. *Brushane. (Brauskopfſchnepfe.)*
Pontoppidan, Naturhiſt. v. Norwegen, II. p. 130. *Bruushane.*
Meidinger, Vorleſ. I. p. 132. n. 1. *der Kämpfer.*

Scopoli,

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 113. n. 149. *der Streitvogel.*

Goeze, nützl. Allerl. I. p. 158. *der Kampfhahn.* Mannichf. II. p. 602. *der Streithahn;* mit 1 F.

Hannöv. Magaz. 1780. p. 418 ff.

Frisch, Tabb. citt. *die Streitschnepfe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Pugnax.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 26. n. 1. Avis Pugnax.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 1. Tringa (Pugnax) pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis.

Müller zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 191. Tringa (Pugnax) rostro pedibusque rubris, rectricibus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis.

Kramer, Austr. p. 352. n. 1. Tringa capite rufo, collo antice pennis longissimis atris obsito, pedibus luteis; *Krößler.*

Kramer, Austr. p. 352. n. 2. Tringa vertice et collo postice nigro, antice collo pennis longis testaceis lituris, maculisque nigris obsito, pedibus fuscis; *Krößler.*

Moehring, av. gen. p. 76. n. 93. Philomachus.

Charleton, onomast. zoic. p. 104. n. 5. Avis pugnax.

Jonston, av. p. 154. Avis pugnax.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 300. n. 1. *der Kampfhahn.*

2. Vanellus. *Der Kybitz.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 406. n. 2. *der Kiebitz.* Tab. 24. fig. 1.

Leske,

(8) Flügelweite 2 1/2 Fuss. Gewicht 8 Unzen. Das Weibchen legt jährlich zwey - auch wohl drey - bis viermal Eyer, wenn sie

Leske, Naturgesch. p. 274. n. 2. *der Kibiz.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 93. n. 2. *der Kiebiz.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 215. n. 2. Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro; *der Kybitz.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 429. n. 1. *der gemeine Kiebitz.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 136. *der gemeine Kiebitz.* p. 143. *Kibiz, Kievitz, Kybitz, Kübitz, Kifiz, Gibitz, Gyfitz, Zifitz, die Zifitzen, Kiebith, Geisvogel, Feldpfau.*
Funke, Naturgesch. I. p. 251. *der Kiebitz.*
Ebert, Naturl. II. p. 96. *der Kiebitz.*
Halle, Vögel, p. 99. n. 8. *der gemeine Kiwiz.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 216. n. 200. *der Kiebiz.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 447. D. *der Kiebitz.*
Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 871. *Kybitz.*
Onomat. hist. nat. II. p. 583. *der Kübitz, Gyfitz.*
Handb. d. Naturg. II. p. 302. *der Kybiz, Pardel.*
Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 111. *der Kibitz.*
Klein, av. p. 19. n. 1. Gavia vulgaris.
Klein, Vorbereit. p. 39. n. 1. *Kybiz, Feldpfau.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 20. n. 1. *gemeiner Kybitz.*
Klein, stemmat. av. p. 3. Tab. 3. fig. 5. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 16. Tab. 6. fig. 2. 3.
Gesner, , Vögelb. p. 150. *Gyfitz.* Fig. p. 151. mittelmäfsig.
Brisson, ornithol. II. p. 236. n. 1. Vanneau.
Batsch, Thiere, I. p. 399. *der gemeine Kibitz.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 726. n. 2. Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.

Beseke,

sie ihm öfters entwendet werden. Zuweilen, aber sehr selten findet man auch weiſse Kybitze.

Beseke, Vögel Kurl. p. 64. n. 125. *der Kiebitz.*
Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 174. n. 2. *der Kybitz.*
Bock, Naturg. v. Preussen, IV. p. 361. n. 122. *der gemeine Kiebitz.*
Cetti, Sardin. II. p. 259. *der Kiebiz.*
Fischer, Livland, p. 87. n. 112. *Kyfiz.*
Taube, Slavon. u. Syrm. I. p. 23. *Kiwitze.*
Pennant, R. d. Schottl. I. p. 19. *Kiebize.*
Pallas, Reise, Ausz. III. p. 475. *Kywit.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 13. *der Kybitz.*
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170. n. 2 *Vibe.*
Linné, auserl. Abhandl. II. p. 283. n. 33. p. 284. n. 41. 43. p. 285 n. 47. p. 296. n. 94. *der gemeine Kiwitz.*
Naturf. XIII. p. 215. n. 122. *der Kiebitz.*
Naumann, Vogelsteller, p. 181. *Kiebitz.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 53. *Kibitz.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 94. 423. 145. *Kybitz.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 113. n. 141. *der Kybitz.*
Anweisung Vögel zu fangen u. s. w. p. 235. *der Gibitz.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 527. *Kibitz.*
Eberhard, Thiergesch. p. 95. *der Kiwitz.*
Meidinger, Vorles. I. p. 132. n. 2. *der Kibiz.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 749 *Kiwitz.*
Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 281. *Kybitz.*
Beckmann, Naturhist. p. 47. *der gemeine Kybitz.*
Goeze, nützl. All. I. p. 158. *der Kiebitz.*
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 98.
Hannöv. Magazin, 1780. p. 420.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Vanellus.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 4. Vanellus.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 2. Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 192. Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.

Kramer, Austr. p. 353. n. 4. Tringa crista dependente, pectore nigro; *Kiwitz.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 361. Vanellus; *Gybitz, Gysitz, Gywitt.*

Charleton, onomast. zoic. p. 108. n. 13. Vanellus.

Moehring, av. gen. p. 76. n. 92. Vanellus.

Jonston, av. p. 164. Vanellus.

Schäfer, element. ornith. Tab. 69.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 139. Tringa Vanellus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 301. n. 2. *der Kybitz.*

6. Bononiensis. *Der bononische Kybitz.*

Brisson, ornithol. II. p. 239. n. 5. grand Vanneau de Bologne.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 726. n. 3. Tringa (Bononiensis) nigra subtus albida, capite et collo superiore castaneis, iugulo et pectore maculis ferrugineis vario, rectricibus nigris.

10. Erythropus. *Der rothbeinige Kybitz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 154. n. 6. *der rothbeinige Kiebitz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 4. Tringa (Erythropus) fusco-cinerea, abdomine fuliginoso, fronte rufa, rectricibus albo-rufescentibus, fascia ad apicem nigra.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 118. n. 146. *das Rothbeinlein.*

3. Gambetta. *Die Gambette.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 407. n. 3. *der rothe Reuter.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 430. n. 2. *die Gambette.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 143. n. 2. *die Gambette.* p. 145. *Stelkr.* p. 146 *Dütchen, kleine Brachvögel, Gambettſtrandvögel.*

Halle, Vögel, p. 485. n. 526. *das graue Waſſerhuhn, mit ſchwarzem Schnabel, gelben Füßen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 444. n. 311. *die Gambette.*

Onomat. hiſt. nat VII. *der rothe Reuter.*

Klein, av. p. 101. ad n. 1. Gambetta.

Klein, Vorber. p. 187. ad n. 1. Gambetta.

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 102. ad n. 1. Gambetta.

Briſſon, ornitholog. II. p. 262. n. 4. Chevalier rouge.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 728. n. 9. Tringa (Gambetta) roſtro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, ſubtus albo.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 115. n. 142. Tringa Gambetta.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 9. Gallinula pedibus nigris.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 3. Tringa (Gambetta) roſtro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, ſubtus albo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 25. n. 204. Tringa (Variegata) ſupra fuſca, luteo maculata, ſubtus cineraſcens, abdomine albo, rectricibus nigricantibus, apice lituraque luteis.

Jonſton, av. p. 159. Gambetta Italis dicta.

4. In-

4. Interpres. *Der Steindreher.* (9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 407. *der Dolmetſcher.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 430. n. 3. *der Steindreher.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 146. n. 3. *die Steindreher.* p. 149. *Mornelsſtrandläufer, dollmetſchende Strandvögel, Schwarzſchnäbel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 439. n. 299. *der hebridiſche Strandläufer.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 568. *der Dollmetſcher.*

Klein, av. p. 21. n. 9. Gavia, quae Pluvialis Arenaria noſtra.

Klein, Vorbereit. p. 40. n. 9. } Mit mehrern
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 22. ad n. 8. } verwechſelt.

Briſſon, ornith. II. p. 246. n. 1. Coulon-chaud.

Latham, Syn. Suppl. p. 249. Turnſtone or Sea Dotterel.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 738. n. 45. Tringa (Interpres) pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 36. *der Steindreher aus der Hudſonsbay.*

Beſeke, Naturgeſch. der Vögel Kurl. p. 64. n. 126. *der Dolmetſcher.*

Lepechin, Tageb. d. ruſſ. R. I. p. 324. *eine roth gefiederte Schnepfe.*

Linné, auserleſ. Abh. II. p. 296. n. 95. *der graue Kiwitz.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 3. *Veydetite.*

Schriften der berlin. Geſellſch. naturf. Fr. VII. p. 462. n. 43. *der Dolmetſcher.*

Linné,

(9) Flügelweite, nach *Briſſon*, 15 1/2 Zoll. Gewicht, nach *Pennant*, 3 1/2 Unzen.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 10. Tringa maritima.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 4. Tringa (Interpres) pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 193. Tringa (Interpres) pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo.

Moehring, av. gen. p. 77. n. 95. Cinclus?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 301. n. 3. *der Steindreher.*

β. Morinella. *Die Morinelle.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 408. n. 6. *der Schwarzschnabel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 149. *die Morinelle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 572. *der Seemornel.*

Brisson, ornitholog. II. p. 247. n. 2. Coulonchaud cendré.

Latham, Syst. ornith. II. p. 739. n. 45. β. Tr. pedibus rubris, rectricibus nigricantibus basi albis, corpore griseo, pectore nigro.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 44. *die Seelerche.*

γ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 739. n. 45. γ. Tr. fusco alboque varia, gula, iugulo, abdomine fasciaque alarum gemina albis, remigibus caudaque obscuris.

δ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 739. n. 45. δ. Tr. fusco alboque varia, subtus alba, pectore maculis fuscis, remigibus caudaque fuscis, rectricibus exterioribus margine, omnibus apice albis.

5. Stria-

(10) Nach *Brisson*, u. a. eine eigene Gattung.

5. STRIATA. *Der gestreifte Strandläufer.* (1)

Müller, Natursystem, II. p. 407. n. 5. *der gestreifte Kibitz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 94. n. 3. *der gestreifte Kiebitz.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 578. *der gestreifte Reuter.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 439. n. 300. *der gestreifte Strandläufer.*

Brisson, ornith. II. p. 263. n. 5. Chevalier rayé.

Batsch, Thiere, I. p. 399. *der gestreifte Kibitz.*

 Latham,

(1) Bey dieser und der 36ten Gattung p. 678. (Tringa Maritima) bemerke ich auffallende Verwechselungen der Synonymen. *Fabrizens Tringa Striata* ist ohne Zweifel der unsrige, wie auch *Latham* bemerkt hat. Aber *Fabric.* rechnet auch die Synonymen aus *Brünniche* und *Leem* (Gmel. Syst. p. 678. n. 36.) dazu, und sagt, p. 108. dass bey *erstern*, und in *Act. nidros.* (Gmel. Syst. p. 672. n. 5.) der Vogel ganz genau beschrieben wäre. Er nimmt also ganz deutlich beyde Synonymen für ein und eben dasselbe Thier an. *Fabric* verweist ferner auf *Müll.* zool. dan. prodr. n. 194. aber auch *Müller* vereinigt eben dieselben Citata, und ausländischen Synonymen. In *Penn.* arct. Zool. II. p. 447. ist zwar bey *Tringa Maritima Müller* n. 206. angeführt. Aber *Müller* zieht *Olafsens Selningus* mit dahin, und auch diesen rechnet *Fabric.* zu *Tringa Striata.* — Nimmt man nun zu diesen offenbaren Zweydeutigkeiten noch folgende Umstände, worin die *Tringa Striata*, mit der *Tringa Maritima* übereinkommt: 1) Das Vaterland; denn beyde finden sich in Norwegen und Island. — 2) Den Aufenthalt: an den Seeküsten. — 3) Die Grösse; die *Pennant* bey beyden mit der eines Staars vergleicht. — 4) Die gelben Füsse. — 5) Die Aehnlichkeit der Stimme; wozu noch 6) kommt, dass *Fabriz* von der Tringa Striata ausdrücklich sagt: dass das äussere Ansehen nach der Jahreszeit und dem Alter sehr verschieden sey — so möchte, vielleicht nicht ungegründet, die Frage entstehen: ob nicht die *Tringa Striata* mit der *Tringa Maritima* ein und eben derselbe Vogel sey?

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 733. n. 24. Tringa (Striata) rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis fusco fasciatis, remigibus plurimis albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 194. Tringa (Striata) rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis fusco fasciatis, remigibus plurimis albis.

Fabric. fn. groenl. p. 107. n. 73. Tringa (Striata) rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis, fusco fasciatis, remigibus plurimis albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 301. n. 4. *der gestreifte Strandläufer.*

β. *Brisson*, ornithol. II. p. 264. n. 6. Chevalier tacheté. (2)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 733. n. 24. β. Tr. nigricans, rufo-griseo marginata, pectore, abdomine uropygioque albis, rectricibus albo nigroque fasciatis.

Latham, Syn. III. 1. p. 127. n. 21. Var. A.

7. MACULARIA. *Der gefleckte Strandläufer.*

Müller, Natursyst. II. p. 408. n. 7. *der geflekte Kiebitz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 150. n. 4. *der gefleckte Kiebitz.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 440. n. 302. *der gefleckte Strandläufer.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 571. *der gefleckte Strandläufer.*

Brisson, ornitholog. II. p. 275. n. 20. Grive d'eau.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 734. n. 29. Tringa (Macularia) rostro basi pedibusque incarnatis, corpore

(2) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

corpore undique maculato, ſuperciliis faſciaque gemina alarum albis.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 67. *die gefleckte Waſſerdroſſel.*

42. Keptuschka. *Der Keptuſchka.* (3)

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 738. n. 42. Tringa (Keptuſchka) corpore cinereo, vertice nigro, abdomine nigricante, ad exitum rufeſcente.

Lepechin l. c. I. p. 229. *der Vogel Keptuſchka.*

25. Cinerea. *Der aſchgraue Strandläufer.* (4)

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 186. n. 14. *der aſchgraue Strandläufer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 441. n. 303. *der aſchgraue Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 733. n. 25. Tringa (Cinerea) nigro cinereo alboque lunato-varia, pectore et abdomine albis, tectricibus caudae albo nigroque faſciatis, rectricibus margine albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 85. n. 202. Tringa (Cinerea) dorſo aliſque cinereis, lituris nigris albiſque undulatis, rectricibus cinereis, marginibus albis.

26. Atra. *Der ſchwarze Strandläufer.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 188. n. 15. *der ſchwarze Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 738. n. 43. Tringa (Atra) capite colloque nigris, dorſo aliſque fuſceſcentibus nigro mixtis, pectore et abdomine

(3) Gröſse des gemeinen Kybitz. Hält ſich um die niedrigen Wieſengründe auf; fliegt heerdenweiſe, und prophezeyhet mit ſeinem Geſchrey Regenwetter. *Lepechin.*

(4) Gewicht 5 Unzen nach *Pennant.* Wegen *Friſch* Tab. 237. S. *Bechſtein* a. a. O. p. 187. u. 723.

mine cinereis, uropygio cinereo albo nigroque undulato.

27. Noveboracensis. *Der Strandläufer von Neuyork.*

Pennant, arct. Zoolog. II p. 441. n. 304. *der Strandläufer von Neuyork.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 735. n. 30. Tringa (Noveboracenſis) nigricans, pennis margine albidis, ſubtus alba, tectricibus caudae albo nigroque faſciatis, cauda cinerea.

28. Virgata. *Der geſtrichelte Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 735. n. 31. Tringa (Virgata) fuſca albo marginata, ſubtus alba, ſcapularibus maculis ferrugineis, capite colloque albis fuſco longitudinaliter ſtriatis.

29. Borealis. *Der nördliche Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 735. n. 32. Tringa (Borealis) cinerea, collo lateribus, pectoreque pallidiore undulatis, ſuperciliis, gula, tectricibus caudae corporeque ſubtus albis.

30. Novae terrae. *Der neufundländiſche Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 735. n. 33. Tringa (Novae terrae) nigricans fuſco marginata, ſubtus cinereo-alba, roſtro, pedibus, alula, remigibus caudaque nigris.

31. Variegata. *Der bunte Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 735. n. 34. Tringa (Variegata) roſtro pedibusque nigris, corpore ſupra fuſco nigro et rufo variegato ſubtus albo, pectore nigro maculato, cauda fuſca.

8. LOBATA. *Der Sturmſegler.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 408. n. 8. *der Sturmſegler.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 94. n. 4. *der Sturmſegler.*

Leske, Naturgeſch. p. 274. n. 3. *der Sturmſegler.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 459. n. 329. *das graue Baſtardwaſſerhuhn.*

Briſſon, ornithol. II. p. 361. n. 1. Phalarope.

Batſch, Thiere, I. p. 399. *der Sturmſegler.*

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 428. *das engliſche Waſſerhuhn.* VII. p. 570. Tringa lobata.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 776. n. 2. Phalaropus (Lobatus) cinereo - caeruleſcens ſubtus albus, tectricibus alarum, remigibus rectricibusque nigricantibus, margine cineraſcente-albis.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 162. n. 4. *buntes Waſſerhuhn.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 98. *die eiſengraue Waſſerdroſſel mit Waſſerhühnerpfoten, eine Art von Becaſſinen.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 151. *Smälle-Bot, Nordweſtvogel.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 4. Tringa Lobata.

Pallas, Reiſ. Ausz. II. p. 240. Tringa lobata.

Linné, auserleſ. Abh. II. p. 297. n. 96. *Waſſerhuhn-Kiwitz.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 122. *das engliſche Waſſerhuhn.*

(5) Nach *Fabric.* (fn. groenl. p. 109.) ſoll die *Tringa Hyperborea* L. n. 9. und *Müller* prodr. n. 196. *das Männchen*; — *Tringa Lobata* L. n. 8. und *Müll.* prodr. n. 195. *das Weibchen*; — und *Brünnichs Tr. Lobata* n. 171. ein jünger Vogel ſeyn.

Müller, zool. dan. prodr. p. 24. n. 195. Tringa (Lobata) roſtro ſubulato apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore albo undulato.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 302. n. 5. *der Sturmſegler.*

32. Glacialis. *Der Eisſtrandläufer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 461. n. 332. *das einfarbige Baſtardwaſſerhuhn.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 776. n. 3. Phalaropus (Glacialis) ſupra nigricans, pennis margine flaveſcentibus, ſubtus albus, genis colloque ſubtus flavicantibus, alis caudaque cinereis.

33. Fusca. *Der braune Strandläufer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 460. n. 331. *das braune Baſtardwaſſerhuhn.*

Klein, av. p. 151. n. 3. Fulica fuſca, roſtro tenui.

Klein, Vorber. p. 278. n. 3. *braunes dünnſchnäblichtes Waſſerhuhn.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 161. n. 3. *braun dünnſchnäblicht Waſſerhuhn.*

Briſſon, ornith. II. p. 363 n. 3. Phalarope brun.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 776. n. 4. Phalaropus (Fuſcus) fuſcus marginibus pennarum dilutioribus, ſubtus albus, capite ſupra nigro, collo cinereo, faſcia alarum alba.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 91. *die Waſſerdroſſel.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 5. Tringa (Lobata) roſtro ſubulato, apice inflexo, pedibus vireſcentibus lobatis, abdomine albido.

34. Cancellata. *Der gegitterte Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 777. n. 5. Phalaropus (Cancellatus) fuſcus, marginibus pennarum

narum albis, ſubtus albus, faſciolis obſcuris, rectricibus utrinque maculis albis.

9. Hyperborea. *Der Eiskybitz.* (6)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 409. n. 9. *der Eiskiebitz.*

Halle, Vögel, p. 606. n. 761. *das braune Rohrhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 460. n. 330. *das rothe Baſtardwaſſerhuhn.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 566. *der nordiſche Strandläufer.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 362. n. 2. Phalarope cendré.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 775. n. 1. Phalaropus (Hyperboreus) cinereus, ſubtus uropygio faſciaque alarum albis, pectore cinereo, colli lateribus ferrugineis. *(Mas.)*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 38. *die Waſſerdroſſel, der Er.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 196. Tringa (Hyperborea) roſtro ſubulato, apice inflexo, pedibus pennatis, pectore cinereo, colli lateribus ferrugineis.

Brünniche, ornitholog. bor. p. 51. n. 172. Tringa Fulicaria.

(6) *Fabric.* fn. groenl. n. 75. iſt im Syſtem hier und bey der 8ten Gattung p. 674. angeführt. Was in unſerm Syſtem von der Naturgeſch. des Vogels bemerkt wird, ſagt *Fabric* von der *Tringa Lobata*, und fügt noch hinzu: daſs der Vogel eine Schwalbenſtimme habe, die er auch beym ſchnellen Flug hören laſſe; daſs er ſehr unvorſichtig ſey; daſs ſein Fleiſch gegeſſen, und ſein Fell in Grönland, wegen der Weichheit von alten Weibern zur Abwiſchung der Augen gebraucht werde. Die Eyer hat *Fabric.* nicht geſehen, ſagt auch nichts von ihrer Anzahl.

β. *Tringa Fulicaria.* (7)

Müller, Naturſyſt. II. p. 408. n. 10. *der graue Kiewitz.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 363. n. 4. Phalarope rouſsâtre.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 775. n. 1. β. Ph. corpore griſeo, ſubtus ruſo, uropygio faſciaque alarum alba, ſuperciliis rectricibusque baſi rufeſcentibus. (*Femina.*)

Seligmann, Vögel, V. Tab. 37. *die rothe Waſſerdroſſel.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 562. *der Waſſerhuhnähnliche Strandläufer.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 6. Tringa (Fulicaria) roſtro recto, pedibus lobatis ſubfuſcis, abdomine ferrugineo.

γ. *Latham*, Syſt. ornithol. II. p. 776. n. 1. β. Ph. fuſco-nebuloſus, gula, abdomine faſciaque alarum albis, lateribus colli macula difformi rufa.

11. Alpina. *Der Alpenſtrandläufer.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 410. n. 11. *der lappländiſche Kiebitz.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 190. n. 16. *der Alpenſtrandläufer.*

Briſſon,

(7) Das Weibchen von *Tringa Hyperborea.* Bis dahin hatte man es als eine eigene Gattung betrachtet, welches wahrſcheinlich zu der groſsen Verwechſelung der Synonymen Gelegenheit gegeben hat, die man in den angeführten Stellen findet. *Fabric.* ſagt, a. a. O. er habe den Vogel nicht geſehen, und bezieht ſich bloſs auf *Brünniche* n. 172. p. 51. tadelt aber den *Müller*, daſs er *Brünn.* n. 172. bey der *Tringa Hyperborea* anführt, weil *Er* dieſe mit zu der *Lobata* gezogen hat.

(8) Soll, nach *Latham*, mit *Scolopax Puſilla*, p. 663. n. 40. einerley ſeyn.

Briſſon, ornith. II. p. 268. n. 11. Alouette-de-mer à collier.

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 555. *der lappländiſche Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 736. n. 37. Tringa (Alpina) teſtaceo-fuſca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuſceſcentibus.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 149. n. 7. Tringa (Alpina) teſtaceo-fuſca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuſceſcentibus.

Brünniche, ornitholog. bor. n. 167. Tringa Falcinellus?

Müller zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 197. Tringa (Alpina) teſtaceo-fuſca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuſceſcentibus.

Friſch, Vögel, Tab. 241. *der kleinſte Schnepfenſandläufer.*

12. HELVETICA. *Der ſchweitzeriſche Strandläufer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 410. n. 12. *der ſchweitzeriſche Kiebitz.*

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 565. *der Schweizer-Kiwiz.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 445. n. 313. *der Schweitzerkiebitz.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 239. n. 4. Vanneau de Suiſſe.

Latham, Syn. Suppl. p. 248. Suiſſe Sandpiper.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 728. n. 10. Tringa (Helvetica) roſtro pedibusque nigris, ſubtus nigra abdomine albo, rectricibus albis nigro faſciatis.

Pallas, Reiſ. Ausz. III. p. 10. n. 28. Charadrius hypomelas.

13. OCRO-

13. Ocrophus. *Der grüne Strandläufer.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 410. n. 13. *der punktirte Strandläufer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 95. n. 5. *der punktirte Strandläufer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 432. n. 5. *der punktirte Strandläufer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 162. *der punktirte Strandläufer.* p. 166. *der grüne Strandläufer, Weissarsch, Steingällel, der größte Sandläufer.*

Halle, Vögel, p. 486. n. 528. *das braune Wasserhuhn, mit schwarzem Schnabel und grünen Füßen.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 217. *das rothe Wasserhuhn.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 573. *der Steingallel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 442. n. 306. *der grüne Strandläufer.*

Klein, av. p. 101. n. 4. Glareola quarta.

Klein, Vorber. p. 188. n. 4. *Grünbeinlein, Grünfüßel, Mattkuillis.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 103. n. 3. *Grünbeinlein, Matkuillis.*

Klein, av. p. 101. n. 7. Glareola octava.

Klein, Vorbereit. p. 188. n. 7. *bunt Motthünlein, gescheckt Mothünlein.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 103. n. 7. *buntes Motthühnlein.*

Gesner, Vögelb. p. 243. *Steingällyl;* mit 1 F.

Gesner,

(9) Flügelweite 18 Zoll. Gewicht 6 Unzen. *Bechstein.* Nistet da wo es viel Schilfgras giebt. Legt 5 bis 6 grünlich weisse, braungefleckte Eyer, auf das blosse Gras, oder in den Sand, und brütet 3 Wochen. — Wird oft mit *Scolopax Totanus* verwechselt.

Gesner, Vögelb. p. 246. *Mattknillis;* mit 1 Fig.
Brisson, ornithol. II. p. 259. n. 1. Becasseau, appellé vulgairement Cul-blanc.
Batsch, Thiere, I. p. 399. *der punktirte Strandläufer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 729. n. 12. Tringa (Ochropus) rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi, abdomine rectricibusque extimis albis.
Beseke, Vögel Kurlands, p. 64. n. 27. *der punktirte Strandläufer.*
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 362. *der punktirte Strandläufer.*
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 258. *der Sandpfeiffer.*
Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 463. n. 44. *der punctirte Strandläufer.*
Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 5. *Horsegiög.*
Naturforsch. XIII. p. 216. n. 123. *der punctirte Strandläufer.*
Frisch, Vögel, Tab. 239. *der kastanienbraune, weißpunktirte Strandläufer.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Ocrophus.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 2. Cinclus.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 8. Tringa (Ocrophus) rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi nitido.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 198. Tringa (Ocrophus) rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi, abdomine rectricibusque externis albis.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 282. Glareola IV. *Grünfüßel, Mattknillis.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 283. Glareola VIII. *bundt Wasser-Hünlin.*

Charleton,

Charleton, onomaſt. zoic. p. 107. n. 3. Ochra.

Jonſton, av. p. 163. Tringa tertia. p. 164. Cincli congener altera. p. 160. Gallinula Rhodopus.

Schäfer, element. ornith. Tab. 67.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 302. n. 6. *der grüne Strandläufer.*

β. Littorea. *Der Küſtenjäger.* (10)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 413. n. 17. *der braune Reuter.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 167. n. 2. *der Uferſtrandläufer.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 448. F. *der Küſtenjäger.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 569. *der braune Reuter.*

Briſſon, ornith. II. p. 265. n. 7. Chevalier cendré.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 731. n. 15. Tringa (Littorea) roſtro laevi pedibusque cinereis, remigibus fuſcis, rachi primae nivea.

Cetti, Sardinien, II. p. 255. *die kleinſte Schnepfe?*

Fiſcher, Naturgeſch. v. Livl. p. 88. n. 114. *Strandhühnlein.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 171. n. 10. *Strandbekkaſſin.*

Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 297. n. 97. *der Uferlaufer-Kiwitz.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 7. Gallinula pedibus nigricantibus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 12. Tringa (Littorea) roſtro laevi, pedibus fuſcis, remigibus fuſcis, rachi primae nivea.

Müller, zool. dan. prodr. p. 25. n. 200. Tringa (Littorea) roſtro laevi pedibusque cinereis, remigibusque fuſcis, rachi primae nivea.

Charle-

(10) Nach *Briſſon*, *Latham*, *Pennant* eine eigene Gattung.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 2. Calidris nigra.

Jonston, av. p. 159. Calidris Bellonii nigra.

γ. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 167. n. 3. *einzeln gefleckte Strandläufer.*

Latham, Syn. III. 1. p. 171. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 730. n. 12. β. Tr. cinerea, supra maculis albidis varia, subtus albida, fronte superciliisque albis, pectore nebuloso, rectricibus lateralibus extus nigro-fasciatis.

31. GLAREOLA. *Der Waldjäger.*

Müller, Natursyst. II. p. 411. Var. B. Tab. XVI. fig. 4.

Pennant, arct. Zool. II. p. 488. G. *der Waldjäger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 730. n. 13. Tringa (Glareola) rostro laevi, pedibus virescentibus, corpore fusco albo punctato, pectore albido.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 8. Gallinula pedibus viridibus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 11. Tringa (Glareola) rostro laevi, pedibus virescentibus, corpore albo punctato, pectore subalbido.

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 250. n. 13. β. Tringa *Glareola* rostro laevi, pedibus virescentibus, corpore fusco albo punctato, pectore albido.

Linné, fn. Suec. I. n. 152. Tringa nigra albo punctata, pectore maculato, abdomine subalbido, pedibus virescentibus.

35. LEUCOPTERA. *Der weißflüglige Strandläufer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 731. n. 17. Tringa (Leucoptera) fusca, corpore subtus super-

ciliis

ciliis uropygioque rufis, cauda rufo maculata, humeris albis.

36. MARITIMA. *Der Pfeiffer.*(¹)
Pennant, arct. Zool. II. p. 447. C. *der Pfeiffer.*
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 135. *Fjäreplit*, *Gaddevierrusch.*
Olaffen, Reise d. Isl. I. p. 309. *Selningur.*
Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 138. *Fierre Muus.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 731. n. 18. Tringa (Maritima) griseo nigroque varia, subtus alba, iugulo caudaque obscuris, rectricibus lateralibus quatuor albo-marginatis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 206. Tringa rostro laevi, subtus alba, supra cinereo-et nigro-variegata, tinctura in medio dorso violacea.
Brünniche, ornithol. bor. p. 54. n. 182. Tringa (Maritima) fusca cinereo undata, rectricibus lateralibus 4. utrinque brevioribus, basi rostri pedibusque flavis.

37. UNDATA. *Der wellenförmig gezeichnete Strandläufer.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 448. E. *der brünnichsche Strandläufer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 732. n. 19. Tringa (Undata) obscura, luteo alboque undulata, tectricibus alarum et remigibus secundariis apice uropygioque albis, cauda cinerea, apice nigro marginata.
Beseke, Vögel Kurlands, p. 65. n. 130.

38. UNIFORMIS. *Der einfarbige Strandläufer.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 449. H. *der einfärbige Strandläufer.*

Latham,

(1) S. die Anmerk. bey *Tringa Striata.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 732. n. 20. Tringa (Uniformis) rostro brevi nigro, tota dilute cinerea.

14. Hypoleucos. *Der Sandpfeiffer.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 451. n. 14. *der Sandpfeiffer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 95. n. 6. *der Sandpfeiffer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 432. n. 6. *der gemeine Strandläufer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 168. *der gemeine Strandläufer.* p. 173. *Strandläuferlein, Pfisterlein, Haarschnepfe, gemeine Sandläufer.* Tab. 8.

Pennant, arct. Zool. II. p. 441. n. 305. *der gemeine Strandläufer.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 567. *das Pfisterlein.*

Gesner, Vögelb. p. 244. *Fisterlein*; mit 1 Fig.

Halle, Vögel, p. 489. n. 534. *das graue Wasserhuhn.*

Brisson, ornitholog. II. p. 260. Guignette.

Batsch, Thiere, I. p. 399. *der Sandpfeiffer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 734. n. 28. Tringa (Hypoleucos) rostro laevi, pedibus cinereis, corpore cinereo, subtus albo.

Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 88. n. 113. *Wasserschnepf.*

White,

(2) Gewicht, nach *Pennant*, 2 Unzen. — Ein geselliger Vogel der in Herden zu zwanzig und mehrern auf seinen Reisen angetroffen wird. Verläßt uns im September, und kommt im May wieder. Zieht des Nachts. Nährt sich besonders von kleinen Wasserschnecken, und ans Ufer geschwemmten Wasserinsekten. Brütet vierzehn Tage. Das Fleisch ist sehr schmackhaft.

White, Naturgesch. v. Engl. p. 37. *Sandpfeifer.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. Tringa Hypoleucos.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 116. n. 143. *das Strandläuferlein.*
Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 6. *Bekkasin, Virleu, kleine Myrstikkel, Strandschnepfe.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 74. *Sandläuffer.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 3. Hypoleucos.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 9. Tringa (Hypoleucos) rostro laevi, pedibus lividis, corpore cinereo, lituris nigris, subtus albo.
Müller, zool. dan. prodr. p. 25. n. 199. Tringa (Hypoleucos) rostro laevi, pedibus lividis, corpore cinereo, lituris nigris, subtus albo.
Kramer, Austr. p. 353. n. 3. Tringa rostro laevi, corpore cinereo, lituris nigris, subtus albo; *Sandlaufferl.*
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 303. n. 7. *der Sandpfeifer.*

15. Canutus. *Der Canutsvogel.* (3)
Müller, Natursyst. II. p. 412. n. 15. *der Canutsvogel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 183. n. 13. *der Kanutsvogel.* p. 185. *graues Wasserhuhn, Kanutsstrandvogel.*
Halle, Vögel, p. 489. n. 533. *das graue Wasserhuhn mit acht Zähnen an der Zunge.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 340. n. 301. *der Canutsvogel.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 560. *der Kanutvogel.*
Brisson, ornitholog. II. p. 276. n. 21. Canut.
Latham,

(3) Flügelweite 19 Zoll. Gewicht 4 1/2 Unze. *Bechstein.* Der Name soll vom König *Kanut* kommen, der ihn für einen grofsen Leckerbissen hielt. Wird zuweilen mit *Tringa Cinclus* verwechselt.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 738. n. 44. Tringa (Canutus) roſtro laevi, pedibus cineraſcentibus, remigibus primoribus ſerratis, rectrice extima alba immaculata.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 66. *der Canutvogel.*

Pennant, R. d. Schottl. I. p. 19. *Kanutsvögel.*

Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 171. n. 7. Tr. Canutus.

Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 6. Canuti avis.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 10. Tringa (Canutus) roſtro laevi, pedibus cineraſcentibus, remigibus primoribus ſerratis.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 107. n. 1. Calidris cinerea.

39. Australis. *Der cayenniſche Strandläufer.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 737. n. 40. Tringa (Auſtralis) roſtro pedibusque nigris, corpore cinereo fuſco luteoque vario, ſubtus pallide rufo, abdomine uropygioque albo.

16. Arenaria. *Der Sandläufer.* (4)

Müller, Naturſ. II. p. 412. n. 16. *der Sandläufer.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 96. n. 7. *der Sandläufer.*

Bechſtein, Naturg. I. p. 434. n. 9. *der Sandläufer.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 194. n. 17. *der Sandläufer.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 557. *der Sandläufer.*

Briſſon, ornithol. II. p. 272. n. 17. petite Maubéche griſe.

Batſch, Thiere, I. p. 399. *der Strandläufer.*

(4) Länge über 7 Zoll. Flügelweite 13 1/2 Z. Gewicht ohngefehr 2 Unzen. *Bechſt.* — Man darf ihn nicht mit *Charadrius Hiaticula* verwechſeln, deſſen Jungen er ähnlich ſieht. *Latham* hält ihn mit *Char. Calidris* für einerley.

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 64. n. 128. *der Strandläufer.*

Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 362. n. 124. *der Sandläufer, Sandregerlein.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. Tringa arenaria.

Naturf. XIII. p. 216. n. 124. *der Sandläufer.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 303. n. 8. *der Sandläufer.*

18. Cinclus. *Die Meerlerche.* (f)

Müller, Naturf. II. p. 413. n. 18. *die Meerlerche.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 96. n. 8. *die Meerlerche, der Steinpicker.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 433. *die Meerlerche.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 173. n. 10. *die Meerlerche.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 442. n. 307. *die Meerlerche.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 561. *die Meerlerche.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 267. n. 10. Alouette-de-mer.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 735. n. 35. Tringa (Cinclus) roſtro pedibusque nigris, loris albis, corpore uropygioque griſeis fuſcisque.

Gesner, Vögelb. p. 544. *Lyßklicker, Steinpicker.*

Moehring, av. gen. p. 77. n. 94. Schoeniclus?

Jonſton, av. p. 163. Cinclus.

β. *Cinclus pedibus fuſcis.*

Wird von *Latham* zu *Tringa Alpina*, p. 676. n. 11. gerechnet.

22. Ru-

(f) Flügelweite, nach *Briſſon*, 13 1/3 Zoll. Gewicht, nach *Pennant*, 1 1/3 Unze. Legt 4 bis 5 gelblich weiſse, blaſs und dunkelbraun gefleckte Eyer in die Löcher der Ufer auf die bloſse Erde, und brütet 3 Wochen.

38. Ruficollis. *Der rothhälſige Strandläufer.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 736. n. 36. Tringa (Ruficollis) cinerea, ſubtus ferruginea, capite colloque ferrugineo nigroque ſtriatis.
Pallas, Reiſ. Ausz. III. Anh. p. 11. n. 31. Tringa *ruficollis*.

39. Calidris. *Der olivenfarbene Strandläufer.*
Müller, Naturſyſtem, II. p. 413. n. 19. *der grüne Strandläufer.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 181. n. 12. *der grüne Strandläufer.*
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 559. *die Waldſchnepfe.*
Briſſon, ornith. II. p. 270. n. 14. Maubéche.
Gesner, Vögelb. p. 237. *Waldſchnepff, Holtzſchnepff;* mit 1 Fig.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 732. n. 21. Tringa (Calidris) roſtro pedibusque nigricantibus, corpore ſubtus olivaceo, uropygio variegato.
Jonſton, av. p. 161. Ruſticola ſylvatica.

40. Naevia. *Der getüpfelte Strandläufer.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 446. B. *der getüpfelte Strandläufer.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 271. n. 15. Maubéche tachetée.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 732. n. 22. Tringa (Naevia) cinereo ruſo violaceoque nigro varia, ſubtus caſtaneo-albida, rectricibus lateralibus fuſcis, extima latere exteriore linea longitudinali alba.
Klein, av. p. 101. n. 5. Glareola caſtanea?
Klein, Vorbereit. p. 188. n. 5. *Braunhünlein?*

41. Grisea. *Der graue ſchwarzfüßige Strandläufer.*
Briſſon, ornith. II. p. 272. n. 16. Maubéche griſe.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 733. n. 23. Tringa (Griſea) griſea ſubtus alba, collo ſubtus uropygio et pectore fuſco undatis, rectricibus margine albis.

20. Pusilla. *Der kleine Strandläufer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 414. n. 20. *der Zwergreuter.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 433. n. 8. *der kleine Strandläufer.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 178. n. 11. *der kleine Strandläufer.* Tab. 10.

Pennant, arct. Zool. II. p. 446. n. 314. *der kleine Strandläufer.*

Briſſon, ornithol. II. p. 269. n. 12. Alouette-de-mer de St. Domingue.

Onomat. hiſtor. nat. VII. p. 576. *die kleine Meerlerche von St. Domingo.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 737. n. 38. Tringa (Puſilla) roſtro pedibusque fuſcis, corpore ſubtus rufeſcente, rectricibus extimis ſcapo albo, uropygio variegato.

23. Squatarola. *Der graue grünfüßige Strandläufer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 414. n. 23. *der Parder.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 151. n. 5. *der graue Kiebitz.* p. 153. *Brachamſel, grauer Strandläufer, Parder, braungefleckter Strandvogel.*

Halle, Vögel, p. 102. n. 110. *der graue Regenpfeifer.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 577. *der graue Regenpfeifer; graue Pulroß.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 444. n. 310. *der graue Strandläufer.*

Klein,

Klein, av. p. 20. n. 3. Gavia s. Pluvialis cinerea.
Klein, Vorber. p. 38. n. 3. *grauer Gysitz, Pardel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 21. n. 4. *grauer Kybitz, grauer Pardel.*
Klein, stemmat. av. p. 3. Tab. 3. fig. 2. a-c.
Brisson, ornith. II. p. 237. n. 2. Vanneau gris.
Latham, Syn. Suppl. p. 248. Grey Sandpiper.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 729. n. 11. Tringa (Squatarola) rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo subtus albido.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 362. *der Parder.*
Pontoppidan, Dännemark, p. 171. n. 8. *Flöytetyten, Dolken.*
Naturf. XIII. p. 216. n. 125. *der Parder.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 117. n. 145. *grauer Pulroß.*
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 11. Tringa Augusti mensis.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 13. Tringa (Squatarola) rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albido.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 201. Tringa (Squatarola) rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albido.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 316. Pardalus II. *Brach-Amsel, großer Brachvogel, grawer Gysitz.*
Charleton, onomast. zoic. p. 109. n. 14. Pluvialis cinerea.
Jonston, av. p. 165. Pluvialis cinerea.

β. Varia. *Der braun und weiß gefleckte Strandläufer.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 414. n. 21. *der Scheck.*

(6) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 153. *der gefleckte Kiebitz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 580. *der bunte Kiwiz.*

Brisson, ornitholog. II. p. 238. n. 3. Vanneau varié.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 729. n. 11 β. Tr. rostro pedibusque nigris, corpore fusco albo variegato; abdomine albo, rectricibus fusco-fasciatis.

Latham, Syn. III. 1. p. 169. n. 11. Var. A.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 88. n. 115. *bunte Schnepfe.*

24. Islandica. *Der rothe Strandläufer.* (7)

Müller, Natursyst. Supplem. p. 113. n. 24. *der Isländer.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 443. n. 309. *der rothe Strandläufer.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 337. n. 39. Tringa (Islandica) rostro pedibusque fuscis, corpore subtus ferrugineo, remigibus secundariis margine albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 203. Tringa (Ferruginea) subtus tota ferruginea, dorso e nigro ferrugineo alboque vario, rectricibus intermediis apice subcaudato.

Olafsen, Reise d. Isl. II. p. 202. *Raudbristingr.*

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 249. n. 6. Tringa Morinellus.	p. 671. n. 4. β *Var. von* Tr. Interpres.

(7) *Pennant*, und mit ihm *Latham*, halten ihn mit *Scolopax Subarquata* p. 658. n. 25. für einerley.

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 249. n. 10. Tr. Fulicaria.	p. 676. n. 9. *b als das Weibchen von* Tr. Hyperborea.
p. 250. n. 13. β. Var. Tr. Ocroph.	p. 677. n. 21. Tr. Glareola.
p. 251. n. 17. Tr. Littorea.	p. 677. n. 13. β. *Var. von* Tr. Ochropus.
p. 252. n. 21. Tr. Varia.	p. 682. n. 23. β. *Var. von* Tr. Squatarola.
pag. 252. n. 22. Tringa Fuſca.	p. 696. n. 2. Glareola Senegalenſis.

Das Geſchlecht iſt um 18 Gattungen vermehrt. Bey der 4ten Gattung ſind *vier*, bey der 5ten *zwey*, bey der 8ten *zwey*, bey der 9ten *zwey*, bey der 13ten *drey*, bey der 18ten *zwey*, bey der 23ten *zwey* Spielarten aus einander geſetzt.

B. *Unbeſtimmtere Thiere.*

1. *Der caſſubiſche Mornell.*
 Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 23. n. 12.
 Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 363. n. 128.
 Naturf. XIII. p. 217. n. 128.

2. *Eine Tringa, die ſich mit keiner von den beſchriebenen Arten vereinigen läßt.*
 Sander: Naturf. XIII. p. 193.

3. *Eine Tringa, die man nicht zu einer der bekannten Arten rechnen kann.*
 Beſeke, Vögel Kurl. p. 65. n. 129.

4. *Der braun und gelbbunte Strandläufer mit gelben Füßen.*
 Friſch, Vögel, Tab. 238.
 Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 723.

5. *Der hochbeinige, grau und weiſs marmorirte Sandläufer mit rothem Unterkiefer und braungelben Füſsen.*
Friſch, Vögel, Tab. 236.
Beſeke, Vögel Kurlands, p. 60. n. 1.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 88. et 722.

6. Tringa nigro luteſcens variegata, pectore macula nigra, rectricibus intermediis longioribus.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 208.
Olaſſen, Isl. II. Tab. 41. *Loar - Thraell.* p. 309. g.
Fabric. fn. groenl. p. 112 (oben.)

C. *Neuere Gattungen.*

1. Tringa (Equeſtris) pedibus vireſcentibus, dorſo fuſco vario, abdomine uropygioque albis.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 730. n. 14.
Büffon, oiſ. VII. p. 511. Pl. enl. 844. Chevalier commun.

2. Tringa (Grenovicenſis) corpore ſupra vario, collo ſubtus cinereo, abdomine, criſſo uropygiique lateribus albis.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 731. n. 16.
Latham, Syn. Suppl. p. 249. Greenwich Sandpiper.

3. Tringa (Fuſca) pallide fuſca nigro maculata, ſubtus alba, collo antice nigro ſtriato, cauda cinerea, tectricibus alarum albido marginatis.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 733. n. 26.
Br. Zool. II. n. 195. — *Latham*, Syn. Supplem. p. 250. Brown Sandpiper.

4. Tr. (Lincolnienſis) alba, ſupra maculis griſeis fuſcisque varia, ſubtus maculis oblongis fuſcis et nigris, rectricibus duabus intermediis toto nigris.
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 734. n. 27.
Br. Zool. II. n. 197. — *Lath.* Syn. Suppl. p. 251.

88. GE-

88. GESCHLECHT. CHARADRIUS. *Der Regenpfeifer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 415. Gen. LXXXVIII.
Leske, Naturgeſch. p. 272. Gen. LII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 108. Gen. LVIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 215. Gen. LX.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 435. Gen. XLIV.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. III. p. 197. Gen. XXX.
Halle, Vögel, p. 99. Gen. IV.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 449.
Onomat. hiſt. nat. II. p. 817.
Briſſon, ornithol. II. p. 220. Gen. LXVII. Himantopus. p. 222. Gen. LXIX Pluvialis.
Batſch, Thiere, I. p. 387. Gen. CIII.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 740. Gen. LXXIV. p. 751. Gen. LXXV. Curſorius.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 138.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 303. Gen. LII.

1. HIATICULA. *Die Seelerche.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 415. n. 1. *der Strandpfeifer.*
Leske, Naturgeſch. p. 273. n. 1. *der Strandpfeifer.*
Borowſky, Thierreich, III. p. 109. n. 2. *der Strandpfeiffer, Uferlerche.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 215. n. 1. Charadrius (Hiaticula) pectore nigro, fronte nigricante, faſciola alba, vertice fuſco, pedibus luteis; *die Seelerche.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 437. n. 4. *der Strandpfeifer.*

Bechſtein,

(8) Gewicht an 2 Unzen. *Pennant.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 214. *der Strandpfeifer.* p. 219. *Uferlerche, Seelerche, sprenglichter Grillvogel, Koppenriegerlein, Kobelregerlein, Sandvogel, Sandregerlein, Tullfiß, Grießhennl.*

Ebert, Naturl. II. p. 97. *Seelerche.*

Halle, Vögel, p. 105. n. 13. *der Strandpfeifer.* Fig. 4.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 451. n. 318. *der Strandpfeifer.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 120. *Seelerche.*

Onomat. histor. nat. II. p. 817. *der gesprengte Grillvogel.*

Klein, av. p. 21. n. 6. Gavia littoralis.

Klein, Vorber. p. 39. n. 6. *Seemoruel, Seelerche.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 22. n. 7. *Seelerche.*

Brisson, ornithol. II. p. 227. n. 8. petit Pluvier à collier.

Batsch, Thiere, I. p. 400. *die Uferlerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 743. n. 8. Charadrius (Hiaticula) griseo-fuscus, subtus albus, pectore nigro, fronte nigricante, fasciola alba, ventre fusco, pedibus luteis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 65. n. 131. *der Strandpfeifer.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 183. n. 1. *die Seelerche, Oostvogel.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 44. *die Seelerche.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 362. n. 126. *Strandpfeifer.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 266. *der Strandpfeifer.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 135. *Sandmuling.*

Pallas, Reis. I. p. 370. *Brachvogel.*

Pallas,

Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 10. Charadrius Hiaticula. p. 14. *das Brachhuhn.* III. p. 13. *der kleine Strandläufer.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171. *Präſtekraver, Sandvrifter.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 118. n. 147. *die Uferlerche.*

Naturf. XIII. p. 217. n. 126. *Strandpfeifer.*

Olaffen, Reiſ. d. Isl. I. p. 309. *Sandlo.*

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 284. n. 41. p. 297. n. 100. *Seelerche.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 55. Hiaticula.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 4. Hiaticula.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 2. Charadrius (Hiaticula) pectore nigro, fronte nigricante faſciola alba, vertice fuſco, pedibus luteis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 209. Charadrius (Hiaticula) pectore nigro, fronte nigricante faſciola alba, vertice fuſco, pedibus luteis.

Kramer, Auſtr. p. 354. n. 2. Charadrius pectore nigro, fronte nigricante lineola alba, vertice fuſco, *Griesshennl.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 109. n. 15. Charadrius.

Jonſton, av. p. 166. Charadrius. p. 211. Matuitui.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 303. n. 1. *die Seelerche.*

β. Ch. griſeus collari abdomineque albis. *

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 744. n. 8. β.

γ. Ch. griſeo-cinereus, fronte collarique albis, caudae ultima medietate nigra, apice ferrugineo. *

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 744. n. 8. γ.

2. Alex-

2. ALEXANDRINUS. *Der alexandrinische Regenpfeifer.* (9)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 416. n. 2. *der Alexandrinſche.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 254. B. *der alexandriniſche Regenpfeiffer.*

Latham, Syn. III. 1. p. 203. n. 9. Alexandrine Plover.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 744. n. 9. Charadrius (Alexandrinus) fuſcus, fronte collarique dorſali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.

Haſſelquiſt, Reiſe n. Paläſt. (Ed. germ.) p. 310. n. 30. Charadrius Alexandrinus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 3. Charadrius (Alexandrinus) fuſcus, fronte collarique dorſali, abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 210. Charadrius (Alexandrinus) fuſcus fronte collarique dorſali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.

β. AEGYPTIUS. *Der ägyptiſche Regenpfeifer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 416. n. 4. *der ägyptiſche.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 744. n. 9. β. Ch. faſcia pectorali nigra, ſuperciliis albis, rectricibus apice albis faſcia nigra, pedibus caeruleis.

Haſſelquiſt, Paläſt. (Ed. germ.) p. 311. n. 31. Charadrius Aegyptius.

γ. ERYTHROPUS. *Der rothfüßige Regenpfeifer.*

Latham, Syn. III. 1 p. 204. n. 9. Var. B.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 745. n. 9. γ.

δ. *Der*

(9) Soll, nach *Bechſtein*, a. a. O. III. p. 216. das Weibchen von *Tringa Hiaticula* ſeyn.

δ. *Der philippinische Regenpfeifer.* (10)

Latham, Syn. III. 1. p. 205. n. 9. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 745. n. 11. Charadrius (Philippinus) fuscus, regione oculorum torque colli caudaque nigris, fronte, corpore subtus rectricibusque apice albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguinea, p. 31. *der kleine Regenpfeiffer der Insel Luçon.*

4. Novae seelandiae. *Der neuseeländische Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 745. n. 12. Charadrius (novae Zealandiae) cinereo-viridis, facie et torque colli nigris, vitta annulari capitis, fascia alarum corporeque subtus albis.

8. Gregarius. *Der gesellige Regenpfeifer.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 115. n. 13. *der Gesellige.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 745. n. 13. Charadrius (Gregarius) cinereus, subtus albus, pectore lunula nigra, postice rufa, rectricibus albis fascia nigra.

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 186. *eine Art Brachvögel die an der Wolga der wilde Kybits, Dikaja Pikaliza oder Pischik genannt werden.*

13. Asiaticus. *Der asiatische Regenpfeifer.*

Müller, Natursyst. Supplem. p. 115. n. 14. *der Asier.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 14. Charadrius (Asiaticus) griseo fuscus, fronte, superciliis, gula abdomineque albis.

Pallas, Reise, Ausz. II. p. 240. Anhang p. 17. n. 32. Charadrius asiaticus.

14. Mon-

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

14. MONGOLUS. *Der mongolische Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 16. Charadrius (Mongolus) cinereo fuscus, fronte subtusque albus, iugulo pectoreque ferrugineis, gula lunula nigra.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 10. n. 29. Charadrius Mongolus.

3. VOCIFERUS. *Der Kildir.*

Müller, Natursyst. II. p. 416. n. 3. *der Schreyer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 113. n. 8. *der Schreyer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 220. n. 7. *der schreyende Regenpfeifer.*

Halle, Vögel, p. 107. n. 17. *der Schwanzkiwiz.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 450. n. 317. *der Killdihr.*

Klein, av. p. 21. n. 8. Gavia brachyptera, vocifera.

Klein, Vorber. p. 40. n. 8. *langgeschwänzter Mornell, Gijbitz.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 23. n. 10. *langgeschwänzter Kybitz.*

Brisson, ornithol. II. p. 228. n. 9. Pluvier à collier de Virginie.

Batsch, Thiere, I. p. 400. *der Schreyer.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 742. n. 6. Charadrius (Vociferus), fasciis pectoris, colli, frontis genarumque nigris, cauda lutea fascia nigra, pedibus flavis.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 42. *der Schreykibiz.*

Nau, Entdeck. aus der Naturgesch. I. p. 247. Charadrius vociferus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 4. Charadrius (Vociferus) fasciis pectoris, colli, frontis genarumque nigris, cauda lutea fascia nigra, pedibus pallidis.

β. TOR-

β. Torquatus. *Der Regenpfeifer mit dem Halskragen.* (¹)

Müller, Naturſyſt. II. p. 419. n. 8. *der Schwarzkragen.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 221 *Regenpfeifer mit dem Halskragen.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 229. n. 10. Pluvier à collier de St. Domingue.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 743. n. 6. β. Charadrius pectore griſeo-variegato, fronte alba, vertice collarique nigro, roſtro pedibusque caeruleſcentibus.

Pontoppidan, Dännemark, p. 171. n. 5. Charadrius Torquatus.

15. Jamaicensis. *Der jamaicaiſche Regenpfeifer.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 117. n. 18. *der Jamaiker.*

Briſſon, ornithol. II. p. 230. n. 11. Pluvier à collier de la Jamaique.

Latham, Syſt. ornithol. II. p 743. n. 7. Charadrius (Jamaicenſis) obſcure fuſcus, ſubtus albus, pectore nigris maculis vario, torque albo, rectricibus albidis, ruſo et nigricante variegatis.

Latham, Syn. III. 1. p. 201. n. 7. Collared Plover.

5. Morinellus. *Der Morinell.* (²)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 417. n. 5. *der Poſſenreiſſer.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 110. n. 3. *das Mornellchen, der Morinell.*

Leske, Naturgeſch. p. 273. n. 2. *der Morinel.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 436. n. 3. *der Mornell.*

Bechſtein,

(1) Nach *Briſſon* eine eigene Gattung.

(2) Gewicht 4 Unzen. *Pennant.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. I. p. 211. n. 5. *der Mornell.*

Ebert, Naturl. II. p. 97. *der Mornell.*

Halle, Vögel, p. 104. n. 12. *das Mornellchen.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 223. n. 217. *das Mornellchen.*

Onomat. histor. nat. V. p. 249 *das Mornellchen, der lappländische Regenpfeifer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 453. A. *der Mornell.*

Klein, av. p. 21. n. 5. Gavia Morinellus simpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 39. n. 5. *Mornelgybitz, Morinelle, Hauptdummer Gybitz.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 21. n. 6. *Mornell.*

Klein, stemmat. av. p. 3. Tab. 3. fig. 3. a. b.

Brisson, ornithol. II. p. 225. n. 5. petit Pluvier ou le Guignard.

Batsch, Thiere, I. p. 400. *der Morinell.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 17. Charadrius (Morinellus) pectore ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque lineari alba.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 66. n. 132. *der Possenreisser.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 271. n. 2. *Pomeranzvogel, Citronvogel, Mornellchen.*

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 474. *der Brachvogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 3. Morinellus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 6. Charadrius (Morinellus) pectore ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque lineari alba, pedibus nigris.

Müller, zool. dan. prodr. p. 26. n. 211. Charadrius (Morinellus) pectore ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque lineari alba, pedibus nigris.

Charle-

Charleton, onomast. zoic. p. 106. n. 1. Morinellus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 304. n. 2. *der Morinell.*

b. Linné, Syst Nat. Ed. VI. p. 26. n. 5. Charadrius lapponicus.

Brisson, ornitholog. II. p. 226. *Femina.*

Halle, Vögel, p. 107. n. 16. *der lappländische Regenpfeifer.*

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 214. *der englische Mornell.*

Klein, av. p. 21. n. 7. Gavia Morinella altera.

Klein, Vorbereit. p. 40. n. 7. *grauer Mornell.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 22. n. 9. *graue Mornell.*

Brisson, ornitholog. II. p. 226. n. 6. Guignard d'Angleterre.

Latham, Syn. III. 1. p. 209. n. 14 Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 747 n. 17 β.

γ. *Müller*, Natursyst. Supplem. p. 116. n. 15. *der Tartar.* (3)

Latham, Syn. III. 1. p. 210. n. 14. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 14. Charadrius (Tataricus) collo cinereo, pectore ferrugineo, fascia gulae pectorisque nigra, abdomine albo, alis caudaque fuscis.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 17. n. 32. Charadrius *tataricus.*

16. ATRICAPILLUS. *Der schwarzköpfige Regenpfeifer.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 452. n. 319. *der Schwarzkopf.*

(3) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 745. n. 10. Charadrius (Atricapillus) cinereo-fuſcus, pileo nigro, ſuperciliis, gula abdomineque albis, cauda alba, faſcia ad baſin nigra.

17. Obscurus. *Der ſchwärzliche Regenpfeifer.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 747. n. 20. Charadrius (Obſcurus) nigricans, ſubtus ochraceus, fronte gulaque albidis, collo obſcuriore ſtriis pallidis.

18. Fulvus. *Der gelbe Regenpfeifer.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 747. n. 21. Charadrius (Fulvus) niger, fulvo-marginatus, ſubtus albidus, pectore fulvo, maculis nigris, faſcia alarum alba.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 211. n. 17. Var. A.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 748. n. 21. β. Char. fuſcus fulvo marginatus, ſubtus albus, pectore obſcuro, cauda fuſca, rectricibus utrinque maculis pallidis.

19. Leucogaster. *Der weiſsbäuchige Regenpfeifer.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 748. n. 22. Charadrius (Leucogaſter) fuſcus, corpore ſubtus, fronte vitta ſupra et infra oculos, remigibus primoribus baſi rectricibusque tribus exterioribus albis.

20. Rubricollis. *Der rothhälſige Regenpfeifer.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 748. n. 23. Charadrius (Rubricollis) cinereus, corpore ſubtus albo, capite colloque nigris, lateribus colli utrinque macula quadrata caſtaneo-rufa.

6. Apri-

6. Apricarius. *Der Haidenpfeifer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 418. n. 6. *der goldgrüne Regenpfeifer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 109. n. 1. *der goldgrüne Regenpfeifer.* Tab. 58.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 203. n. 3. *der Haidenpfeifer.* p. 205. *Grillvogel, Feldläufer, ſchwarzgelber Ackervogel.*

Halle, Vögel, p. 106. n. 15. *der ſchwarzgelbe Ackervogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 449. n. 315. *der Haidenpfeiffer, Grillvogel.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 23. n. 11. *ABC Kybitz.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 224. n. 4. Pluvier doré de la Baye de Hudſon.

Batſch, Thiere, I. p. 400. *der Ackervogel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 742. n. 5. Charadrius (Apricarius) pectore abdomineque nigro, corpore fuſco, albo luteoque punctato, pedibus cinereis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 35. *das fleckigte Waſſer-Huhn.*

Martini, Naturlex. I. p. 257. *Ackervogel.*

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 66. n. 133. *der goldgrüne Regenpfeifer.*

Siemſſen, meklenburg. Vögel, p. 184. n. 2. *der Strandpfeifer, Braakvogel.*

Leem, Nachricht von den Lappl. in Finnmarken, p. 132. *die Amſeln.* p. 133. *Heiloner.*

Olaffen, Isl. I. p. 309. f. *Heylo.*

Linné, Reiſ. d. Oel. u. Gothl. p. 83. *Alwargrim.*

Pontoppidan, Naturhiſt. v. Norwegen, II. p. 147. *Heiloe oder Myreloe.*

Schriften der berlin. Geſellſchaft naturf. Fr. VII. p. 463. n. 47. *der goldgrüne Regenpfeifer.*

Linné, auserlef. Abh. II. p. 297. n. 98. *der Regenpfeifer.*

Linné, Syft. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 1. Pluvialis nigro flavus.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 7. Charadrius (Apricarius) pectore nigro, roftro bafi gibbo, pedibus cinereis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 212. Charadrius (Apricarius) abdomine nigro, corpore fufco albo luteoque punctato, pedibus cinereis.

7. Pluvialis. *Der Goldregenpfeifer.*

Müller, Naturf. II. p. 419. n. 7. *der Grillvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 111. n. 4. *der Grillvogel.*

Bechftein, Naturgefch. I. p. 436. n. 2. *der Goldregenpfeifer.*

Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. III. p. 206. n. 4. *der Goldregenpfeifer.* p. 211. *grüne Regenpfeifer, Pardel, Pardelvogel, Grillvogel, Faftenfchleyer, Dittchen, Dütc, mittlere, große Brachvogel, Keylhaken, Brachhennl.*

Halle, Vögel, p. 101. n. 9. *der grüne Regenpfeifer.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, p. 224. n. 209. *das Dittchen.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 450. n. 316. *der Goldregenpfeifer.*

Handb. d. deutfchen Thiergefch. p. 112. *der kleine Brachvogel.*

Siemffen, meklenb. Vögel, p. 185. n. 3. *der gemeine Regenpfeifer, Thütvogel.*

Klein, av. p. 19. n. 2. Gavia viridis.

Klein, Vorbereit. p. 37. n. 2. *grüner Gybitz, Pardel, Pulvier, Pulros.*

Klein,

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 20. n. 3. *grüner Kybitz.*
Klein, ſtemm. av. p. 3. Tab. 3. fig. 1. a-c.
Gesner, Vögelb. p. 405. *Pulvier*, *Pulros.* Fig. p. 406.
Briſſon, ornithol. II. p. 222. n. 1. Pluvier doré.
Batſch, Thiere, I. p. 401. *der Grillvogel.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 740. n. 1. Charadrius (Pluvialis) corpore nigro viridique maculato, ſubtus albido, pedibus cinereis.
Latham, Syn. Suppl. p. 252. Golden Plover.
Fiſcher, Zuſ. z. Naturgeſch. v. Livl. p. 46. n. 496. *gemeiner Regenpfeifer.*
Cetti, Naturgeſchichte von Sardinien, II. p. 263. *der Brachvogel.*
Bock, Naturgeſch. v. Preuſſen, IV. p. 363. *Grillvogel, großer Brachvogel.*
Pennant, Reiſe durch Schottland, I. p. 271. *grüne Taucher.*
Wirſing, Vögel, Tab. 34. *kleiner Brachvogel?*
Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 284. n. 41. 46. p. 297. n. 99. *gemeine Regenpfeifer.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 51. *Keylhaken.*
Naumann, Vogelſteller, p. 182. *Keulhaken.*
Naturf. XIII. p. 218. n. 129. *Grillvogel.* XXV. p. 23. *Keulhaken.*
Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 171. n. 3. *Brokfugle, Hyeiler.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 110. *der Regenpfeiffer, Grillvogel.*
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 55. Pluvialis.
Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 26. n. 2. Pluvialis viridis.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 151. n. 8. Charadrius (Pluvialis) pedibus cinereis, corpore nigro viridique maculato, ſubtus albido.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 213. Charadrius (Pluvialis) corpore nigro viridique maculato, subtus albido, pedibus cinereis.

Brünniche, ornithol. bor. p. 57. n. 187. Charadrius Pluvialis.

Kramer, Austr. p. 354. n. 1. Charadrius nigro lutescenteque variegatus, pectore concolore; *Brachhennl.*

Charleton, onomast. zoic. p. 109. n. 2. Pluvialis flavo-virescens.

Moehring, av. gen. p. 75. n. 90. Charadrius.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 317. Pardalus III. *Brachvogel, Seetaube, Pulros.*

Jonston, av. p. 165. Pluvialis flavescens.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 304. n. 3. *der Goldregenpfeifer.*

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 211. n. 2. *der kleine Goldregenpfeifer.*

Brisson, ornitholog. II. p. 223. n. 2. petit pluvier doré.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 318. Pardalus IV. *kleiner Brachvogel.*

γ. *Brisson*, ornitholog. II. p. 224. n. 3. Pluvier doré de S. Domingue.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 740. n. 1. β. Ch. corpore nigricante flavescenteque vario, subtus albo, collo inferiore et pectore dilute griseis.

21. Rubidus. *Der rothe Regenpfeifer.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 452. n. 321. *der rothe Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 740. n. 2. Charadrius (Rubidus) rutilus pulveratim albo varius, maculis nigris, rectricibus duabus intermediis fuscis margine ferrugineis, lateralibus albis.

9. Cali-

9. CALIDRIS. *Der graue Regenpfeifer.* (4)
Müller, Naturſyſtem, II. p. 419. n. 9. *der graue Regenpfeifer.*
Borowſky, Thierreich, III. p. 112. n. 5. *der graue Regenpfeifer.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 452. n. 320. *der Sonderling.*
Briſſon, ornitholog. II. p. 272. n. 17. petite Maubéche griſe.
Batſch, Thiere, I. p. 401. *der graue Regenpfeifer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 253. Curwillet.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 741. n. 4. Charadrius (Calidris) roſtro pedibusque nigris, loris uropygioque ſubgriſeis, corpore ſubtus albo immaculato.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 197. n. 4. Var. A.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 742. n. 4. β. Ch. fronte et corpore ſubtus ex cinereo albis.

10. OEDICNEMUS. *Der große Regenpfeifer.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 420. n. 10. *der Dickfuß.* Tab. 16. fig. 6.
Borowſky, Thierreich, III. p. 112. n. 6. *der Steinwälzer.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 435. n. 1. *der Steinwälzer.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 197. *der Steinwälzer.* p. 201. *Steinpardel, Grünſchnäbler, Trick, Griel, großer Brachvogel, Gluth.*
Halle, Vögel, p. 103. n. 11. *der Steinwälzer.*
Onomat. hiſt. nat. V. p. 668. *der Steinwälzer.*
Klein, av. p. 20. n. 4. Gavia roſtro vireſcente, conico, acuto.

(4) Gewicht gegen 13/4 Unzen. *Pennant.*

Klein, Vorber. p. 38. n. 4. *grünſchnäblichter Pardel, Steinwälzer.*

Klein, verbeſſerte Vögelhiſt. p. 21. n. 5. *Steinpardel, Steinwälzer, Grünſchnäbler.*

Gesner, Vögelb. p. 505. *Triel, Griel;* mit 1 F.

Friſch, Vögel, Tab. 215. *der große Brachvogel oder Gluth.* (ein Weibchen.)

Briſſon, ornithol. II. p. 230. n. 12. grand Pluvier, appellé vulgairement Courly de terre.

Batſch, Thiere, I. p. 401. *der Steinwälzer.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 661. n. 11. Otis (Oedicnemus) griſea, remigibus primoribus duabus nigris, medio albis, roſtro acuto, pedibus cinereis.

Cetti, Naturgeſch. v. Sardinien, II. p. 267. *Steinpardel.*

White, Naturgeſch. von England, p. 31. 59. n. 12. *der große Regenpfeifer.*

Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſ. I. p. 309. Oedicnemus.

Neue ſchwed. Abhandl. III. p. 107. Charadrius Oedicnemus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 151. n. 9. Charadrius (Oedicnemus) griſeus, remigibus primoribus duabus nigris, medio albis, roſtro acuto, pedibus cinereis.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 74. n. 11. Oedicnemus *Bellonii.*

Jonſton, av. p. 65. Oedicnemus Bellonii.

Schäfer, element. ornith. Tab. 58.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 138. Charadrius Oedicnemus.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 304. n. 4. *der große Regenpfeifer.*

22. Sibiricus. *Der sibirische Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 747. n. 9. Charadrius (Sibiricus) fronte ex albo et nigro varia, vertice nigricante fasciato, pectore fusco, fascia alba terminato, abdomine ferrugineo.

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, II. p. 185. *ein sibirischer Hahn.* (russ. *Sibirskoi Petuschok.*)

11. Himantopus. *Der Strandreuter.*

Müller, Natursyst. II. p. 420. n. 11. *der Langfuß.* Tab. 16. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 123. n. 7. *das Riemenbein.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 438. n. 5. *der Strandreuter.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 201. *der Strandreuter.* p. 203. *Riemenfuß, Riemenbein, Stelzenläufer, Langfuß, Langbein, Dünnbein, fremder Vogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 98. *das Riemenbein.*

Halle, Vögel, p. 109. n. 20. *der Strandreuter.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 178. *der Strandreuter.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 453. n. 322. *das Langbein.*

Klein, av. p. 22. Gen. V. Himantopus.

Klein, Vorber. p. 42. *Dünnbein, Riemenbein.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 23. *Riemenbein.*

Klein, stemmat. av. p. 3.

Brisson, ornitholog. II. p. 220. n. 1. *Echasse.*

Latham, Syn. Suppl. p 252. *Long-legged Plover.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 741. n. 3. Charadrius (Himantopus) albus dorso nigro, rostro nigro capite longiore, pedibus longissimis.

Lepechin, Tageb. d. russ. R. I. p. 309. *der Grillvogel Himantopus.*

Pallas,

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 370. *die hochbeinige Schnepfe.*

Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 22. Charadrius Himantopus.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 120. n. 148. *das Dünnbein.*

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 308. Charadrius autumnalis.

Eberhard, Thiergesch. p. 110. *der Strandreuter.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 151 n. 10. Charadrius (Himantopus) supra niger, subtus albus, rostro nigro capite longiore, pedibus rubris longissimis.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 3. Himantopus.

Jonston, av. p. 159. Himantopus.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 47. Himantopodi.

12. Spinosus. *Der Dornflügel.*

Müller, Natursyst. II. p. 421. n. 12. *der Dornflügel.* Tab. 16. fig. 7.

Borowsky, Thierreich, III. p. 114. n. 9. *der Dornflügel.*

Brisson, ornithol. II. p. 233. n. 15. Pluvier armé du Sénegal.

Batsch, Thiere, I. p. 401. *der Dornflügel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 748. n. 24. Charadrius (Spinosus) remigibus, pectore pedibusque atris, occipite cristato, rectricibus dimidiato-albis, alulis spinosis.

Hasselquist, Paläst. (Ed. germ.) p. 314. n. 33. Charadrius spinosus.

Russ. Alep. p. 72. Tab. 11.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 151. n. 11. Charadrius (Spinosus) remigibus, pectore, abdomine pedibus-

pedibusque atris, rectricibus dimidiato-albis, humeris spinosis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 136. Charadrius spinosus.

β. *Der gehäubte persische Regenpfeifer.* (5)

Halle, Vögel, p. 108. n. 19. *der persische Kiwiz.*

Klein, av. p. 22. n. 10. Gavia s. Vanellus Indicus.

Klein, Vorbereit. p. 42. n. 10. *schwarzbrüstiger Kybitz.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 20. n. 2. *schwarzbrüstiger Kybitz.*

Brisson, ornithol. II. p. 232. n. 14. Pluvier hupé de Perse.

Latham, Syn. III. 1. p. 214. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 748. n. 24. β. Ch. corpore supra castaneo, collo abdomineque imo albis, collo antice, pectore, capite supra remigibus caudaque apice nigris, alulis spinosis.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 93. *der indianische Kybitz mit schwarzer Brust.* (das Männchen.)

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 69. *das Wasserhuhn mit gespornten Flügeln.* (das Weibch.)

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 1. Charadrius (Cristatus) gula, pileo pectoreque nigris, occipite cristato, dorso testaceo, pedibus nigris.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 139. Charadrius Cristatus.

γ. *Der cayennische Dornflügel.* (6)

Latham, Syn. III. 1. p. 215. n. 20. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 749. n. 25. Charadrius (Cayanus) capite, collo postico, fasciaque pectoris nigris, fascia occipitis annulari collo

(5) Nach *Brisson* eine eigene Gattung; wofür ihn auch *Hermann* hält.

(6) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

collo antice, abdomine basique caudae albis, alulis spinosis.

23. Pileatus. *Der senegalische Regenpfeifer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 749. n. 26. Charadrius (Pileatus) cristatus fronte carunculata, corpore supra rufo-griseo, subtus albo, vertice, gula, remigibus caudaque apice nigris.

24. Coronatus. *Der gekrönte Regenpfeifer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 749. n. 27. Charadrius (Coronatus) fuscus, capite superiore nigro, occipitis annulo, abdomine, fascia alarum caudaque albis, remigibus fasciaque rectricum ad apicem nigris.

25. Bilobus. *Der malabarische Regenpfeifer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 750. n. 28. Charadrius (Bilobus) rufo griseus, superciliis, abdomine fasciaque alarum albis, pileo, remigibus fasciaque rectricum nigris, caruncula frontis dependente.

26. Melanocephalus. *Der schwarzköpfige Regenpfeifer.* (7)
Latham, Syst. ornithol. II. p. 750. n. 29. Charadrius (Melanocephalus) caeruleo-griseus, capite, collo postico et dorso nigris, superciliis, collo antice pectoreque pallide rufis.

27. Gallicus. *Der französische Regenpfeiffer.* (8)
Latham, Syst. ornithol. II. p. 751. n. 1. Cursorius (Europaeus) fuscescens, striga per oculos pallida,

(7) Das Vaterland ist Senegal.

(8) Ist in Frankreich nur ein einziges Mal angetroffen, und soll überhaupt in Europa äusserst selten seyn. Wegen des spitzigen, nach der Spitze zu gekrümmten Schnabels, des weiten

pallida, remigibus macula pone oculos et ad apicem rectricum lateralium nigris.

Gerin. ornithol. Tab. 474. Pluvialis morinellus flavescens.

β. Ch. flavo-rufescens, lateribus capitis, gula abdomineque pallidioribus, pone oculos macula obscura, remigibus rectricibusque lateralibus ad apicem nigris. *

Latham, Syn. Suppl. p. 254. Tab. 116.

Latham, Syst. ornith. II. p. 751. n. 1. β.

28. Coromandelicus. *Der Regenpfeifer von Coromandel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 751. n. 2. Cursorius (Asiaticus) fuscus subtus rufus, superciliis, gula, abdomine imo, uropygio caudaque apice albis, remigibus fasciaque oculari nigris.

29. Curonicus. *Der kurländische Regenpfeifer.*

Beseke, Vögel Kurlands, p. 66. n. 134.

Latham, Syst. ornith. II. p. 750. n. 31. Charadrius (Curonicus) albus, rostro nigricante, cervicis fascia et lunula frontis nigra, verticis pileo cinereo, fascia oculari nigricante undulata, dorso, alis caudaque cinereis, pedibus rubescentibus.

30. Naevius. *Der schwarz und weißbunte Regenpfeifer.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 67. n. 135.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 750. n. 32. Charadrius (Naevius) supra ex cinereo nigro alboque varius, subtus albus, fascia infraoculari nigro punctata, rostro pedibusque nigricantibus.

A. *Ver-*

weiten Rachens, der eyförmigen Nasenlöcher und der spitzigen Zunge, hat Latham aus dieser und der folgenden Gattung ein eignes Geschlecht gemacht.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 254. n. 4. Charadr. Aegyptius.	p. 684. n. 2. β. Ch. Alexandrinus. *Var.*
p. 255. n. 8. Charadr. Torquatus.	p. 685. n. 3. β. Ch. Vociferus. *Var.*

Das Geschlecht ist der Anzahl nach um *achtzehn*, da aber zwey der XIIten Edition jetzt als Varietäten von andern angenommen, und an deren Stelle andere eingeschaltet worden, mit *zwanzig* neuen Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung ist überdem die Var. β, bey der 2ten die Var. γ und δ, bey der 5ten die Var. β und γ, bey der 7ten die Var. β und γ, bey der 9ten die Var. β, bey der 10ten die Var. β und γ, und bey der 12ten die Var. γ hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der Schreyer.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 363. n. 127. Naturf. XIII. p. 217. n. 127. Kulycek. (poln.)

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Regenpfeifer von den Falklandsinseln.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 747. n. 18. Charadrius (Falklandicus) fusco-nebulosus, fronte, collo subtus abdomineque albis, vitta annulari capitis ferruginea, fascia verticis pectoreque nigris.

2. *Der kleine indianische Regenpfeifer.*

Brisson, ornith. II. p. 234. n. 16. petit Pluvier des Indes. (Pluvialis minima Indica.)

Latham, Syn. Suppl. p. 254. Indian Plover.

Latham, Syst. ornith. II. p. 750. n. 30. Ch. (Indicus) fuscus, subtus albus, pectore fasciis duabus fuscis, rectricibus basi albis.

89. GESCHLECHT. RECURVIROSTRA. *Der Säbelſchnäbler.* (Waſſerſäbler.)

Müller, Naturſyſt. II. p. 89. Gen. LXXXIX.
Leske, Naturgeſch. p. 281. Gen. LXV.
Borowsky, Thierreich, III. p. 85. Gen. L.
Blumenbach, Handbuch der Naturgeſch. p. 216. Gen. LXI.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 434. Gen. XLIII.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. III. p. 222. Gen. XXXI.
Briſſon, ornithol. II. p. 504. Gen. CXIV.
Batſch, Thiere, I. p. 385 Gen. XCV.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 786. Gen. LXXXV.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 141.
Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 305. Gen. LIII.

1. AVOCETTA. *Die Avocette.*(9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 422. *der Säbelſchnäbler.* Tab. 17. fig. 1.
Leske, Naturgeſch. p. 281. *die Avocette.*
Borowſky, Thierreich, III. p. 85. *der Waſſerſäbler.* Tab. 50.
Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 216. n. 1.
Recurviroſtra (Avocetta) albo nigroque varia.
Bechſtein,

(9) Länge 18 Zoll. Flügelweite 30 Zoll. Gewicht 13 Unzen. *Penn.* — *Cetti* ſagt: ſie ſey ziemlich ſo groſs als eine Taube — Der oberwärts gekrümmte Schnabel, der an dieſem Vogel das unterſcheidenſte iſt, iſt in einigen Abbildungen, ſelbſt beym *Aldrovand* und *Jonſton* ſo krumm gezeichnet, daſs er beynahe den Bogen eines Halbzirkels ausmacht. Nach *Cetti* beträgt der Bogen in ſeiner Krümmung 3 Zoll, und der Chorde von der Spitze bis an das Ende des Schnabels drey Zoll weniger eine Linie.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 434. *der gemeine Wasserfäbler.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 223. n. 1. *der gemeine Wasserfäbler.* p. 226 *Wasserfäbel, Säbelschnabel, Säbelschnäbler, Avozette, Kremer.*

Ebert, Naturl. II. p. 99. *der Säbelschnäbler.*

Halle, Vögel, p. 585. n. 730. *der Wasserfäbel.* Fig. 52.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 466. B. *der Säbelschnabel.*

Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 401. *Säbelschnäbler.*

Onomat. histor. nat. II. p. 74. *der weißschwarze Krummschnabel.*

Handbuch d. Naturgesch. II. p. 383. *der Schabbelschnabel, Säbelschnäbler.*

Klein, av. p. 142. n. 1. Plotus recurvirostер.

Klein, Vorber. p. 262. n. 1. *Schabbelschnabel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 150. n. 1. *Schabbelschnabel, Säbelschnäbler.*

Gesner, Vögelb. p. 40. *Vberschnabel;* Fig. p. 41.

Brisson, ornith. II. p. 504. n. 1. Avocette.

Batsch, Thiere, I. p. 388. *Avosette.*

Latham, Syn. Suppl. p. 263. Scooping Avosetta.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 786. n. 1. Recurvirostra (Avocetta) albo nigroque varia.

Cetti, Sardin. II. p. 296. *die Avosette oder der Verkehrtschnabel.* Tab. 4.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 302. *die Stachelschnäbel.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 370. *die Avosettschnepfe.*

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 14. IV. p. 22. *die Avosettschnepfe.*

Pontoppidan, Dännem. p. 171. n. 1. *Klyde, Laufugl.*

Linné,

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 297. n. 101. *der gemeine Säbelschnäbler.*

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 182. n. 1. *das Avosettchen.*

Meidinger, Vorlesf. I. p. 136. *die Avozette.*

Eberhard, Thiergesch. p. 120. *der Wassersäbel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 90. *Avosetta.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 105. n. 129. *die Schnepfe mit über sich krumm gebogenem Schnabel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Recurvirostra.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 25. n. 1. Avosetta.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 151. n. 1. Recurvirostra (Avosetta) albo nigroque varia.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 214. Recurvirostra (Avosetta) albo nigroque varia.

Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 8. Avosetta.

Moehring, av. gen. p. 74. n. 86. Trochilus.

Jonston, av. p. 135. Avosetta.

Salerne, ornithol. p. 359.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Recurvirostra Avocetta.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 305. *die Avocette.*

2. Americana. *Die amerikanische Avocette.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 465. n. 338. *die Pennants-Avosette.* Tab. 21.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 787. n. 2. Recurvirostra (Americana) rostro nigro, corpore albo nigroque vario, capite, collo pectoreque rufescentibus.

3. Alba. *Die weiße Avocette.*

Müller, Natursyst. II. p. 403. n. 17. *der canadische Schnepf.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 28. *die weiße Schnepfe aus Canada.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 15. *weißer Strandläufer.*

Brisson, ornithol. II. p. 283. Barge blanche.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 787. n. 3. Recurvirostra (Alba) rostro aurantio, corpore albo, remigibus rectricibusque flavicantibus, pedibus fuscis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 34. *das weiße Haselhuhn aus der Hudsonsbay.*

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit *zwey* Gattungen vermehrt; wovon die 3te aus dem 86ten Geschlecht hieher versetzt worden.

90. GESCHLECHT. HAEMATOPUS. *Der Austernfischer.*

Müller, Natursyst. II. p. 224. Gen. XC.

Leske, Naturgesch. p. 276. Gen. LVI

Borowsky, Thierreich, III. p. 106. Gen. LVII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 216. Gen. LXII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 443. Gen. L.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 226. Gen. XXXII.

Brisson, ornitholog. II. p. 221. Gen. LXVIII. Ostralega.

Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. XCIX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 752. Gen. LXXVI.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 305. Gen. LIII.

1. OSTRA-

1. OSTRALEGUS. *Der Austerndieb.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 424. *der Austerfischer.* Tab. 17. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 276. *der Austernfresser.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 106. *die Meerelster.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 216. n. 1. Haemat. (Ostralegus) rostro pedibusque rubris.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 443. *der Austernfischer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 226. n. 1. *die Meerelster.* p. 230. *Austerfischer, Austersammler, Austermann, Austerfresser, schwarz und weiße Schnepfe.* Tab. 12.

Ebert, Naturl. II. p. 99. *der Austerndieb.*

Halle, Vögel, p. 109. n. 21. *der Austernsammler.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 218. n. 204. *die Meerelster.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 454. n. 323. *die Meerelster.*

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 460. *Austermann.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 123. *der Austernsammler, Augstermann.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 379. *der Austermann.*

Klein, av. p. 23. Ostralega.

Klein, Vorber. p. 44. *Augstermann.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 24. *Austermann.*

Brisson, ornitholog. II. p. 321. n. 1. Huitrier, appellé vulgairement Pie de Mer.

Batsch, Thiere, I. p. 394. *Austernfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 752. n. 1. Haematopus (Ostralegus) niger, corpore subtus fascia gulari et alarum, uropygio caudaque basi albis.

(10) Flügelweite 2 7/12 Fuss 6 Lin. *Brisson.* — Gewicht 16 Unzen. *Pennant.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 365. *der Austernfischer, Strandelster.*

Fischer, Zus. z. Naturgesch. v. Livl. p. 46. n. 497. *Seelster.*

Lepechin, Tageb. d. russ. R. I. p. 194. *Wasserelstern.*

Pennant, R. d. Schottl. I. p. 285. 293. *Austerfischer.*

Olaffen, Reis. d. Isl. I. p. 257. *Tiälderen.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 134. *die Meerelster. (Kield* od. *Rone Kalv.)*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 7. *Heisterschnepfen.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 15. *Austerschnepfe.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 22. *der Austerndieb.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171. n. 1. *Strandskade.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 179. *die Strandelster.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 70. *der Austerndieb.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 186. n. 1. *der gemeine Strandheister, Strandhäster.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 298. n. 103. *der Austerndieb.*

Naturf. XIII. p. 219. n. 133. *der Austerfischer.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 109. n. 135. *die schwarz und weiße Schnepfe.*

Wirsing, Vögel, Tab. 36. *Austermann.*

Eberhard, Thiergesch. p. 110. *der Austernsammler.*

Meidinger, Vorles. I. p. 134. *der Austernfresser.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Pica marina.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 25. n. 1. Pica marina.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 1. Haematopus Ostralegus.

Müller,

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 215. Haematopus Oſtralegus.
Charleton, onomaſt. zoic. p. 105. n. 11. Haematopus. p. 68. n. 4. Pica marina.
Moehring, av. gen. p. 75. n. 89. Haematopus.
Jonſton, av. p. 156. Haematopus Bellonii.
Nov. comment. Petropol. IV. p. 425. Pica marina.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 305. *der Auſterdieb.*

β. H. corpore toto nigro. *
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 753. n. 1. β.

γ. H. gula alba. *
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 230. n. 2.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

GLAREOLA. *Das Seerebhuhn.* (Sandhuhn, Sandſtrandläufer.)

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 446. Gen. LII.
Bechſtein, Naturgeſchichte Deutſchl. III. p. 231. Gen. XXXIII.
Klein, av. p. 100. Gen. XII.
Briſſon, ornithol. II. p. 248. Gen. LXXIII.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 753. Gen. LXXV.
Kramer, Auſtr. p. 381. Pratincola.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 129. Trachelia.
Donndorff, Handb. der Thiergeſchichte, p. 306. Gen. LV.

1. AUSTRIACA. *Die Wieſenſchwalbe.* (¹)
Müller, Naturſyſt. II. p. 635. n. 12. *die Wieſenſchwalbe.*

(1) Gröſse, nach *Kramer*, eines Ziemers (Turd. Viſcivorus) nach *Schwenkfeld*, einer Wachtel; nach *Scopoli* und *Briſſon* einer Amſel. (Turd. Merula.)

Borowsky, Thierreich, III. p. 158. n. 6. *die Wiesenschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 446. *das österreichische Sandhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 231. n. 1. *das österreichische Sandhuhn.* p. 233. *Koppenriegerle, Kobelregerlein, Wiesenschwalbe.* Tabula 13.

Ebert, Naturl. II. p. 151. *die Wiesenschwalbe.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 242. *das Kobel-Regerlein.*

Brisson, ornith. II. p. 248. n. 1. Perdrix-de-mer.

Batsch, Thiere, I. p. 364. *die Wiesenschwalbe.*

Gesner, Vögelb. p. 249. *Koppriegerlein;* mit 1 F.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 753. n. 1. Glareola (Austriaca) griseo-fusca, subtus rufo-alba linea gulari incurvata nigra, rectricibus quatuor exterioribus basi albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 318. *die schwalbenschwänzige Steppenralle.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 24. *die Pratincola.*

S. G. Gmelin, Reis. d. Russl. I. p. 77. Tab. 16.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 129. n. 161. *die Wiesen-Trachelia.*

Eberhard, Thiergesch. p. 96. *die Seeschwalbe.*

Kramer, Austr. l. c. *Brachvogl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 281. Glareola II. *Kopp-Riegerle, Sandvogel.*

Charleton, onomast. zoic. p. 90. n. 5. Hirundo marina.

Jonston, av. p. 160 Gallinula erythropus minor.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 137. Hirundo Pratincola.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 306. *die Wiesenschwalbe.*

β. Die

β. *Die Wiesenschwalbe mit dem Halsbande.* (2)
Klein, av. p. 101. n. 6. Glareola V. *Schwenkf.*
Klein, Vorber. p. 188. n. 6. *Sandregerlein, Riegerlein.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 5. *Sandregerlein.*
Brisson, ornitholog. II. p. 249. n. 2. Perdrix de mer à collier.
Gesner, Vögelb. p. 250. *Riegerlein;* mit 1 Fig.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 233. n. 2. *das Sandhuhn mit dem Halsbande.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 753. n. 1. β. Gl. griseo-fusca, subtus albida, fronte nigra, utrinque macula alba, linea gulari incurvata fusca.
Latham, Syn. III. 1. p. 223. Collared Pratincole.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 282. Glareola V. *Riegerlein, Sand-Regerlin, Tullfiß.*

γ. *Das Seerebhuhn von den maldivischen Inseln.*
Latham, Syn. III. 1. p. 224. Maldivian Pratincole.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 754. n. 1. γ. Gl. griseo-fusca, subtus uropygioque albo, gula striis nigris lineaque incurvata nigro cincta.
Sonnerat, Reis. nach Ostindien, (ed. germ.) III. p. 169. *das Seerebhuhn.*

δ. *Das Seerebhuhn von Coromandel.*
Latham, Syn. III. 1. p. 224. Coromandel Pratincole.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 754. n. 1. δ. Gl. fusca, corpore subtus, uropygio basique caudae albis, linea gulari incurvata nigra.
Sonnerat, Reis. n. Ostind. p. 169.

(2) Nach *Brisson*, u. a. eine eigene Gattung. *Bechstein* ist geneigt, diesen Vogel für ein Junges, oder für das Weibchen von *Charadrius Hiaticula* zu halten, wenn ich anders die Stelle p. 234. a. a. O. recht verstehe.

ε. *Latham*, Syn. III. 1. p. 224. Madras Pratincole.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 754. n. 1. ε. Gl. rufo-grisea, femoribus, crisso, uropygio, cauda basi, rectricibus lateralibus ad apicem lunula albis.
Sonnerat, Reis. nach Ostind. p. 170.

2. SENEGALENSIS. *Das senegallische Seerebhuhn.*
Müller, Natursystem, II. p. 414. n. 22. *der senegalische Strandläufer.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 563. *der braune Strandläufer.*
Brisson, ornithol. II. p. 250. n. 4. Perdrix de mer du Senegal.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 754. n. 2. Glareola (Senegalensis) rostro pedibusque fuscis, corpore fusco immaculato.
Linné, auserl. Abh. II. p. 280. n. 12. *der braune Kiwitz.*

3. NAEVIA. *Das gefleckte Seerebhuhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 235. n. 3. *das gefleckte Sandhuhn, Rothknussel, Rothknillis.*
Halle, Vögel, p. 487. n. 530. *das rothe Wasserhuhn mit schwarzen Füßen.*
Klein, av. p. 101. n. 9. Glareola, Gallinula Melampus.
Klein, Vorbereit. p. 188. n. 9. *Rothknussel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 9. *Rothknussel.*
Gesner, Vögelb. p. 245. Melampus; *Rotknillis;* mit 1 Fig.
Brisson, ornith. II. p. 250. n. 3. Perdrix de Mer tachetée.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 754. n. 3. Glareola (Naevia) maculis fuscis et albicantibus varia, supra fusca subtus rufa, abdomine imo basique caudae candicantibus.

Verän-

Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das ganze Geschlecht ist hier neu. Die erste und zweyte Gattung sind aus andern Geschlechtern hieher versetzt, die dritte ist neu hinzugekommen. Bey der 1sten Gattung sind fünf Varietäten aus einander gesetzt.

91. GESCHLECHT. Fulica. *Das Wasserhuhn.*

Müller, Natursystem, II. p. 426. Gen. XCI.
Leske, Naturgesch. p. 277. Gen. LVII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 96. Gen. XXIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 216. Gen. LXIII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 438. Gen. XLV.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 236. Gen. XXXIV.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 461.
Neuer Schaupl. d. Natur, IX. p. 563. II. p. 794.
Onomat. hist. nat. III. p. 990.
Brisson, ornitholog. II. p. 350. Gen. LXXXVII. Porphyrio. p. 364. Gen. XC. Fulica.
Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. C.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 766. Gen. LXXX. Gallinula. p. 777. Gen. LXXXIII. Fulica.
Hermann, tab. affin. anim. p. 163.
Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 306. Gen. LVI.

* *Mit gespaltenen Füßen: Meerhühner.*

1. Fusca. *Das braune Meerhuhn.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 426. n. 1. *das braune Wasserhuhn.*

Bechstein,

(3) Soll, nach *Bechstein*, das Weibchen von *Fulica Chloropus*, und das Weibchen desselben ein Junges davon seyn. Schranks

Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. n. 2. *das braune Meerhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 245. n. 2. *das braune Meerhuhn.* p. 247. *welsches Wasserhuhn.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 8. *das dunkelbraune Wasser-Huhn.*

Brisson, ornitholog. II. p. 359. n. 2. petite Poule d'eau.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 771. n. 15. Gallinula (Fusca) fronte flavescente, armillis concoloribus, corpore fuscescente.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 67. n. 136. *das braune Wasserhuhn.*

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 178. n. 1. *das braune Wasserhuhn.*

Frisch, Vögel, Tab. 210. *das Oliven-Wasserhuhn.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 464. n. 5. *das braune Wasserhuhn.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 122. *das weißbauchigte Wasserhuhn.*

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 2. Rallus Italorum.

Jonston, av. p. 147. Rallus Italorum.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 307. n. 1. *das braune Wasserhuhn.*

β. *Das große braune Meerhuhn.* (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 248.

Brisson,

Schranks Wasserhühnchen (Naturf. XVIII. p. 70.) nimmt *Bechstein* für eine *Fulica Chloropus* kurz vor dem ersten Mausern, oder kurz nach demselben an, und rechnet auch *Frisch's Oliven-Wasserhuhn* dahin.

(4) Nach *Brisson* eine eigene Gattung. Nach *Bechstein* vielleicht ein junges Männchen von *Fulica Chloropus*; wenn nicht die Größe im Wege stünde.

Brisson, ornitholog. II. p. 360. n. 3. grande Poule d'eau.

Latham, Syn. III. 1. p. 261. n. 14. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 771. n. 15. β Gallinula fronte flavicante, corpore supra castaneo subtus cinereo, marginibus pennarum albis, capite et collo nigricantibus, imo ventre albo.

4. Chloropus. *Das grünfüßige Meerhuhn.* (5)

Müller, Natursystem, II. p. 428. n. 4. *der Grünfuß.* Tab. 17. fig. 3.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 439. n. 1. *das grünfüßige Meerhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 237. n. 1. *das grünfüßige Meerhuhn.* p. 244. *gemeines Meerhuhn, Wasserhenne, Rothbläßchen, Grünfuß, rothes Blaßhuhn, Rohrhühnlein.*

Halle, Vögel, p. 490. n. 535. *das dunkelbraune große Wasserhuhn, mit nackter rother Stirn und Knie.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 221. n. 208. *die Wasserhenne.*

Onomat. hist. nat. III. p. 993. *das schwarze Wasserhuhn mit grünen Beinen.*

Klein, av. p. 103. n. 2. Rallus aquaticus?

Klein, Vorbereit. p. 191. n. 2. *schwarzer Wassertreter, Wasserläufer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 2. *schwarze Ralle, Thauschnarre.*

Brisson, ornithol. II. p. 358. n. 1. Poule d'eau.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 770. n. 13. Fulica (Chloropus) fronte fulva, armillis rubris, corpore nigricante, crisso albo.

Beseke,

(5) Gewicht des Männchens 14 Unzen. Ein zänkischer und scheuer Vogel, der aber doch sehr zahm und kirre gemacht werden kann.

Beseke, Vögel Kurl. p. 68. n. 139. *der Grünfuß.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 179. n. 3. *das Wasserhuhn mit den grünen Füßen.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 364. *der Grünfuß.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 289. *grünfüßiges Wasserhuhn.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171. n. 2. *Vandhöne.*

Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 10. *das kleine Wasserhuhn.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 123. n. 153. *das grünfüßige Wasserhuhn.*

Naturf. XIII. p. 218. n. 131. *der Grünfuß.* XV. p. 159. *der Grünfuß.* XVIII. p. 234. (Anat.)

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 2. Fulica (Chloropus) fronte alba, corpore nigro, digitis simplicibus.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 217. Fulica (Chloropus) fronte fulva, armillis rubris, pedibus simplicibus, corpore nigricante.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 1. Gallinula, Chloropus.

Kramer, Austr. l. c. *Rohrhennl mit rothem Blaßl, kleines Rohrhennl, Wasserhennl.*

Jonston, av. p. 161. Gallinula Chloropus.

Zinnan. Uov. p. 109. Tab. 29. fig. 98. Gallinella aquatica, Porzanone.

Schäfer, element. ornith. Tab. 36.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 307. n. 2. *das Rothbläschen.*

8. Viridis. *Das grüne Meerhuhn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 638. *das grüne Sultanshuhn.*

Brisson,

Briſſon, ornitholog. II. p. 352. n. 3. Poule-Sultane verte.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 769. n. 12. Gallinula (Viridis) corpore ſupra obſcure viridi ſubtus albo, fronte, roſtro pedibusque viridiflaveſcentibus.

9. MELANOCEPHALA. *Das ſchwarzköpfige Meerhuhn.* (6)

Briſſon, ornitholog. II. p. 352. n. 1. Var. A. Poule-Sultane à tête noire.

Latham, Syn. III. 1. p. 257. n. 10. Black-headed Gallinule.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 768. n. 7. Gallinula (Melanocephala) fronte fulva, corpore caeruleo, capite colloque nigris.

Feuillée journ. p. 288. (edit. 1725.) Gallinula paluſtris.

11. PURPUREA. *Das purpurfarbene Meerhuhn.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 769. n. 11. Gallinula (Purpurea) fronte roſtroque rubente, corpore ſaturate purpureo albo vario.

Jonſton, av. p. 182. *Quachilton, Jacacinthli.*

12. FLAVIROSTRIS. *Das gelbſchnäblige Meerhuhn.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 769. n. 10. Gallinula (Flaviroſtris) fronte rubra, corpore ſupra caeruleo, ſubtus uropygioque albo, remigibus caudaque fuſcis.

5. PORPHYRIO. *Das Sultanshuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 428. n. 5. *der Sultan.*

Halle, Vögel, p. 427. n. 448. *das Sultanshuhn, Purpurhuhn.*

Gatte-

(6) Nach *Briſſon* eine Varietät von *Fulica Porphyrio* n. 5.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 221. n. 209. *der Sultan.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 97. n. 1. *das purpurfarbene Waſſerhuhn.* Tab. 53.

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 634. *das Sultanshuhn, der Purpurvogel.*

Klein, av. p. 104. n. 6. Rallus aquaticus, roſtro, fronte pedibusque rubris, reliquo corpore cyaneo, ſub cauda plumis albis.

Klein, Vorbereit. p. 192. n. 6. *der purpurne Rall.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 106. n. 7. *Purpurralle.*

Briſſon, ornithol. II. p. 351. n. 1. Poule-Sultane.

Gesner, Vögelb. p. 403. *Purpurvogel.* Fig. p. 404.

Batſch, Thiere, I. p. 395. *das purpurfarbne Waſſerhuhn.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 768. n. 6. Gallinula (Porphyrio) fronte rubra, armillis rubris, corpore viridi, ſubtus violaceo.

Pallas, nord. Beytr. I. p. 8. *das perſiſche blaue Huhn.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 9. *das purpurfarbene Waſſerhuhn.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 122. n. 152. *das violette Waſſerhuhn.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 102. *der Purpurvogel.*

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgeſch. I. p. 227. anatomiſche Beſchreib. einer Sultanshenne. Tab. 71. *die Sultanshenne.* Tab. 72. die Zergliederung.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 3. Fulica (Porphyrio) fronte calva, corpore violaceo, digitis ſimplicibus.

Philoſ. Tranſact. XXIII. p. 1395. 19. Chloropus, Acbac.

Charleton, onom. zoic. p. 104. n. 6. Porphyrion.

Jonſton,

Jonston, av. p. 155. Porphyrion.
Aelian. histor. animal. L. 3. c. 41. L. 5. c. 28. Πορφυριων.
Athen. Deipnos. L. 9. c. 10. Πορφυριων.
Aristot. histor. anim. L. 7. c. 6. Πορφυριων.
Martial. Epigr. L. 13. Ep. 78. Porphyrio.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 40. 46. 47. Porphyrio.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 307. *das Sultanshuhn.*

β. F. nigro-violacea, collo subtus cyaneo, fronte pedibusque rubris. *
Latham, Syst. ornithol. II. p. 768. n. 1. β.
Aldrov. III. p. 438. Tab 440. Porphyrio alter.

6. Carthagena. *Das carthagenische Meerhuhn.*
Müller, Natursyst. II. p. 429. n. 6. *das carthagenische Wasserhuhn.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 767. n. 2. Gallinula (Carthagena) fronte caerulea, corpore rufo.

12. Cayennensis. *Das cayennische Meerhuhn.*
Müller, Natursyst. Supplem. p. 119. n. 1. *das cajennische Wasserhuhn.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 767. n. 3. Gallinula (Cayanensis) griseo-fusca, pectore abdomineque superiore rufis, dorso alisque olivaceis, gula albida.

13. Ruficollis. *Das rothhälsige Meerhuhn.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 767. n. 4. Gallinula (Ruficollis) corpore subtus nigro, dorso fusco-viridi, collo subtus pectoreque rufis.

14. Maderaspatana. *Das malabarische Meerhuhn.*
Brisson, ornithol. II. p. 357. n. 10. Poule-Sultane de Madras.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 767. n. 5. Gallinula (Maderaspatana) cinerea, subtus alba, collo subtus et pectore maculis lunatis nigris.

7. MARTINICENSIS. *Das martinikische Meerhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 409. n. 7. *die Langzähe.*

Brisson, ornitholog. II. p. 352. n. 2. petite Poule-Sultane.

Latham, Syst. ornith. II. p. 769. n. 9. Gallinula (Martinica) fronte caerulea, armillis concoloribus, corpore fusco-caerulescente.

Latham, Syn. Suppl. p. 258. Martinico Gallinule.

15. NOVEBORACENSIS. *Das gelbbrüstige Meerhuhn.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 457. n. 327. *die Gelbbrust.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 771. n. 16. Gallinula (Noveboracensis) fusca, scapularibus margine flavescentibus, pectore flavo, abdomine albo.

16. NAEVIA. *Das bunte Meerhuhn.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 22. ad n. 8. *Albins Poliopus.*

Gesner, Vögelbuch, p. 341. Poliopus; *Dessyt*; mit 1 Fig.

Onomat. histor. nat. VI. p. 636. *das kleine Wasserhuhn.*

Brisson, ornithol. II. p. 355. n. 8. Poule-Sultane tachetée.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 772. n. 18. Gallinula (Naevia) fronte crocea, corpore rufescente, nigro-maculato, collo subtus cinereo-caerulescente, maculis nigris, superciliis albidis.

17. MACULATA. *Das gefleckte Meerhuhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 248. n 3. *das gefleckte Meerhuhn.* p. 249. *Rheinvogel, Matkneltzel, Matkern.*
Halle, Vögel, p. 487. n. 53. *das rothe Wasserhuhn.*
Klein, av. p. 101. n. 8. Glareola IX. Schwenkf. Cenchramus; *Matkneltzell* Bellon
Klein, Vorbereit. p. 188. n. 8. *Mattkern, klein Brachvogel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 103. n. 8. *kleiner Brachvogel, Mattkern.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 637. *der Rhein-Vogel.*
Brisson, ornitholog. II. p. 354. n. 7. Poule-Sultane mouchetée.
Gesner, Vögelb. p. 247. Erythra; *Mattkern;* mit 1 Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 772. n. 20. Gallinula (Maculata) fronte flava, corpore fusco-rufescente supra maculis nigris candidisque adsperso, genis, gula colloque subtus albis.
Schwenkfeld, av. Sil. p. 284. Glareola IX. *Mattkern.*
Jonston, av. p. 160. Gallinula Erythra.

18. FLAVIPES. *Das gelbfüßige Meerhuhn.* (7)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 249. n. 4. *das gelbfüßige Meerhuhn.* p. 250. *Schmirrling, Gelbbeinlein.*
Halle, Vögel, p. 485. n. 527. *das rothe Wasserhuhn, mit schwefelgelben Beinen und Augenliedern.*
Klein, av. p. 101. n. 2. Glareola III. Schwenkf.
Klein, Vorbereit. p. 187. n. 2. *Geel-Gelbbeinlein, Schmiering, Geelfüßel.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 103. n. 2. *Gelbbeinlein, Schmirring.*

 Brisson,

(7) Nach *Bechstein* ein Junges von *Fulica Chloropus.*

Brisson, ornith. II. p. 354. n. 6. Poule-Sultane rousse.

Gesner, Vögelbuch, p. 242. Ochropus magnus; *Schmirring;* mit 1 F.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 773. n. 21. Gallinula (Flavipes) fronte calva, corpore supra rufo, maculis nigricantibus vario, subtus albo, capistro genisque candidis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 281. Glareola III. *Schmirring, Geelfüssel.*

19. Fistulans. *Das Glutthuhn.* (8)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 250. n. 5. *das Glutthuhn.*

Brisson, ornith. II. p. 353. n. 4. Poule-Sultane brune.

Gesner, Vögelb. p. 240. Glottis; *Glutt;* m. 1 F.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 773. n. 22. Gallinula (Fistulans) fronte viridi-flavicante, corpore fusco, subtus albo, genis candidis.

Jonston, av. p. 160. Chloropus tertia; *Glutt.*

20. Cinerea. *Das aschgraue Meerhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 773. n. 23. Gallinula (Cristata) fronte cristata rubra, corpore supra cinereo-virescente, subtus apice colloque cinereis, abdomine medio albo.

** *Mit gefiederten, d. i. in kleine auswärts gebogene Lappen, getheilten Füßen. Eigentliche Wasserhühner.*

2. Atra. *Das gemeine schwarze Wasserhuhn.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 427. n. 2. *das russfarbige Wasserhuhn.*

Leske,

(8) Nach *Bechstein* ein Junges, oder das Weibchen von *Fulica Chloropus.*

(9) Gewicht 24 bis 28 Unzen. *Penn.* Der Beyname *russfarbig* kommt ihm wohl nicht zu, da es in der That rabenschwarz ist.

Leske, Naturgesch. p. 277. n. 1. *das schwarze Wasserhuhn.* Tab. 5. fig. 11. (der Fuss.)

Borowsky, Thierreich, III. p. 97. n. 2. *das schwarze Wasserhuhn.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 216. n. 1. Fulica (Atra) fronte incarnata, armillis luteis, corpore nigricante; *das schwarze Blaßhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. n. 3. *das gemeine Wasserhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 251. n. 1. *das gemeine Wasserhuhn.* p. 258. *Bläßhuhn, Blaßhuhn, Bläßchen, Bläßling, Blaßgieker, Pfaffe, Horbel, Bläßente, Rohrhenne, Weißbläße, rußfarbiges Wasserhuhn, glänzender Rabe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 253. *das schwarze Wasserhuhn.*

Halle, Vögel, p. 604. n. 759. *das schwarze Rohrhuhn.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 220. n. 206. *das gemeine Wasserhuhn.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 461. n. 333. *das gemeine Wasserhuhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 991. *das schwarze Wasserhuhn mit breiten Zehenlappen.*

Handbuch d. deutschen Thiergesch. p. 112. *das Bläßlein.*

Klein, av. p. 150. n. 1. Fulica recentiorum.

Klein, Vorber. p. 277. n. 1. *Rohrhahn, Wasserhun, Pfaffe.*

ist. Bloss die untern Deckfedern des Schwanzes sind wie bey der *Ful. Fusca.* Die Indianer um Niagara bereiten die Häute dieser Thiere und gebrauchen sie als Beutel. Nach *Latham* gehört auch *Scopolis Fulica albiventris* (*Gmelin.* System p. 697. n. 1.) als Spielart hieher.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 161. n. 1. *ſchwarz Blaßhuhn*, *Rohrhahn*.

Klein, ſtemm. av. p. 40. Tab. 40. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 36. Tab. 12.

Gesner, Vögelb. p. 44. *Bölchinen*, *Belchinen*, *Belch*, *Florn*, *Pfaff*, *Bleß*, *Bleſſing*, *Hagelganß*, *Schwarztaucher*, *Zapp*. Fig. p. 45.

Briſſon, ornitholog. II. p. 365. n. 1. *Foulque ou Morelle*.

Batſch, Thiere, I. p. 395. *das ſchwarze Waſſerhuhn*.

Latham, Syn. Suppl. p. 259. Common Coot.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 777. n. 1. Fulica (Atra) fronte incarnata, armillis luteis, corpore nigricante.

Beſeke, Naturgeſch. der Vögel Kurl. p. 67. n. 137. *das rußfarbige Waſſerhuhn*.

Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 180. n. 3. *das gemeine Waſſerhuhn*, *Zapp*.

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 364. *das rußfarbige Waſſerhuhn*.

Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 291. *das rußfarbige Waſſerhuhn*, *oder der Bläßling mit der rothen Bläſſe*.

Pontoppidan, Dännemark, p. 171. n. 1. *Bliſshöne*.

Haſſelquiſt, Paläſt. p. 316. n. 34. Fulica atra.

Pallas, nord. Beytr. I. p. 8. *das gemeine Waſſerhuhn*.

Linné, auserleſ. Abhandl. II. p. 298. n. 104. *das ſchwarze Waſſerhuhn*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 121. n. 149. *das Blaßhuhn*, *Weißbläſſe*.

Naturf. XIII. p. 218. n. 130. *das rußfarbige Waſſerhuhn*.

Döbel,

Döbel, Jägerprakt. I. p. 72. *Horbel, Bläß-Ente oder Bläßgen.*

Naumann, Vogelsteller, p. 193. *Hurbel.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 418. *der Bläßling.*

Schneider, zoolog. Abhandl. p. 139. 141. *das schwarze Wasserhuhn.* p. 149. *Kritschäne, Kritschele.*

Meidinger, Vorles. I. p. 135. n. 1. *das schwarze Wasserhuhn.*

Eberhard, Thiergesch. p. 123. *das schwarze Rohrhuhn.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 1. Fulica nigricans.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 1. Fulica (Atra) fronte calva, corpore nigro, digitis lobatis.

Linné, fn. Suec. I. n. 130. Fulica fronte calva aequali.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 216. Fulica (Atra) fronte incarnata, armillis luteis, pedibus pinnatis, corpore nigricante.

Kramer, Austr. p. 357. n. 1. Fulica nigricans, fronte et rostro incarnatis; *Rohrhennl, Blaßl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 263. Fulica; *Wasserhun, Rohr-Henne.*

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 16. Fulica.

Moehring, av. gen. p. 70. n. 78. Fulica.

Jonston, av. p. 146. Fulica. p. 135. Phalaris.

Zinnan. Uov. p. 108. Tab. 19. fig. 96. Falaga o Polon.

Schäfer, element. ornith. Tab. 34.

Plin. hist. nat. L. 18. c. 35. Fulicae.

Varro, de re rust. L. 3. c. 11. Phalarides.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 308. n. 4. *das schwarze Wasserhuhn.*

 3. Ater-

3. Aterrima. *Das große schwärzlich aschgraue Wasserhuhn* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 427. n. 3. *das schwarze Wasserhuhn.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 98. n. 3. *der Meerteufel, das schwärzeste Wasserhuhn.*

Halle, Vögel, p. 605. n. 760. *das schwarze Flußteufelchen.* Fig. 55.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 220. n. 207. *das Blaßhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. n. 4. *das schwärzeste Wasserhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 259. n. 2. *das schwarze Wasserhuhn.* p. 260. *das rußfarbige Blaßhuhn, große Blaßhuhn, Meerteufel, Timphahn.*

Klein, av. p. 151. n. 2. Fulica maior.

Klein, Vorbereit. p. 277. n. 2. *Meer-, Wasserteufel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 161. n. 2. *Meerteufel.*

Klein, Vögeleyer, p. 36. Tab. 12. fig. 3?

Brisson, ornithol. II. p. 366. n. 2. grande Foulque, on Macroule.

Batsch, Thiere, I. p. 395. *der Meerteufel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 778. n. 2. Fulica (Aterrima) fronte alba, armillis rubris, corpore nigricante.

Beseke, Vögel Kurl. p. 68. n. 138. *das schwarze Wasserhuhn.*

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 181. n. 4. *der Wasserteufel, Bläsenörk.*

Scopoli,

(10) Diese Benennung kommt ihm wirklich zu, denn es ist durchaus schwärzlich aschgrau. Nach *Beseke* soll es fast noch einmal so groß als das vorige, nach andern nur um 1/2 Zoll größer seyn. *Bechstein* hält es mit demselben für einerley.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 121. n. 150. Fulica fuliginosa; *das rußfarbene Blaßhuhn.*

Eberhard, Thiergesch. p. 123. *das Flußteufelgen.*

Meidinger, Vorles. I. p. 135. n. 2. *das kohlschwarze Wasserhuhn.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 2. Fulica aterrima.

Charleton, onom. zoic. p. 101. n. 1. Cotta maior.

Barrere, ornitholog. 23. Fulica crasso corpore aterrima.

Jonston, av. p. 147. Fulica, quam Parisienses *Diabolum marinum* vocant.

21. LEUCORYX. *Das weißflüglige Wasserhuhn.* (1)

Latham, Syn. Suppl. p. 259.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 778. n. 1. β. Fulica nigra alis albis.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 258. n. 2.

22. AETHIOPS. *Das Mohrenwasserhuhn.* (2)

Latham, Syn. Suppl. p. 259.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 778. n. 1. γ. Fulica tota nigra.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 258. n. 3.

23. AMERICANA. *Das amerikanische Wasserhuhn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 779. n. 5. Fulica (Americana) fronte albida, corpore cinereo, gula abdomineque medio albis.

24. MEXICANA. *Das mexikanische Wasserhuhn.*

Brisson, ornitholog. II. p. 367. n. 3. Foulque du Mexique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 779. n. 4. Fulica (Mexicana) fronte coccinea, corpore pallide

 virescente

(1) Nach *Latham* u. *Bechstein* eine Varietät von *Fulica Atra.*

(2) Nach *Latham* u. *Bechstein* eine Varietät von *F. Atra.*

virefcente cyaneo et fulvo variegato, fubtus, capite et collo coccineis.

Eberhard, Thiergefch. p. 123. Yohoalcoochillin.

25. Cristata. *Das madagaſcariſche Waſſerhuhn.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 779. n. 3. Fulica (Criſtata) caruncula rubra bifida erecta, armillis tricoloribus, corpore caeruleo-nigricante.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 18 Gattungen vermehrt. Bey der 1ſten Gattung ſind *zwey* Varietäten aus einander geſetzt. Uebrigens ſind die ſogenannten Meerhühner von den eigentlichen Waſſerhühnern getrennt, und beyde in beſondere Unterabtheilungen gebracht.

B. *Unbeſtimmtere Thiere.*

1. *Das kleine geſprenkelte Waſſerhuhn des Friſch.* Tab. 211.

Beſeke, Vögel Kurlands, p. 68. n. 140.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 711. 735. (An Rallus Porzana Linn. S. N. p. 712. n. 3?)

Es iſt wohl ein Schreib- oder Druckfehler, wenn *Friſch*, Tab. 211. in unſerm Syſtem p. 711. bey *Rallus Crex* citirt worden. Offenbar muſs es 212 heiſsen.

2. *Das grünſchnablige Waſſerhuhn.*

Beſeke, Vögel Kurl. p. 68. n. 141.

3. Fulica fronte, roſtri baſi coccinea, armillis nullis, pedibus pinnatis, corpore nigro.

Sander: Naturforſch. XIII. p. 191.

C. *Neue-*

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Das weiße Wasserhuhn von der Insel Norfolk.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 768. n. 8. Gallinula (Alba) fronte, rostro pedibusque rubris, corpore toto albo.
White, Reis. n. Neusüdwales; — in dem Magazin merkw. Reisebeschreib. V. p. 120. Fulica candida; *das weiße Bläßhuhn.*

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT. VAGINALIS. *Der Scheidenvogel.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 441. Gen. XLVII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 182. Gen. LVI.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 774. Gen. LXXXI.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 308. Gen. LVII.

1. ALBA. *Der weiße Hornschnabel.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 442. *der weiße Scheidenschnabel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 182. *der weiße Hornschnabel.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 774. n. 1. Vaginalis Chionis.
Donndorff, Handb. der Thiergeschichte, p. 308. *der weiße Hornschnabel.*

92. GESCHLECHT. PARRA. *Der Spornflügel.*
Müller, Natursyst. II. p. 430. Gen. XCII.
Leske, Naturgesch. p. 277. Gen. LVIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 98. Gen. LIV.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 217. Gen. LXIV.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. Gen. XLVI.

Onomat.

Onomat. hist. nat. VI. p. 171.

Brisson, ornithol. II. p. 242. Gen. LXXI. Jacana.

Batsch, Thiere, I. p. 396. n. 2.

Latham, Syst. ornith. II. p. 762. Gen. LXXIX.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 134. 142.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 309. Gen. LVIII.

1. DOMINICA. *Der Spornflügel von St. Domingo.* (³)

Müller, Natursyst. II. p. 431. n. 1. *der domingische Kiebitz.*

Ebert, Naturl. II. p. 101. *der domingische Spornflügel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 174. Parra dominica.

Brisson, ornitholog. II. p. 241. n. 8. Vanneau armé de St. Domingue.

Latham, Syn. III. 1. p. 165. n. 6. Var. A. Louisiane Sandpiper.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 6. β. Tringa caruncùlata alis armatis, corpore fulvo, subtus rosea, rectricibus fulvis, rostro pedibusque flavis.

6. LUDOVICIANA. *Der louisianische Spornflügel.*

Brisson, ornithol. II. p. 241. n. 7. Vanneau armé de la Louisiane.

Pennant, arct. Zool. II. p. 445. n. 312. *der Waffenträger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 727. n. 6. Tringa (Ludoviciana) carunculata, alis armatis, corpore griseo-fusco, subtus basique caudae albo-rufescente, pileo, remigibus fasciaque rectricum nigris.

7. CAYEN.

(³) Nach *Latham* eine Spielart von der folgenden Gattung.

7. Cayennensis. *Der cayennische Spornflügel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 5. Tringa (Cayanensis) cristata alis armatis, dorso viridi-purpureo, collo rufescente, fronte, gula fasciaque pectoris caudaeque nigris, margine alarum extus, abdomine basique caudae albis.

Fermin, Beschr. v. Surinam, II. p. 175. *Kiebitz.*

8. Goensis. *Der Spornflügel von Goa.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 7. Tringa (Goensis) caruneulata armata fusca, apice collo remigibus fasciaque caudae nigris, linea longitudinali colli, pectore, abdomine, fascia alarum basique caudae albis.

2. Senegalla. *Der senegallische Spornflügel.*

Müller, Natursystem, II. p. 431. n. 2. *der senegallische Kiebitz.*

Ebert, Naturl. II. p. 101. *der senegalische bewaffnete Kiebitz.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 175. Parra Senegalla.

Brisson, ornithol. II. p. 240. n. 6. Vanneau armé du Senegal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 728. n. 8. Tringa (Senegalla) caruneulata armata fusca, gula, remigibus fasciaque caudae nigris, fascia alarum longitudinali, abdomine, basi apiceque caudae albis.

Adanson, R. n. Senegal, p. 64. *Uet-uet.*

9. Chilensis. *Der Theghel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 765. n. 5. Parra (Chilensis) unguibus modicis, pedibus fuscis, occipite subcristato.

Vidaure, Chile, p. 73. *der Threguel oder Keltreu.*

Goeze,

Goeze, nützl. All. III. p. 124. n. 10. *der Lanzettenvogel.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 309. n. 1. *der Theghel.*

9. JACANA. *Die Jacane.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 431. n. 3. *der Nachtkopf.*

Borowſky, Thierreich, III. p. 99. n. 2. *der braune Spornflügel.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 217. n. 1. Parra (Jacana) unguibus poſticis longiſſimis, pedibus virideſcentibus.

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 174. Parra Jacana.

Ebert, Naturl. II. p. 101. *die ſogenannte amerikaniſche Gans mit dem Dornflügel.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 244. n. 4. Chirurgien brun.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 762. n. 1. Parra (Jacana) caſtaneo-purpurea, capite, collo ſubtusque ex nigro violacea, remigibus olivaceo-viridibus, apice fuſco marginatis, rectricibus apice nigro-violaceis.

Fermin, Beſchr. v. Surinam, II. p. 174. *Reuter.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 95. *der Jacan.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 115. n. 1. Anſer chilenſis, ſeu caput nocturnum.

Jonſton, av. p. 187. Jacanae quarta ſpecies.

Jonſton, av. p. 181. Jochualcuachili. (Yohualcuachili.)

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 309. n. 2. *die Jacane.*

10. NIGRA. *Der ſchwarze Spornflügel.*

Halle, Vögel, p. 491. n. 537. *das ſchwarze Waſſerhuhn.*

Briſſon, ornith. II. p. 243. n. 3. Chirurgien noir.

Latham,

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 762. n. 2. Parra (Nigra) nigra, ſubtus fuſca, remigibus viridibus, apice fuſcis, rectricibus nigris.

Jonſton, av. p. 181. Jacanae tertia ſpecies.

11. Brasiliensis. *Der braſilianiſche Spornflügel.*

Halle, Vögel, p. 490. n. 536. *das braſiliſche Waſſerhuhn.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 243. n. 2. Jacane armé, ou le Chirurgien.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 763. n. 3. Parra (Braſilienſis) nigro-viridans, alis ad fuſcum vergentibus, rectricibus nigro-viridantibus.

Jonſton, av. p. 181. Jacanae alia ſpecies, Braſilienſibus *Aquapecaca* dicta.

12. Viridis. *Der grüne Spornflügel.*

Briſſon, ornith. II. p. 242. n. 1. Jacana.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 763. n. 4. Parra (Viridis) nigro-viridans, capite collo pectoreque violaceo-variantibus, rectricibus nigro-viridantibus, tectricibus ſubtus albis.

Jonſton, av. p. 180. Jacana Braſilienſibus.

4. Variabilis. *Der bunte Spornflügel.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 332. n. 4. *der mexicaniſche Kiebitz.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 98. n. 1. *der mexicaniſche Spornflügel.* Tab. 54.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 441. *der mexikaniſche Spornflügel.*

Neuer Schaupl. der Nat. VII. p. 11. n. 7. *Karthaginenſer.*

Halle, Vögel, p. 496. n. 547. *der gehörnte Sporenvogel.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 175. Parra variabilis.

Klein,

Klein, av. p. 104. n. 7. Rallus digitis triuncialibus, calcaneo biunciali, aculeiformi, anomalo. Follata excelſa.

Klein, Vorber. p. 193. n. 7. *Karthaginenſer.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 106. n. 7. *Carthaginenſer Ralle, mit ſonderlicher Hinterzähe.*

Briſſon, ornith. II. p. 245. n. 5. Chirurgien varié.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 763. n. 5. Parra (Variabilis) caſtaneo-purpurea, ſubtus ſuperciliisque albis, remigibus viridibus, faſcia per oculos nigra.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 95. *das Waſſerhuhn mit Flügelſpornen.*

Bankroft, Naturgeſch. von Guiana, p. 104. *das Waſſerhuhn mit Spornen an den Flügeln.*

Mannichf. IV. p. 216. *das bunte Waſſerhuhn* mit *Flügelſporn.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 4. Fulica (Spinoſa) fronte carunculata, corpore variegato, humeris ſpinoſis.

13. Luzoniensis. *Der Spornflügel von der Inſel Luçon.*

Latham, Syn. Suppl. p. 256. Luzonian Jacana.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 764. n. 6. Parra (Luzonienſis) fuſca, ſubtus, ſuperciliis, tectricibus alarum minoribus remigibusque ſecundariis albis, lateribus colli faſcia cinerea, remigibus primoribus tribus elongatis denudatis, apice rhombeis.

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguin. p. 31. *der Wundarzt von der Inſel Luçon;* mit 1 Fig.

14. Africana. *Der afrikaniſche Spornflügel.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 764. n. 8. Parra (Africana) cinnamomea, collo ſubtus albo,

pectore

pectore flavescente nigro vario, vitta per oculos, collo postice remigibusque nigris.

15. SINENSIS. *Der chinesische Spornflügel.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 764. n. 7. Parra (Sinensis) castaneo-vinacea, capite, collo anteriore tectricibusque alarum albidis, collo postico lutescente, remigibus duabus rectricibusque intermediis elongatis.

5. CHAVARIA. *Der neuspanische Spornflügel.*
Müller, Natursyst. II. p. 333. n. 5. *der Krüppel.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 99. n. 3. *der neuspanische Spornflügel.*
Ebert, Naturl. II. p. 102. *der bewaffnete Kiebitz aus Neuspanien.*
Batsch, Thiere, I. p. 396. *der neuspanische Spornflügel.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 171. Parra Chavaria.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 764. n. 9. Parra (Chavaria) crista occipitis dependente, corpore supra fusco, collo abdomineque nigris, temporibus gula albis, alulis spinosis.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 134. 142. Parra Chavaria.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 310. n. 3. *der neuspanische Spornflügel.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *zehn* Gattungen vermehrt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der indianische Spornflügel.*
Latham, Syn. Suppl. p. 257. Indian Jacana.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 765. n. 10. Parra (Indica) caeruleo-nigricans, dorso alisque fuscis, superciliis albis, ad rictum oris macula rubra.

93. GESCHLECHT. RALLUS. *Die Ralle.*

Müller, Natursystem, II. p. 435. Gen. XCIII.
Leske, Naturgesch. p. 271. Gen. LI.
Borowsky, Thierreich, III. p. 100. Gen. LV.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 217. Gen. LXV.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 444. Gen. LI.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 261. Gen. XXXV.
Halle, Vögel, p. 491. Gen. III.
Neuer Schaupl. d. Natur, VII. p. 10.
Onomat. hist. nat. VI. p. 765.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 455.
Klein, av. p. 102. Gen. XIII.
Brisson, ornitholog. II. p. 251. Gen. LXXIV.
Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. XCVIII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 755. Gen. LXXVIII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 142.
Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 310. Gen. LIX.

1. CREX. *Der Wachtelkönig.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 435. n. 1. *der Wachtelkönig.*
Leske, Naturgesch. p. 272. n. 1. *der Wachtelkönig.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 100. n. 1. *der Wachtelkönig.* Tab. 55.

Blumen-

(4) Flügelweite 16 Zoll. *Bechstein.* — Gewicht 6 bis 8 Unzen, nachdem er mager oder fett ist. *Pennant.* Schon beym *Plinius* finde ich die Sage, dass dieser Vogel der Wachteln Heerführer im Strich sey, und davon ist vielleicht die deutsche Benennung entstanden. Brütet drey Wochen.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 217. n. 1. Rallus (Crex) alis rufo-ferrugineis; *Wachtelkönig, Schnerz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 444. n. 1. *der Wachtelkönig.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 262. n 1. *der Wachtelkönig.* p. 267. *Ralle, Schnarrwachtel, Wiesenknarrer, Wiesenschnarcher, Arpschnarp, Feldwächter, Gras- und Wiesenläufer, Schnarrichen, Schnarker, Schars, Schrecke, der alte Knecht, Eggenschär, Grasrätscher, Schnarf, Kreßler, Heckschnärr, Grösel, Schnärz.*

Ebert, Naturl. II. p. 103. *der Wachtelkönig.*

Halle, Vögel, p. 492. n. 539. *der Wiesenknarrer.* Fig. 37.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 222. n. 211. *die Ralle.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 408. *Wachtelkönig.*

Onomat. hist. nat. V. p. 768. *der gemeine Wachtelkönig.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 458. A. *der Wachtelkönig.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 308. n. 3. *der Wachtelkönig.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 112. *der Wachtelkönig.*

Klein, av. p. 102. n. 1. Rallus terrestris, vulgo Rex Coturnicum.

Klein, Vorber. p. 190. n. 1. *Gras-, Wiesenläufer, alte Knecht, Schryck.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 1. *Wachtelkönig.*

Klein, stemmat. av. p. 22. Tab. 23. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 31. Tab. 12. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 52. *Crex.* p. 542. *Wachtelkönig*; mit 1 Fig.

Brisson, ornithol. II. p. 253. n. 3. Rale de genet ou Roi de Cailles.

Batsch, Thiere, I. p. 394. *der Wachtelkönig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 766. n. 1. Gallinula (Crex) grisea, pennis medio nigricantibus, alis rufo-ferrugineis, corpore subtus albo rufescente.

Beseke, Vögel Kurl. p. 68. n. 142. *der Wachtelkönig.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 176. n. 1. *der Wachtelkönig, Wachtelkönning.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 88. n. 116. *Wachtelkönig, der schwarze Casper.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 286. *der Wachtelkönig.*

White, Naturgesch von England, p. 34. n. 15. p. 59. n. 17. *Wachtelkönig.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 366. *der Wachtelkönig.*

Linné, auserl. Abh. II. p. 282. n. 31. p. 297. n. 90. *der Wachtelkönig.*

Pontoppidan, Dännem. p. 171. n. 1. *Skovsnarre, Akerrixe.*

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 123. *Aker-Rixe, Ager-Hön.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 58. *Schnertz.*

Naumann, Vogelsteller, p. 177. *Wachtelkönig.*

Hervieux, Canarienvögel, p. 181. *Wachtelkönig.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 124. n. 154. *die Schnarre.*

Schwed. Abh. XXXVIII. p. 294. *Wiesenknarrer.*

Naturf. XIII. p. 220. n. 134. *der Wachtelkönig.*

Meidinger, Vorles. I. p. 131. n. 1. *der Wachtelkönig.*

Zorn,

Zorn, Petinoth. I. p. 549. II. p. 284. *Schnarre.*
Schriften der dronth. Gesellschaft, II. p. 308. 311. *Ager-Rixe.*
Eberhard, Thiergesch. p. 97. *der Wachtelkönig.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1350. *Wachtelkönig.*
Hannöv. Magazin, 1780. p. 416.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 105.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 1. Crex.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 153. n. 1. Rallus (Crex) alis rufo-ferrugineis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 218. Rallus (Crex) alis rufo-ferrugineis.
Charleton, onomast. zoic. p. 106. n. 3. Crex. p. 75. n. 14. Ortygometra.
Schwenkfeld, av. Sil. p. 313. Ortygometra; *Schnerber, Wachtel-König.*
Moehring, av. gen. p. 73. n. 85. Ortygometra.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 142. Rallus Crex.
Schäfer, element. ornith. Tab. 60.
Zinnan. Uov. p. 36. Tab. 5. fig. 18. Re delle Quaglia.
Decouv. Russ. I. p. 470.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 23. Ortygometra.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 310. n. 1. *der Wachtelkönig.*

β. *Brisson*, ornitholog. II. p. 253. n. 5. Poule-Sultane roussâtre. (5)

γ. *Latham*, Syn. III. 1. p. 251. n. 1. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 767. n. 1. β. Gallinula corpore rufo-fusco, subtus pallidiore, remigibus caudaque saturatioribus, gula crissoque albidis.

(5) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

δ. *Latham*, Syn. III. 1. p. 252. n. 1. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 767. n. 1. γ. Gallinula corpore supra rufo griseo, subtus tectricibusque alarum ferrugineo-fuscis, pedibus obscuris.

2. AQUATICUS. *Die große Wasserralle.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 436. n. 2. *die große Wasserralle.*

Leske, Naturgesch. p. 272. n. 2. *die große Wasserralle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 102. n. 2. *der große Wasserralle.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 445. n. 2. *der große Wasserralle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 267. *die große Wasserralle*, p. 271. *die schwarze Wasserstelze, das Sammthuhn, Miethuhn, schwarze Wassertreter, kleine Wasserhühnchen, Thauschnarre, schwarze Caspar.* Tab. 14.

Ebert, Naturl. II. p. 103. *die größere Wasserralle.*

Halle, Vögel, p. 493. n. 540. *der graue Wiesenknarrer.*

Halle, Vögel, p. 493. n. 541. *die schwarze Wasserstelze.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 222. *die große Wasserralle.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 766. *die große Wasserralle.*

Klein, av. p. 103. n. 2. Rallus aquaticus.

Klein,

(6) Kömmt als Zugvogel in der Mitte des Aprils zu uns, und verläst uns zu Ende des Septembers wieder. Nistet auf trocknen Hügeln in Sümpfen und an feuchten Teich- und Seeufern. Legt 8 bis 12 Eyer. Das Fleisch ist sehr schmackhaft.

Klein, Vorbereit. p. 191. n. 2. *ſchwarzer Waſſertreter, Waſſerläufer.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 105. n. 2. *ſchwarze Ralle, Thauſchnarre.*

Klein, ſtemmat. av. p. 22. Tab. 23. fig. 1. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 251. *Sammethünlein*; m. 1 F.

Briſſon, ornitholog. II. p. 251. n. 1. Râle d'eau.

Batſch, Thiere, I. p. 394. *die groſse Waſſerralle, das Sammthuhn.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 755. n. 1. Rallus (Aquaticus) alis griſeis, fuſco-maculatis, hypochondriis albo maculatis, roſtro ſubtus fulvo.

Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 176. n. 2. *die Waſſerralle.*

Bock, Naturgeſch. von Preuſſen, IV. p. 367. *die groſse ſchwarze Waſſerralle.*

Cetti, Sardin. II. p. 287. Rallus aquaticus.

Pennant, R. d. Schottl. I. p. 18. *Aſchhühner.*

Linné, auserleſ. Abh. II. p. 296. n. 91. *die Waſſerralle.*

Pontoppidan, Naturgeſch. v. Dännemark, p. 171. n. 2. *Vagtelkonge, Vandrixe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 125. n. 155. *der Waſſerrall.*

Naturf. XIII. p. 221. n. 135. *die groſse Waſſerralle.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 421. *das Sammet-Hünlein.*

Meidinger, Vorleſ. I. p. 131. n. 2. *die groſse Waſſerralle.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 97. *der Wieſenknarrer, Sammthuhn.*

Schriften der dronth. Geſellſch. II. p. 308. *Vandhöne* oder *Waſſerhuhn.* Tab. 12.

Linné, Syſt. Natur. Edit. VI. p. 25. n. 1. Ortygometra alis fuſcis.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 153. n. 2. Rallus (Aquaticus) alis griseis, fusco maculatis, hypochondriis albo maculatis, rostro luteo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 219. Rallus (Aquaticus) alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis albo maculatis, rostro subtus fulvo.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 4. Gallinula serica.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 283. Glareola VII. *Aesch-Hünlein?*

Jonston, av. p. 160. Gallinula serica.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 142. Rallus aquaticus.

Schaefer, element. ornithol. Tab. 60. (caput.)

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 311. n. 2. *die große Wasserralle.*

3. Porzana. *Die kleine Wasserralle.*

Müller, Natursystem, II. p. 437. n. 3. *die kleine Wasserralle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 102. n. 3. *die kleine Wasserralle.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 445. n. 3. *der mittlere Wasserralle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 271. *der mittlere Wasserralle.* p. 273 *kleine europäische Wasserralle, Winkernell, Graßhuhn, Makosch.* Tab. 15.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 222. n. 213. *die kleine Wasserralle.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 771. *die kleine europäische Wasserralle, Winkernell.*

Klein, Vögeleyer, p. 31. Tab. 12. fig. 2. (Rallus alter, Casparus.)?

Gesner, Vögelb. p. 248. Ochra; *Wynkernnel.*

Brisson,

Briſſon, ornitholog. II. p. 252. n. 2. petite Râle d'eau ou la Marouette.

Batſch, Thiere, I. p. 394. *die kleine Waſſerralle.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 772. n. 19. Gallinula (Porzana) fuſco-olivacea, nigro albidoque variegata et maculata, ſubtus cinerea, albido varia, rectricibus duabus intermediis albo-marginatis.

Siemſſen, meklenburg. Vögel, p. 177. n. 3. *die Wieſenſchnarre.*

Friſch, Vögel, Tab. cit. *das kleine geſprenkelte Waſſerhuhn.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgeſch. I. p. 117. n. 144. Tringa Porzana.

Meidinger, Vorleſ. I. p. 131. n. 3. *die kleine Waſſerralle.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 108. n. 5. *Porzana* Italorum.

Jonſton, av. p. 160. Gallinula Ochra.

Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 311. *die kleine Waſſerralle.*

12. Crepitans. *Die Klapperralle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 455. n. 324. *die Klapperralle.* Tab. 20. kleinere Fig.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 756. n. 2. Rallus (Crepitans) olivaceo-fuſcus, gula alba, collo ſubtus pectoreque fuſco-flaveſcentibus, hypochondriis cinereo alboque transverſim lineatis.

13. Troglodytes. *Die neuſeeländiſche Ralle.*

Iſt, nach *Latham*, mit *R. Auſtralis* p. 717. n. 18. einerley.

4. Fuscus. *Die braune Ralle.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 437. n. 4. *die braune Ralle.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 769. *die braune Ralle.*
Brisson, ornithol. II. p. 256. n. 7. Râle brun des Philippines.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 757. n. 6. Rallus (Fuscus) fuscus, crisso albo undulato, pedibus flavis.
Naturf. XIII. p. 221. n. 13. *die braune Ralle.*
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 367. *die braune Ralle.*

5. Striatus. *Die gestreifte Ralle.* (7)
Müller, Natursyst. II. p. 537. n. 5. *die gestreifte Ralle.* Tab. 17. fig. 5.
Onomat. hist. nat. VI. p. 772. *der gestreift Ralle.*
Brisson, ornithol. II. p. 255. n. 5. Râle rayé des Philippines.
Latham, Syn. III. 1. p. 232. n. 4. Var. C.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 756. n. 4. γ. R. nigricans albo-undulatus, pedibus flavis.

6. Torquatus. *Die Ringelralle.*
Müller, Natursystem, II. p. 438 n. 6. *die Ringelralle.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 102. n. 4. *die Ringelralle.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 772. *die Ringelralle.*
Brisson, ornith. II. p. 255. n. 6. Râle à collier des Philippines.
Batsch, Thiere, I. p. 394. *die Ringelralle.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 757. n. 5. Rallus (Torquatus) fuscus, subtus albo-undulatus, linea infra oculos alba.

7. Philippensis. *Die philippinische Ralle.*
Müller, Naturs. II. p. 438. n. 7. *die bandirte Ralle.*
Onomat.

(7) Nach *Latham* eine Varietät von *Rallus Philippensis* n. 7.

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 770. *die gröſsere philippiniſche Ralle.*

Briſſon, ornithol. II. p. 254. n. 4. Râle des Philippines.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 756. n. 4. Rallus (Philippenſis) fuſcus ſubtus griſeo-faſciatus, ſuperciliis albis, collo ſubtus rufeſcente.

β. *Latham*, Syſt. ornithol. II. p. 756. n. 4. β. R. rubro-fuſcus, nigro alboque maculatus et ſtriatus, capite caſtaneo, corpore ſubtus ſuperciliisque cinereis.

γ. *Latham*, Syn. III. 1. p. 332. n. 4. Var. B.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 757. n. 4. δ. R. fuſcus albo-maculatus et ſtriatus, ſubtus albus, ſuperciliis griſeis, cauda fuſco alboque faſciata.

δ. R. ſupra fuſcus, ſubtus cineraſcens, dorſo alisque albo maculatim lineatis, abdomine imo albo faſciis nigricantibus. *

Latham, Syn. Suppl. p. 225. n. 4. Var. D.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 757. n. 4. ε.

8. Bengalensis. *Die bengaliſche Ralle.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 438. n. 8. *die bengaliſche Ralle.*

Halle, Vögel, p. 494. n. 542. *die braungrüne Waſſerſtelze.*

Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 768. *die Ralle aus Bengala.*

Klein, av. p. 104. n. 5. Rallus aquaticus bengalenſis.

Klein, Vorbereit. p. 192. n. 5. *bengaliſche Ralle.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 106. n. 5. *bengaliſche Waſſerralle.*

Briſſon,

(8) Nach *Latham* eine Varietät von *Scolopax Capenſis.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 266. n. 9. Chevalier de Bengale.

Latham, Syn. III. 1. p. 140. Var. D. Bengal Water-Rail.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 717. n. 10. δ. Scolopax albus capite colloque nigro, alis dorſoque viridibus, remigibus primariis rubro maculatis.

9. CAROLINUS. *Das Lerchenhuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 439. n. 9. *die caroliniſche Ralle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 456. n. 326. *das Lerchenhuhn.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 768. *die caroliniſche Waſſerralle.*

Klein, av. p. 103. n. 4. Rallus terreſtris americanus.

Klein, Vorbereit. p. 192. n. 4. *braune Ralle aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 106. n. 4. *braune Erdralle.* n. 8. *Ralle aus der Hudſonsbay.*

Briſſon, ornitholog. II. p. 356. n. 9. Poule-Sultane de la Baye de Hudſon.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 771. n. 17. Gallinula (Carolina) griſea, capiſtro nigro, pectore plumbeo, roſtro flavo, pedibus vireſcentibus.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 40. *braune Ralle.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 39. *das kleine amerikaniſche Waſſerhuhn.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 311. n. 4. *das Lerchenhuhn.*

14. PHOENICURUS. *Die rothgeſchwänzte Ralle.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 770. n. 14. Gallinula (Phoenicura) fronte incarnata, corpore

nigro

nigro, vertice ſubtus geniſque albis, criſſo caudaque ferrugineo - rubris.

Naturforſch. I. p. 273. n. 9. *das rothgeſchwänzte Waſſerhuhn.*

β. Latham, Syſt. ornithol. II. p. 770. n. 14. *β*. Gallinula fronte rubra, corpore cinereo - nigricante ſubtus albo, abdomine imo criſſoque rufis.

γ. Latham, Syn. III. 1. p. 260. n. 13. Var. B.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 771. n. 14. *γ*. Gallinula fronte alba, corpore ſupra nigro - nitente, ſubtus albo, criſſo rubro.

10. Virginianus. *Die virginiſche Ralle.* (9)

Müller, Naturſyſtem, II. p. 439. n. 10. *die virginiſche Ralle.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 773. *die amerikaniſche Landralle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 455. n. 325. *die virginiſche Ralle.*

Briſſon, ornithol. II. p. 257. n. 8. Rallus Virginianus; *Râle de Virginie.*

Briſſon, ornithol. II. p. 257. n. 9. Rale de Penſylvanie.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 755. n. 1. *β*. R. ſuperne fuſcus, infra fuſco - rufeſcens, rectricibus fuſcis, ſuperciliis gulaque albis.

Latham, Syn. III. 1. p. 228. Virginian Rail.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab 69. *der amerikaniſche Waſſerſchnepf oder Wachtelkönig.*

15. Ferrugineus. *Die rothbrüſtige Ralle.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 758. n. 7. Rallus (Ferrugineus) nigricans, ſubtus cinereus, collo pectore-

(9) Nach *Pennant* und *Latham* eine Varietät von *Rallus Aquaticus* n. 2.

pectoreque ferrugineis, hypochondriis albo transverſim lineatis, ſuperciliis pallidis.

15. Capensis. *Die capſche Ralle.*
Müller, Naturſyſt. Supplem. p. 120. n. 11. *die capſche Ralle.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 758. n. 8. Rallus (Capenſis) ferrugineus, ſubtus albo nigroque faſciatus.

16. Caerulescens. *Die bläuliche Ralle.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 758. n. 9. Rallus (Caeruleſcens) fuſco-ruber, corpore ſubtus albo, collo antice pectoreque pallide caeruleis, hypochondriis albo nigroque transverſim lineatis.

17. Zeylanicus. *Die zeylaniſche Ralle.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 758. n. 10. Rallus (Zeylanicus) ferrugineus, ſubtus pallide ruber fuſco-nebuloſus, capite nigricante, roſtro pedibusque rubris.

18. Australis. *Die neuſeeländiſche Ralle.* (10)
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 756. n. 3. Rallus (Auſtralis) cinereo-ferrugineus, alis caudaque ſaturate brunneis, pennis nigro-faſciatis.

19. Pacificus. *Die Ralle von den Inſeln des ſtillen Oceans.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 758. n. 11. Rallus (Pacificus) niger, albo punctatus, alis faſciatis. corpore ſubtus albido, capite fuſco, pectore cinereo-caeruleſcente.

20. Ta-

(10) Ich behalte die deutſche Benennung von n. 12. p. 713 hier bey, weil *Latham* ſelbſt ſeinen *Troglodyte Rail* mit *Rallus Auſtralis Sparrm.* für einerley ausgiebt.

20. Tabuensis. *Die Ralle von Tonga-tabu.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 759. n. 12. Rallus (Tabuenſis) corpore toto nigro, ſubtus pallidiore, palpebris iridibusque rubris.
β. *Latham*, Syſt. ornithol. II. p. 759. n. 12. β. R. fuſco-nigricans, criſſo albo nigroque, faſciis nigris, pedibusque rubris.

21. Niger. *Die ſchwarze Ralle.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 759. n. 13. Rallus (Niger) corpore toto fuſco-nigricante, roſtro flavo, pedibus rubris.

22. Sandwichensis. *Die Ralle von den Sandwichinſeln.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 759. n. 14. Rallus (Sandvicenſis) pallide ferrugineus, ſupra maculis obſcuris, roſtro pedibusque cinereis.

23. Tahitiensis. *Die otaheitiſche Ralle.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 759. n. 15. Rallus (Taitienſis) cinereus, corpore ſupra rubrofuſco, gula remigibusque latere exteriore albis, cauda nigra.

24. Obscurus. *Die dunkelbraune Ralle.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 759. n. 16. Rallus (Obſcurus) fuſco-ferrugineus, ſtriis nigris, ſubtus ferrugineo-fuſceſcens, pedibus rubrofuſcis.

25. Longirostris. *Die langſchnäblige Ralle.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 759. n. 17. Rallus (Longiroſtris) corpore ſupra cinereo fuſco maculato, ſubtus ferrugineo-albo, hypochondriis albo transverſim undatis, roſtro elongato ferrugineo.

26. Varie.

26. VARIEGATUS. *Die schwarz und weißbunte Ralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 760. n. 20. Rallus (Variegatus) nigro alboque maculatim variegatus, remigibus caudae fuscis, tectricibus alarum fuscis albo striatis.

27. CAYENNENSIS. *Der Kiolo.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 760. n. 21. Rallus (Cayanensis) olivaceo-fuscus, vertice subtusque rufus, genis nigricantibus, remigibus nigris.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 312. n. 5. *der Kiolo.*

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 238.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 761. n. 1. β. R. fuscus, corpore subtus et vertice castaneo, genis cinereis, gula crissoque albidis.

28. JAMAICENSIS. *Die jamaicaische Ralle.*

Brisson, ornitholog. II. p. 258. n. 10. Râle de la Jamaique.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 761. n. 22. Rallus (Jamaicensis) fusco-rufescens, taeniis nigricantibus, collo subtus pectoreque caerulescente, capite nigro, abdomine, femoribus hypochondriisque fusco alboque undatis.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 68. *das kleine Wasserhuhn.*

29. MINUTUS. *Die kleine cayennische Ralle.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 761. n. 23. Rallus (Minutus) fuscus, subtus flavescens, dorso alisque maculis striisque pallidis, superciliis fasciisque hypochondriorum et caudae albis.

β. *Latham*,

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 240. n. 21. Var. A.
Latham, Syſt. ornithol. II p. 761. n. 23. β. Rallus fuſcus dorſo faſciolis albis, corpore ſubtus albido, abdomine et hypochondriis albo nigroque undulatis.

30. Pusillus. *Die tauriſche Ralle.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 446. n. 4. *die kleine Waſſerralle.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 274. n. 4. *die kleine Waſſerralle.* p 276. *das kleine Waſſerhühnchen, Sumpfſchnerze.* Tab. 16.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 761. n. 24. Rallus (Puſillus) ferrugineo nigroque lituratus, corpore ſubtus nigro faſciolis albis, iugulo pectoreque caeruleſcentibus.
Pallas, Reiſe, Ausz. III. Anh. p. 11. n. 30 Rallus puſillus.

31. Barbaricus. *Die Ralle aus der Barbarey.*
Latham, Syſt ornithol. II. p. 760. n. 18. Rallus (Barbaricus) fuſcus, alis albo-maculatis, uropygio albo nigroque vario, criſſo albo.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit 21 Gattungen vermehrt. Bey der 1ſten Gattung ſind *vier*, bey der 7ten *drey* Varietäten aus einander geſetzt.

B. *Unbeſtimmtere Thiere.*

1. *Die unbeſtimmte Ralle.*
Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 760. n. 19. Rallus (Dubius) fuſco ferrugineoque lituratus,

abdomine albo, hypochondriis fuscis ferrugineo-cinerascente fasciatis, remige prima extus longitudinaliter alba.

94. GESCHLECHT. PSOPHIA. *Der Trompetenvogel.* (Knarrhuhn.)

Müller, Natursyst. II. p. 440. Gen. XCIV.

Leske, Naturgesch. p. 278. Gen. LXII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 217. Gen. LXVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 442. Gen. XLVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 657. Gen. LVIII.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 312. Gen. LX.

1. CREPITANS. *Der Agami.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 440. *der Farzer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 81. n. 1. Grus Psophia, *der Trompetenvogel, das Knarrhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 218. n. 1. Psophia (Crepitans) nigra, pectore columbino; *der Agami, Mackukawa.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 442. *der Trompetenvogel.*

Bechstein,

(1) Hier findet sich in mancher Rücksicht eine grosse Verwechselung der Synonymen bey den Ornithologen; besonders zwischen dieser Gattung und *Tetrao Maior* Gmel. p. 767. n. 63 In der XIIten Edition rechnete *Linné* die *Macucagua* des *Raj. Marcgr. Pis.* und *Will.* mit hieher, die auch *Brisson* bey seinem *Perdix maior Brasiliensis* anführt. In der XIII. Edition sind diese Synonymen zu *Perdix Maior* gezählet — Von dem *Caracara* sagt *Büffon* selbst, dass es der *Agami* nicht sey, und auch *Latham* hat den *Caracara* des *Büffon* und *du Tertre* bey dem *Agami* nur zweifelhaft aufgeführt.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 183. *der Trompetenvogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 149. *Trompetenvogel.*

Onomat. hiſtor. nat. VI. p. 697. *das Knarrhuhn.* p. 699. *Blähungshuhn.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 104. n. 17. *blähender Strandläufer.*

Briſſon, ornithol. I. p. 64. n. 5. *große Perdrix du Breſil.*

Briſſon, ornitholog. I. p. 75. n. 2. Faiſan des Antilles.

Batſch, Thiere, I. p. 393. *das Knarrhuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 309. *der Karakara.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 203. *der Agami;* mit 1 Figur.

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 657. n. 1. Pſophia (Crepitans) nigra, dorſo griſeo, pectore caeruleo-viridi ſplendente, orbitis nudis rubris.

Pallas, Naturgeſch. merkwürd. Th. IV. p. 5. Grus Pſophia. — p. 8 *der Trompetenvogel oder der Trompeter, Mucucaqua, die knarrende Pſophia.* Tab. 1.

Fermin, Beſchreib. von Surinam, II. p. 141. *der Trompetenvogel.*

Reiſ. der Miſſionar. (von Murr) p. 232. *Trompetero.*

Samml. zur Phyſ. und Naturgeſch. III. p. 104. *der Agami.*

Condamine Reiſ. p. 261. *der Trompeter.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 154. n. 1. Pſophia (Crepitans).

Voſmaer, monogr. Amſt. 1768. Trompette Americain; mit Abbild.

Hermann,

Hermann, tab. affinit. animal. p. 133. Psophia Crepitans.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 312. *der Agami.*

2. UNDULATA. *Der afrikanische Trompetenvogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 225. Undulated Trumpeter.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 657. n. 2. Psophia (Undulata) cristata undulata, subtus alba, pennis pectoralibus dependentibus.

Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit *einer* Gattung vermehrt.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Donndorff, Johann August,

Zoologische Beyträge zur XIII. Ausgabe des Linneischen Natursystems

Bd.: Zweiter Band

Leipzig 1794

Zool. 128-2,1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307066-2
VD18 90665589